





*Henrici effigies huius sacrorum clarissimi
Regis auctoritate nostra, litteris, et
seal.*



HENRICO III. GALLIÆ
ET NAVARRÆ REGI
CHRISTIANISSIMO
ET INVICTISSIMO;
ANDREAS LAVRENTIVS S.



QVOD foelix faustumque fit (Rex Christianissime & inuictissime) tandem optatus ille iamdudum expectatæ Pacis dies, tibi & bonis omnibus illuxit. Fruere nunc iucundissimo laborum tuorum fructu: viue beatissimam vitam tibi; viue tuis; viue vniuersæ reipublicę Christianæ. Tu enim vnus es, quo nititur omnis omnium salus: te omnes gentes, quæ lucis vsura fruuntur, admirantur, suspiciunt; ac ne ipse quidem Sol mundi oculus, quicquam te augustius, aut aspexit innumerabilibus iam seculis, aut aspiciet vnquam. Itaque dum ciuilibus bellis arderent omnia, vt, magnitudine animi penè incredibili, insanientium quorundam impetus cohibuisti; prudentia verò & clementia singulari, cæterorum omnium ora, vultus, animos conciliaisti; qui solus nosti

Pacique imponere metam:

Parcere subiectis eg debellare superbos:

ita nunc, Pacis tempore, iustitiam & pietatem cole; virtutis studiosos & Musarum alumnos amplectere; & qui iacentem armorum gloriam nuper subleuasti; nunc penè extinctas, aut certè in exilium relegatas bonas literas in pristinum honorem splendorémque restitue. Scio te id ardentissimis votis exoptare. Egregium iam propensi tui in rem literariam animi specimen præbuiisti. Præclara in Regio Monspeliensium Medicorum collegio Regiæ tuę liberalitatis extant monumenta, quæ subticere nec possum, nec debeo. Quid enim est eorum quæ ad Academiæ illius dignitatem, ornamentum, incrementum spectare videbantur, quod non præstiteris? Necessarius erat in celeberrima totius Europæ schola Anatomicus & Botanicus professor: Tu primus doctorem qui vtramque artem profiteretur & doceret publicè, propo-

fitis amplissimis præmiis instituisti : atque vt illustrior esset vtraque professio, Anatomico quidē doctōri, dissectorem chirurgum Regiis & titulo, & stipendiis decoratum præbuiisti ; Botanico autem hortum construendum curasti, qui nunc arborum, fruticum, herbarum, florum, quæ illic ob cœli & soli clementiam quasi sponte nascuntur & ybique luxuriant varietate, iam est aridens fructuosusque. Chirurgiæ etiam & Pharmaciæ professorem publicum tu primus, me postulante, in tuorum numerum ascripsisti ; & cū aliquando Maiestati tuæ indicassem professorum stipendia minora esse, quàm & Academiæ celebritas, eorumdēque in docendo industria, assiduitas & labor improbus postulerent, tu statim liberali manu ea auxisti, in pignus certum futuræ beneficentiæ largioris. Te igitur ob præclara hæc in Medicos beneficia tanquam numen aliquod, Apollinæ artis alumni omnes nunc & in posterum venerentur ; tibi epinicia canant ; tortiles nexu Ogygio ex salutaribus herbis, panace, moly, anthora, vincetoxico & similibus corollas struant, quibus redimitus, morborum insultus omnes arcere, venenis resistere & Nestoreos annos viuere possis. Ego sanè quamdiu spiritus hos reget artus, Regiæ animi tui dotes & singulare in rem publ. litterariâ studium scripto & verbis profiteri non desinam. Cur enim fileam, quod sæpè in mediis bellorum ciuiliū flammis (dictu mirum) nos de humani corporis structura differentes attentè audiueris ? Annon hoc aliquando habuisti in deliciis, mirabile cordis, aurium, oculorum artificium ipsis oculis intueri ? Sic Alexander ille magnus, Marcus Antoninus Imperator, Ptolomeus aliique Ægyptiorum reges, Boëtius & Paulus Sergius Romani Consules cadauerū sectionibus affuisse & Anatomicam artem excoluisse dicuntur. Hæc enim partium contemplatio quemque nostrum ad Dei primum, deinde ad sui ipsius cognitionem quasi manu ducit. Scripsit ad Alexandrum libros de historia & partibus animalium Aristoteles : ego solius hominis, quem *ζῷον ζωνύματον*, animal adorandum & augustum Dei templum dicunt, structuram describo, tibi que magno seculi huius miraculo & Dei in terris simulacro voueo consecrōque. Magnum sanè est opus & indefessi laboris, in Academia tua Monspelienſi natum, in Aula tua, in castris tuis, in ipso armorum strepitu educatū illustratūque. Tibi ergo debetur meritò. Tuū est potius quàm meum. Tua interest à virulentis liuidisque calumniatorum morſibus illud defendere. Hoc si feceris, Zoilus illa rumpet, nobisque ad grauiora & altiora capeſſenda animos addes.



STVDIOSO LECTORI ANDREAS

LAVRENTIVS SAL.

EDIDERAM (*candide Lector*) superioribus annis amicorum precibus euictus opera quadam Anatomica; qua cum laudari à multis viderem; ego verò dum ea perlegerem mihi ipsi non satis facerem, incudi illa reddere & iterum tundere visum fuit. Multa in historia Anatomica desiderabantur, quae in opere hoc videbis satis accuratè expressa. Similares enim particulas sparsim & confusè satis descripseram, nunc ordine singulas percurro, & ex illis tanquam medicis & sensibilibus elementis totum corpus compono, idque libris quatuor. Totum hoc in dissimilares partes resoluo, in organa scilicet naturalia, vitalia, animalia & artus, idque libris septem. Est autem instituti mei haec ratio. Historiam cuiusque partis primum describo, dein quaecunque in ea occurrunt inuoluta summeque ardua aperio, & controuersias omnes Anatomicas, commentariorum instar, attexo. Hippocratis & veterum libros Anatomicos multis difficultatum inuolucris implicitos explico; Galenum à recentiorum penè innumeris calumniis vindico, non ita tamen ut ei plus faueam quàm veritati. Ego enim hactenus is fui, qui nullius iurare in verba magistri assueui. Multa prioribus seculis incognita & diligenti nostra obseruatione animaduersa in apertam lucem profero. Quia verò figurarum inspectio multorum oculos oblectat, nec omnino tyrunculis est inutilis, precipuas & communiores depingendas curavi, nouas etiam addidi, ut eas quae vteri vasa spermatica à nemine adhuc descripta, spinalis medulla & nervorum ab ea prodeuntium diuarcationem, cordis in fœtu & recens natis anastomoses, venarum porta & caua communiones delineant. Accipe igitur (*studiose Lector*) nouum hoc opus libris septem auctum & ducentis ferè capitibus illustratum; in quo exarando, si paulo longior fui quàm postulares, rogo te per candorem animi tui, ne genium nostrum & propensum in quatuorpes studium accuses; sed multa condonès nobis, cum & aulicae occupationes, & armorum strepitus, & ea quam Regi nostro debeo assiduitas, saepe animum à studiis & manum à calamo auocarint. Bene vale, & iucundissimis nostris laboribus diu fruiere. Datum in aula Regia anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo nono.



AD ANDREAM LAVRENTEM COLLEGAM,
DE EDITA AB IPSO *μικροκοσμογενής*,
CARMEN.

VT Pullos nido paucos excludat ab onis
Chrysaëtos volucrum regia scepra tenens,
Nonnullum è paucis tamen exturbare suavit
Exaëton cuius senserit esse genus;
At solis qui contra merâ splendentia luce
Sustinet expansis cernere luminibus,
Gnemon hic, aquila demum germana propago
Vnica solliciti cura parentis erit.
Hæc Iouis æthereas inter se condere nubes
Gessit aus, gessit solis adire vias,
Mox summo validum suspendit in aëre Corpus
Atque leues contra nititur una Notos.
Haud secus & vatum qui dant sua nomina Phæbo
E paucis paucos gaudet amare Deus;
Quin si quis claras soteris Apollinis artes
Culpa infelicis, deterat ingenij,
Famam huius (cùm sit Medicus de nomine tantum))
Iratæ tradet ludibrium Zephyris.
Non ita te, LAVRENS, tam parvo amplexus amore est.
E cuius Lauro nomen & omen habes;
Fecit ut imbueret calamumque atque ora loquentis
Nectaris innumera parte suada sui,
Ille tibi medicos peragrarè licentius hortos,
Pomâque Philosophis sacra, legenda dedit;
Fecit & ut sophiæ flammæ (mirabile dictu)
Corporis exacti de silice excuteret,
Et tu sic parvi pandis miracula mundi,
Conditor ut mundi iam videre novi.
Sic sculper laurus doctæ tibi frontis honorem,
Laurus Apollinei stemma fauoris erit.
Nec verò fragili sic pangis nomina cippo
A summi cùm sit fulmine tutæ Iouis.

FRANCISCI ROSSETI REGIS MEDICI, AD DOMI-
NVM LAVRENTIVM, PRO RECENTE SVA

Anatome, Εὐχαριστιών.

NON opus est laudent tua tot tantique medentes
Scripta minusque loco quicunque minore sedemus.
Namque ferunt secum proprie praconia laudis.
Sed quisnam mundi (quas tot scrutare) minoris

Diuitias, vires, vsum, ornatumque professus
Dicere laudator falsus non fallat hiantum
Attentas aures, vulgusque subire cachinnos
Non metuat, nisi cui nihil est in fronte pudoris,
Et populo ridente audet preferre lucernam
Aestuo soli, cunctisque praere videntis?
Idne volunt quia te laudare baud ultima laus est
Quamuis sat celebrem scriptorum iure tuorum
Iis quibus in libris sua nomina scripta videri
(Quos paris aeternum victuros) ambitiose
Igniculae saepe prurit secreta Cupido?
Subticuisse tamen dantis beneficia putatur
Ingrati esse animi non excusabile probrum
Illi qui dignas debent tibi soluere grates
Supprimis; idque ideo meritis quia gratia desit,
Exhaustos abs te queat ut pensare labores.
Attamen est aliquid memorem, fidumque dicare
Erga illos animum, bene qui fecere priores.
Sed quid egant (dices) sexcenti (turbata tuorum
Miratrix operum tibi dedita) sine medendo
Officium faciant, (quo nunc sum ordine) sine
Voce, manuque rudes doceant quot partibus intus,
Et quam diuersis homo sit constructus, & extra.
Inter quos unum quae te vigilantia nuper
Fecerat, illa loco te tandem principe sistit.
Laudibus ergo tuis certatim insistere pergant,
Materies nostris non est ea viribus aqua,
Hoc mihi nunc satis est (tenues quia plura nequimus)
Si quascunque decet, possumque offerre merenti
Grates accipias. Id donum Iuppiter ipse
Auro plurius habet, gemmisque, & thure Sabaeo.
Qui benefactori multum debere fatetur
Ingenuus, fieri maioris debitor eris
In benefactores spe non fallace meretur.
Iis capui exsoluens veteri pro fenore quicquid
Possidet, ac vitam, te sic poscente rependit.
Ergo velut donis homines maioribus auge

Illos cœlicolũm solio pater almus ab alto,
Qui didicere illi grates persolvere grati,
Sic tu Gemma scholæ Pelij carissima montis
(Cuius ego medicum suxi lac matris alumnus)
Fac labor ut tuus hic tam faustus crescat in horas,
Fauustior optabit (res est non parua) vicissim
Crescentum numerus tibi felix omen ab astris;
Robore corporeo ut valeas & acumine mentis
Nestoris ultra annos, samãque superstite viua;
Et cunctos superans abs te superere merendo,
Ac de te referens victor victorẽ triumphum
Natas gestes circum tua tempora lauros;
Qualis Honorati caput olim regia texit,
Cuius eras ex matre nepos dignissimus illo;
Inuida quem Pelio maiestas regia monti
Surripuit, raptum luxit schola tota, sed illi
Venisti successor, at es (velut ille) dolenti
Surreptus; sed te (si Rex indulerit) optat
Presentem rursus, querula quod voce precatus.
Huic ego charus eram auditor, quo tempore prima
Illic baccifera decerpsti è fronde corollam,
Iunior illius Celebrator laudis, in aula
Quæ doctore nouo, aulæque superba scholarum
Omnibus ex æquo festina luce patebat
Tunc honor is primi gestante insignia pili
Inter bacciferos anni currentis auito
Solemniq; scholæ decreto, ac more manebat,
Inde sibi comitem me saepe vocabat eunti
Cum sibi dilectis magnos medicarier egros.
En agor. At veniam pietas, manẽsque magistri
Sponte dabunt, reuirescit amor sic partus eundo
Eius honoris ego venio ceu debitor alter
Officij accepti tibi, promptus quando reposces
Temporis vsuras aliquot persolvere, si res
Æqua voluntati pateretur, & eius egeres
Exactor durus, tibi quod natura negauit
Contento grata, memorisq; nomis mate mentis,
Maacte ergo virtute, tibi iam multa Galenus,
Cous & Hippocrates sese debere fatentur;
Sed quid non alij faciant, si talia tanti?
Quorum ego si numeri pars esse haud vltima possem,
Æmulus illorum iuueni tibi subdere dextram
Optarem, quamuis senior iam venerit etas,
Cruda tamen, quando discendi offertur auaro
Grande opera pretium, dignũque senilibus annis,
(A st altercantum deliramenta peroso)
Multa licet canis incommoda congerat etas.

*Macte (inquam) virtute Heros Phœbee, sequetur
 Æmula posteritas quidquid tua scripta docebunt
 Dicendum rudibus, reminiscendumque peritis,
 Omnia namque soles sensu, & ratione probare,
 Inuictis rerum, doctrinarumque ministris,
 Anceps naturæ meliorve vel artis habendus
 Sis mystes, quod nec forsan diuinet Apollo,
 Cesso ne videar blandiri, dum tibi de te
 Quid nos præterea (memores tamen ante bonorum)
 Speremus versu, præsentî scribo rogatus.
 Sed quid calcar equo, currenti, subdo, nec illi
 Author sum potius ne sudans ilia ducat?
 Est aliquo prodire tenuis, sat prata biberunt
 Nostra, tui fluido qua libri fonte rigantur.*

F. ROSSET VS.

RICHARDI LAVRENTII MEDICI REGII
in inuidum detractorem

IAMBICI SENARI.



*Q*UID digna Cedri æternitate, Palladis
 Venerabilique reponenda in sacratio
 Audes, calumniator imputentior
 Pattracione, futiliorque Zoilo
 Fraterna falso postulare plagij
 Monumenta? sicine clauiculariè
 Famam aucuparis flagitiosis artibus?
 Dum literatorum labores arduos,
 Magnæque molis dentibus laceffere
 Pergis virulentis liuidisque morsibus
 Num christianos, eruditosque & pios
 Suffusa tetro lingua toxico decet?
 Sed quid procaces, amabo, moramur onagros
 Mi frater? haud frangunt animos, mouit leues
 Immotæ cautes, fert procellas æquoris
 Obstâtque quamlibet furibundis fluctibus
 Quin quo pede capisti, hoc opere sum confice
 Iter, ut manet æterna quæ te gloria
 Comes virtutis, constantem excipiat breui.

R. LAVRENTIVS.



IN PRÆCLARVM D. ANDREÆ LAVRENTII
MÆDICI REGII OPVS ANATOMICVM RAYMVNDI
Massaci Collegij facultatis Medicæ, apud Aurelios Decani,
πρὸς πενήντῳ.



ONNE satis fuerat Laurenti maxime, Palmam
Præripuisse viris, quos secti gloria quondam
Corporis humani, factique industria summa
Ad summum extulerat, rutiloque æquarat olympo?
Tot virides Hedera, & circum tua tempora lauri
Num modò sufficiunt, tua quas tibi nomina donant?

Quales quòsve parat victrici Marte triumphos
Editione ista, quam verè credo secundam?
Ab quotiens iacta in vulgus problemata legi
Exagitata tuis rationibus, undique pressum
Hùc illùc animùm quibus ambiguùmque ferebas!
Sic nobis per te variè insanire licebat,
Nec poterant certa insani consistere meta,
Errantes donec duxisset ramite recto:
Historieque basi vestigia figere firma
Monstrasses, veròque tuis contraria telis
Exarmans, tuta tandem statione locasses.

Non aliter curvæ super æquora vasta feruntur
In dubium naues, quando Boreasque Notusque
Incursant velis, undasque ad sydera tollant,
Et mox detrudunt in biantia tartara nautas:
Hesperii dum nunc, dum nunc iactantur Eois
Fluctibus, euersis similes, & transstra perosis:
Donec ceruleus Triton cum voce sonanti
Et tempestatem fluctusque coercuit omnes,
Neptunusque Pater secura ad littora duxit.
Pascere tum sese mentem rationibus istis,
Amplecti historiam, suaves verique medullas,
Qua sibi perpetuò similes sub cortice viuunt
Armato spinis, dumisque horrentibus hirtis,
Rupibus incluso, cum latis undique fossis,
Peruia sed per te sunt loca, promissæ & illinc
Innumeros fructus LAVRENTI, & munera diuinum
Occupata diu obscurisque immersa tenebris,

*Quis nos felices reddis nostrique scientes,
 Barbarie expulsa, turpique errore subactos:
 Turbatosque lacus doctrinae in flumina pura
 Conueritis, late totum fluxura per orbem;
 Chiara Iouis soboles medias clapsus in auras
 Qualis erat Perseus pedibus talaria gestans,
 Et virgam nitidis manibus, tegimenque capillis,
 Atque harpen lateri, vicit cum monstra Medusa
 Gorgona surripuit, montemque Atlanta petiuit,
 Et tulit Hesperidum domito aures mala dracone,
 Fudit Castaliæ exorti tunc ungula monstri
 Parnasso in bijugo, visa & gaudere camæna.
 Præbuit en talem tanti te cura laboris*

*LAVRENTI, superas & te volitare per auras
 Hippocrates vidit, columnenque medentum
 (Elysio in medio nam norunt omnia manes)
 Et quis tantus ait nostris ex ossibus author,
 Qui structuram hominum, mentisque arcana recludit?
 Ille enectus equi cælum tranantibus altum
 Tam purum lumen medicis qui fundit, Eoo
 Occiduum ad pelagus, nunc, æternumque triumphet.*

*Et quis tantus, ait scriptor pater ipse Galenus,
 Qui me, qui medicam sublimis vindicat artem
 Moribus à rabidis, & dogmata nostra tuctat?
 Nate mea vires, mea nate potentia, vince;
 Pasce oculos pictis, res est non parua, tabellis.
 Pasce animos dictis, res est hæc maxima nate.
 Floruit ut quondam medicorum Græcia cæta,
 Gallia nunc claret; per te res ipsa probatur,
 Suscipe nate vices, terras sic fata volutant.*

MONSPELIENSIS ACADEMIA IN MERITIS-

SIMI ALVNI VICTVRAM GLORIAM

hos versus æternitati vouet.

ANT Æ molis opus, natum fœlicibus astris,
 Ibit in immenso s æui venientis honores,
 Et decus authoris, noménque æquabit Olympo
 HENRICI auspiciis tutum, & victricibus armis:
 Huic medico medicum stillauit ex ubere necesse
 Purpureumque insigne dedi, certamine partium
 Testante inuidia, & multum plaudentibus astris,
 Mox Græiùm euoluens, Arabumque oracula, nostrum
 Nomen in æternos promittit fœliciter annos
 Monspelium, ut feri possint meminisse nepotes.
 Ergo umbra occidua, longique obliuia seclis
 Hinc diras cohibete manus, mirandæque in ænum
 Extremum æternis uiuant LAVRENTIA chartis.

Eidem Tetraftichon.

D^V M mirè humanos pingit LAVRENTIVS artus
Pingit in humano corpore cuncta simul:
Sed dum hominum vultus diuinos pingit, & ora,
Huc usque impictum pingit & ille Deum.

Ad eundem Distichon.

Q^{VI} viuis hominum depinxit membra figuris,
Æternum viuis viuet imaginibus.

Hæc obseruandissimo Preceptori in sempiternam amicitie,
& beneficiorum gratiam posuit Ioannes Aubrius
Molinsensis Medicinæ Doctor.



Εἰς τὸ ἔ Ανδρέα Λαυρεντίου δευτέρου σύνταγμα
ἀνατομικὸν Τετραστιχον.

Κύπριδ' ὃς εἶπε πάρος γε γέφυρ' ἐνταῦθα τελείω,
Ἦς ῥ' αὖ μόνης κεφαλῆς ζωγεγίφος ἦρχε πάλαι.
Υἱ' ἐρέειν λέξει μῶν Κύπριδα Κύπριδος αὐτὸς,
Εἰδὼς τῇ νεαρῇ νῦν κεχνίλω ὑπέχην;

Φράγκισκος ὁ περ ῥ' ἕλλος.

IN EIVSDEM OPERIS ANATOMICI COMMEN-
TATIONEM EIVSDEM PERRELLI MEDICI
EPIGRAMMA.

RES eadem, haud eadem nunc extat quæ fuit antè,
Vnam, non vnam forma nouata facit.
Vt formam informem fœtus, cum sæpè relambit
Vrsa, quod est, & non, prodit, & amplificat:
Sic sua dum recoquit, fecit cui LAVREA nomen,
Edit opus maius quàm prius extiterat.
Diffecat in partes totum, sectumque reformat,
Non sic, ut Colchis Æscna restituit.
Vita etenim dedit hunc quondam Medea priori,
Cui quàmmodò rursus grata inuenta perit.
Ast nihil his scriptis quisquam queat addere quidquam, aut
Demere, nunc summam namque coronin habent.
Ergo dum studio stabunt exculta frequenti,
Florida LAVRENTI & fama perennis erit.

STRUXERIT humanos quàm miris artibus artus
 Alma parens Natura: quotis stet machina nostri
 Corporis adnixa, adfirmatâque partibus: ipse
 Quam benè compacte fuerint quoque ordine, partes:
 Sanguineis sparsum tubulis quos corpus abundet,
 Luxurièque thoris: quèisque intus viribus actum
 Cor solitos peragat nullo cogente labores.
 Hæc ea doctrina cupidus si noscere forsan
 In te vel cupias si contemplarier ipso
 Quæcunque in toto voluuntur corpora mundo,
 Hæc tibi sufficiant, quæ dum dictasset Apollo
 Peonia longè pollens LAVRENTIVS arte
 Per medios scripsit, desert quos Aula, labores.





Εἰς τὰς ἀναλομικὰς βίβλους ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΤΡΕΝΤΙΟΥ τοῦ
ἐτέρου ἀρχαίου, καὶ ἐν πάσῃ παιδείᾳ διαφέροντος.

Εργα Θεοῦ σοφίῃ τ' ἐξαυδᾷ καὶ μέγα κῦδος
 Ἡ σιωπῶντων τοῦ Δαφνίδος ἡδὲ βίβλος;
 Πᾶσαν ὃ γ' ἐξέπλυξε βροτῶν φύσιν, ἀνδρὶ χαλκῶντων
 Τῇ σινυλῇ παλάμῃ πᾶν μέρος ἡδὲ μέρος.
 Ὅσα, σάρκα, ἵνα, μυελόν, τὸ παρέγχυμα, νεῦρα,
 Ἐγκατα, ἐγκέφαλον, ἀγγεῖα σπερμόδοχα.
 Τίω δ' ἀναλεξάμενος ἴς, τὸν μικρὸν ὅ αἶμα κόσμον
 Τόντε μέγας γνοίῃ, τὸν τ' ὅπῃ πᾶσι Θεόν.
 Ὡς πηγὴ σοφίας! ὦ τεύχος ἀριπρεπές! ὄντως
 Ἡν' ἄρα τοῦτο σοφὸν ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΤΤΟΝ ἔπος.

IS. CASANBONVS.

In eundem
 Αναξαμαντασμός.

Εἰ νέστις Φάλας, Λαυρέντιον ΓΑΤΡΟΝ ΑΝΔΡΑ
 ΛΕΥΣΣΕ, φέρει σεφθὲν πύονμα μαῖντοσύλῳ.

N. P.

LATINE.


*Esse cupis sanus, Laurenti respice nomen:
 Quod versum si sis, satidicum quid habet.*



INDEX CAPITVM ET CONTROVERSIARVM TOTIVS OPERIS.

*LIBER PRIMVS, IN QVO HOMINIS
dignitas, Anatomes præstantia, vtilitas, necessitas, & vniuersalia
Anatomica artis præcepta explicantur.*

LIBRI PRIMI CAPITA.

CAP. I.		
	 OMNIS præstantia ex eius partibus indicatur; animo scilicet & corpore; ac primùm quanta sit animæ di- gnitas. PAGINA 1	
II.	Quàm mirabilis sit humani corporis dignitas & stru- ctura. 2	
III.	Damnantur Epicurus, Momus, Plinius & alij naturę calumniatores; atque hominis præstantia ex illius nuditate demonstratur. 6	
IIII.	Quid hominis corpus à cæteris animalibus distet, & quid habeat pe- culiare in sui structura. 7	
V.	Quàm sit vtilis Anatomie ad sui cognitionem. 9	
VI.	Quàm sit vtilis Anatomie ad Dei cognitionem. 11	
VII.	Quàm sit vtilis Anatomie Philosophis & omnibus ferè artificibus. 12	
VIII.	Medico non modò vtilem sed omnino necessariam esse Anatomem demonstratur. 13	
IX.	Qua methodo doceri & demonstrari possit Anatomie. 14	
X.	Qui fuerint Anatomes scriptores; ac primùm quid de ea Hippo- crates. 16	
XI.	Quid de Anatomie scripserit Galenus, & quàm malè à Neotericis ac- cusetur. 17	
XII.	Quid de Anatomie senserit Aristoteles. 19	
XIII.	Quid reliqui Authores Græci de Anatomie scriptis mandarint. 26	
XIIII.	Qui fuerint nostro sæculo Anatomes scriptores. ibid.	
XV.	Quid sit Anatomie & quotuplex. 21	
XVI.	Quòdnam sit Anatomes subiectum, pars scilicet, vbi partis definitio explicatur. 22	

INDEX CAPITVM

XVII.	Quid in qualibet parte spectare debeat Anatomicus.	23
XVIII.	Partium differentiarum; ac primum Hippocratica partium diuisio.	25
XIX.	Partium diuisio in principes & ignobiles.	26
XX.	Partium diuisio elegans in similes & dissimiles, eiusque exquisita interpretatio.	27
XXI.	Reliquae partium differentiarum explicantur.	30

CONTROVERSIÆ LIBRI PRIMI.

QVÆST. I	De partis definitione.	31
II.	De partium principatu contra Peripateticos docetur non vnicum esse principium, cor scilicet.	32
III.	Quot sint principes partes.	35
IIII.	Quae pars inter principes nobilior statui debeat.	37
V.	De partibus similibus & dissimilibus; ac primum de earum numero.	38
VI.	An similis pars organica dici possit, & actiones similiarum sint partium vel organicarum.	39
VII.	De partibus spermaticis an ex semine generentur.	41
VIII.	An spermaticae partes coalescere possint.	44
IX.	An spermaticae partes carnosae sint calidiores.	47
X.	An solidae partes resiccatae humectari possint.	48

LIBER SECVNDVS, IN QVO OSSIVM OMNIVM Historia accuratè describitur, & quae in ea occurrunt controuersa explicantur.

LIBRI SECVNDI CAPITA.

CAP. I.	Cur ab ossibus inchoandum.	50
II.	Ossis definitio, eiusdemque elegans explicatio.	ibid.
III.	Ossium differentiarum omnes explicantur.	52
IIII.	Ossium partes singulae, & multorum nominum explicatio, quorum in peculiari ossium historia frequens fit mentio.	53
V.	De ossium structura & connexu in vniuersum.	55
VI.	Breuis ossium omnium humani corporis diuisio & enumeratio.	64
VII.	De ossibus cranij eorumque futuris.	65
VIII.	Cranium non vnico osse constare, sed pluribus, quae futuris articulantur, futurarum usus & numerus explicantur.	66
IX.	Peculiaris ossium cranij descriptio, ac primum de ossibus frontis.	68
X.	De ossibus sincipitis.	69
XI.	De ossibus temporum.	ibid.
XII.	De ossiculis tribus in temporum cauitate contentis.	70

ET CONTROVERSIARVM.

XIII.	De osse occipitis.	71
XIII.	De osse sphenoidē.	72
XV.	De osse ethmoide.	73
XVI.	Ossium capitis vera descriptio in puerulis & recens natis.	ibid.
XVII.	De zygomate.	78
XVIII.	De maxilla superiore.	ibid.
XIX.	De inferiori maxilla.	79
XX.	De dentibus.	80
XXI.	Numerus dentium, & singulorum peculiaris historia.	82
XXII.	Epilogus cavitatum, sinuum & foraminum totius capitis.	83

Secunda σκελετῶ pars quę truncum complectitur, ac primū

XXIII.	De spina.	87
XXIII.	De ceruicis vertebris.	89
XXV.	De vertebris dorſi & lumborum.	90
XXVI.	De osse sacro & coccyge.	ibid.
XXVII.	De thoracis ossibus.	93
XXVIII.	De sterno.	ibid.
XXIX.	De costis.	94
XXX.	De scapulis.	95
XXXI.	De ossibus ilium, ischij & pubis.	96
XXXII.	Tertia σκελετῶ pars quę artus cōplectitur, ac primū de humero.	ibid.
XXXIII.	De cubito & radio.	97
XXXIII.	De ossibus extremæ manus, carpo scilicet, metacarpo & digitis.	ibid.
XXXV.	De pedis ossibus, ac primū de osse femoris.	98
XXXVI.	De ossibus tibiæ & rotulæ.	99
XXXVII.	De ossibus extremi pedis.	ibid.
XXXVIII.	De sesamoidē ossibus.	100
XXXIX.	De osse hyoide.	ibid.

CONTROVERSIE LIBRI SECVNDI.

QVÆS. I.	An simiarum tantū ossa descripserit Galenus lib. de ossibus, vt falsō imponunt Neoterici.	57
II.	De ossis definitione eiūsque temperamento.	58
III.	An ossa sentiant.	ibid.
III.	An ossa omnia medullā habeāt, & an medulla ossium sit alimentū.	59
V.	De epiphyseon vsu & substantia; defenditur Galeni opinio contra Vesalium, Columbū & iuniores.	60
VI.	De articulationis natura; defenditur Galeni opinio contra Vesalium, Columbū & cæteros calumniatores.	61
VII.	De symphyscos natura; vindicatur Galenus à Vesalio, Columbo, Fallopio & iunioribus.	63

VIII.	De figuris capitis & futurarum varietate Hippocratis & Galeni de- fensio.	64
IX.	An cranium figuram det cerebro aut cerebrum cranio.	76
X.	An cranium cerebri gratia sit constructum.	ibid.
XI.	De sphenoidis foraminibus defenditur Galenus & ab aliis plerisque calumniis vindicatur.	77
XII.	De sensu dentium.	84
XIII.	De materia dentium, & cur continuo crescant.	85
XIII.	An dentes sint ossa.	86
XV.	De motu capitis defenditur Galeni opinio contra Neotericos.	91

*LIBER TERTIVS; DE CARTILAGINIBVS,
vinculis, membranis & villis.*

LIBRI TERTII CAPITA.

CAP. I.	Quid cartilago.	102
II.	De cartilaginum vsu.	103
III.	De cartilaginum differentiis.	ibid.
III.	Peculiaris cartilaginum descriptio; ac primum de palpebrarum carti- laginibus.	104
V.	De aurium cartilaginibus.	105
VI.	De nasi cartilaginibus.	ibid.
VII.	De epiglottide.	ibid.
VIII.	De laryngis cartilaginibus.	106
IX.	De asperæ arteriæ cartilaginibus.	ibid.
X.	De spinæ cartilaginibus.	107
XI.	De thoracis cartilaginibus & xyphoide.	ibid.
XII.	De articulorum cartilaginibus.	108
XIII.	Quid sit ligamentum.	ibid.
XIII.	Vfus ligamentorum omnes explicantur.	109
XV.	Differentiæ ligamentorum.	110
XVI.	De ligamentis capitis.	ibid.
XVII.	De ligamentis ossis hyoidis & linguæ.	111
XVIII.	De spinæ & thoracis ligamentis.	ibid.
XIX.	De ligamentis omoplatae, brachij, cubiti & radij.	112
XX.	De ligamentis carpi & digitorum.	ibid.
XXI.	De ligamentis ilij, pubis, femoris, tibiæ.	ibid.
XXII.	De pedis ligamentis.	113
XXIII.	Quid sit membrana.	ibid.
XXIII.	Differentiæ membranarum.	114
XXV.	Brevis membranarum ferè omnium aut saltem præcipuarum enu- meratio.	115
XXVI.	Definitio villorum.	116
XXVII.	Villorum differentiæ.	117

LIBER QVARTVS, ΠΕΡΙ ΑΡΤΕΙΩΝ, DEVASIS;
venis scilicet, arteriis & nervis; in quo multa inter Medicos
& Philosophos controuersa explicantur.

LIBRI QVARTI CAPITA.

CAP. I.	Quid sit vena.	118
II.	De venarum vsu & actione.	120
III.	Venarum differentię.	121
IIII.	Venę portę, & ramorum eius elegans descriptio.	122
V.	Venę cauę descriptio; ac primũ trunci descendētis delineatio.	124
VI.	Venę cauę ascendētis distributio.	126
VII.	Axillarię rami diuarcatio.	127
VIII.	Quid sit Arteria.	143
IX.	De arteriarum vsu.	144
X.	Arterię ascendētis descriptio.	145
XI.	Arterię magnę descendētis distributio.	146
XII.	de vasis vmbilici, vena arteriosa, & arteria venosa.	147
XIII.	Quid sit neruus.	148
XIIII.	De vsu neruorum.	149
XV.	De neruorum differentiis.	150
XVI.	De neruis qui à cerebro oriuntur, de prima neruorũ coniugatione.	151
XVII.	De cæteris neruorum paribus.	152
XVIII.	Quomodo nerui à spinali medulla oriuntur.	153
XIX.	De neruis ceruicis.	ibid.
XX.	De neruis thoracis, lumborum, ossis sacri, pedis.	154

CONTROVERSIÆ LIBRI QVARTI.

QVÆS. I.	Varie de venarum ortu opiniones proponuntur; ac primũ quę fuerit Hippocratis sententia.	128
II.	Peripateticorum rationes omnes proponuntur.	129
III.	Galenı & Medicorum sententia, quę hepar venarum principium statuit.	131
IIII.	Aristotelis opinio examinatur, & Peripateticorum singulis rationibus satisficit.	132
V.	Vesalij de ortu venarum sententia examinatur & refellitur.	134
VI.	Epilogus totius disputationis, & quid sentiamus de venarũ ortu.	135
QVÆS. II.	An venę vim habeant sanguificandi.	136
III.	Soluuntur tria Problemata priorem quæstionem illustrantia.	139
IIII.	De venarum sensu, motu & villis.	ibid.
V.	An eadem venę mesenterij simul & semel chylum vehant & reuehant sanguinem.	140

INDEX CAPITVM

VI.	De azygo & iugularibus contra Vesalium.	142
VII.	De ortu neruorum contra Peripateticos.	155
VIII.	An nerui arteriis venisque continui sint, vt voluerunt quidam. Et de colici doloris in paralyfin transmutatione.	157
IX.	An nerui sensus motusque sint organa.	159
X.	An nerui motorij à sensificis distinguantur.	160
XI.	Cur pereat sensus illaeso motu, & contra motus sensu non vitiat.	162
XII.	An sola facultas per neruos influat, an cum facultate spiritus.	165
XIII.	Per quam nerui partem internam an externam feratur spiritus & facultas sensifica ac motrix, & an nerui caui sint.	167

LIBER QVINTVS ΠΕΡΙ ΣΑΡΚΩΝ, ID EST, *de carnibus & viscerum & glandularum & musculorum.*

LIBRI QVINTI CAPITA.

CAP. I.	Quid caro & carniū differentiae omnes.	169
II.	De carnibus viscerum.	170
III.	Quid sit glandula, & glandularum differentiae.	171
IIII.	Præcipuarum vniuersi corporis glandularū brevis enumeratio.	172
V.	Quid sit musculus.	173
VI.	Quot & quæ sint musculorum partes.	175
VII.	Quæ sit musculi actio & motus musculorum differentiae.	176
VIII.	Differentiae omnes musculorum explicantur.	177
IX.	De musculorum numero.	179
X.	De musculis faciei; ac primū de musculis frontis.	184
XI.	De musculis palpebrarum.	185
XII.	De musculis oculorum.	ibid.
XIII.	De musculis aurium.	186
XIIII.	De musculis narium.	ibid.
XV.	De musculis labiorum.	187
XVI.	De musculis maxillae inferioris.	ibid.
XVII.	De musculis ossis hyoidis.	189
XVIII.	De musculis linguae.	ibid.
XIX.	De musculis faucium.	ibid.
XX.	De musculis laryngis.	190
XXI.	De musculis caput mouentibus.	191
XXII.	De musculis ceruicis.	192
XXIII.	De musculis scapularum.	ibid.
XXIIII.	De musculis brachij.	193
XXV.	De musculis cubiti.	ibid.
XXVI.	De musculis radij.	194
XXVII.	De musculis carpi.	ibid.

XXVIII.	De musculis digitorum quatuor.	ibid.
XXIX.	De musculis pollicis.	196
XXX.	De musculis respirationi dicatis.	ibid.
XXXI.	De diaphragmate.	197
XXXII.	De musculis abdominis.	198
XXXIII.	De musculis dorfi.	199
XXXIII.	De musculis ani.	() 200
XXXV.	De musculo vesicæ.	ibid.
XXXVI.	De musculis testium.	ibid.
XXXVII.	De musculis penis.	() ibid.
XXXVIII.	De musculis femoris.	201
XXXIX.	De musculis tibiæ.	ibid.
XL.	De musculis pedis.	202
XLI.	De musculis digitorum.	ibid.

CONTROVERSIÆ LIBRI QVINTI.

QVÆS. I.	An musculus voluntarij motus organum sit.	180
II.	Quæ musculi pars princeps motus causa statuenda sit, carône, tendo an neruus.	182
III.	Vindicatur Galenus à plerisque Vesalij calumniis.	184
IIII.	An hyoides os voluntariè moueatur, & eius musculi motus gratiâ sint comparati.	203
V.	De numero musculorum laryngis, & cur in angina laryngis rubet aliquando ceruix & sternum, demonstratio Anatomica.	204
VI.	De linguæ motu.	205
VII.	De musculorum intercostalium numero & actione.	ibid.
VIII.	De motu & ortu diaphragmatis.	207
IX.	De musculorum abdominis ortu, insertione & situ, noua opinio; vindicatur etiam Galenus à recentiorum calumniis.	208
X.	De musculorum paruorum, quos succenturiatos vocant, structura & vsu.	209
XI.	De situ & officio sphincteris vesicæ.	ibid.

*LIBER SEXTVS, IN QVO PARTIVM NV-
tritioni dicatarum Historia describitur; tum quæ in ea
observantur controuersa explicantur.*

LIBRI SEXTI CAPITA.

CAP. I.	Humani corporis diuisio.	269
II.	Ventris inferioris diuisio.	270
III.	De cuticula.	272

III.	De cute.	273
V.	De adipe.	275
VI.	De panniculo carnoſo.	276
VII.	Partium continentium propriarum deſcriptio.	283
VIII.	De peritonæo.	284
IX.	De vaſis vmbilicalibus.	286
X.	Partium in regione ima contentarum breuis delineatio.	288
XI.	De epiploo.	289
XII.	Inteſtinorum vniuerſalis deſcriptio.	ibid.
XIII.	Peculiaris inteſtinorum διαγεγραφή ſiue delineatio.	291
XIII.	De craſſis inteſtinis.	292
XV.	De meſenterio & pancrea.	294
XVI.	Venæ portæ diuaricatio.	302
XVII.	De ventriculo.	ibid.
XVIII.	De partibus ventriculi diſſimilaribus, oriſiciis quippe & fundo.	304
XIX.	De hepate.	309
XX.	De veſicula fellea.	314
XXI.	De liene.	320
XXII.	Venæ cauæ deſcendentis delineatio.	327
XXIII.	De renibus.	ibid.
XXIII.	De vteribus & veſica.	334
XXV.	De veſica.	ibid.

CONTROVERSIÆ LIBRI SEXTI.

QVÆST. I.	An cutis organum ſit tactus.	276
II.	De temperamento cutis.	278
III.	De ortu & generatione cutis.	ibid.
III.	An cutis actionem edat officialem.	279
V.	An adeps frigore vel calore concreſcat.	ibid.
VI.	An adeps pars ſit corporis animata & viuens.	282
VII.	An per epigaſtricam & mammariam venas, mammarum & vteri conſenſus fiat.	283
VIII.	De peritonæi membranis, uſu & productionibus.	285
IX.	De noua hydropicorum per vmbilicum compunctione.	287
X.	An inteſtina vim habeant attractricem.	294
XI.	An inteſtina vim habeant retentricem.	296
XII.	An inteſtina vim habeant concoctricem.	297
XIII.	De vi inteſtinorum expultrice & eorundem motu periltaltico.	298
XIII.	An cliſteres ad ventriculum uſque ferri poſſint.	299
XV.	De ſæcum foetore.	300
XVI.	De inteſtinorum ſubſtantia & ſitu.	301
XVII.	An oriſcium ſuperius ſedes ſit appetentiæ.	305

XVIII.	De orificij superioris situ & consensu.	306
XIX.	An chylosis à calore potius quàm à forma ventriculi fiat, & cur ventriculus quatuor substantias non gignat, vt hepar.	307
XX.	De ventriculi nutritione, an chylo alatur, vel sanguine.	308
XXI.	An hepar princeps sit pars.	312
XXII.	An hepar naturalem spiritum gignat.	ibid.
XXIII.	An vesicula bilem trahat eaque nutriatur.	316
XXIII.	De ductibus bilem expurgantibus, contra Fallopiū.	318
XXV.	De lienis vsu, contra Galeni calumniatores.	321
XXVI.	Per quas vias à liene ad ventriculi fundum feratur melancholicus succus, & in quem vsu.	325
XXVII.	Quomodo per vrinas expurgentur lienosi, & per quos ductus.	326
XXVIII.	De renum vsu & vrinæ materia.	330
XXIX.	Vnde varia calculo laborantium symptomata, rationes ex Anatome petendæ.	332
XXX.	An vesica vrinam trahat.	335
XXXI.	De retentione & excretionē vrinæ, an naturalis vel animalis facultatis sint opera.	ibid.

*LIBER SEPTIMVS, IN QVO PARTIVM
procreationi dicatarum tum virilium tum muliebrium historia
primū accuratè describitur, mox quæ in ea occurrunt
controuersæ explicantur.*

LIBRI SEPTIMI CAPITA.

CAP. I.	De partium generationi dicatarum necessitate.	337
II.	De virorum genitalibus; ac primū de vasis semen præparantibus.	338
III.	De partibus semen excoquentibus, epidymide quippe.	339
III.	De testibus.	ibid.
V.	De vasis semen deferentibus.	341
VI.	De partibus semen excipientibus & asseruantibus.	342
VII.	De pene.	ibid.
VIII.	De mulierum genitalibus; ac primū de vasis semen præparantibus.	352
IX.	De vasis semen deferentibus.	ibid.
X.	De testibus mulierum.	353
XI.	De vtero.	ibid.
XII.	De singulis vteri partibus dissimularibus.	356

CONTROVERSIÆ LIBRI SEPTIMI.

QVÆS. I.	An testes principes sint partes.	344
II.	De testium vsu.	346
III.	De testium vsu opinio Medicorum & nostra.	347

INDEX CAPITVM

III.	De testium substantia & tunicis.	348
V.	De testium & thoracis sympathia.	349
VI.	An penis erectio naturalis sit vel animalis.	350
VII.	De situ glandularum prostaticarum.	351
VIII.	An mulierum genitalia solo situ à virorum genitalibus distinguantur, ut existimarunt veteres, & an foemina in marem conuerti possit.	352
IX.	De vteri motu an naturalis sit, an animalis.	360
X.	Cur & quomodo vterus odores persentiat.	361
XI.	De mirabili vteri cū omnibus ferè corporis partibus sympathia.	363
XII.	De vteri acetabulis, cornibus, tunicis.	365
XIII.	An hymen reperiatur, & de notis virginittis.	366

LIBER OCTAVVS, IN QVO FOETVS HISTORIA accuratè describitur, & generationis principia, conceptus, conformatio, nutritio, vita, motus, tandèmq; partus, ad Hippocratis doctrinam, quantum fieri potest, accommodatè explicantur.

LIBRI OCTAVI CAPITA.

CAP. I.	Quæ requirantur ad generationem perfectam.	367
II.	De principiis generationis, semine & sanguine.	373
III.	De materno sanguine, altero generationis principio.	385
IIII.	De conceptione.	393
V.	De partium conformatione.	400
VI.	De foetus nutritione, & quomodo naturales facultates exerceat.	417
VII.	Quomodo vitales facultates exerceat foetus.	420
VIII.	Infantis exclusio seu partus.	435

CONTROVERSIÆ LIBRI OCTAVI.

QUEST. I.	De sexuum diuersitate.	368.
II.	De temperamēto foeminarū, an viris frigidiores sint calidioresve.	369
III.	Quid sit semen.	375
IIII.	An semen ab omnibus corporis partibus sit deciduum.	377
V.	An mulieres semen emittant.	381
VI.	De seminis excretionē, à qua vi fiat.	384
VII.	Vnde voluptas in seminis emissionē.	ibid.
VIII.	An menstruus sanguis qualitate noxius sit.	387
IX.	An menstruus sanguis variolarum & morbillorum, qui semel in vita infestare solent, causa sit.	389
X.	De periodicæ menstruorum excretionis causis.	392
XI.	An ad conceptionem semina simul effundi & cum voluptate debeant, statimque misceri.	394

ET CONTROVERSIARVM.

XII.	An vterus vim habeat agendi aliquam in conformatione foetus.	296
XIIL.	De vitiosis conceptionibus, ac præcipuè de mola.	ibid.
XIIIL.	Demonstris & hermaphroditis.	399
XV.	An omnes partes simul conformentur.	403
XVI.	An membranę foetum inuoluentes omnium sint primę, & an à vi formatrice fiant, tum an à muliebri semine.	406
XVII.	De vasorum vmbilicalium numero.	407
XVIII.	De ortu vasorum vmbilicalium.	408
XIX.	De marium & foeminarum conformationis temporibus.	409
XX.	Vnde natorum similitudo.	410
XXI.	Quomodo gemelli & multiplices foetus generentur.	413
XXII.	Quomodo fiat superfoetatio; cur sola ferè mulier grauida coitum appetat, & per quas vias eadem semen ei aculetur.	415
XXIII.	An foetus alimentum per os trahat; an solo sanguine nutriatur, & an vnam tantum coctionem perficiat.	418
XXIIII.	An sanguine solo nutriatur foetus, & an vnam tantum coctionem perficiat.	419
XXV.	De communione vasorum quatuor cordis in foetu.	421
	Exercitatio prima, in qua Galenicę demonstrationis veritas illustratur.	ibid.
	Exercitatio secunda.	423
	Exercitatio tertia.	427
XXVI.	An respiret in vtero foetus & pulmonis operá egeat.	429
XXVII.	An vitalis facultas spirituum pro creatrix in foetu sit otiosa, & an propria vi moueatur cor paradoxon.	430
XXVIII.	An spirituum animalium fiat in foetu generatio, & qualis eius sit in vtero situs.	434
XXIX.	De partus natura & differentiis.	437
XXX.	Quot & quę sint humani partus tempora.	439
XXXI.	Quę partus sint causę vniuersales & particulares.	443
XXXII.	An in desperato partu Cæsarea sectio tentanda sit.	448
XXXIII.	An in partu ossa pubis & ilium diuellantur.	ibid.

*LIBER NONVS, IN QVO PARTES VITA-
les, pulsus quippe & respirationis organa describuntur, multęque
inter Medicos valde controuersa enodantur.*

LIBRI NONI CAPITA.

CAP. I.	Singularum thoracis partium brevis descriptio.	451
II.	De mammis.	453
III.	De musculis thoracicis.	458
IIII.	De diaphragmate.	ibid.

V.	De pleura & mediastino.	461
VI.	Partium in thorace contentarum brevis enumeratio.	462
VII.	Venæ cavæ ascendentes distributio.	ibid.
VIII.	De arteria magna ascendente.	463
IX.	De pericardio.	464
X.	De corde.	465
XI.	De ventriculis, auriculis, vasis quatuor & membranulis cordis.	468
XII.	De pulmonibus.	496
XIII.	De collo & eius partibus.	510
XIII.	De aspera arteria.	ibid.
XV.	De larynge.	512
XVI.	De epiglottide & glottide.	513
XVII.	De œsophago.	514

CONTROVERSIAE LIBRI NONI.

QVÆS. I.	De mammarum actione & usu.	454
II.	An ante conceptionem generari lac queat.	455
III.	De lactis generatione solvuntur problemata.	456
III.	De phrenitide diaphragmatis, demonstratio Anatomica.	460
V.	De aqua pericardij, an in vivente animali reperiatur, & unde eius generatio.	464
VI.	An cor vitalis facultatis sit sedes, & ad quam animæ facultatem referenda sit.	470
VII.	De motu cordis.	472
VIII.	Quomodo moveatur cor, & an in sua systole aut diastole percutiat pectus.	475
IX.	A qua vi moveantur arteriæ.	476
X.	An dilatato corde dilatentur arteriæ; aut contrà, dilatato corde restringantur arteriæ.	479
XI.	De vitalis spiritus generatione, & per quas vias à dextro in sinistrum sinum feratur sanguis.	481
XII.	An per sinistru cordis ventriculum & arterias, empyicorū pus expurgari queat; & quomodo per urinas, aluū & abscessus expurgetur.	485
XIII.	De cordis temperamento.	488
XIII.	De cordis nutritione, an venoso alatur sanguine, an tenuissimo in suis ventriculis contento.	490
XV.	De cordis substantia & carne.	491
XVI.	De numero & temperie ventriculorum cordis.	493
XVII.	Vter sinuum præstantior sit, dexterne an sinister.	ibid.
XVIII.	An cor abscessum, solutionem continui & grauiores morbos perferre queat.	494
XIX.	De respirationis natura; quid sit & quot sint eius causæ.	498
XX.	An respiratio animalis sit vel naturalis actio.	501

ET CONTROVERSIARVM.

XXI.	De motu & vſu arteriæ venoſæ.	ſo4
XXII.	De temperamento pulmonum.	ſo5
XXIII.	De pulmonum motu.	ſo7
XXIII.	An tuſſis motus ſit pulmonum & thoracis naturalis, an animalis. ibid.	
XXV.	An potus in pulmones feratur.	ſo8
XXVI.	De deglutitione an ſit animalis vel naturalis actio, & cur ſolida plerumque deglutimus, liquida verò non ita facile.	ſ15

*LIBER DECIMVS, IN QVO ANIMALIA
organa, cerebrum quippe eſt quæ ab eo oriuntur deſcribuntur.*

LIBRI DECIMI CAPITA.

CAP. I.	De capitis figura, ſitu & magnitudine.	ſ17
II.	Singularum capitis partium brevis deſcriptio.	ſ19
III.	De partibus continentibus communibus, ac primùm de pilis. ibid.	
III.	De cuticula, cute & panniculo carnoſo capitis.	ſ20
V.	De partibus continentibus propriis; ac primùm de pericranio. ibid.	
VI.	De cranio.	ſ21
VII.	De membranis cerebrum velantibus, ac primùm de dura meninge. ib.	
VIII.	De tenui meninge.	ſ23
IX.	De cerebri præſtantia, ſitu, figura, magnitudine, ſubſtantia, temperie, motu, ſenſu & vſu.	ſ24
X.	De ſingulis cerebri partibus.	ſ26
XI.	De cerebello.	ſ29
XII.	De ſpinali medulla.	ibid.

CONTROVERSIÆ LIBRI DECIMI.

QVÆST. I.	An cerebrum facultatum principum ſit ſedes.	ſ31
II.	An principes facultates ſedibus diſtinguantur.	ſ33
III.	An facultates principes à temperie pendeant cerebri, vel à confirmatione, id eſt, an ſimilares ſint vel organiæ actiones.	ſ35
III.	De cerebri vſu contra Ariſtotelem.	ſ36
V.	Cur vulnerata aut inflammatione obſeſſa dextra capitis aut cerebri parte, conuulſio in oppoſitas partes cadit.	ſ37
VI.	Cur ſauciata aut obſtructa dextra capitis parte, reſolvitur oppoſita.	ſ39
VII.	De animali ſpiritu, quænam ſit eius natura, quis generationis modus & locus.	ſ42
VIII.	De animali ſpiritu, Argenterij opinio conuellit.	ſ44
IX.	An moueatur cerebrum propria & inſita vi, an arteriarum motu.	ſ46
X.	An ſentiat cerebrum.	ſ49
XI.	De temperamento cerebri.	ſ51
XII.	Quot & quæ ſint excrementa cerebri; & per quos ductus expurgentur.	ſ52

INDEX CAPITVM

XIII.	De numero, vfu, & præſtantia ventriculorum cerebri.	554
XIII.	De præſtantia ventriculorum cerebri.	ibid.

LIBER VNDECIMVS, IN QVO SENSIVVM organa deſcribuntur, multæque inter Philoſophos & Medicos controuerſa explicantur.

LIBRI VNDECIMI CAPITA.

CAP. I.	De faciei dignitate & partibus.	556
II.	Sensus omnes in facie locatos eſſe; cur quinque tantum ſunt, & quæ ſit viſionis præſtantia.	557
III.	De oculorum præſtantia.	558
III.	De oculorum ſtructura in vniuerſum.	559
V.	De ſingulis oculi partibus, ac primùm de muſculis.	560
VI.	De tuniſis oculorum.	561
VII.	De humoribus oculorum.	563
VIII.	De cæteris oculi partibus, neruis, venis, arteriis, ſpiritibus, adipe, glandulis.	564
IX.	De oculi externis partibus, ac primùm de palpebris.	565
X.	De ciliis & canthis ſeu angulis oculorum.	566
XI.	De ſuperciliis.	567
XII.	De auditus organo; ac primùm de aure externa, quam <i>auriculam</i> vocant.	580
XIII.	De aure interna, quæ verum eſt auditus organum.	581
XIII.	De organo odoratus.	586
XV.	Naſi interni deſcriptio.	587
XVI.	De cæteris faciei partibus externis, genis, labiis, mento.	590
XVII.	De ore & partibus in eo contentis.	ibid.
XVIII.	De lingua.	591

CONTROVERSIÆ LIBRI VNDECIMI.

QVÆS. I.	An viſio emittendo fiat vel recipiendo: vbi viſionis natura accuratè explicatur.	568
I.	An aliquid intra oculum videri poſſit; & an per propriam ſpeciem aut alienam: vbi de ſuſuſionis & viſorum natura quædam explicantur.	571
III.	An viſionis organum igneum ſit, vel aqueum.	572
III.	Cur oculi variè ſint colorati.	573
V.	De muſculis oculorum & eorum motu.	575
VI.	De motu oculorum ſoluuntur problemata duo, cæque obſcuriſſima.	ibi.
VII.	De oculorum humoribus, an ſint partes animatæ.	577
VIII.	De opticorum exortu, coitu & inſertione.	578

IX.	De audiendi modo.	583
X.	An infitus & vernaculus aër in aure contentus primum sit & princeps auditus instrumentum.	584
XI.	De mira aurium & palati, linguæ ac laryngis sympathia.	585
XII.	Quod verum sit & præcipuum odoratus organum; vbi refellitur Aristoteles.	588

*LIBER DVODECIMVS, IN QVO
artuum historia describitur.*

LIBRI DVODECIMI CAPITA.

CAP. I.	Brevis artuum descriptio.	593
II.	De totius manus partibus in vniuersum.	594
III.	De manuum præstantia.	595
III.	De vsu, figura & structura extreme manus.	596
V.	Similarium omnium particularum, quæ manum constituunt, ratio explicatur.	597
VI.	Dissimilares manus partes explicantur de carpo & metacarpo.	ibid.
VII.	De digitis manus.	598
VIII.	De pede in vniuersum, eiusque præstantia, figura, structura, vsu.	599
IX.	De pedis totius partibus similaribus.	600
X.	Pedis totius dissimilares partes explicantur.	601

Finis indicis Capitulorum & Controuersiarum.



*Uultum Laurenti cernis sub imagine scriptis
Divini Ingenij conspiciantur opes.*



LIBER PRIMVS.

IN QVO HOMINIS DIGNITAS,

ANATOMES PRÆSTANTIA, UTILITAS,

NECESSITAS, ET VNIVERSALIA ANATOMICÆ

ARTIS PRÆCEPTA EXPLICANTVR.

*Hominis præstantia ex eius partibus indicatur, animo scilicet & corpore;
ac primum quanta sit animæ dignitas.*

CAPVT I.



OMINEM, cui celestis inesse igniculos seminaque diuinitatis, cum faciei impressa maiestas, tum corporis totius figura erecta & in cælum versa restantur, Animal adorandum & admirandum à sapientissimis Ægyptiorum Sacerdotibus, appellatum fuisse prodidit antiquitas. Mercurius ille ter Maximus hominem miraculū magnum, animal Deo simillimum, Deorum interpretem vocat: Pythagoras μέτρον ἀπάντων rerum omnium mēsuram: Plato ψῆμα ζῶντων: Theophrastus vniuersi Exemplar, ἀντίμυμον ὡς εἰδὲ γμα: Aristoteles animal politicum ad societatem natum: Synefius Orizonrem corporeorum & incorporeorum: Tullius diuinum animal plenum rationis & consilij: Plinius mundi Epitomen & naturæ delicias. Omnes vero vno consensu μικρόκοσμον, id est paruum mundum

Quam magnificè & egregie simul exornetur homo.

appellatur. Corpore enim corporum, anima animatorum omnium vires continet. Vetusissimus Zoroaster singulare hominis artificium diu contemplatus tandem exclamauit, Ὁ ἄνθρωπος, ἰσολμνησάτης τῆς φύσεως ἀγαλμα: O homo audacissima & omnia confidenter molientis naturæ decus. Barbarus ille Abdalas interrogatus aliquando quid in rerum natura maxime putaret admirabile: non barbare, sed scienter respondisse fertur, *Hominem unum esse qui admirationem omnem superet*; Quippe qui cum magni istius mundi simulacrum sit, possit Protei cuiusdam aut chamæleonis more sese in quiduis subiro transformare. Fauorinus nihil in terris magnum præter hominem agnouit. Theologi omnem creaturam vocant, quod sit potestate quodammodo omnia, non secundum materiam, vt volebat Empedocles; sed ἀναλογικῶς per specierum receptionem. Alij Augustum Dei tēplum & simulacrum dicunt; vt enim in Numismate Charagma Cæsaris, sic in homine Dei conspiciatur imago. Alij rerum omniū finem, cui sublunaria omnia feruiant, ipse nulli, nisi forte homo homini. Regius ille Propheta cælesti numine plenus hominis dignitatem his verbis extollit. *Minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloria & honore coronasti eum & constituisti eum super opera manuum tuarum.* Præclara sunt

Cur paruum mundum dicatur.

hæc, ne dicam diuina hominis encomia; quæ partim ab anima formatû omnium præstantissima, partim à corpore corporeorum omnium mensura & velut exemplari habet. Anima quidem adeò diuina res est, vt supra naturales omnes formas sese aliquando extollens erigensque res incorporeas ab omni materia seingatas minifica illa protusq; libera & cogi nescia vi mentis complectatur. Hæc si oculis cerni aut saltem animo concipi posset, quàm mirabiles exciteret amores sui? Sola hæc creatur non generatur, & licet (vt loquuntur Philosophi) supponatur subiectû in ipsius productione, non tamen ex illius potentia educitur, sed illud perficit. Sola hæc indiuidua est, cæteræ omnes formæ naturales augentur, minuuntur, diuiduntur cum subiecto; Ar hæc tota est in toto, & tota in qualibet corporis particula. Sola est immaterialis; id tantum cum materia habens comune, quòd omnium specierum est capax, non secus ac materia prima formarum omnium, nec tamen par est similisque in hac & illa recipiendi modus. Materia enim formas recipit indiuiduas & sine cognitione; Anima vniuersales tantum & cum cognitione. Materia particulares formas materialiter admittit & cum abiectione contrarij; Anima hominis vniuersales rerum ideas ab omni materiæ contagione liberas & absque contrarij abiectione excipit. Sola hæc incorporea est, impatibilis, *ἀναλλοίωτος*. Hæc specierum omnium locus & pròptuarium dici potest, estque Aristoteli tertio de anima quodammodo omnia; delentur enim in organo sensiles species, sola anima eas conseruat. Hæc secundum Platonicos in medio rerum omnium est gradu, cum supra se Deum habeat & Intelligentias; infra se corpora & qualitates, vt ita amborum sit particeps. Hæc secundum Theologos proxime ad naturam accedit Angelicam, ratione intellectus, originis, eternitatis, imaginis, cognitionis & beatitudinis. Est postremo in ea quid metaphysicum veteribus Philosophis qui in densa rerum caligine versabantur incognitû, Christianis solis quibus Euangelicæ legis splendor affulsit exploratum; lucet quippe in ea imago Trinitatis, ratione trium *ἡ γερμονικῶν* id est principum facultatû, memoriæ, intelligentiæ, voluntatis. Sed cur animæ essentiam describere audeo, cum plane diuina sit, de diuinis autem, vt dicebat olim Simonides, possimus tantum dicere quid non sint? Cur inuolutam illius naturam & sensus nostros effugientem, quam ideo *φύσιν ἀφανέα* id est naturâ inaspectabilem vocat Hippocrates, explicare instituo? Sunt hæc altioris contemplationis & alterius artificis. Quæ igitur Physica sunt sensibusque obiecta pertractemus, & ad alteram hominis partem corpus scilicet, quod verè in medici contemplationem cadit, accedamus.

Quàm mirabilis sit humani corporis dignitas & structura.

CAP. I I.



V T ANIMA hominis, formatum omnium quæ sub Lunæ concavo sunt, est nobilissimas ita hominis corpus, animæ domicilium, cæteris vniuersis ita antecellit, vt corporeorum omnium μέτρον & tegula dici possit. Eius præstantiam multa indicant, sed hæc inter cætera; figura recta in cælum sese attollens, temperies moderata, partium æquabilis & iusta proportio, tandèmq; mirabilis rerum omnium, quæ naturæ lege imperioque continerur, amplexus; in eo enim vniuersi istius quod oculis cernimus viuam imaginem, tanquam in speculo aut parua tabella adumbratâ, intueri licet. Figuram solus homo erectâ obunuit, vnde

Hominis tam prædara insignia, partem animæ partem corpore accepta referenda. Anima præstantia. Sola creatur.

Sola est indiuidua.

Sola immaterialis.

Anima specierum est locus.

Anima in medio rerum est gradu.

Anima natura Angelica.

In anima lucet imago Trinitatis.

Humanis corporis præstantia ex quatuor indicatur.

1. Figura recta.

à quibusdā, *ἡ θεωροῦστος*, vulgo *ἄνθρωπος* quasi *ἀναθεωρῶν* sursum respiciēs est dictus, licet Plato in Cratylō hominē *ἄνθρωπον* dictum putet, quasi *ἀναθεωρῶν τὸ ὅπλον*, id est contemplantem quæ videt. Huius figuræ ratio plane est philosophica, quippe quæ ex causis, efficiētē, materiali & finali pendeat. Efficiens duplex est, primaria, & secundaria. Primaria, anima est, quæ extrinsecus adueniēs cœlitūque immissa, dum idoneis edēdis functionibus sibi edificat domicilium, suæ originis memōr, illud in sublime attollit. Secundaria, est calor, quo inter cetera animalia abūdat homo, præsertim circa præcordia; caloris ergo natura inualescens, incrementum de medio agit pro suo impetu, id est impellit in eam mundi partem versū quam calidū aprum est moueri, sursum scilicet: Materia mollis est, temperata & opificiā quidvis sequax. Animalium enim humidissimum & maximē sanguineum est homo. Finalis vero causa multiplex. Figuram enim rectam habuit homo; primum vt cœlestia contempleretur. Idē cū interrogatū fuisset Anaxagoras, cur natus esset, respondit vt videret cœlum & stellas. Deinde vt externorum sensuum, quī omnes in capitis regia & rationis conspectu velut satellites sunt collocatī, functiones præclarius exerceantur: non enim ad noxiū fugam & vtilis prosecutionē tantum sunt comparatī, sed ad contemplationem; Ergo in excelsō locandi erant; sic sermo animi nūcius ex alto melius exauditur; olfactus ascēdentem vaporem commodius excipit; Oculi cū sint velut exploratores interdiu noctūque nobis exubantes, & ad hoc dati vt sublimia contempleremur, rectam figurā postulabant. Postremō solus homo figuram habuit rectam, quia solus inter animalia manū habuit, organū ante omnia organa. Quod si prona esset figura hominis, manū incederet vt & pedibus diuinum illud animal, nobilesq; illē manus actiones impedirentur. Quis enim pronus vel supinus scribere, equitare, vitā ciuilem ducere, aras Deo erigere, nauēs construere; omnia telorum genera iaculari, aliāsq; præclaras artes exercere posset? Solus ergo figuram in cœlum versam obtinuit homo; & ideo solus inter animalia formatus est ad rationem vniversi, quia superiores, inferiores, anticas, posticas, dexteras & sinistras partes habet distinctas; reliqua animalia aut non habent; aut confusas admodum. Dextera & sinistra similia omnino sunt, nisi quod sinistra imbecilliora, at antica posticis dissimilia sunt, inferiora autem aliqua ex parte superiorum similitudinem præ se ferunt.

Temperiem moderatam obtinuit homo, & corporū omnium est tēperatissimum, reliquorum *μέτρον*, mensura & regula; Aliorum animalium corpora vel nimis terrea sunt, vel nimis aquea: Ad hoc vnum tanquam medium generis viuētium omnium & plantarū, & animalium temperies refertur; vt calida, frigida, humida siccaque dicantur *ὑπό τινι*, si eorum ad hominis temperiem fiat collatio. Solus homo viuētium omnium temperiem in se concludit, reliquorum animalium singula fere omnia idē, in eadē specie, tēperamentū obtinuerunt. Multos reperies in hominis specie quī struthiocameli verticillū, alios quī leonis cor, quodā canis, quā plurimos Suis, infinitos quī asini temperiem habent. Sed & humani corporis *εὐκρασία* id indicat, quod pluribus morbis obnoxii sit & ab extremis eque ledatur, quia ab illis equaliter distat. Potuisset quidē ex cœlesti materia omnium nobilissima constari corpus omnium nobilissimum; sed debuit necessario ex sublunari & elementari materia constitui, vt sensilium species (à quibus omnis nostra cognitio) reciperet. Cum enim ad intelligendum natus sit homo & intelligētem oporteat phantasmata speculari, non fiat autem idolorum perceptio, nisi externorum sensuum, qui animæ sunt internuntij, ministerio; necessarium fuit hominis

Figura recta
causa efficiens
duplex.
Primaria.

Secundaria.

Materialis
causa.

Finalis causa
triplex.
Prima,
Secunda.

Tertia.

Solus homo
formatus ad rationem
vniuersi.

2. Corporis præstantia ex temperie indicatur.
Medium est generis.

Solus homo viuētium omnium temperies in se concludit.

Cur è cœlesti materia constitutus non est corpus humani sed elementari.

corpus ex ea materia componere, quæ sensuum esset capax; omnium porro sensuum fundamentum est tactus, qui in quatuor primarum qualitatum moderatione suam habet essentiam.

Partium mirabilis proportio.

Partium vero humani corporis *συμμετρία* & proportio est mirabilis. Hanc vnam pro exemplari sibi ob oculos proponunt artifices, ad hanc tanquam Polydæi regulam omnia referunt architecti, Templâ, edes, machinas, nâvigia construunt, & arcam Noë ad humani corporis mensuram fabricatam ferunt: ut enim humanum corpus est in longitudine trecentum minorum, in latitudine quinquaginta, in altitudine triginta: sic arcæ longitudo fuit trecentum cubitorum, latitudo quinquaginta, altitudo triginta. Quin etiam in ea partium proportione & circuli figuram, quæ omnium est perfectissima, & quadratam manifeste deprehendes, quod in ceteris animalibus non obseruabis. Nam umbilico totius corporis medio & velut centro constituto, si hominem supinum statuas, ac quam maxime tum pedes, tum manus deducere cogas, immotoque circini altero pede, & umbilico innixo, alterum circumagas, attinges tum crassiores pedum digitos, tum manuum medios: quod si qua parte hæc ratio deficiat, illic subesse vitium existimandum. Quin & si inter expansos pedes mensum concipias, itemque inter manum ac pedem vtrinque, perfectum habebis circulo inscriptum quadratum. Præclata sunt hæc quæ de humani corporis figura, temperie & partium proportionem annotauimus: sed postremum hoc omnem admirationem excedit, quod in se vno ea omnia contineat, quæ vniuersus hic mundus amplissimo suo sinu coercet, ut parvus mundus & vniuersi exemplar vel Epitome merito dici possit. Veteres magi nec

A. Hæc omnia in se continet quæ vniuersus coercet mundus.

non sapientissimi Aegyptiorum sacerdotes vniuersi partes statuerunt tres: superiorem vnam quam intellectualem & angelicam vocabant, sedem intelligentiarum, quarum nutu inferiora gubernantur: Alteram mediam coelestem dictam, in cuius medio præest sol, tanquam dux & moderator reliquorum siderum; Tertiâ sublunarem seu Elementarem, cuius in procreandis, augendis, alendisque animalibus & stirpibus mira est fecunditas. Quarum trium partium simulacra in humano corpore penitus expressa & velut penicillo adumbrata quis non videt? Caput humanæ mentis arx, rationis sedes, sapientiæ domicilium, memoriæ, iudicij, cogitationum, (quibus humanum genus intelligentiis est simillimum) officina, editissimum locum obtinens, an non supremam illam & angelicam mundi partem pulchrè refert? Mediam vero & coelestem habes in thorace & medio ventre ad vnguem expressam. Vt enim in coelesti illa præest sol, cuius motu, radiis & lumine illustrantur omnia; ita in medio thorace sita est cor, cuius tanta est cum sole analogia, ut solem non dubitarint antiqui cor mundi, & cor solem hominis appellare. Nam quemadmodum perenni ac continua solis motione eiusdemque calore viuifico, vniuersa exhilarantur ac vigent, terra floribus redimitur, fruges gignit, multiplices, herbarum innumeras varietates fundit ex sese, arbuta gemmas trudent & viriditate foliorum vestiuntur, animalia cuncta amoris stimulis incitantur, in amplexus venereos ruunt, ac vberissimo foetu vrbes, terrâ mariaque frequentant. Propterea hanc stellam prosperam & salutarem appellauit Aristoteles *γυναικίλιον*, quod rerum omnium sit procreatrix: Contra eadē solis stella longius à sedibus nostris digressa, horrescit terra, arbuta folijs & baccis spoliantur & bona pars eorum quæ naturæ fecunditas ediderat labefactatur: ita cordis perpetua motione, eiusdemque vitali calore, paruis iste mundus reficitur, conseruatur, viget: nihilque in eo aut ferax, aut ad partus edēdos aptum natumve esse potest, nisi vis illa

Homini cum mundo collatu.

Solis & cordis elegantia analogia.

præpotens cordis fecunditatem largiatur. A corde vitalis facultas manat, à cœlo cœlestis. Hæc inferiorum dicitur cōseruatix, illa insitum cuiusque partis calorem suscitatur, fouet, reficit. Cœlum agit in inferiora motu & lumine; cor perenni suo motu & spiritu æthereo quasi lumine singulas partes illustrat. Motus & lumen in superioribus instrumenta sunt intelligentiarum & cœli; intelligentiarum quidem tanquam primi mouentis immoti: cœlorum autem tanquam primi mouentis moti. Vitalis spiritus & cordis pulsatio instrumenta sunt animæ & cordis; animæ tanquam mouentis non moti, cordis tanquam mouentis moti ab anima. Iam vero sublunarem mundi partem in ventre inferiore expressam quis non vider? In eo enim partes nutritioni & procreationi dicatæ continentur, vt non sit cunctandum profiteri, omnia in humano corpore reperiri, quæ vniuersus hic mūdus amplissimo suo sinu cohibet. Vis-tu stellas etrantes in microcosmo intueri? Humectam lunæ vim profluens cerebri refert medulla. Veneræ potestati genitales humani corporis partes inseruiunt. Mercurio vario pariterque ingenioso facundia & venustatis instrumenta conueniunt. Solis & cordis mirabilem analogiam, iam declarauimus. Beneuolo & benefico Ioui humanum hepar fons gratiosi vaporis ritè confertur. Martis incendium & furem fœllis in se concipit vesicula. Saturni sūdus frigidum ac maleficū flaccida lienis caro humoris melancholici receptaculum perpulchrè refert. Ita quidem paribus numeris æquaque proportionē sibi inuicem respondent vtriusque mundi cœlestes vocatæ particulæ. Duodecim Zodiaci signa in humano corpore ab Asttologis eleganter depicta tacitū prætereo; trita enim sunt hæc & satis peruulgata. Luber altiora meditari & paulo sublimius mentis nostræ aciem intendere. Mundum in simplicia & mixta corpora dirimūt Petipathetici; simplicia quinque statuunt, cœlū & Elementa quatuor; Mixtorum alia imperfecta esse volunt, Meteora vocant, eaque, ignea, ærea, aquea, terrea; Alia perfecta vt animata. Quæ quomodo in homine se habeant, quia res est ad intelligendū pulcherrima, quæso diligenter animaduertite. Parui huius mūdi simplicia corpora, quinque sunt, spiritus & humores quatuor. Spiritus quinta est Essentia, ætherea, proportionē (inquit Philosophus) respondens elemento stellarum; humores quatuor Elementa corporis sensibilia dicuntur. Bilis temperamentō calidissima & furens, ignem refert; sanguis calidus humidus, æri; pituita frigida humida, aquæ; melancholicus humor frigidus siccus, terræ non ineptè conferuntur. τὰν μετεώρων vero microcosmi huius videre mirabile analogiam. Fulgores primum terrificos & cotulcationes ignitas, exandescentiū oculorum rubrè indicant suffusionē & quæ inde emicāt ἐκλάμψις. Intestinatorū rugitus, borborygmi obmurmuratus, strepentes crepirus & ructus mille tonitruum species exhibent. Inguentem statuum vim ventorumque tempestates turbidas, cruditarum exhalationes, aurium sibili & tinnitus prænuntiant. In faucium spatia, laryngem, thoracē, decumbens fluentis instar humor, pluuias atque imbres insinuat; coacta rotundaque spūta grandinis gerunt similitudinem, lacrymę rori assimilantur: conculsiui, conuulsiui, tremuli & palpitantes motus, terrę motus designant. Reperiuntur in corporibus nostris fodinę, è quibus metalla & lapides eruuntur, non ad edificandam sed diruendam domum; Renum itaque & vesicę calculi, fossilium ac mineralium speciem præ se ferunt. Hęc microcosmi est meteorologia, hæc imperfectę mixtorum demonstratio. Quod si perfectę mixti corporis exemplum in homine desideres, en tibi totum corpus, in quo ea est discordium quatuor qualitarum concordia, tamque equabilis elementorū mixtura, vt inter viuētia omnia & animata

Vitalis cœlestis facultas similis præclara.

Stellas errantes in microcosmo.

Præcipue mundi compositio ex Petipathetici curi doctrina.

Homini simplicia corpora.

Microcosmi meteorologia.

medij tationem obtineat. Est igitur homo paruus mundus, miraculum magnum, eiusque structura mirabilior est vniuersi totius opificio. Nam in magna tabula multa pingere facilius est quam in exigua tabella omnia complecti.

Damnantur Epicurus, Momus, Plinius & alij natura calumniatores: atque hominis præstantia ex illius nuditate demonstratur.

CAP. III.



TACEAT nunc Belluinus ille Epicurus qui hominum corpora casu & fortuito facta affirmabat, ex turbulento scilicet atomorum concursu. Exhibetur & explodatur vt imprudens Momus ille, qui multa in humani corporis structura manca mutilaque agnoscebat. Exulens è naturæ schola Plinius istique omnes pseudophilosophi, qui naturam iniuriis lacessere nõ desinunt, quod nudum & inermem, in nuda humo, natali die, abiecerit hominẽ ad vagitus statim & ploratum. Namque vt ab Epicuro incipiam, Quæ casu fiunt (ô Epicure) tato contingunt; eorum nec cettus nec prosper perpetuo sperari debet euentus; At si decem hominum millia attentè intuearis, omnia eorum corpora pari artificio constructa reperiẽs, eandem ossium, cartilaginum, vinculorum, netuotum, venarum, artetiarum, viscerum structuram, eundem contextum, figuram, numerum, situm, dexta sinistris similia, totũque corpus eodem ferè circino ἰσορροπον inuenies: nihil ergo in structura corporis se ingerit fortuitum, nihil quod sapientiæ summæ maiestati non refetat. Galenus, vt Epicuri errorem conuinceret, dicebat se illi daturum centum annos, vt situm, figuram, & structuram alicuius patris mutaret, neque dubitate se futurum tandem vt fateri cogeretur, non alio; nec perfectiori modo id fieri potuisse. Dicam ego audacius Angelos omnes etiam, si mille annos in hominis structura consumpsissent, eam nec dissimili ratione, nec melius adumbratos fuisse. Abeat ergo cum suo commento Epicurus, Momus vero imprudentia dandus qui fenestrata optabat corpora vt animi omnes affectus paterent. An non (Mome) in facie, vultu & oculis lucet animi omnia pathemata? Sunt oculi animi indices, vt vultus animi est imago, per oculos velut per fenestrã ad animũ vsq; penetratur, vt præclare dixerit Alexander ὁφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς κατὰ πρὸν εἶναι, oculos animæ speculum esse. Mirantur oculi, adamant, concupiscunt, amoris, iræ, furoris, misericordiæ, vltionis indices sunt, denique ad animi affectus omnes oculi sunt cõpositi, eius imaginẽ ita exprimentes vt alter animus esse videantur, hos enim cum osculamur, animum ipsum attingere videmur. In facie vero quam manifesta vi sunt motus, timentis, cupidi, irati, gaudentis animi signa! In vultu audacia, pudor, maiestas: conspicua sunt. Namque in supercilijs superbia inhabitat, in genis pudor, in mento maiestas, in corde nascuntur hæc omnia, sed hic sedem habent, huc subeunt, hinc pendent. Iam vero illotum effrenis audacia cohibenda est, qui naturam tristem nouercam appellant, quod hominem omnino nudum & animo, & corpore ptoduxerit, ideoque animalium omniũ imperfectissimum esse contendunt. Ac de animæ quidem nuditate ita philosophantur. Cetera animalia sentire suam naturam, alia pernecitatem vsurpare, alia præpetes volatus, alia nare, hominẽ scire nihil, non fari, non ingredi, non vesci, denique animal ceteris impetaturũ non ad aliud naturæ spõte ferri, quã ad fletũ, vt à supplicijs virã auspice- tur, vnam tantũ ob culpam, quia natum est. Sed & vincitur (aiunt) à multis, sensuũ

*Epicuri error
enunciatur.*

*Momus calum-
nia datur.*

*Quam male
natura tristi
nouercam appel-
latur.*

*Animæ ho-
minis nuda.*

perfectiōne. Nam acie luminum vincunt nos aquilæ, sagacitate narium canes, acutior talpæ & vulpis auditus, gallinæ acrior gustus, araneæ tactus exquisitior; ira imperfectior, homini anima. De corpore vero eorum querelas audiamus. Ceteris animalibus varia tegumenta tribuit natura, testas, cortices, villos, fetas, pennas, squamas, vellera, cornua, dentes, ungues, quibus & se tueri & alia laceffere possint: hominem solum omnino inermem & nudum, natali die, abiecit. Queruntur etiam quod non magnitudine corporis æquemus Elephantes, velocitate ceruos, leuitate aues, impetu tauros, vitæ longitudine coruos, quod solidior sit cutis belluis, decentior damis, densior vrsis, nulli denique aiunt vita fragilior. Sed quam male philosophentur & quam iniqui sint diuinorum munerum estimatores, audiant omnes. Nudum sane ideo creauit hominem Deus, vt rerum omnium quæ naturæ lege imperioque continentur princeps esset. Quemadmodum enim sensuum organa omnis alienæ qualitatæ expertia sunt, vt rerum omnium species admittere queat, nullus in cristallino peculiaris color, nullus in auribus natiuus sonus, lingua nullo sapore fucata, nares vernaculum odorem non habet, tactus extremorum nullum obtinet. Ita non decuit animam hominis quæ, vt docet Philosophus, potestate quodammodo erat omnia, peculiari aliqua arte & industria ornari. Corpus veto nudum & inermesse debuit, ne vni armorum generi tantum addictum esset animal ceteris imperaturum; quam enim & incommodum & indecorum fuisset homini, ad contemplationem nato, perpetuo gestare arma? potest pro voluntatis iussu & omni armorum genere vestiri & illa statim deponere. Nudus ergo est homo & esse debuit. Sed tribus eum armauit præsidiiis Deus, quæ ceteris animantibus denegauit, ratione ad inuentionem, sermone ad auxilium, manibus ad perfectionem; Ratio, manus est intellectus, rationis oratio, orationis manus. Manus iussa facit, iussa obediunt rationi, ratio vis intellectus est. Itaque pro nuditate animæ duo habuit, rationem scilicet, quæ ars est ante omnes artes, actiui omnium ars & officina, & λόγος id est sermonem animi nuntium; pro nuditate corporis, manum organum ante omnia organa instrumentum instrumentorum. Rationis & manuum opera, licet imbecillus & nudus nascatur homo, à mutis tamen animantibus tutus est, & ea omnia quæ firmitiora nascuntur imo ferociora, etiam si vim cæli fortiter patiantur, ab homine tamen tuta esse non possunt. Vide nunc quisquis es naturæ calumniator, quanta nobis tribuerit parens nostra, quanto valentiora animalia, rationis & manuum opera, sub iugum miscemus, quanto velociora consequamur, quam nihil sit mortali non sub nutu nostro positum. Ita fit vt plus homini conferat ratio, quàm natura mutis: plus linguæ & sermonis velocitas, quam leuitas vsusque pennarum: plus manuum industria quam taurorum impetus, ferini dentes, ungulæ, cum efficeret ea non possint quominus opprimantur à nobis, aut nostræ subiecta sint potestati.

Corpus hominis nudum.

Cur anima nuda, elegans demonstratur.

Cur hominis corpus nudum.

Hominem tribus præsidiiis armant Deus.

Quid rationis & manuum opera præstet homo.

Quid hominis corpus à ceteris distet animalibus, & quid habeat peculiare in sui structura.

CAP. IIIL



AM VERO ne quid à petitis desiderati possit quod ad hominis dignitatem & mirabilem eius fabricam spectet, reliqua quæ vni homini rerum omnium parens & moderatrix diuina sapientia concessit persequamur, & quid hominis corpus à ceteris distet explicemus. Vt in homine & ceteris animalibus, patet est vitæ ac nutritionis ratio; ita vitalium & naturalium organo-

rum in his non est dissimilis structura; sensus vero & motus in quibus animalitatis (date hanc vocem Philosopho) natura consistit, quia in homine nobiliori formæ mancipantur & ad diuiniore usus, quam ad noxiæ fugam ceteraque appetitus obiecta sunt comparati, organa maiori artificio constructa postulabāt. Habet itaque præter ea quæ dicta sunt, erectam scilicet figuram & manus, multa in organorum animalium structura peculiaris, quæ corporis dignitatem magis magisque indicant. Namque ut singula, à capite ad pedes, percurram: soli animalium homini orbiculari figura tornatus est caput, tum ad capacitarē, tum ad *δυσανέθειαν*, ne tam facile ictus excipiat, tum ad faciliorem motum, tum denique quia rationis futurū erat domicilium, anima autem ex cælo rotundo infusa est nobis; Non ramen illud est exquisitè globosum, sed quadamtenus oblongum, verticibus geminis extumescens & ad latera vtrinque compressum.

Vnus animalium homo, cerebrum habet amplissimum & humidissimum ad animalium functionum varietatem, nō enim sine spiritu functiones suas exequitur anima; spirituum materia, sanguis est; copiosus autem sanguis pusillo corpore non concluditur.

Faciem soli homini propriam dicunt, unde Græci *πρόσωπον* appellarūt nomine à re ipsa accepto, quia *πρόσωπεν ὄψεαι*; cæteris animalibus os & rostrū natura dedit. Hic sedem habet audacia, pudor, maiestas, ideo solus homo verecūdatur. Huius faciei aspectu terretur animalia cuncta, quia plures in ea quam reliquo corpore lucent diuinitatis radij. Est porro hoc vnum in ea mirabile, quod cum in facie vultuque nostro sint decem aut non multo plura membra, nullas duas in tot millibus hominum inditeretas effigies cernere liceat.

Sunt in homine solo variegati oculi & numerosissimæ varietatis, cæteris vero animantibus, excepto equo, in sua specie perpetuo similes; sic boum omnium nigri, ouium aquei, aliorum rufi. Distant oculi hominis sibi interuallo, proportionē magnitudinis respectu cæterorum animalium, minimo ut celerius ab altero in alterum transmittantur spiritus. Vni animalium homini deprauantur oculi, unde cognomina strabonum & pætorum ab iisdem qui altero lumine orbi nascuntur.

Palpebræ quadrupedibus in superiore tantum cilio, volucribus in inferiore; Homo solus si struthiochamelum excipias vtrinque palpebras habet.

Nasus homini altior ad decorem, neque alij animalium eminet.

Aures homini tantum immobiles & fixæ ad latus vtrumque in eadem linea cū oculis. Soli homini clauæ sunt datæ.

Nullum est animal quod præter hominem mammas parte gerat priore, Elephantes mammas duas quidem, sed non in pectore habent.

Partes quas homo habet priores anterioresque, pectus, ventrem, guttur, quadrupedes, habent inferiores; quas autem ille posteriores, dorsum, lumbos, nates, hæ habent superiores.

Homo paucissimis tegitur pilis nisi in capite, quod ut humidissimum, ita & pilis est confertissimum.

Animantibus, quæ pilis vestiuntur, partes pronæ hirsutæ sunt, supinæ aut glabræ omnino, aut minus pilis ornata; Homo contra parte priore hirsutior est, quia cum pili operimenti gratia facti sint, egent quadrupedum prona tegumēto, priora autem etsi nobiliora sunt, tamen per corporis flexum fouentur. Homini vero quia ob celsam rectamque figuram corporis anterior pars compar erat posteriori, debuit nobilior pars pilis muniri.

Soli homini pili sub alis & pube erumpunt.

Solus canescit & caluescit homo.

Omnium quadrupedum crura & coxæ, ossibus neruoque abundant, carne deficiunt; homo contra, nullam ferè corporis partem carnosiores habet natibus, tibiis, femoribus.

Flectunt quadrupedes crura priora & posteriora, cōtrario modo quam homo, nam brachia retrorsum flectit, crura antrosum.

Homo cum ad iusta incrementa peruenit, partem superiorem habet minorem quam inferiorem: priusquam vero adolescat, superiorem maiorem habet, contra quàm cætera animalia: propterea nō eodem modo progreditur, sed primum cum infans est, quadrupes reprat, deinde paulatim sese erigit, tandem bipes progreditur.

Cæteris animalibus discrimen ossium nullum est, sed omnia à primo ortu perfecta apparèt: ac pueris sincipur molle est, seroque induratur. Cum cætera animalia nascantur cum dentibus, homo se primo mense dentire incipit. Solus homo terrestrium bipes.

Solus ad amussim rectus, crurum beneficio, incedit.

Solus homo sedet, rum quia diu stare nō potest, ut animalia bruta, quæ & quatuor habent pedes, & humi prostrata iacent: duo autem pedes rotius, corporis molem diu sustentare nequeunt; tum quia necessario sedet, ob nobiliorem finem, ad præclaras artes exercendas, ad contemplationem.

Vni homini cutis polita, æqualis, lucida & maxime temperata; cæteris animalibus aut restacea est, aut omnino pilosa, aut mollior, quia tactus, fundamentum est omnium sensuum; ira que in puriore tactu sensus est defecior, & phanasmata subtiliora, unde animæ sublimior operatio: propterea ingenij vires ex tactu æstimandas putat Aristoteles secundo de anima.

Quàm sit utilis Anatomie ad sui cognitionem.

C A P. V.



CUM ITAQUE homo parvus sit mundus, & eorum omnium, quæ vniuersi istius amplissimo sinu continètur, astrorum, meteorum, metallorum, mineralium, vegetabilium, animalium, spirituum semina in se contineat, quisquis seipsum prædare nonit, omnia nouerit, cum in se rerum omnium habear simulacra. Deum in primis cognosceret, quia ad illius imaginem est efformatus, unde augustum Dei templum dicitur à Theologis: deinde Angelos, quia cum illis intelligit: postmodum bruta, sentiendi enim & appetèdi facultatem cum illis habet communem: vegetat cum plantis: existit cum lapidibus: corporum denique omnium est regula. Propterea sapienter Apollinis oraculo, ut est apud Platonem in Alcibiade, quisque incitatur ad sui cognitionem. Hæc, omnium iudicio, vera est & solida Philosophia. Nam Demonax interrogatus, quando cepisset philosophari, Cum (inquit) cepi meipsum cognoscere. Putabar Socrates furori ac demeritæ proximum esse, supremam inquirere & aliena perferutari, iis ignoratis quæ sunt in nobis. Hoc à verula quadam Thaleti Philosopho Milesio facerè olim exprobratum. Is enim cum, incōsulius oculos ad cælorum cōtemplationem erigens, in foueam cecidisset: O stulte, exclamauit verula, quæ supra te sunt quæris, quæ vero infra te, imo intra te ipsum sunt, ignoras. Magnifica vero vox, non verula, sed

14. Pili sub alis.

15. Solus canescit.

16. Coxæ & crura carne abundant.

17. Partium flexus dissimilis.

18. Superiori & inferiori partium dispar ratio.

19. Discrimen ossium.

20. Solus bipes.

21. Solus rectus.

22. Solus sedet.

23. Solus politum habet cutim.

Qui seipsum nouerit, omnia nouerit.

Sui cognitio quàm sit utilis.

Philosopho digna. At sui ipsius cognitio, ut pulcherrima est, ita & difficillima. Hæc tamen, ex corporum sectione & anatome ipsa, facillime assequemur. Cum enim anima in hoc corporis ergastulum coniecta, functiones suas, sine corporeo organo, exequi non possit, quisquis animæ notitiam comparare volet, is corporis structuram cognitam habere necesse est. Sic Abderita ille Democritus, ut iræ & melancholiæ sedem inueniret, animalium corpora secabat, & cum à ciuibus insanus existimaretur, Hippocratis edicto sapientissimus est iudicatus. Age vero, an non ille sui notitiam habere dicitur, qui animi mores temperare, intestinos tumultus, quorum procellis & fluctibus miserè iactatur, placare, & varia pathemata, quibus tanquam furiis agitur, comprimere ac sedare nouit? At hoc ipsum perbelle nos docet anatome. Qui enim uiderit totum corpus, partiū diuersi generis structura, varium, multiplexque, earumdem continuatione vnū fieri; Qui obseruauerit mirabilem partium *συμπάθειαν*, conspirationem vnā, mutua officia, ut nullis agitatis auaritiæ stimulis sua sibi non referuent, sed cum aliis liberaliter communicent, is proculdubio animi mores ita moderabitur, ut omnia consentiant, & inferiora superioribus obsequantur. Qui singularum partium vsum, figuram, situm, mirabile artificium, & externotum sensuum organa accurate lustrauerit, is quomodo singulis debeat uti, agnoscet facile, quo quid præclarius; quid vtilius; Figuram habes erectam, ut, otiginis tuæ memor, non humi, brutorum modo, reptes, sed in cælum te erigas, dicasque cum Theologis; *Nostra conuersatio est in cælis*. Sunt oculi in supremo loco collocati, ut scias ad hoc tibi datos ut sublimia contempleris.

Aures tibi duas easque patulas construxit natura, ut discas duplo plus audiendū quam loquendum. Linguam vero vnicam dedit, musculis decem & vinculo validissimo, velut freno, alligatam, ore ac dētibz velut clathris clausam, ut prius mēis diiudicet, quam proferat, verbumque prius transeat per limam, quam per linguam. Facultatum animæ sedes si inspicias, rationalem in summo loco, cerebro quippe, caluaria vndique circumsepto, locatam, irascibilem in corde, concupiscibilem in hepate reperies; ideoque debere has superiori tanquam reginæ & principi famulari. Principum vero partium & ignobiliū, mutua si spectent officia principes & ignobiles, videbunt illi quomodo imperare, hi quomodo obsequi debeant. Discant illi, ex cerebro, quomodo populis iura dici debeant: à corde, quomodo ciuium vita & salus conseruanda; ab hepate, liberalitatem; Nam cerebrum in editissimo loco pro tribunali sedens, singulis sensuum *αισθητικῶν* dignitatum officia distribuit. Cor regis instar partium omnium vitam, vitali suo calore tuetur. Hepat gratiosi humoris fons, propriis sumptibus vniuersi corporis familiam; tanquam munificentissimus princeps, alit. Ignobilior autē plebs, quæ sunt leges seruitutis, facile à ministrantibus organis accipiet. Quæ enim in imo ventre continentur partes, hepatis omnes famulantur; ventriculus cibum coquit; intestina distribunt; venæ mesenterij præparant; vesicula, lien, renes, regiam domum expurgant, totāque illuuiem, velut è culina, extrudunt. Quæ in thorace concluduntur partes, cordi subseruiunt; Quæ in capite, cerebro ancillantur: ita mutuas sibi tradunt operas. Quod si earum quædam à debito munere deficiat, tota statim corruiat & labascit œconomia. Hoc artificio olim Menenius Agrippa Romanum populum, qui in montem sacrum secesserat, Senatus Imperium agrè ferentem, reuocauit. Est ergo anatome velut certissima dux, ad præclaram sui ipsius, id est, naturæ propriæ cognitionem: propterea magnanimos Principes, illustrissimos heroas, inuictissimos Imperatores, hæc sui ipsius *γνώσεως* cupiditate pellectos, in ipso etiam

Anatome
certissimam
ad sui cogni-
tionem.

Ducet nos
Anatome
quomodo
sint animi
mores con-
grediendi.

Quomodo sen-
suum sit exen-
dum.

Cur oculi sint
in alto colloca-
ti.

Cur aures
duæ.
Cur lingua
vnicæ.

Anatomes
cognitiō quid
Regibus &
Principibus
inferuat.

armorum strepitu tumultuque bellico, studiose rem anatomicam excoluisse legimus. Alexander magnus, inter tot tantosque rerum præclarè gestarum triumphos, se animalium naturam & singulas partes, sub præceptore Aristotele, diligenter observasse gloriabatur. Historiarum monumentis proditum est, Ægyptiorum reges propriis manibus corpora secuisse. Marcus Antoninus Imperator ex dissectione corporum sui constitutionem didicisse affirmabat. Boetium & Paulum Sergium Consules Galeno olim, Romæ sectionem publice molienti, affuisse accepimus. Hec itaque prima esto anatomes vtilitas.

*Qui Reges &
Principes an-
tistes exco-
luerint.*

Quàm sit utilis Anatomie ad Dei cognitionem.

CAP. VI.



RÆCLARVM est sanè sui ipsius notitiam habere, quod ipsa nos docet & quasi digito indicat corporum sectio; sed longe diuini-
or vberiorque est altera anatomes vtilitas; nobis, quibus Euan-
gelicæ legis splendor affulsit, peculiaris, Dei scilicet immortalis cog-
nitio. Non potest summus ille rerum omnium parens, solus per
se habēs immortalitatem, qui lucem omni luci clariorem incolit,
ad quam nullus aditus patet, quem nemo hominum non oculis modo, sed ne ani-
mo quidem cernere potest, nisi per effectus cognosci, & omnis quæ de Deo habe-
ri potest cognitio, non à priori, sed à posteriori petenda est. Sic Mosè rutilantem
Dei faciem & oculorum aciem obtundentem ferre non potuisse, sacra testatur
pagina. *Inuisibilia Dei* (inquit Apostolus) *per ea quæ visibilia sunt cognoscuntur.*
Quis ergo mirabilem hominis structuram, si attentius contempletur tanti opifi-
cij authorem & architectum non colat, veneretur, suspiciat? *Celebrabo te* (inquit
Regius Propheta) *Domine, quia mirabiliter sum formatus.* Phidie Mineruam, Apel-
lis Venerem, Polycleti regulam miratur antiquitas, eisq; summos decreuit hono-
res; commendatur Ctesicles, quod marmoream statuam tanta arte effinxerit, vt
Samij adollescentes eius potiundi desiderio in templo pernoctarent. Tu horum
omnium Archetypum & exemplar (hominis corpus intelligo) non suspicies? Imita-
bantur illi in operibus naturæ quod est minimum, nempe exteriorem faciem:
nam muta sunt, immobilia, & inanimata eorum opera; hominis quam varij sint
morus iique mirabiles, ipsa corporum inspectio docet. Veterum, quidam humani
corporis fabricam, Dei librum appellarunt. In omnibus sane apparet naturæ nu-
men, teste Heraclito, qui cum in casa furnaria sederet & qui eum alloqui cupiebāt,
intrare non auderent; Intrate (inquit) nam etiam hic Dij sunt. Iouis (aiunt Poætæ)
omnia quidem sunt plena; sed in humani corporis structura est nescio quid augus-
tius, lucet quippe in ea admirabilis Dei potentia, incredibilis eius sapientia, & infi-
nita bonitas. Potentiā quis non ex eo iudicet, quod ex tantillo semine, cuius partes
videtur homogeneæ, & guttulis aliquot sanguinis, tam varias partes effinxerit, ossa
plusquā ducenta, cartilagine totidē, ligamentā quā plurima, mēbranas pene innu-
meras, arteriarū tubos, venarū myriades, neruorū plusquā triginta paria, musculos
ferè quadringentos, viscera denique omnia delineauerit? Incredibilis verò sapien-
tia, in mirabili totius & tam dissimilium partium artificio, apparet. Ingredere tu
quisquis es, etiam Athæ: ingredi, quæso, sacram Palladis arcem (cerebrum homi-
nis intelligo) & regiē illius domus columnas & concamerata inuolucra, superbi
ædificij ingentem molem, suffulciētia, atria, sinus quatuor, speculum lucidum,

*Anatome
quàm utilis
ad Dei cog-
nitionem.*

*Homini stru-
ctura, Desli-
ber est.*

*Dei mirabilis
potentia lucet
in hominis
structura.*

*Dei Sapientia
in artificio par-
tium apparet.*

*Elegans totius
structura ar-
tificium.*

plexus arteriolarum labyrinthicos, venarum mirabiles ductus, Cerebri elices, & aqueductus, nervorum innumeras scarurignes, medullæ illius albæ quam Sapiens in Ecclesiaste funem vocat argenteum miram fecunditatem contemplare. Hinc πύλας solis portas & fenestras animi (oculos dico) mentis aciem intende, crystalli fulgentis nitorem humorum aquei & vitrei puritatem, tunicarum contextum, musculorum in oculis versandis miram volubilitatem intue're: Auris internæ artificium, labyrinthis, cochleis, fenestellis, tympano, tribus ossiculis, stapede, incude & malleolo, musculis exiguis, nervo auditorio, ductu cartilagineo tam affabre cōcinnatum. Lingue pusilli corpusculi, quod benedicit Domino & maledicit hominibus, quod anguillæ & murene in modum tam variis motibus agitur, vires, stru-ctutam, musculos, carnem propriam, membranas, nervos, frenum conspice. Cordis sinus duos, auriculas totidē, quatuor insignia vasa, quæ (vt ait Hippocrates) sunt velut πύλαμοι καὶ πηγαὶ φύσιος ἀνθρώπου, id est fontes humane nature & flumina quibus totum corpus irrigatur, hostiola vndecim, Hepatis mirabiles plexus, arteriarum & venarum diuortia omnia, partium denique animalium, vitalium & naturalium mirabilem structuram conspice; an non etiam inuitus exclamabis. O Architectum admirabilem; o opificem inimitabilem; & cum vaticinatio Prophetæ hyinnum Creatori canes. *Confitebor tibi Domine, quia tuæ sapientiæ magnitudinem declarasti in mei corporis fabrica.* Postremò infinita Dei bonitas in hoc artificio lucet, qui singulis partibus tam benè prouidit, vt quælibet suum habeat peculiare vsum; omnes verò tanta conspitatione ita sint aptè connexæque, vt mutuas sibi tradant operas, & earum vna affecta, reliquæ statim in illius σύμπασιαν trahantur. Hanc partium societatem ita indicauit Hippocrates libello de alimento, σύμπασιον μέλας σύρριον μέλας, σύμπασιον πασιαν, conspiratio vna, confluxus vnus, consensientia omnia. Admiranda igitur hæc in structura corporis Dei opera, sunt velut magistri muti, libri vulgaris Theologiæ & Doctores sapientiæ diuinæ.

Quàm sit utilis Anatome Philosophis & omnibus ferè artificibus.

CAP. VII.



VNT HI DVO Anatomæ fructus vberissimi omnibus, vt opinor, communes: natura nostra primum, dein inuisibilis Dei cognitio: sunt & alij Philosophis, Poëtis, Pictoribus & plerisq; artificibus ad artis perfectionem peculiare. Ac Philosopho quidē naturali vtilem esse Anatomem putat Galenus, vel solius speculationis gratia, vel vt doceat singulare naturæ artificium in qualibet particula. Cum enim illius subiectum adæquatum sit Corpus naturale; hominis autem corpus reliquorum omnium sit μέτρον & regula, non debet nec potest verè Phisicus appellari, quisquis humani corporis historia ignorauerit; propterea summus ille naturæ genius Aristoteles, libros de historia, de partibus & de generatione animalium scripsit elegantissimos. Vtilis etiam est moralis Philosopho. Quomodo enim animi mores temperare; rempublicam aut ciuitatem regere, priuatam domum gubernare debeat, facile, ex mutuis partium officiis & naturalis economiæ constitutione, addiscere poterit. Mitto quam sit Poëtis & pictoribus, ad artis perfectionem, vtilis. Nam & Homerus ipse de Anatomie multa eaque præclara scriptis mandauit; hoc vnum docere institui, Medico Phisico, Chirurgo & Pharmacopœo non modo vtilem, sed omnino necessariam esse.

*Fructus anatome
Philosopho
naturali.*

*Fructus morali
Philosopho.*

*Fructus Poëtis
& pictoribus.*

Medico non modo utilem, sed omnino necessariam, esse Anatomiam demonstratur.

CAP. VIII.

VT AD HISTORIÆ fidem conferre creditur Geographia, ita ad artem medicam humani corporis cognitio videtur necessaria. *Φύσις γὰρ τοῦ σώματος ἀρχὴ τῆ ἐν ἱατρικῇ λόγῳ:* Natura enim corporis; principium est sermonis, in arte medica. vnicam agnoscit Hippocrates libro de Flatibus morborum ideam; sola est locorum varietas, quæ morborum differentiam facit. Quisquis ergo partium humani corporis historiam ignorabit, is earundem affectus male dignoscet, peius curabit, pessime, qui euasuri sint aut non euasuri, prædicet.

Diagnosıs circa duo versatur, affectus scilicet & affectus partis notitiam. Partis affectus in indicia ex multis quasi fontibus, sed situ præsertim, & actione læsa hauriuntur: Qui enim nouit ventriculi actionem esse coctionem, si ea lædatur, venter esse affectum dignoscet: Qui nouerit hepar in dextro hypochondrio situm esse, si dolcat aut intumescat hypochondrium dextrum, hepar non lienum affectum esse affirmabit. At situs & actiones partium ipsa nos docet Anatomie.

Prognoseos apud Hippocratem tria sunt capita, excreta, actio læsa, & habitus corporis, in colore, figura & mole; at hæc sola anatomie dignoscuntur. Curationi quantum inserviat partium cognitio expressit eleganter Galenus initio libelli *ὡς ἐστὶν. πάντα* (inquit) *ἐν τῇ ἱατρικῇ σκόπον ἔχει τὸ κατὰ φύσιν, id est, omnia que sunt in medendo, scopum habent id quod naturaliter est constitutum.* Iubet Hippocrates libro de officina medici, vt similia primum intueatur medicus, dein dissimilia. Aristoteli primo de Anima: rectum, index est sui & obliqui. Quomodo enim fracta aut luxata ossa restituet Medicus, si naturalem eorum situm, figuram & structuram ignoret? Non potest exquisita medendi methodus, nisi per indicationes absolui; at indicatio sumitur non solum à morbo, sed etiam à parte affecta, & pro varia partis natura, temperie, situ, connexu, sensu, immutari debet remedia. Neque vero Medico tantum Phisico, sed etiam Chirurgo & Pharmacopœo necessaria est Anatomie. Chirurgo magis necessaria est externarum partium, vt musculorum, neruorum, venarum, & arteriarum cognitio: ne credat in sectionibus latum ligamentum esse membranam, & rotundum vinculum esse neruum: ne arteriam secet pro vena; qui enim horum ignarus erit, in ancipiti versabitur perpetuo, eritque in rebus securis timidus, & in his, quæ metuendæ non sunt, audacissimus.

Pharmacopœo ad remedium admotionem cōfert partium situm & figuram agnoscere: nam si laboret hepar, hypochondrio dextro: si lien, sinistro: si venter & vesica, hypogastrio: si cot, mammae sinistræ, topica admovebit, fofus, linimēta, emplastra. Talem etiam figuram, qualis est partis figura, cōficiet, ne partes vicinæ obtegantur. Mitto quam sit utilis & necessaria ad Hippocratis, Galeni, & veterum Medicorum scripta illustranda. Multa enim obscura sunt, quibus anatomica cognitio lucem, splendoremque affert eximium; propterea solebāt veteres, medicinæ tyrōnibus, præcepta anatomica tanquam primæ artis rudimenta proponere.

Libro de locis in homine.

Quomodo sit necessaria partium cognitio ad morborum diagnosis.

Necessaria anatomie ad prognosin. Necessaria ad curationem.

Necessaria anatomie Chirurgo.

Pharmacopœo utilis.

Utilis anatomie ad veteris scripta intelligenda.

Qua methodo doceri & demonstrari possit Anatome.

CAP. IX.



VM ITAQUE TANTA SIT Anatomes utilitas & necessitas, studiosos omnes hortor, ut eius studio sedulam ac diligētem operam impendant: nec debet eos artis difficultas terrere, facilis enim est, si ordine ac methodo explicetur. Methodus autem discendę ac docendę anatomes hæc esto.

*Anatomem
duobus modis
comparare pos-
sumus, inspec-
tione & do-
ctrina.*

Anatomicam artem duobus modis comparari posse existimo, *αἰσθητικῇ* seu inspectione & doctrina. Vterque modus ad artis perfectionem est necessarius, sed prior certior, posterior nobilior: ille historicus, hic *ἱστορικὸς* id est, scientificus dici potest. Inspectio vel est figurarum tantum, quę in chartis pingi solent, vel corporum, tum hominis, tum brutorum, hominis mortui tantum, brutorum, & extinctorum, & viventium ad internos partium motus observandos. Doctrinam duobus modis, scriptis scilicet clarissimorum virorum & viua voce, assequimur. Inspectionem figurarum damnarunt quidam, quod sint umbrę tantum, quę studiosos remorantur magis quam promoueant. Si enim (aiunt) plantas non dico pingi, sed ne describi quidem voluit Galenus, verum per manus tradi & doceri, quomodo illam partium corporis nostri picturam tolerasset? Ego tamen non omnino vanam fulemque eam cenſeo; multa enim quotidie noua & prioribus seculis incognita observantur, quę hisce figuris quasi digito indicantur, non secus ac Geometrarum demonstrationes, & Geographorum tabulę. Accedit, quod cadauerum semper non suppetit copia; quę ergo in sectionibus prius sunt animaduersa, hic penicillo ad viuum adumbrata expressaque in memoriam reuocantur.

*Inspectio figu-
rarum non em-
endone damna-
da.*

His tamen solis non puto fidendum, cum nec Nauderum, nec imperatorem, nec alios quo suis artifices hac umbratili & typica exercitatione formare liceat; ad alią itaq; quę certior, est & tutior inspectionem veniendum. Ea porro corporum est, quę cum sint varia in humanis maxime se exercere debet Medicus, quia non brutorum, sed hominis corpora curat, Secentur autem mortua tantum, non viua. Scio veteres, quosdam ut Herophilum & Erasistratum damnatos regum permissione, viuos secuisse, quod etiam nostro seculo fecerunt Carpus & Vesalius. Sed impium hoc & plane inhumanum iudico, nec villo modo necessarium: nam ided viua secantur corpora ut actiones quę in demortuis conspicuę non sunt agnoscantur; at eas per quę in brutis deprehendere licet. Obijcies, differre hominis & brutorum actiones, præsertim animales, nec similia omnino esse organa, motus, musculos scilicet. Sed dicam ego ad motrices & sensificas actiones dignoscendas sectione opus non esse; sunt enim fere omnes sensibus conspicuę; soli abditarum partium sensusq; nostros effugientium motus, sectione deprehendi debent: At similis est in homine & brutis cordis arteriarumq; motus, ut & cerebri, diaphragmatis, intestinorum. Viua ergo nunquam secantur hominum corpora, sed mortua tantum. Veteribus medicis non ita licebat humana secare cadauera, id enim impium credebatur, sed inhumanius iudicatum est, ob anatomes imperitią, viuos necare homines. Nunc principum & legum autoritate id conceditur, & solent in academia Monspelięsi Consules ciuitatis quatuor cadauera quotannis dare. Si desint humana, ad bruta cōfugiendum, eaque & viua & mortua secari debent. In viuorum anatomie actio dignoscitur, quę pars, à quo musculo moueatur. In mortuorum sectio-

*Saltem viuorum
hominum &
impia & im-
pium.*

*Bruta quę ad
humanam cor-
poris magis ac-
cedunt secen-
da.*

ne partium situs, figura, magnitudo, cōnexio, ortus, & similia. Cæterum, cum brutorum varia sint genera, ea quæ ad humanū corpus magis accedunt secanda sunt. Galenus refert ad quinque genera. Primum est ruminantium, quæ cibum reman-
dunt, & à rumine, quasi à quodā ventriculo, ad os reuocâr, vt oues & boues. Secun-
dum est solidam vngulam habentium, cuiusmodi sunt asini, equi, muli. Tertium
ferratos dentes habentium, vt canes, lupi, leones. Ad quartum genus refert por-
cina; ad quintum simias. Omnis autem horum animalium sectio, non confusè, sed
methodo quadam aggredienda est, ideoque præscribendæ sunt anatomicae leges.
Hæc ergo communissima lex fanciatur, vt à notioribus incipiamus, præcedat mor-
tuoꝝ sectio eam quæ viuorum est animalium, quia facilior notiorque.

Deinde, cum partium corporis aliæ sint interne, aliæ externe, primum in externis
sefe exerceant iuuenes, est namque externarum partium facilior, magisque Chi-
rurgo necessaria cognitio.

Præterea, cum partium aliæ sint solide, vt ossa, cartilagine, vincula; aliæ carnosæ,
vt muscoli, ab illis inchoandū, quæ aliorum sunt fulcra, sic ossibus muscoli herēt,
ab illis oriuntur, in ea inferuntur, & sane ante Galeni tempora solebant veteres, in
Alexandrina schola, adolescentibus cadauera ressecata proponere, deinde integra
corpora. Ad solidas autem partes accuratè dignoscendas, aptiora sunt senum &
gracilium corpora, quia excarnia paucoque adipe conferta. Ad hæc cum duplex
sit sectio, vel partis à toto ablata, vel toti adiacentis, prius administranda sectio par-
tis à toto ablata, quia facilior, quam secare toti adiacentem. Sed & cum in singulis
partibus tria spectanda iubeat Galenus, structuram, actionem & vsum, debet ana-
tomicus primum structuram inuestigare, mox actionem, tandem vsum.

Postremo, in sectione administranda duplex ordo obseruari debet. Alter, dum
cadauerum suppedit copia; alter, dum deficit. Si plura adsint corpora, vasa tantum
in vno conspicias: in altero musculōs: in alio viscera sola; si vnicum habeas corpus,
& cuncta velis inspicere, cadauer eligendum incorruptum, suspendio, stragulis
vel aqua extinctum, cuius singule partes ordine commonstrandæ sunt. Est autem
Anatomicus ordo triplex, dignitatis, situs, seu dissectionis & diuturnitatis. Dignita-
tis ordo postulat, vt à cerebro omnium nobilissimo incipias. Situs seu dissectionis
ordo, ea quæ intuenti primo occurrunt, prius commonstrat. Quod si cadauer diu
conseruare velis, ab illis partibus inchoanda sectio, quæ putredini magis sunt ob-
noxie. Ita quæ imum ventrem prius secat, mox thoracem, dein caput, tandem artus.
Hanc methodum in scholis & sectionibus publicis obseruant anatomici omnes,
dum in vno eodemque corpore omnia, aut certè quamplurima demonstrare vo-
lunt. Atque hæc prima est discendæ anatomæ methodus, inspectio scilicet, quæ se-
ctione comparatur. Potest etiam citra sectionem doceri anatomæ, idque aut viuâ
voce, aut scriptis; multa enim sola inspectione sciri nequeunt, quæ describenda, vt
cur tot & tales sint muscoli, cur talis figura, magnitudo, & similia. Euoluenda sunt
ergo & veterum & neotericorum, qui in eo docendi genere excelluerunt, scripta.
Qui autem fuerint anatomæ authores, sequenti capite declarabo. Cæterum, scribi
& doceri potest anatomæ duplici methodo. Altera dicitur ἀναλύσεως seu resolution-
is, quæ totum in suas partes resoluit, vt dum humanum corpus in quatuor præci-
puas partes, caput, thoracem, ventrem, & artus secamus: has rursus minutius con-
cidimus, donec ad simplicissimas peruentum fuerit. Altera est γένεσεως seu com-
positionis, quæ ex similibus dissimilares constituit, & ex his totum componit.
Nos, in hoc opere Anatomico, vtramque methodum obseruabimus. Prioribus

*Quæ methodo
sectio institui
debeat.*

*Leges anatomi-
cæ.*

Prima.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

*Anatomicus
ordo triplex.*

*Doctrinam a-
natomicā qua-
modo cōparare
possumus.*

*Scribenda a-
natomæ du-
plex metho-
dos.*

enim quatuor libris similes omnes particulas describemus, ex quibus totum coagmentabimus. Totum hoc libris sequētibz, in tres ventres & artus scabimus, in quorum descriptione, sectionis ordinem sequemur.

Qui fuerint Anatomes scriptores: ac primum quid de ea Hippocrates.

C A P. X.



*Hippocrates
laur.*

*Hippocrates
non ignorauit
eā Anatome,
quæ affert ad
vsum medi-
cinarum.*

*Ossium natu-
ram quā uole-
gauer descri-
psit Hippoc.*

*Spinæ elegans
descriptio.*

HIPOCRATEM. C O V M, tanquam oraculum Græciæ & numen aliquod venerandum, coluit antiquitas; is enim rudi adhuc & nascenti Medicinæ maximum incrementum præbuit, rerumque omnium, quæ amplissimo illius campo continentur, seminaria nobis reliquit, tanquam bonus agricola, sed omnia satis obscure, & velut αἰνυµατωδῶς, vt tot sint ferè in eo effata, quot nomina. Non erat ante Hippocratis tempora, explorata Anatomica cognitio, nulla extabant ea de re vetetum scripta; primus ille diuino afflatus numine, & sua fretus µεγαλοψυχία, multa, quæ ad artem Anatomicam spectabant, publicis consignauit monumentis. Dicam ingenuè (fremât licet omnes) nihil ferè eorum, quæ ad artis vsum spectare videntur, ignorasse Hippocratem. Cum enim duplex sit Anatome apud Galenum, secūdo de anatomicis administrationibus; Altera vtilis, quæ ad vsum medicum est necessaria; Altera supra vsum artis, quæ ornamentū & voluptatis plus affert quam vtilitatis, superabundantem vocat, illam accuratè & eleganter descripsisse Hippocratem, demonstrare aggredior.

Pattium aliæ sunt similes, aliæ dissimiles. Similes sunt ossa, cartilagines, vincula, membranæ, venæ, artetiæ, nerui; de quibus multa, eaque præclara, scriptis mandauit: Ac de ossibus quidem in vniuersum, qualis sit eorum natura, quis modus generationis, quæ causa materialis, efficiensque, quis vsus, libris de ossium natura, de carnibus, & de natura puelli, aperuit. Materiā his verbis descripsit, vbi pinguis plufquam glutinosi extitit, ossa formata sunt. Efficientem causam ita delineauit. τὰ ὀστέα σκληρύνει αἱ τῶν θερμῶν πηγνύµενα, id est, ossa à calore densata resiccantur. Communè ossium vsum quis tam paucis verbis tam accuratè vnquam expressit? τὰ ὀστέα τοῦ σώματος εἰσὶν καὶ ὀρθότητα καὶ ἑδὸς ἀπαρέχουσαι, id est, ossa corpori stabilitatem, rectitudinem & speciem, seu figuram exhibent. Particularem vero ossium historiam, singulorum differēcias, figuras, partes, descripsit: capitis quidem, libro de vulneribus capitis: reliquorum ossium, libro de articulis, & de ossium natura. Priusquam enim ossium affectus tradat, naturam & figuram cuiusque ossis inquirat. Erit mihi hæc vnica spinæ descriptio instat omnium.

Spinæ (inquit) natura prius cognoscenda est. Est autem illius figura ἰθυσκόλιος, id est, quadamtenus recta, sed ita vt nunc extrorsum, nunc introrsum inclinet. A prima ceruicis vertebra ad septimam vsque, figuram habet λορδὴν, id est, introrsum inclinantem, vt œsophago, & artetiæ asperæ subternatur. A prima dorsi vertebra ad duodecimam vsque, figuram habet κυφὴν, id est, extrorsum protuberantem, vt organis respirationi dicatis, cordi quippe ac pulmonibus, amplior relinquantur capacitas. Lumbi introrsum inclinant; os autem sacrum ἰθὺκυφον, cum rectitudine extrorsum protuberat, vt amplior hypogastrij relinquantur capacitas, quæ vesicæ, rectum intestinum & vterum contineat. Reliqua eodem modo persequitur. De Cartilaginibus, vinculis & membranis, quædam sparsum tradidit. De venis multa, eaque obscurissima, scriptis mandauit, libris de locis in homine, de sacro morbo, de ossiū natura,

natura, & secundo epidem. Ac primum venæ cavæ (quam ἡσυχίαν, id est, Iecorariam vocat) ascendentem & descendentem truncum, eleganter describit, sect. 4. lib. secundi Epidem.

Venæ cavæ
descriptio.

Iecoraria (inquit) per lumbos ad magnam usque vertebra deorsum fertur; ex hepate verò sublata per diaphragma, correcta, deinde iugula petit. Peculiarem autem venarum historiam, id est, exquisitam ramorum diuicationem, & si accurate non delinearit, nihil tamen eorum, quæ ad medendi usum spectant, videtur ignorasse. Nam venarum omnium, quas Medici secare solent, meminit. Secatur venæ frontis, pūppis, linguæ, aurium, iugulares, humeraria, basilica, poplitis, malleoli; at has omnes agnouit Hippocrates Aphorismo 68. sectionis quintæ. Dolenti partem capitis posteriorem recta frontis vena incisa iuuat. Libro tertio de morbis, in angina venas rūdī sub lingua, libro de acibus, locis & aquis, meminit venarum quæ sunt pone aures, quas solebant Scythæ, ut ischiarico dolori mederentur, secare.

Venas omnes
quæ secari so-
lent agnouit
Hippoc.

Iugulares venas descripsit libro quarto de morbis. Libro de ossium natura in lumborum & testium dolore venam poplitis & malleoli secandam iubet. Sectione prima libri sexti Epidem. in nephritide secat venam poplitis. Humerariam descripsit libro de ossium natura, quam appellat sanguifluam. Libro de victus ratione in acutis secat in pleuritide basilicam, quam τὴν ἐῖσω φλέβα, id est, venam internam vocat; Communem verò venarum ortum & usum indicauit libello de alimento, ut & arteriarum. ῥίζωσις φλεβῶν ἡπαρ, ῥίζωσις ἀρτηρίων καρδίη, radicatio venarum hepar, radicatio arteriarum, cor; ex his diffluunt in omnes corporis partes sanguis, spiritus & calor. De nervis multa sparsim leges, sed communem eorum ortum qui omnes ferè latuerat, designauit. Molles enim & sensorios à cerebro, duros & motui destinatos à cerebello ortum ducere voluerunt omnes; at constat nunc quod à quibusdā animaduersum est, præsertim à Varolio, omnes etiam opticos à posteriore cerebro ortiri, quod an non primus indicauit Hippocrates libro de ossiū natura? Νευρίων (inquit) ἐκφυσις ἀπὸ τοῦ ἐντὶ τοῦ ἀχρὶ τοῦ ῥαχίς ἐστι: Nervorum exortus ab occipitio est usque ad spinam, coxendicem, pudendum, femora, brachia, pedes, tibias. De glandulis integrum habes libellum. Atque hæc de similibus vocatis particulis. De organicis verò multa, eaque præclara, scriptis mandauit. De corde aureolum scripsit libellum, in cuius historia ita excelluit, ut ne Galenum quidem ac Vesaliū exactius descripsisse putent; sed multa obscura sunt, quæ commentariis illustrare cœpimus, ut & cæteros Hippocratis libros anatomicos. Historiā fœtus, generationis principia, conceptum, formationem, nutritionem, vitam, motum, partum, an non accuratè descripsit, libris de natura pueri, de septimestri & octimestri partu? Diuina ergo sunt Hippocratis, sed obscurissima de re anatomica scripta.

Nervorum or-
tum indicauit
Hippoc.

De corde au-
reolum libellus.

Quid de Anatomie scripserit Galenus, & quàm malè à Neotericis accusetur.

CAP. XI



GALENVM Græci fetè omnes, Arabes & Latini alterum ab Hippocrate, medicinæ parentem nō immerito prædicant. Is enim vniuersam medēdi artem diuinis planè scriptis tantopere & exornauit, & amplificauit, ut sub eo rursum nata medicina videatur. Multa quidē extabant monumēta veterū, sed confusa & ἀτάκτα erant omnia, quibus summus ille vir ornamentum attulit, sparsa colligens, in culta

Adami lani.

illustrans, confusa certo ordine distinguens, multa particularibus experimentis obseruans. De ceteris medicinæ partibus nihil dicam, hoc vnum audacter affirmabo, Galenum rem anatomicam ita illustrasse, vt cum prioris seculi tenebras discusserit, posteriori lucem splendoremque attulerit eximium. Nam cum tria sint media, quæ ad perfectam Anatomies cognitionem quasi manu nos ducit, sectiones partium, actiones earundem & vsus, singula ita accurate descripsit, vt in eo scribendi genere omnibus excelluerit. Sectionis modum libris de anatomicis administrationibus, de musculorum & neruorum sectione, aperuit. Actiones partium indicauit, libris de facultatibus naturalibus, de placitis Hippocratis & Platonis: de vsu vero singularum corporis partium, libros edidit decem & octo, qui posteros in tantam pertraxerunt admirationem, vt diuini ab omnibus appellentur. Maxima ergo sunt Galeni in nos beneficia. Hunc tamen proh dolor Neoterici ferè omnes vbique carpunt, imo discerpunt, hunc quo iure, quaque iniuria lancinant, hic ambitionis stimulo, ille cauillandi gratia, pauci veritatis studio. Sed quæ admodum fluctus in scopulum impingentes, quanto violentius sese inferunt, tanto miserius dissipantur; ita inanes & ridiculos eorum conatus existimo, qui alieni nominis, maximè vero præceptorum ruina, gradum sibi parant ad gloriam. Accusatur Galenus à Neotericis. Primum, quod brutorum, non hominis, anatomem descripserit: neque enim humana corpora vnquam secuisse dicunt. Deinde, multa eum ignorasse, quæ hodie sunt notissima, vbique iactitant. Tertio, pugnantia & dissentientia sæpe loquutum fuisse. Postremo, omnia confusè & sine methodo scripsisse. Quæ enim (aiunt) in libris de vsu partium, quos diuinos vocatis, methodus obseruari potest? Primum enim de manu, deinde de cruribus & pedibus, postmodum de imo ventre & partibus naturalibus disserit. Verum quàm fuitiles sint hæc calumniæ, & quàm misere hi allucinentur, audiant omnes. Namque vt à prima aggrediar, dico non simiarum modò, sed etiam hominū cadauera sæpe Galenum secuisse: proferam auctoris ipsius testimonia. Libro decimo tertio de vsu partium. Propositum mihi est (inquit) solius hominis structuram explicare. Primo de anatomicis administrationibus. Inspecere oportet quamque particulam præsertim in hominibus. Secundo libro: Iam, (inquit) simiæ pes ab humano differt, quod structura digitorum huic animali sit dissimilis. Quarto de anatomicis administrationibus, & tertio de vsu partium, discrimen affert tendinum, qui in crura & pedes feruntur. Primo de anatomicis administrationibus, femoris caput obliquius esse vult, & musculos dissimiles, qui in tibiam inferuntur; tradit etiam lumborum differentiam inter hominem & simiam. Secundo de ratione victus, hominem differre ait à quibusdam animalibus in exortu venæ azygos: decimo tertio de vsu partium, humanum vterum ab aliis animalibus differre scribit. Si ergo quid habeant simile, quid item dissimile hominum & simiarum corpora, agnouit Galenus, verissimile est eum humana corpora secuisse; nam in similibus dissimilia dignoscere solius est artificis, eiusque peniti. Atque hæc prima fit in Galeni calumniatores depulsio. Dicunt multa ignorasse Galenum, quæ ad humani corporis structuram spectabant, quasi vero proprium hominis non sit ignorare. Nunquid Vesalius multa ignorauit, quæ posthac à Falopio sunt animaduersa, & nos multa quotidie prioribus seculis incognita obseruamus? Sumus, vt bonus dicebat Cauliacensis, in collo gigantis, & vt vetustissimus canit Poëta, εἰς ἀνὴρ οὐ πάλιν ὄρε. Quod autem obiciunt, Galenum sibi ipsi non con-

Neoterici
in Galenum
calumniam.

Prima calum-
nie depulsio.

Galenum ho-
minis structuram
non ignorasse.

Alteram ca-
lumniam de-
pulsio.

sentire, sed pugnantiæ sæpe scripsisse. Discat, fuisse veteribus hoc in more positum, ut sæpe ex aliorum sententia multa proferant. Sic Hippocratem, Aristotelem, & Platonem more vulgari sæpe loquitos fuisse, testatur interpretes. Dum ergo ex aliorum sententia loquutus est Galenus, dissentientia fortasse scripsit; at dum ex professio de re anatomica disputat, sibi ipsi consentit perpetuo. Postremo, libros de usu partium confuse & sine methodo scripsisse clamitant. Sed nescio quod rapiat eos contradicendi & calumniandi æstus; admirabilis enim est eorum librorum methodus, quam multis incognitam, nunc ego in apertam lucem proferam. Propositum est mihi, inquit Galenus, hominis structuram, & singulari eius partium usum explicare; ergo quid habeat in sui structura peculiare, quidque à cæteris animantibus distet, prius aperiendum.

*Galenus doctri-
nam sibi ipsi
conferre.*

*Mirabilis me-
thodus libro-
rum de usu par-
tium explica-
tur.*

Habet autem pro nuditate animæ, rationem, quæ ars est ante omnes artes; & pro nuditate corporis, manum, organum ante omnia organa. De manu itaque, quam solus habuit homo, primo & secundo libris tam accuratè & eleganter disserit, ut posteris gloriam omnem præripuerit. Quia vero crura maximam cum manibus habent affinitatem, estque in eorum structura quid peculiare; nam solus ad amussim rectus crurum beneficio incedit homo, ideo de cruribus libro tertio agit: id enim doctrinæ ordo postulare videtur, ut quæ similia sunt, simul explicentur. His explicatis, quæ homini propria sunt, ad ea quæ sunt homini cum cæteris animantibus communia, accedit. Earum autem partium, quæ hominis, & perfectorum animalium corpora constituunt, cum aliæ conseruent vel indiuiduum, vel speciem, aliæ conseruantibus famulentur, ut venæ, arteria, nervi; de his, quæ indiuiduum conseruant, primo loco disserit. Hæ porro vel naturales sunt, vel vitales, vel animales, unde corpus in tres regiones dirempitur; de naturalibus, quarto & quinto libris; de vitalibus, sexto & septimo; de animalibus, cerebro quippe, octavo: & nono; de iis quæ à cerebro pendent, sensu quippe *αἰσθητικῶν*, decimo, unde decimo, duodecimo, tertio decimo libris, ornate disserit, qui ordo naturæ dici potest. Quæ speciei propagandæ dicata sunt organa, genitales partes intelligo, tum viro- rum, tum mulierum; libris decimo quarto & decimo quinto describuntur. Quæ vero his omnibus famulantur, venæ, arteriæ & nervi, decimo sexto & decimo septimo delineantur. Postremus liber, est velut omnium epilogus. Abeant ergo isti calumniatores.

Quid de Anatomie senserit Aristoteles. CAP. XII.



ARISTOTELEM Philosophi omnes verum naturæ interpretem, eiusdem genium & lumen, vnicum spiritum veritatis, qui non modo incitet animos, sed expleat, alteram denique naturam & eam eloquentissimam appellat. Is enim quæ Physica sunt, & eorundem causas, accuratè exposuit, sed ita obscurè, ut à paucis intelligatur; noluit enim Philosophiæ arcana in vulgus temerè renūtiare; ea ergo non fabularum inuolutis, ut sacri Poëtæ, non superstitionis numerorum ratione, ut Pythagorici, sed obscura breuitate occultauit, & ita edidit, quasi edita non essent. Sic Sepia ne à piscatoribus capiatur, effuso humore atro, se abscondit. Cum autem Physices duæ sint partes; prior, quæ de vniuersali est natura; posterior, quæ peculiarem animalium & hominis naturam inuestigat; in illa describenda omnibus excelluisse tam est notum, quam quod maxime; in hac autem igno-

*Aristoteles
laus.*

*Aristoteles i-
gnoravit non
paucos in pecu-
liari animalium
historia esse
clivum.*

rasse non pauca, & absurda etiam nonnulla scripsisse, Galenus medicique omnes, multis demonstrationibus, sed præsertim *αὐτοψίς*, quæ omnium est certissima, convincent. Scripsit Aristoteles libros de generatione, de partibus, & de historia animalium; sed multa ex aliorum potius quàm ex propria sententia enuntiavit, neque eum hominum corpora secuisse verisimile est: non enim in his, quæ sensilia sunt, ita errasset. Nam & in simularium partium historia, & in dissimularium descriptione, absurda multa protulit: ut dum venas omnes à corde ortum ducere scribit, dum nervorum scaturiginē in corde statuit, dum tres in corde sinus agnoscit, dum cerebrum solius refrigerationis gratia constructum putat, & similia, quæ nos in particulari ossium, venarum, arteriarum, nervorum, cordis, cerebri, & singularum partium historia annotabimus; ea igitur inde repetat studiosus lector.

Quid reliqui authores Græci de Anatome scriptis mandarint.

CAP. XIII.



FERVUNT post Hippocratis tempora insignes quidam viri, qui Anatomicam artem diligenter excoluerunt, & multa publicis consignarunt monumentis, quæ nescio quo fato periēre. Alcmaeus Crotoniata, ut est apud Calchidium, humani corporis anaromen exercuit. Diocles Carystius, Epistola ad Antigonom regem, humanum corpus dirimit in caput, thoracem, ventrem & vesicam. Lycus Macedo in musculorum dissectione existimabatur peritus, eiusque libri, ut scribit Galenus, quarto de Anatomicis administrationibus, magno studio circūferebantur. Quintus Lyci præceptor, de Anatome quædam scripserat: Marinus libros viginti ediderat, de ignoratis in Anatome à Lyco. Erasistratus multa de Anatome prodidit. Herophilus (ut ait Tertullianus) plus quam septuaginta cadauera secuit, & sæpe viva hominum corpora. De eo autem ita scripsit Galenus. Herophilus cum in aliis omnibus, quæ ad artem spectant, tum vero ad exquisitissimam anatomes cognitionem peruenit, ac maiori ex parte, non in brutis, ut plerique solent, sed in hominibus ipsis periculum fecit. Docuit publicè Anatomen Pelops, & Galeni fuit præceptor: is vasa omnia à cerebro ortum ducere affirmabat. Scripsit libellum de venis Diogenes Apolloniata. Asclepiades, Eudemus, Praxagoras, Philotimus, Ælianus, Polybius, Calistus, in ea arte suis temporibus excellerunt. Horum omnium nulla extant apud nos scripta; si tamen Aristoteli & Galeno fides est adhibenda, multa absurda & *γέλαια*, eos protulisse credendum. Fuerunt & recentiores Græci, qui de Anatome quædā consignarunt, ut Areteus, Theophilus, Oribasius. Sed Galeno prima debetur laus, ut iam demonstravimus.

Qui fuerint nostro sæculo Anatomæ Scriptores. CAP. XIII.



*Latini scripto-
res.*

Mundinus.

Carpus.

MULTA ETIAM DE RE Anatomica scriptis mandarunt Arabes, quorum princeps creditur Avicenna: sed omnium maximè Latini, & inter eos qui hoc sæculo scripserunt, eam artem ita exornarunt, ut videatur nunc summum perfectionis fastigium attigisse. Habemus inter veteres Mundinum, qui facili methodo, eaque *αναλύσας* Anatomen descripsit, & in sua resolutione, sectionis ordinem sequutus est. Hunc amplissimis commentariis illustravit Carpus;

sed multa in utroque auctore absurda & mutila deprehendo. Edidit magnum opus Thomas de Zerbis, sed ex aliorum potius sententia loquutum, nec valde in sectionibus exercitatum fuisse puto. Hos sequuti sunt Vasseus, Charolus Stephanus, Andernacus: Omnium meo iudicio accuratissimè scripsit Andreas Vesalius, nihilque eorum, quæ ad secandi peritiâ, actiones partium & vsus spectât, omisisse creditur à quibusdam; sed damnatur à multis, quod cum omnia ferè ex Galeni libris transcripserit, eum tamen nescio quo ambitionis stimulo aut cōtradicens studio lacescere non desierit. Iacobo Sylui hæc prima debetur laus, quod musculorum & vasorum omnium syluam ac confusionem in exquisitum ordinem digesserit, & propriis nominibus designarit: sed multa Typographi vitio in eius scriptis mutila & superflua obseruo. Floruerunt eadem ætate Vesalius & Syluius; sed ille in calūniando nimis mordax, hic in Galeni doctrina propugnanda nimis acer iudicatus est. Multa ab illo contra Galenum temerè sunt effusa: multa hic, dum præceptorem Galenum tutatur, absurda proferre cogitur. Gabrieli Falopio, subtilissimo huius sæculi anatomico, multum debemus: is enim quamplurima prioribus seculis incognita aperuit in suis obseruationibus; Commentaria etiam edidit elegantissima in libellum Galeni de ossibus. Columbus vniuersam hanc artem libris quindecim cōplexus est & ornate & breuiter: Valuerda etiâ Hispanus.

Habemus Eustachij opuscula anatomica de ossibus, & de renum structura. Bauhinus externas & internas partes accuratè delineauit. Extât eruditissimæ Archangeli Picholominæ ciuis Romani prælectiones anatomicae, refertæ multis de rebus controuersis disputationibus. Quædam etiam Varolius Arantius, & Pigafeta de re anatomica scriptis mandarunt. Volcherus Comiter & Felix Platerus hanc artem tabulis illustrarunt, sed illius doctrina facilior est, huius scripta, accurata quidem sunt, sed quæ non nisi à peritis intelligi possint. Sunt & nostrates quamplurimi, qui vulgari & patrio sermone scripserunt: inter cæteros Iacobus Guillelmus, Regius Chirurgus, qui vniuersam Anatomien tam clarè, & tabellis, & figuris exornauit, vt ad grauissimorum authorum scripta, facilem omnibus aditum patefaciat. Idem, de Paræo, & Cabrollo, Regio in Monspelieâ Academia Anatomico, dicere possum. Seuerinus Pineus multa, quæ ad Anatomien spectant, mihi cōmunicauit, quæ nondū sunt edita. Scripsit nuper libellū de notis virginitalis: in quo, partium generationi dicatarum historia, accuratè describitur. Docuit iam à multis annis, & adhuc Lutetiæ docet Anatomien, maxima cum sui nominis cōmendatione. Atque hi sunt ferè omnes, qui rem Anatomica scriptis illustrarunt. Ego superioribus annis, dum Monspelij medicinam docerem publicè, amicorum suâsu, & studiosorum precibus victus, magnum opus edideram, quod nunc polire & illustrare cœpi. Historiam cuiusque partis primum describo, id est, quæcumq; ad structuram, actionem & vsum spectant, deinde controuersia aperio, & disceptationes omnes, commentariorum instar, attexo.

Quid sit Anatomie, & quod duplex. C. A. P. XV.



OMH Græca dictio, sectionem aut secturam quamlibet, apud Latinos sonat. *ἀνατομή* vero, sectio est diligens & accurata, aut sectio quæ fit ad contemplandum & cognitionis causa. Nam *ἀνατέμνω*, est accuratè secare, quia id interdum significat *ἡ ἀνά*. Est autem Anatomies apud Medicos acceptio duplex. Nam aut actionem denotat, quæ manu perficitur, aut habitum animi, & actionem intelle-

Zerbi.

Vesalius accuratissimè scripsit.

Sylui laur.

Falopij laur.

Qui tabulis hanc artem illustrarunt.

Qui Galienū scripserunt.

Anatome duplex, historica & scientifica.

Anatomes definitio.

Quæ requiritur ad sectionem artificiosam.

Instrumenta omnia anatomica.

Altera anatomæ definitio.

ctus perfectissimā. Illa *περὶ ἀνθρώπου*, hæc *περὶ ζώων*, dicitur; illa experiētia, hæc ratione cōparatur; illā inspectione sola & sectione, hæc viua doctorū voce, & eorundē scriptis, assequimur; illā historicā, hæc *ἐπιστημονικὴν*, id est, *scientificā*, dicere possumus; illa ad vsum artis omnino est necessaria, hæc vtilitaturū est, & sæpe supra vsum artis; illa partium structurā, hæc structurę causas, actiones & vsus inquiri. Si priorē significationē spectes, definitur Anatomē, Artificiosa partiū externarū & internarum sectio. Artificiosam dixi, vt distinguatur à fortuita, quam vulnerariam vocat Galenus; sæpe enim in magnis vulneribus tum internarum partium, tum externarum, figuram, situm, magnitudinem & structuram obseruamus, sed satis confusē, nec licet nobis neruorum ramos, venarum diuortia, arteriarumque diuarcationes omnes exquisitè intruēri. Vt autem artificiosa sit sectio, hæc requiruntur. Primum, vt partes à partibus ita separentur, vt singulę integrę nec vllō modo lacerę videantur; dein, vt quę non connata sunt, facile diuidantur; tertio vt quę connata sunt, difficile diuidantur. Quarto, ne plures partes simul iunctas cōstituamus vnā esse, aut ex vnica plures faciamus. Non possunt autem artificiose partes secari, nisi consectorēs & administri accommodata habeant instrumenta: eiusmodi sunt nouacula omnis generis, magnę, paruę, mediocres, acurę, retusiores, rectę, ancipites, id est vtrimque secantes, styli teretes, oblongi, ex ære, argēto, plūbo, cultrum buxēū, eburneum, hamuli, acus obliquarę porius quā rectę, cannulę, calami, tubuli ad inflandas partes, funiculi, ferrę, terebrę, malleoli, modioli & spongię. Posteriore significato definitur Anatome, Scientia quę partis cuiusque naturam, eiusdemque naturę causas exquisitè rimatur & inuestigat. Scientiam dico; habet enim vniuersalia theoremata, & communes notiones, ex quibus primis, veris, immediatis & notioribus, conficiuntur demonstrationes. Naturę nomine multa complector; substantiam, quę domicilium est determinatę facultatis; temperiem, quę similariū forma dicitur; quę consequuntur temperiem, qualitates puta, tractabiles, durities, mollities, densitas, rarietas, crassitudo, tenuitas, colores, sapores, odores. Quę accidunt, compositio scilicet partis, ad quam refero magnitudinem, numerum, situm, figuram, cōiunitatem & situm, postremo actiones partiū & earumdem vsus.

Quodnam sit Anatomæ subiectum, pars scilicet, vbi partis definitio explicatur.

CAP. XVI.

Partis nomen.



TRIVSQUE Anatomæ & historice & scientificę subiectum est pars: non enim corpus integrum continuūque tractat anatomicus, sed in membra partesque diremptum; partis igitur natura cuiusque differentię omnes aperiendę sunt. Pars, particula, membrum, locus, *μέρος, μόριον, τόπος, μέρος*, apud quosdam sæpe vnum idemque sonant.

Partis definitio.

Aristoteles partis nomen in similibus; membri autem, organicis, & maximè compositis, magis conuenire putat. Theódorus, loci & partis nomen latius patere existimat, quam membri; quod membrum de organicis tantum; pars verò & de compositis, & de simplicibus enuntietur. Nobis, cum Hippocrate, & Galēno, nihil inrer est; partemne, particulam, aut locum voces. Partem definit Galenus primo Methodi, quidquid totum complet & integrat; & primo de Elementis, quicquid ad humani corporis constitutionem facit. Est enim pars, ex eorum numero,

quæ Logici τὰ πρῶτα appellant: quippe pars, totius integrique pars, dicitur. Accuratius primo de usu partium definiri partem: corpus, quod nec vndiquaque circumscriptionem habet propriam, nec vnde quaque coniunctum est aliis: quod enim omni ex parte circumscriptionem habet, non pars, sed totum dici debet: cum verò pars totum debeat componere, necesse est cum eo coherere, connexionē quantitatis, reuera ergo in toto corpore existit pars, eique continuatur, sed ratione ab eo diuiditur. Verum, amplior vtraque mihi videtur definitio; non enim viuentes modo (quæ solæ veræ sunt particule, cum solæ actiones edant, solæque morbos pariantur) sed inanimatas etiam; vt pilos, vngues, adipem, medullam ossium, complectitur. Perfectissima, & numeris suis omnibus absoluta à recentioribus hæc traditur partis definitio: *Pars est corpus toti coherens, communique vitæ coniunctum, ad illius functionem usumque comparatum.* Hinc collige, duo ad partis naturam constituendam requiri: Primum vt toti cohereat: deinde, vt sit alicuius gratia, cohereret autem toti, duplici connexionē, Mathematica scilicet, & Physica; prior illa quantitatū est: nam separata animalis pars ab animali toto, non nisi æqui uocē, eiusdem pars, dici debet. Posterior vnio vitæ & specifica dici solet: emortua enim pars etiam si toti cohereat, non nisi æqui uocē pars appellabitur; quia formā cum toto vniocam non habet. Singulas porro huius definitionis particulas, quia minutatim, & accuratè exponit Fernellius secundo suæ physiologiæ libro, nolo in ea explicanda diutius immorari.

Exquisita partis definitio.

Connexio duplex, Physica & Mathematica.

Quid in qualibet parte spectare debeat Anatomicus. CAP. XVII.



IN QUALIBET parte multa obseruare solent Anatomici; quæ Galenus libris de usu partium, ad nouem refert capita. Nos, clarioris doctrinæ gratia, ne radiorum ingenia obruantur, tria tantum in qualibet parte spectanda statuimus, ad quæ cetera omnia referri possunt: structuram scilicet, actionem, & usum. Structuræ nomen latissimè hic usurpo, vt sæpe solent, Aristoteles, & Galenus, non pro sola partium conformatione, sed pro eo omni, quod ad partis constitutionem facit. Constituunt autem partem tria hæc; substantia, temperies, & conformatio. Substantia, domicilium est determinatæ facultatis, & cuiuslibet parti peculiaris est, eius ratione, substantia partis dicitur ossea, membranosa, neruosa, carnosa, medullosa; eam autem, partim à forma, partim à materia consequitur, & per sensibiles qualitates dignoscitur: vt duritiæ, mollitiæ, crassitiæ, tenuitatis, raritatis, densitatis, colore, sapore. Temperies substantiam eam comitatur proximè, & materiales sequitur qualitates, non enim abstractum est aliquid, sed suo subiecto firmiter coherens: ideo, partium simularium forma, dicitur à medicis (licet reuera non sit, sed tantum πρῶτον δεξιόν,) temperies: hæc medico consideranda est; nam singulæ partes hoc vel illo modo agunt per temperiem, & qui partium actionem tueri vult, is temperiem conseruare debet. Eius ratione, partes calidæ, frigidæ, humidæ, siccæque, dicuntur: conferuntur autem ad medium aliquod, nempe cutem. Frigidam & calidam temperiem, ratione potius, quàm sensu, exploramus, cum in viuente nihil actu frigidum persentiat. Humidam verò & siccam solus sensus patefacit, mollities quippe, aut durities partis: quicquid enim tangenti durum percipitur, id siccum statuatur, cum nihil concretionē durum sit in viuente: quicquid molle sentitur, idem esto humidum. Conformatio partis in symmetria, & na-

Tria in qualibet parte spectanda sunt.

Structura.

Substantia partis, quid.

Temperies.

Conformatio.

rurali constitutione multorum, consistit: figuræ scilicet, magnitudinis, numeri, & situs. Ad figuram, refero superficiem, meatus, cavitates. Ad situm, & sedem partis, & connexionem cum aliis; non enim peniles, & penitus separatæ inuicem, sunt partes, sed vinculis, & membranis colligatæ coherent; ideo, quibus partibus vinciantur, agnoscere debet Medicus, ut una affecta, sciat, quæ possit in illius sympathiam trahi. Ad conformationem, refert Galenus pulchritudinem partis, quam in ἰσότητι, id est, partium æqualitate, consistere putat, nos, totius corporis pulchritudinem, in partium inæqualitate, quantitate nempe, & magnitudine dispari illarum, locamus; sed, quæ proportionis commensura apto, inter se, ac concinno sibi inuicem respondeant. Atque hæc de structura partis. Subsequitur Actio, quæ Aristoteli finis dicitur structuræ: nam, actionis gratia, & substantiam qualem cernimus, & temperiem, & cōformationem, adipiscitur quælibet pars. Sic cor, quia vitalis facultatis futurum erat domicilium, & arteriosi sanguinis officina, substantiam habuit carnosam & solidam, temperiem calidam & humidam. Figuram aliquantulum oblongam, sed ad sphaericam accedentem proximè, duobus sinubus, & multis quasi foueis excavatam; ibi enim, quasi lares, focumque esse oportuit, unde natiui caloris, & spirituum iugis esset scaturigo. Actionem definitio cum Galeno, motum partium factiarum, vel motum agentis, ut ab affectione distinguatur: affectio enim, motus est passiuus, vel patientis corporis; actio autem, motus est effectiuus. Sic pulsus, actio est cordis, palpitatio, affectio est, seu passio; ille à facultate manat, hic à causa morbifica. Actionum, aliæ sunt communes, aliæ propriæ; illæ, ubique reperiuntur; hæ, ab unica parte perficiuntur: Communis actio est nutritio; viuentes enim partes omnes, & animatæ nutriuntur, cum vita definitur nutritione: propriæ actiones, à peculiari eduntur organo, suntque aut principes, aut principibus ministrantes. Rursum, actionum aliæ sunt similes, aliæ organice. Similares actio à sola temperie inchoatur, ab eadem perficitur, & à quolibet partis particula integra & perfecta editur; organica, à sola temperie non inchoatur, nec nisi à toto organo integra editur. Postremo, partium vsus anatomico considerandus venit: scribit enim Philosophus, nos deduci in cognitionem organi, non ex structura, sed ex vsu. Vsus porro, Græcis ῥῆμα, duplex à Galenò statuitur. Alter sequitur actionem, id est procedit ab ipsa actione, & est finis actionis, ut, ex videndi actione hunc vsum cōsequitur animal, ut fugiat quæ nocitura sunt, & prosequatur quæ vtilia. Hic vsus, actione quidem posterior est, si generationem & constitutionem spectes, sed dignitate prior censetur, quia actionum omnium est finis; finis autem nobilior his quæ ante finem. Alter vsus actionem præcedit, & definitur aptitudo quædam ad agendum; sic, in oculo cristallinus visionem edit primario; reliqui humores, tunice, opticus, neruus, vsus præstant, & ad actionem perficiendam diriguntur. Hic vsus, dignitate, posterior quidem est actione, sed generatione prior: ex quibus patet, differre actionem ab vsu: licet multi soleant cōfundere: nam actio, motus est partis actiuus: vsus vero, aptitudo quædam ad agendum; actio in sola est operatione, vsus etiam in membri otio; actio in omni organo solius est principis partis similis, vsus reliquarum omnium: denique plures partes vsum habent sine actione, ut pili & ungues.

Figura.
Situs.

Pulchritudo
partis.

Actio partis.

Actio quid
sit.

Actuum
differentia.

Vsus.

Vsus duplex.

Quid vsus
differat ab
actione.

Partium differentia, ac primum Hippocratica partium diuifio.

CAP. XVIII.



NTIQUISSIMA est diuini senis sexto Epid. partium diuifio in *ισχυρά* *ισχόρμα* καὶ ὀρμῶντα; id est, *continentia*, *contenta*, & *impetum facientia*. Apertius Alexander corpus diuidit in *σπῆκα* ὑγρὰ καὶ πνευματώδη: id est, *solida*, *humida*, & *spirituosa*. Nos, in nutrienda, nutriētia, & impellentia. Continentia sunt solida & nutriēda. Solida autem nomen non accipio, more vulgi, pro

Continentia quid.

eo quod durum densumque est, nec pro eo quod opponitur rato & concauo, sed cum politionibus Philosophis, pro eo quod est τὸ ὅλον, tale, quod est sui plenum totum, non alieni, quod similem parilemque naturam adeptū est: Nam & solum & solidum à voce Græca sunt ὅλον, mutata aspiratione in sibilum. Hac ratione, carnosæ etiam partēs, solidæ dici possunt & continentēs: Sic cor, viscus carnosum, in suis sinubus, dextro quidem venosum, læuo autem arteriosum sanguinem, continet; Sic medullaris cerebri substantia, multis foveis excauata, & humores, & spiritus continere dicitur. Nutriēda etiam appello solida omnia, quia quicquid solidum est, idem & simile, similis autem actio est nutritio. Contenta, sunt humores, vasis propriis, tanquam ἐργαστηρίοις & conceptaculis conclusi. Galenus interpretatur τὰ ὑγρὰ; τὰ ἐν τοῖς ἀγγείοις ἐμφορόμενα, καὶ κατὰ πᾶν σῶμα διεσπασμένα, ἐν ισχόρμα malunt quidam appellare, vt ea quæ in nobis continentur, & quæ partium substantiam conseruant, facilius indicent; propterea, vocaui nutriētia, vt alimentarios tantum humores, non excrementitios significare, ὀρμῶντα, vel ἐν ὀρμῶντα, impellentia & incitantia refert. Fernelius, ad animæ facultates, non spiritus; sed errat, meo iudicio; Esi enim continentur spiritus, & propria habeant conceptacula, venas, arterias, ac neruos, impellere tamen dicuntur. Loquitur autem Hippocrates de corpore & corporeis, non igitur de facultatibus. Cæterum spiritus nomine, non status intelligo; sunt enim ψευδοπνεύματα, Aui- cennâ fraudulentos vocat spiritus, quorum sæpe tam vehementes sunt impetus, vt maximos in naturali œconomia tumultus excitent, & videatur horum procellis ac fluctibus, vniuersum corpus miserè iactari. Legite, quæ de flatuum vitibus scripsit Hippocrates lib. de flatibus; sed per spiritus primum & immediatum illud animæ instrumentum intelligo, quod animæ & corporis vinculum appellarunt Stoici. Horum spirituum tanta est vis, & naturæ tenuitas, vt celerrime, quauersum ferantur, in omniaque quantumuis crassa & densa, repente se insinuant, vt in animi pathematis, in somno, & vigilia experiri licet. Horum ministerio, viuentium omnes motus perficiuntur, & naturales, & vitales, & animales: insluit per eosdem in singulas partes, vita, nutritio, motus, sensusque. Est denique perennis spirituum motus, & per se, & per aliud; per se, id est ab innato principio continenter mouentur in vtramque partem, sursum & deorsum; sursum, quia leues: deorsum, ratione pabuli. Mouentur etiam ab alio dum pelluntur, dum trahuntur; Pelluntur vitales, corde cōtracto; animales, cōpresso cerebro. Sunt ergo spiritus ἐν ὀρμῶντα: ignei enim sunt & ærei, propterea tenuissimi, & pernecitate veloces: sic se tenent, licet crassum, viscidumque, permeat tamen momento vasa nullis conspicuis cavitatibus peruia, quia spirituosum. Sunt & alia partium differentia apud Hippocratem, libro de veteri medicina, quæ à substantia, figura, & situ pe-

*Quid solidum Philosophi.**Contenta quid.**Impetum facientis spiritus.**Perennis spirituum motus.**Motus spirituum duplex.**Hippocratica partium differentia.*

tuntur. A substantia alia densa, alia rara & succulenta, alie spongiformes, & molles. A figura, alie sunt caue, & ex amplitudine in arctum coactae, alie expansae, alie solidae & rotundae, alie latae & peniles, alie extentae, alie longae. A situ, anteriores alie, alie posteriores, alie profundae, alie mediae, supernae, infernae, dextre, sinistree.

Partium diuisio in Principes & Ignobiles.

CAP. XIX.



CLEBRIS EST, & petuulgata partium diuisio, in Principes, & Ignobiles. Principem partem definitio, quae absolute ad indiuidui totius conseruationem, est necessaria: Aut quae facultatem toti largitur, vel saltem communem materiam. Vtraque ratione, tres tantum statuendae sunt principes partes, cerebrum, cor, hepar. Cerebrum in editissimo loco sedet pro tribunali, singulis sensuum

aioumneiois dignitarum officia distribuens. Cor, regis instar, in medio thorace situm, partium omnium vitam ac salutem, vitali suo calore fouet, ruerit, conseruat. Hepar, gratiosi humoris fons, propriis sumptibus vniuersi corporis familiam, tanquam munificentissimus princeps, alit. A cerebro animalis facultas per neruos, tanquam funiculos, in vniuersum corpus influit. A corde, vitalis per arterias tanquam tubos & aquae ductus, in singulas partes excutrit. Ab hepate, si non facultas, saltem spiritus, si non spiritus, saltem communis materia sanguis, scilicet per venas, in totum corpus diffunditur. Adeo ut, tres tantum absolute, ad totius indiuidui conseruationem, sint necessariae, cerebrum, cor & hepar, quae tanta conspiratione inter se aptae connexaeque sunt, ut muris egeant auxilium, earumque vna intecidentem, reliquae pariter emoriantur. Non tamen par est harum principum partium dignitas: cor enim hepate nobilius existimatur, corde vero cerebrum est praestantius: tum quia diuiniore eius sunt actiones, rationis quippe sedes est ac domicilium: tum quia cerebro omnia famulantur: tum quia formam dat toti corpori: ex cerebri enim & caluariae magnitudine, reliquorum ossium figuram pendere putat Hippocrates. Addit Galenus testes, quia praecipua sunt procretaionis organa: procretaione autem sola, conseruatur species. Sed nos, ad indiuidui totius conseruationem, nihil omnino conferre existimamus: nec enim materiam praestant toti corpori, nec facultatem, nec spiritum, sed qualitem solam cum tenuissima aura, vnde conciliatur carnibus seminalis nidus, & sapor, & ad actiones robur. Ceterae omnes partes, ignobiles dici debent: tum quia, ab illis facultas, spiritus & communis materia non manant: tum quia, singulae principibus famulantur, sic sensuum organa, solius cerebri gratia sunt constructa; sic pulmo, diaphragma, arteriae tam leues quam asperae soli cordi temperando, expurgandoque dicatae sunt. Sic ventriculus, intestina, lien, renes, utraque vesica, propter hepar condita sunt, tum denique, quia earum, ad indiuidui totius conseruationem, nulla est necessitas: non enim αἰσῶς; sed tantum secundum quid, necessariae sunt. Quid quiesco brachio, cruri, ventriculo, conferunt pulmo, lien, renes? Quid pulmonibus, lieni, renibus conferunt crura & brachia? At cor, his omnibus vitam, hepar, alimentum: cerebrum, sensum, & motum suppeditant: ut iecur, cor, cerebrum in omnibus sint corporis partibus, per vasa. Ceterum ut principum partium non eadem est dignitas, ita ignobilium, non sunt iidem gradus. Quaedam enim principibus subseruiunt aliquid preparando, aliae aliquid deferendo, Barbaris, seruitus haec latoria, illa pra-

Quid sit pars principis.

Tres principes partes.

Cerebrum curae praestantissimum.

Testes quomodo principes partes dici debeant.

Quae sint partes ignobiles.

Ignobilium partium differentia.

paratoria, dicitur. Sunt & partes, soli principum expurgationi dicatæ, omnium ignobilissimæ, Barbari Emunctoria vocant. Sic, hepatis ventriculus cibum coquit; venæ, mesenterij rudimentum aliquod sanguini conferunt; venæ caua perfectum sanguinem deferunt; cordi pulmo spiritum præparat: aortæ, tubi cōfectum vitalem spiritum, deducunt. Cerebro, mirabilis plexus, præparat spiritum, nervi deferunt: sunt pone aures, cerebri Emunctoria, sub axillis glandulæ totidem, cordis superflua excipientes, in inguinibus hepatis Emunctoria.

Partium diuisio elegans in similes & dissimiles, eiusque exquisita interpretatio.

CAP. XX.



REQVENS EST APVD Philosophos & Medicos, ad exquisitam morborum dignotionem, omnium maximè necessaria partium diuisio, in similes & dissimiles. Similes primus Plato appellauit *πρωτόγονα*, quod ordine generationis aliquomodo compositis sint priores, quodque corpus primo constituent. Aristoteles *ἀπλὰ καὶ ἀσύνθετα μέρη*, id est, *simplices vocat & incompressas*, quod ex aliis partibus non componantur. aut *πρός τινι*, id est, respectu compositarum: non enim reuera tales sunt, cum animalis corpus simplex esse non possit, igitur nec partes. Primus Anaxagoras, *τῆς ὁμοιομερείας* nomen inuexit, & post eum Aristoteles has partes *ὁμοιομερῆ* similes dixit, quod vnā parilemque substantiam sint adeptæ. Sunt qui eas *πρὸς ὅλην* μέρη, id est, *continuas vocent*, quod secundum materiam & formam continuæ sint. Alij informes dicunt, nos melius vniformes. Aristoteles sensorias; quia, quod simile est, capax est sensibile, & sensus omnis à similibus primario editur. Galenus nunc elementa appellat sensibilia, quia ad sensum simplicissima apparent, nunc *ἐλάχισα σοιχῆα* minimas particulas, nunc prima, & vltima corpora, prima, ratione compositionis; vltima, quia in his, tanquam sensu minimis, corporis dissolutio consistit. Sunt qui solidas vocent, non quod constantes sint & minimè fluxiles (ita enim caro similis non esset) sed quia plenæ sunt vndiqueque, vulgus id solidum dicit quod durum, densum compactumque est; sic aquam & spongiam, nullus è populo solida dixerit. Philosophus solidum id appellat, quod est sui plenum totum, non alieni, quod similis & eiusdem naturæ est. sic, ignis in suo globo, & cælum (licet rarissima sint) solida erunt lectis ingeniis. Hippocrates *ἰσχυρὰ* vocat, id est, continetia. Sed hæc de nomine dicta sufficiant. Iam quæ sit, similiarium partium essentia explicemus. Similars pars duobus modis considerari potest, aut ratione materiæ; aut ratione formæ: si materiam spectes, quæ tota est vniuerso di, & sibi omni ex parte similis, definientur similes partes, ex Aristotele, *ὅσα διαίρῃται εἰς ὁμοιομερῆ*, quæ in partes sibi similes diuiduntur; ex Galeno, quarum omnes particule tum in se, tum toti sunt similes, aut quæ in partes specie non differentes, diuiduntur. Si formam similiarium spectes, definientur, quæ vndique vniformem habent figuram: Nam, cum forma denominationem det propriam, simile aliquid dicitur ob formæ & figuræ similitudinem. Priori ratione, quælibet similatis partis particula nomen retinet totius, non autem posteriore: sic tibie os, ob materiæ similitudinem, est vniuerso di; si autem figuram illius spectes, non erunt singulæ eius partes eiusdem naturæ; non enim minimum illius fragmentum est cauum. Hinc collige similitatem omnem partem organicam dici posse, & malè similari opponi organi-

Similiarium partium nomenclatura.

Similari pars duobus modis consideratur. Definitorum similiarium partium.

Similari pars duobus modis consideratur. Definitorum similiarium partium.

cam : nam Philosophis, partis & totius eadem est natura; totum verò corpus organicum est, quia anima actus est organici corporis. Similariū partium essentia incerta quadam elementorum miscella, & calidi, frigidi, humidi sicque temperie, consistere videtur; ideo à Medicis, temperies forma similariū dicitur, quia est *ἡ αὐτὴν δεξιῶν*, primaque vis, cum qua, & per quam forma agit, & patitur quicumque agit pars similis vř similis: sic nutritio, quæ partium similariū communis est actio, à sola temperie inchoatur, ab eadem perficitur, & à qualibet partis particula integra & perfecta editur.

Similariū partium differentię, aliæ philosophicæ sunt, aliæ medicæ. Philosophus, à primis qualitatibus, & iis quæ temperiem consequuntur, suas differentias capit; Medicus, à sensibilibus & materialibus generationis principiis. Primariæ qualitates quatuor quidem sunt, sed quia caliditas & frigiditas actus quodammodo sunt; actus autem secundum se indiuisibilis, à sicci tantum & humidi diversitate, differentias sumit Philosophus. Itaque apud Aristotelem, partium similariū aliæ statuuntur humidæ, aliæ siccæ. Humidæ, vel sunt propriè sic dictæ, quæ scilicet, suæ præ natura, suis terminis sese continere nequeunt, ideo conceptaculis indigent, vř sanguis; vel molles, quæ suis terminis sese magis continent, vř caro. Sicque dicuntur, quarum superficies compressa, difficile vel nihil cedit, eas *σπῆξ* vel *σπῆξ ῥὰ μέν*, id est, solidas vocat, quarum duo constituunt genera: Alię enim sunt fragiles, quæ flecti sine partium dissolutione nequeunt, vř ossa; alię lenes seu ductiles, quæ flecti extendique sine dissolutione possunt, vř ligamenta & membrane; Medici à sensibilibus & materialibus generationis principiis, similariū partium differentias colligunt. Principia materialia duo sunt, seminis crassamentum (soli enim spiritus sunt opifices) & sanguis; iraque partium alię sunt spermaticę, alię carnosę. Ille, immediatè ex seminis crassamento, hæc ex sanguine generantur, ille, in adultis & senioribus difficile coalescunt *ἡ αὐτὴν αὐτῶν*, ob efficienris imbecillitatem (frigide enim sunt) ob materię ineptam dispositionem, quæ tota simul & *αὐτόμας* non affluit, quęque varias subit alterationes; accedit siccitas & durities partium: nam arida unionem facile non admittunt, & in omni mixtione aqueum requirit Philosophus: vř eo, velut glutino, uniantur omnia. Carnosę cōtra, quia calidiores, molliores, & sanguine, nullam fere alterationem subeunte, aluntur, statim coeunt, alias immediare, interdum per medium homogeneum. Spermaticarum partium & carnosarum, varię sunt differentię: semen enim, licet videatur simile; habet tamē parres dissimilis naturę, alias crassiores, alias tenuiores, alias pingues, alias glutinosas, alias tensioni, alias concretioni idoneas. Dum ergo vis procreatrix, in seminis partem, quę tensionis est capax, agit; membranas effingit, venas, arterias, nervos; dum in eam, quę concretioni est opportuna, ossa efformat, & cartilagines; vbi pinguis plusquam glutinosi existit, ossa fiunt & cartilagines.

Rursum, in spermaticis partibus duplicem obseruat substantiam Galenus, verè solidam & carnosam; illa rigari tantum potest, non refarci, hæc velut concretus est liquor, solidis fibris adherescens. Carnosarum partium tria sunt genera, quia triplex est caro. Est caro propriè dicta, musculorum scilicet, quos ideo *σάρξ*, id est, *carnes* absolute vocat Hippocrates. Et caro viscerum *σπέρχυμα* dicitur, quasi affusio & concretio sanguinis, est & peculiaris singularum partium caro. Addamus tertiam similariū partium diuisionem, in communes, & proprias. Communes appello, quę plures & dissimilis naturę compositas partes, con-

Essentia partium similariū temperie est propria.

Differentia partium similariū.

Philosophica diuisio in humidas & siccas.

Medica diuisio in spermaticas & carnosas.

Spermaticarum partium differentia.

In partibus spermaticis, duplex substantia.

Tertia, similariū partium diuisio.

fituunt: eiusmodi sunt ossa, cartilagine, ligamenta, membranae, caro, nervi, arteriae, venae. Ex quibus priores quinque reuera similes sunt, posteriores sensu tantum: nervi enim interior substantia medullosa est, exterior membranosa. Proprias voco, quæ vnius tantum partis substantiam, qualem alibi nullam reperias, constituunt; eiusmodi sunt medulla cerebri, humores oculorum, crystallinus & vitreus. Partium omnium similarium duplex est necessitas; altera, ut ex his fiant dissimiles: altera, ex Auerroë, ut sint sedes virtutum sensificarum: sensus enim omnibus contingit per similes.

Partium similarium necessitas fita & usus.

Similari parti opponitur dissimilitas, ut enim similis, in similes: ita dissimilis, in partes diuersæ speciei, secatur: ut similis partis particulæ nomen totius retinent, sic dissimilatum particulæ nomine carent. Definiantur ergo dissimiles partes, quæ in partes dissimilis naturæ & diuersæ speciei, diuiduntur. Has Medici *ἁπλοῦς* organicas vocant, quod & perfectior euidetiorque sit earum actio, & figuræ concinnitas, magnitudo, numerus, situs (quæ quatuor organi naturam perficiunt) in compositis partibus magis luceant, quam in simplicibus; adeo ut, & ratione formæ, & ratione actionum, magis animæ organa dici debeant: forma namque similarium est temperies, dissimilarium laudabilis conformatio; at conformatio animæ magis conuenit, quam temperies, quia definitur anima, actus organici corporis. Actio similis naturalis est nutritio, quippe, quæ etiam in plantis conspicua est; dissimilis actio animalis est, propterea, illa naturæ, hæc animæ, dicitur. Organum porro definitio, cum veteribus, animalis partem, quæ perfectam edere actionem potest; perfectam interpretor propriam: nam similarium actio communis est, non propria. Organorum quatuor statuit ordines Galenus. Primi ordinis organa appellat simplicissima, quæ ex solis similaribus consistunt, ut musculi.

Quid sit pars dissimilis.

Dissimiles sunt magis animæ organa quam similes.

Secundi, quæ ex primis coagmentantur, ut digiti. Tertijs, quæ ex secundis, ut manus. Quartis, quæ ex tertijs, ut brachium. Rursum, in perfectissimo organo, quatuor partium genera obseruantur. Primum earum est, à quibus primario editur actio; his positus ponitur facultas: propterea, principes dicuntur organi partes; talis est in oculo crystallinus humor, solus enim à coloribus alteratur, & visillum imagines excipit. Secundum genus earum est, sine quibus actio non fit; hæ non actionem primo & per se, sed actionis necessitatem respiciunt; eiusmodi sunt in oculo nervus, opticus, vitreus, & albugineus humor. Tertium, per quas melius editur. Hæ actionis perfectionem respiciunt, ideoque iuniores dicuntur, tales sunt oculorum tunicae, & musculi vnde quaque mira volubilitate oculum versantes. Postremum genus earum est partium, quæ actionem conseruant. Hæ faciunt ut ceteræ omnes tuto agant, & ut actionem diuturnent, non quatenus actio est simpliciter, sed ut perseverare debeat; eiusmodi sunt, in oculis palpebræ, & interior orbita. Hęc dissimilarium & organicarum partium natura est. Ceterum, ne quid videatur intactum à nobis, hoc vnum pro coronide addamus; Partium dissimilarium alias, tales esse primo naturæ instituto, ut manus, & pedes, à quibus, si omnes similes remoueas, in nihilum rediguntur. Alias secundo, propter venarum, arteriarum, nervorum implexum, ut cor, cerebrum, pulmonē: nam si à cerebro similes & vulgatas particulas demas, remanebit adhuc propria cerebri substantia.

Organum quid.

Organorum quatuor ordines.

In perfectis organo quatuor partium genera obseruantur.

Partium dissimilium alia distinctio.

Reliquæ partium differentie explicantur.

C A P. XXI.

SUNT & aliæ partium differentie non ita Medico necessarie, quas tamen, ne quid videatur inactum, breuiter explicabo. Galenus, in arte parua, quatuor partium statuit differentias. Sunt partes, quæ principij rationem habent, eiusmodi sunt cerebrum, cor, hepar, & testes; sunt quæ à principibus oriuntur, eisque subministrant, vt nerui, arteriæ, venæ, & seminaria vasa sunt quæ nec aliorum gubernationi præsumt, nec aliunde gubernantur, sed innatas tantum habent facultates, vt ossa, cartilagine, vincula, membranæ; sunt postremo partes, quæ & insitas, & aliunde influentes vires habent, vt motus sensusque organa. Arabes partium diuisiones colligunt, à substantia, temperie, iis quæ temperiem consequuntur, & iis quæ parti accidunt. Itaque partium aliæ sunt carnosæ, aliæ spermaticæ; aliæ calidæ, aliæ frigidæ, aliæ humidæ, aliæ siccæ; aliæ molles, aliæ duræ; aliæ mobiles, aliæ immobiles; aliæ denique sensu præditæ, aliæ insensiles. Quæ sensu pollent, aut illum habent exquisitum, aut paulo hebetiorem. Exquisitum habere dicuntur tribus modis, vel ob sensus perfectionem; sic cutis quæ volam manus inregit, maximè quæ summos digitos, exactius qualitates tractabiles per sentit; vel quia à qualitatibus, quæ sensum feriunt, tum internis, tum extrinsecus occurrentibus, celerius faciliusque læditur; sic oculus acerrimi sensus esse dicitur, vel quia peculiarem & determinatum sensum habet, quem alibi reperite non liceat; sic os ventriculi sensus est exquisitissimi, vt reliquarum partium exhaustum & suctum per sentiat, & genitalia vtriusque sexus incredibili libidinis æstro percita sunt. Vulgus anatomicorum totum corpus in caput, thoracem, ventrem imum, & artus diuidit, Ægyptij in caput, collum, thoracem, manus & crura; Diocles in caput, thoracem, ventrem & vetricam. Fernelius secundo Methodi corpus in publicas & priuatas regiones dirimir, idque meo iudicio accommodatè ad praxim. Publica regio triplex est: vna verè quæ prima, è gula in mediam iecoris partem dirigitur, in qua ventriculus, venæ melsaricæ, caua iecoris, lien & his interiectum pancreas includuntur. Altera è medio iecore in tenues partium singularum venas excurrit, comprehendens iocinoris conuexa, omnem venam cauam, atque illi comitem arteriam maiorem, & quicquid eorum incidit inter axillas & inguina. Tertia regio musculos complectitur, membranas, ossa, omnem denique corporis molè. Priuatæ regiones multe sunt, quæ propria etiam habent superuacua & peculiare expurgationis ductus.

EORVM QVÆ IN HISTORIÆ CONTEXTV

CCCVRVNT, CONTROVERSA ENODATIO.

QVÆSTIO PRIMA.

De partis definitione.



DE RE ANATOMICA multi quidem scripserunt; sed pauci illa explicare & in perspicuam lucem proferre conati sunt, quæ in historia anatomica observantur inuoluta, summeque ardua. Ego amicorum suavis, & multorum precibus victus, singularum partium historiam describere sum aggressus, cui disceptationes omnes anatomicas, commentariorum instar, subtexere, & quicquid beata Græcorum, & Arabum, ea de re mihi

*Instauratum
anterior.*

astillarunt, vbera, in publicum effundere expromereque institui, non speciosis & politis verbis (nam verbi lenocinium deformat plerumque venustam sententia faciem) sed significantibus, & interdum barbaris dictionibus. Quoniam vero, non grauiora tantum consecrari, sed etiam in rudiorum gratiam in lenioribus ludere consilium est, lubet à partis definitione disceptationes nostras inchoare. Pars, particula, membrum, locus, apud Hippocratem & Galenum, sepe sunt synonyma. Oculum (ait Galenus primo methodi) membrum vocamus, nec enim, siue membrum, siue pars dicatur, quicquam interest; si quis dixerit oculum esse partem, & non membrum, vel membrum, & non partem, à me dissentiet minimè. Primo de locis affectis, Non solum (inquit) recentiores Medici, sed veterum quoque non pauci, corporis particulas, locos nominare consueverunt. Hippocrates, partes, locos appellat libro αὐτὸ τοῦτον τῶν καὶ ἀνθρώπων, id est de locis in homine, & libro de victus ratione in acutis; sunt tamè, qui membrum à parte, & particulam à loco distinguant. Aristoteles, ea tantum corpora, quæ ex diuersæ naturæ partibus constât, membri nomine insignienda vult, ut caput, pedes, manus: quæ verò similia sunt, partes appellat propriè. Theodorus apud Aristotelem, loci, & partis nomen, latius patere existimat quam membri. Idem sentit Galenus sexto methodi. oculum enim, & partem & membrum appellare licet, coruam tunicam partem, non membrum. Sed, quoniam Philosophantes non de verbis, sed de rebus sollicitos esse oportet, nobis, qui aucupes verborum non sumus, nihil interest partem, particulam, membrum aut locum voces, præstat partis naturam definitione ὁρισθῆναι, explicare. Auicenna sen prima primi, doctrina quinta, capite primo, partem definit, corpus ex prima humorum permixtione genitum: ut humores ex prima constant ciborum mistura, & cibi ex Elementis. Sed presior est, & nimis angusta hæc Arabis definitio, quippe quæ solis homogeneis, non eterogeneis conueniat. Quis enim non videt, dissimiles particulas ex similibus immediatè, non ex prima humorum miscella ortum ducere: hoc expressis & apertissimis verbis docuit Galenus primo de elementis: ubi compositas partes, immediatè ex simplicibus: simplices, ex humoribus: humores, ex alimentis: alimenta ex elementis conflare scribit. Qui Arabis partes tuentur, definitionem hanc materialem esse, non formalem, asseuerant: nam & similes & dissimiles in materia communicant: forma autem, & ratio utrarumque diuersa, sed non videt definitionem οὐσαν, formam, quæ præcipua pars est essentie, & quæ dat esse rei, exprimere debere. Aponensis partem definit, corpus solidum & spissum, ex humiditatibus genitum, naturæ viribus insignitum. Sed eodem hæc definitio laborat vitio: simplices enim tantum, non dissimiles conspiciuntur. Extant dug apud Galenum partis definitiones: quarum prior primo methodi cap. 5. & 1. de elementis, cap. 6. Altera, primo de usu partium scripta legitur. Ille, partem definit, quic-

*Pars, particu-
la, membrum
locus, sunt sy-
nonyma.*

*Partis defini-
tio ab Auicenna
trahita improbat.*

*Excusatio
Arabum
nulla.*

*Definitio
Aponensis.*

*Galeni definitio
duæ.*

Vitæque des-
criptio amplius
est.

Argentierij
in Fernelius
edumui.

Fernelij de-
scriptio.

quid totum complet, & integrat, aut quicquid ad humani corporis constitutionem facit: hic, corpus, quod nec undiquaque circumscriptionem habet propriam, nec undiquaque coniunctum est aliis. Sed latior est vitæque definitio: non enim viuentes solum, quæ solæ veræ sunt partes, sed inanimatas etiam, ut pilos, ungues, adipem complectitur. Hac fusa & ampla partis significatione usus est Hippocrates, sexto Epid. dum ἰσχυρότερα καὶ ὁρμηώτερα, humores & spiritus, partes appellat. Sic Aristoteles semen, sanguinem, lac, medullam, pituitam, seuum partes vocat. Perfectam partis definitionem tradit Fernelius, cap. primo libri secundi physiologie, cuius singulas partes sigillatim minutatimque excutit. Argentierius, ut est in omnes contumeliosus, Fernelij definitionem damnat, & humanum corpus variè considerat: primum, ut substantia est, & illius partes statuit materiam & formam, deinde, ut corpus, & illius partes sunt substantiæ omnes corporeæ; postremo, ut viuens & animatum; & ea ratione, quæcunque viuunt, partes viuentis, non corporis dici debent: Male igitur (inquit) humani corporis partem definit Fernelius, corpus toti coherens communique vitæ coniunctum, ad illius functionem usumve comparatum. Verum, nimis arguta sunt hæc, & extra medicam considerationem: nam, hominis corpus, non quatenus Physicum, materia constans & forma, medicus contemplatur; sed quatenus morbo, aut sanitati obnoxium. Itaque ea tantum corpora nomine partis insignienda putat, quæ sanitatis & morbi subiecta sunt; at ea tantum partes morbis affliguntur, quæ actiones edunt, Actiones viuentium sunt non inanimatarum, est enim morbus dispositio; actionem primo & per se ledens: Medica igitur & exquisita est Fernelij definitio.

De partium principatu contra Peripateticos, docetur non vnicum esse principium, cor scilicet.

QVÆSTIO II.

Aristoteles
unicum agnos-
cit principium,
cor scilicet.



DE PARTIUM Principatu nobilis existit inter Medicos & Philosophos controuersia. Summus ille naturæ genius & interpretæ Aristoteles, secundo de partibus animalium, cap. 7. & 10. tertio de partibus animalium, cap. 4. secundo de generatione animalium, libello de vita & morte, libris de somno & de causa motus animalium, unicam statuit principem partem, vnicum vult esse principium, quod omnes facultates sinu complexuque suo contineat: Eiusmodi putat esse cor, venarum, arteriarum & nervorum scaturiginem, caloris, spirituum & visifici necesse fontem uberrimum, primam & unicam conficiendi sanguinis officinam, denique vegetantis, sentientis & ratiocinantis animæ sedem ac domicilium. Hunc sequuti sunt Auerrhoes secundo collectivæ, Aphrodisæus primo de anima, aliiq; ex Grecorum & Arabum familia quamplurimi. Ad huius sententiæ confirmationem, rationes afferunt probabiles quidem & veri specie quadam adumbratas, sed non necessarias. Præstat, (inquunt Peripatetici) vnum principium statuere quam plura: Quod enim principij ratione subit vnum necessario sit oportet: Nam si una est numero animalis anima eaque individua, aut vnum esse oportet totum animalis corpus, aut eius aliquam principem partem unam: non sunt enim sine necessitate entia multiplicanda; & quemadmodum in vniuerso, quod oculis cernimus vnicum esse principium, quod primum mouens, primus motor dicitur Aristoteli octavo Physicorum.

Peripateticorum
rationes.

Primatui.

Οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανιῇ, εἰς κοίρας ἐῖναι.

Haud multos regnare bonum est, Rex vnicus esto.

Cardus Agui-
tat.

Ita in microcosmo, vnicum statuendum est principium, vnicus princeps, eiusmodi erit cor, cuius præstantiam & dignitatem hæc inter cetera luculenter demonstrant, quod omnium
primum

primum vita fruitur postremumque mortem oppetit, unde vita & anime primordium dici potest, quod nullum grauem affectum patiat, nec vite supplicia irahat grauiora, quod sedem quæ in medio est corpore digniorem obtineat, quod eius perpetua motione vniuersa exhilarentur & vigeant, nihilque in animali sit ferax, nisi vis illa præpotens cordis fecunditatem largiatur. Illic (aiunt) anime domicilium statuendum, ubi calor fuerit deprehensus, primum functionum omnium instrumentum: at cor nativi caloris fons est vberissimus, à quo per arterias tanquam riuulos in omne corpus diffunditur ac deriuatur. Quin & ibi facultatum omnium locanda sedes, ubi facultatum apparent organa: At venæ omnes, arteria & nervi à corde ortum ducunt. De arteriis nemo unquam dubitauit. Venarum autem ortus ibi debet statui, ubi earum apparet terminus. At circa cor apparet, estque similis venæ caue & arteriæ magnæ implantatio; sed & venæ omnes cordi sunt cōtinuæ huic affixæ sunt habentque membranas veluti fores appositæ, quæ venarum videntur principia & capita: Per hepar vero disseminantur tantum, reliqua viscera pertransseunt aut in capillamenta abeunt. Est etiam Aristoteli cor neruorum principis: eius enim caro dura est, densa & coriacea, interiores autem sinus, plexus habent neruorum penè infinitos. Postremo cor primum est αἵματι πρῶτον ἰχθύν, primum ζωτικόν, primum χυμικόν καὶ αἰσθητικόν. Primam esse consensendi sanguinis officinam demonstrat Philosophus, quia continetur sanguis in corde, ut vase & conceptaculo, in hepate, ut canali, & nullibi extra venas continetur sanguis præterquam in corde, ut sit cor τὸ σπασμὸς sanguinis; nam & in animi pathematis refugio sanguis ad cor tanquam fontem, non hepar, non cerebrum. Esse autem cor primum sensorium, id est, sentiendi, mouendi, & appetendi vires à corde duci, consensient his rationibus Peripatetici, quod in syncope, deficiente vitali spiritu, præceptum facultatum omnium lapsus & ruina appareat; Quod in noxiorum motibus & fuga, pallor in vitium prosecutione, rubor contracto intus aut foras euocato cordis calore, sint conspicua; Quod ligatis carotidibus caros subsequatur, indeque animalitatis parcant nobis Ciceroniani manes priuatio. Quod letitia, tristitia, spes, motiones sint cordis: in quibus consistit appetentia persequendi aut fugiendi; Quod denique per somnum facultates animales ferientur ac cessent; at somnus retractione fit caloris ad cor. Cerebrum vero temperamento frigidum, ad motum omnino ineptum, refrigerandi tantum cordis gratia constructum, & sensus autorem esse non posse contendunt, cum ipsum sensu omnino careat. Hæc & similia adducunt Peripatetici, quibus sibi persuadent, unicum esse principium, cor scilicet. Verum hæc Aristotelis & Philosophorum decreta, iam pridem à Medicorum scholis explosa sunt & exularunt; si quidem & falsa assumunt illi & probabilia tantum non necessaria proferunt. Quid quæso absurdius quàm argumentationis probabilitatem sensuum, rationis, & experientie auctoritati antepone-re? At venas ab hepate ortum ducere, neruos intus molles & medullosos, foris autem membranis vestitos, à cerebri substantia propagari vel cæcus etiam videt. Observauit summus ille Philosophus, Fibras & villos quamplurimos in utroque cordis ventriculo ex membranularum extremis contextos, & neruulos esse voluit, cum tamen unicus sit isque perexiguus neruulus à sexta coniugatione ortus, qui cordis substantiam ingreditur. Vidi cauam venam in dextro cordis ventriculo insignem, sed non obseruauit hanc cordi adaperiri tantum, & patentissimo ostio hiare, ut in dextrum sinum, tanquam cisternam sanguinem effundat ad vitalis spiritus generationem, non autem cor ipsum egredi, quod tricuspidis illæ membrane foris biantes, intus clausæ, manifestè indicant. Sed hanc de venarum & neruorum ortu disputationem fusiùs suo loco agitabimus, hic obiter hæc dixisse sufficiat. An non rationi & experientie aduersatur, cor sensus & motus principium statuere? Mouetur quidem cor, sed naturalis est, non voluntarius illius motus: mouetur sua, non nostra sponte. Docet quotidianus usus, compressis aut oppletis cerebri ventriculis, ut in apoplexia, epilepsia, & caro otiari omnia, corde autem leso nec motum, nec sensum inter-

Secundatio.

Tertia.

Cor vterumque principium.

Cor neruorum principium.

Quarta ratio. Cor prima est sanguinis officina.

Cor primum est sensorium.

Conuictio Peripateticorum opinio.

Cor nec venarum, nec neruorum esse principium demonstratur.

Cor non est motus animalis principium.

Rati eleganti
contra Peripatetico-
sicos.

cipi. Si cor facultatum omnium esset sedes, ut contendunt Peripatetici, corde affecto eiusque temperamento insigniter deprauato, functiones omnes lederentur, quia actio à temperie; at in hectica febre, in qua alienatio est temperamenti (equalis enim est intemperies) voluntaria & principes facultates illesæ manent. Corde violenter moto, ut sit in palpitazione, nec voluntarius partium motus deprauatur, nec ratio ipsa. Quis neget ab aura pestilente, à venenato morbo hæc haustu vitalem vim oppugnari & obsideri. At ita affecti & sentiunt & ratiocinantur. Refrigerato cerebro statim obrepit somnus? At somnum definit Aristoteles ἡ παύλας τῆς πνεύματος αἰσθητικῆς, id est, quiete primi sensorij. Si facultatum principum, sensificarum aut motricum quæpiam afficiatur, capiti non cordi remedia admo-ia iuuant. Est igitur cerebrum non cor, primum κεντρικόν, primum αἰσθητικόν. Obiiciunt Peripatetici, cerebrum non sentire, propterea sensus authorem non esse. Audiant eruditum Galeni responsum. Non sentit cerebrum αἰσθητικῶς, sed ἐνεργητικῶς. Non recipit species & idola sensilium; sed iudicis instar impressam dignoscit imaginem, & de omni sensu iudicat. Ineptum (aiunt) ad motum est cerebrum, quia frigidum. Imo frigidum esse decuit, id est, minus calidum, ad functiones edendas. Si enim calidissimum esset cerebrum, motus temerarij essent & sensationes deliræ, quales sunt phreneticorum. Per syncopen concidunt animales facultates ob inopiam & exolutionem vitalis spiritus, quo indiget animalis ut foueatur. Ligatis carotidibus fit sensus & motus priuatio, per interceptionem vitalis spiritus, qui animali materiam suggerit. Sed audio exclamantes Peripateticos: præstat unum principium statuere quàm plura. Hoc eis lubens & sciens admitto. Verum ne id in microcosmo fiat, multa prohibent. Certum est neruorum, arteriarum & venarum diuersam esse substantiam, dissimilem structuram, nec eandem omnino temperiem: Quomodo igitur ab unica parte tam varij generis organa pronascentur? Debent organa hæc in exortu esse crassissima, ut celeriter & conferim spiritum & communem materiam in uniuersum corpus effundant; at non tanta est cordis nec alterius principij moles, quæ omnia ex se possit fundere. Tunc accedit, quod cum facultates animæ, corporis sequantur temperiem, nequeunt tam diuersæ facultates, ab unica parte eodem temperamento prædita, manare. Qui fieri potest ut tres diuersæ facultates, & sæpe contrariæ, ratio, ira, concupiscentia, in eodem sint organo? & quomodo dum ira exaestuât cor, ratio ipsi resistit, quæ mediâ gaudet temperie? Quid? an nõ vitalis & animalis facultas diuersam temperiem postulant? distincta igitur organa: cor soli vitali continendæ & promouendæ aptissimum erat, animali autem conservandæ ineptissimum. Nam vitali spiritui gignendo continendoque, valido & robusto opus erat organo, calidissimo & assiduus motibus suffecturo; animalis facultas aliam temperiem postulabat, alioqui motus essent furibundi, sensus præcipites, ratio aberraret perpetuo, quia calidi proprium est, omnia confundere & continenter mouere. His argumentis, tæquam sustibus, Peripateticorum opinio in exilium relegata, & à medicorum scholis repulsa videri possit.

Quomodo ce-
rebrũ sentiat.

Cur frigidum
cerebrum.

Peripateticorũ
rationibus sa-
tisfit.

Cur unicum
non sufficiat
principium.
Demonstratio
prima.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Auicenna
quomodo Ar-
istotelem in-
terpretatur.

Iuniorũ
quomodo opinio.

Quomodo igitur ab unica parte tam varij generis organa pronascentur? Debent organa hæc in exortu esse crassissima, ut celeriter & conferim spiritum & communem materiam in uniuersum corpus effundant; at non tanta est cordis nec alterius principij moles, quæ omnia ex se possit fundere. Tunc accedit, quod cum facultates animæ, corporis sequantur temperiem, nequeunt tam diuersæ facultates, ab unica parte eodem temperamento prædita, manare. Qui fieri potest ut tres diuersæ facultates, & sæpe contrariæ, ratio, ira, concupiscentia, in eodem sint organo? & quomodo dum ira exaestuât cor, ratio ipsi resistit, quæ mediâ gaudet temperie? Quid? an nõ vitalis & animalis facultas diuersam temperiem postulant? distincta igitur organa: cor soli vitali continendæ & promouendæ aptissimum erat, animali autem conservandæ ineptissimum. Nam vitali spiritui gignendo continendoque, valido & robusto opus erat organo, calidissimo & assiduus motibus suffecturo; animalis facultas aliam temperiem postulabat, alioqui motus essent furibundi, sensus præcipites, ratio aberraret perpetuo, quia calidi proprium est, omnia confundere & continenter mouere. His argumentis, tæquam sustibus, Peripateticorum opinio in exilium relegata, & à medicorum scholis repulsa videri possit. Auicenna sen. prima primi, doctrina quinta, capite primo, Aristotelis sententiam interpretatur, vultque facultates omnes in corde ut prima radice insidere; cæterum in aliis membris lucere, hoc est, cor principium esse diuersarum facultatum, sed cerebro uti tanquam instrumeto ad sentiendum, ut animalis facultas radicaliter ita loquitur sit in corde, manifestatiuè in cerebro. Sunt qui pro Peripateticis contendunt in corde, tanquam principio & fonte, facultates principes, motrices & sensificas insidere, in corde neruorum esse radices, sed quoniam angustius est cor, quàm ut neruorum omnium propagines possit ex se promere, cerebrum constructum putant, tanquam secundum principium, in quo non obscure, ut in corde, sed manifeste animales functiones emicent: quam vim cum à corde semel acceperit cerebrum, non nisi ex longis intervallis cordis opera indigeat; perinde ac si legionum ducem ubi semel exercitum disposita, quæ acies à Rege susceperit, regio non amplius indigere presidio dicamus. Volunt itaque cerebrum & hepar partes quidem dici principes, sed hunc principatum

cordis acceptum referendum, non secus ac proreges à summo principe selecti, vicariam gubernandi potestatem à rege accipiunt. Alij nervos à cerebro, venas ab hepate oriri materialiter, sed primum & formale principium esse in corde statuunt. Doctissimus Scaliger exercitatione CCLXXXIX. in corde multa statuit principia. Primarium est τὸ ζωτικόν, secundarium τὸ κινητικόν, hæc neque unquam cessant, neque somno impediuntur aut interceptiuntur, non sunt tamen τὰ πρῶτα αἰσθητικὰ, tametsi τῷ πρῶτῳ αἰσθητικῷ. Ita Peripatetici cum medicis conciliare student doctissimi viri. Sed videntur mihi hæc ab Aristotelis mente alienissima. Nulla enim ratione cerebrum sensus authorem esse, nec ab eo nervos oriri voluit Aristoteles, nusquam vicariam sentiendi potestatem ei tribuit, refrigerandi tantum cordis gratia constructum vult, cum tamen primum sit sensus & motus principium, nec ullam sentiendi ac movendi vim à corde suscipiat. Quod autem dicunt Arabes, facultatem animalem radicaliter esse in corde, manifestatiue in cerebro, id non admittimus. Nam si animalis facultas in corde esset, ut radice, obstructo cerebro non redderetur totum corpus immobile, quia maneret adhuc in sua radice aliquis sensus & motus. At obstructo corde, aut interceptis viis à corde ad cerebrum, tantum abest ut repente animalia sensu & motu priuentur, ut non raro plurima in sacrificiis præciso corde vociferare & currere visa fuerint. Galenus primo de placitis rem totam eleganti demonstratione illustrat. Si cor (ait) vim animalem cerebro tribueret, sane vis ea, aut per venas, aut per arterias, aut per nervos insufleret: non enim alia sunt vasa utrique parti communia. Per venas & arterias noluit unquam Aristoteles vim eam deferri, adde quod vasa hæc non rectè feruntur ad cerebrum, sed varie intorta. Per nervos autem non insuflere id inter cætera testatur: quod secto, aut intercepto nervo, qui per cordis substantiam disseminatur, non occidit animal, sed tantum obtumescit. Verisimilius est ergo cum anima unica sit & simplex, eaque tota in toto, & tota in qualibet corporis particula, non nisi organorum ministerio suas edat functiones, ibi facultatum sedes assignare, ubi facultatum organa magis lucent: At cum fateantur Peripatetici, motus & sensus organa in cerebro magis esse conspicua, quàm in corde, cur non animalem facultatem in cerebro, vitalem in corde, naturalem in hepate cum Medicis locant? Explodatur ergo è Lyceò nostro & schola medica hæc principatum unitas.

Opinio Scaligeri.

Aristoteles mentem non assequuntur unanimes, Ingrabatun Arabum interpretationem.

Galenus elegans demonstratur.

Conclusio tantum diffinitio.

Quot sint principes partes. QVÆSTIO III.



M ergo ex his, quæ fusa verborum serie discernimus, cuilibet planum & apertum sit, non unicum esse principium, sed plura iam quot ea sint videamus. Hunc sane principum partium numerum non aliunde quàm ex principatus essentia & definitione colligere possumus, at non satius inter medicos cõstat quid sit pars princeps. Galenus libris de usu partium, principatum definit necessitate, ut ea pars princeps dicenda sit, quæ ad vitam est necessaria. Volo (inquit) indicare quibus notis pars princeps indicanda sit, ex utilitate scilicet, quæ cum triplex sit genere, aut enim refertur ad vitam simpliciter, aut ad vitam commodiorem, aut ad utrarumque conservationem; quæ ad vitam necessarie sunt, hæc principes sine dubio sunt habenda. cap. i. libri 14. de usu partium, triplex nature fuit scopus in partium humani corporis structura. Primus earum quæ ad vitam necessarie sunt, eiusmodi sunt principes, cerebrum, cor, hepar, &c. Definiatur ergo pars princeps à nobis, quæ absolute ad individui totius conservationem est necessaria. Argenterius, qui studio cõtradicens Galeno bellum indixit, definitionem hanc rejicit, quia si definiatur principatus necessitate: ventriculus, pulmo, lien, vesica, renes, partes erunt principes. Ventriculi enim actio ad vitam est necessaria. Pulmonis opera ne ad punctum quidem temporis animal cavere potest.

Quid sit pars princeps.

Prima definitio principatus. Argenterij in Galenon calumniam.

Urina interceptio leibalis, eius ergo excretio, quæ renum & vesicæ sit ministerio, necessaria. Sed mentem Galeni non videtur assequutus, est enim parium necessitas duplex. Sunt quædam absolute necessaria ad individui totius conservationem: sunt alia non ἀπὸ τῶς, sed secundum quid necessaria: priores verè principes dicuntur, ut cerebrum, cor, hepar: posteriores principibus observantur. Quid brachio, cruri & ventriculo præstant pulmo, renes, vesica, lien. At brachio, cruri, ventriculo, cor vitam; hepar alimentum; cerebrum sensum & motum suppeditat. Hac iunioribus obscuriora videri poterunt, faciam tamen ut explorum appositione illustriora & clariora evadant. Hepar regionis infimæ unicus est princeps, & solus in ea absolute necessarius, suis sumptibus universi corporis familiam alens, reliqua omnes propter hepar condita sunt. Ventriculus hepatis cibum tanquam famulus subministrat: vesicula bilem: splen melancholicum succum: renes serosum humorem expurgant. Ita regie hepatis domus illuuiem totam velut è culina extrudunt. Ministrant itaque hepatis omnes, & si necessarie sunt, non absolute & per se, nec ad totius conservationem, sed ad hepatis solius ministerium sunt necessaria, Galeno lib. de formatione fœtus. Cor in media regione sedet tanquam in regia. Pulmones, diaphragma, arteria omnes, cordis solius gratia, sunt constructa, idem de cerebro statuendum. Solæ igitur hæ partes, cerebrum, cor, & hepar, principes sunt, quia solæ ad individui totius conservationem absolute sunt necessaria. Respondet alio modo Galenus: Ventriculi actionem non esse absolute necessariam: sed tantum si per longa temporis spatia duraturum sit animal, quia quæ per hyemem in latibulis degunt, ventriculi non egent actione: quin etiam clysteres nutriendes ad ventriculum usque non feruntur, eorum tamen portio à mesaraicis suggitur & ad hepar transportatur: Vinit ergo ad tempus animal sine chylo, quæ actio est ventriculi, non autem, ut docet Galenus sexto de placitis, sine αἵματι τῶς, quæ propria est hepatis functio. Quod de pulmonibus obtrudunt nullius momenti est: non enim absolute ad vitam confert pulmo, sed ad cordis commoditatem tantum. Posset cor per asperas & leues arterias aëris inspiratu frui, sed ne extraneus & impurus aër repente irruens cordi officeret, pulmonem medium interposuit natura, tanquam spiritus ἐπὶ πύρρῃ πύρρῳ, ita neotericorum obiectis satisfactum putamus, & solas eas partes principatus titulo insigniendas, quæ ad animalis conservationem absolute sunt necessaria. Sed video quosdam Galenum Galeno obijcientes, & solum cor principium statuentes, quia solum cor absolute necessarium. Hæc sunt Galeni capite primo libri quinti de locis affectis verba. Si nec nutriatur animal, nec sentiat, nec moveatur (quod in subterraneis & latentibus animalibus contingit) nihilominus vivere ipsum posse, quoad cor manserit illa sum, certissimum est; at si cor respiratione priuatur, hominem illico interire necesse est. Respondemus, cerebrum & hepatis actionem in sanguineis & perfectis animalibus necessariam omnino esse, at quæ per hyemem in latibulis degunt exangusta sunt, quinimo etiam absque respiratione vivunt quædam ad tempus, ut hysterice mulieres. Est altera principij apud Galenum definitio perlegans cap. 10. lib. 6. de placitis. Princeps pars ea dicitur, quæ vel facultatem toti largitur, vel materiam saltem. Hac ratione tres etiam erunt principes partes. Cerebrum animalem facultatem, cor vitalem diffundit; de hepate ambigi potest, nulla enim videtur naturalis influens cum omnibus insita sit, sed si non facultatem, saltem materiam toti mandat, quod satis est ad principis partis naturam. Avicenna fen. prima, doctrina quinta cap. primo partem principem definit, quæ habet in se principium primarum facultatum corporis, vel in quavis aliqua earum quibus corpus dispensatur, ut in præcipua sede viget maxime. Receniores quidam partem principem definiunt, quæ instrumentum aliquod actuum ex se promit, & aliis partibus communicat instrumentum eiusmodi spiritus est. Itaque tres erunt perpetuo principes partes, cerebrum, cor, hepar. Nam si necessitatem spectes, hæ tantum necessaria sunt: si facultatum principia, in cerebro animalis, in corde vitalis, in hepate naturalis maxi-

Conuelleretur
Argeretur.
Partium duplex est necessitas.

Respondens
Galeno.

Pulmo non absolute necessarius est.

Obiectis in
Galenum.

Respondens.

Altera partium principis definitio.

Avicenna definitio.

Iuniorum definitio.

mè lucent, si instrumenta, à cerebro animalis spiritus per nervos influit, à corde vitalis per arterias, ab hepate naturalis per venas diffunditur. Addit Galenus, in arte parva, testes, non ratione individui, sed ob sobolis & species conservationem. Testes enim nec materiam præstant toti corpori, nec facultatem, nec spiritum, sed qualitatem solum cum tenuissima aura, unde conciliatur carnibus seminalis nidor, & sapor, & ad actiones robur.

Testes quomodo sint partes principes.

Quæ pars inter principes nobilior statui debeat.

QUESTIO III.



IS ita de principum partium numero constitutus, ne quid intactum & quasi prætermisum desiderari possit, quod ad rei huius perfectam cognitionem spectet, quam harum partium nobilior statui debeat, breviter inquirendum. Galenus primo de semine, testes cordi videtur prætulisse. Cor (inquit) viuendi quidem est author, ut bene tamen animantia vivant testes cōcedunt. Præcisus enim testibus, omnis libidinis usus, amorque exstinguitur, nec fœminam prosequuntur mares, nec latitudo venarum amplius inest, nec pulsus validi sunt, sed marci, victi ac veterinosi, glabreta sunt omnia, perit denique virilitas omnis: hic alterum innati caloris fontem statuit Galenus, hic velut lares focumque contineri vult, quo vniuersum corpus incalecat: maxima denique & penè incredibilis testium est vis, non modo ad fecunditatem, sed etiam ad temperamentum, habitum, substantie proprie & morum alterationem: Quanto igitur ipsa simplici vita bene pulchrèque vivere præstantius est, tanto in animalibus testes corde ipso sunt præstantiores. Verum sophistica est Galeni argumentatio: testes enim non dant vivere, ut cor, sed vitam beatiorē reddunt, ut oculi: at quod dat vivere, & hoc, præstantius quidem est quam quod dat vivere simpliciter: testes ad vitam simpliciter nihil, quia sine his vivit animal, quod de corde nemo sentiet, unde conficitur, cor testibus esse præstantius. Magis ambiguo certamine cum corde cerebrum videtur contendere. Peripatetici, quorum princeps creditur Aristoteles & Stoici ferè omnes, maxime verò Chrysippus, cordi principatum hunc deferendum putant, tum quia digniorem sedem obtineat, eam scilicet quæ media est, tum quod nativi caloris fons sit uberrimus, tum denique quia præcipuum sit animæ domicilium, nam & Hippocrates ipse libello de corde, animam in sinistro cordis sinu locat: propterea cor καρδιά vocat, quasi καρτία, quod principatum denotat, κερτος enim imperium est, & κερττω impero. Nos cerebrum corde præstantius esse volumus, quia diuiniore sunt & nobiliores cerebri functiones: sensus namque omnis & voluntarius motus à cerebro est; est hoc sapientie domicilium, memorie, iudicii & cogitationum officina. Sed & cerebro omnia famulantur, eiusque solius gratia totum corpus constructum est. Nam cum intelligentiæ facultas sit sedes, & intelligentem phantasmata speculari deceat, non fiat autem idolorum perceptio, nisi externorum sensuum ministerio, sensuum organa necessario creari oportuit: ad sensuum porro perfectionem locali eguit motu animal, hinc organa motus constructa sunt, muscoli, tendines, nervi: quæ ossibus fulcienda & cartilaginibus, ne vermiculorum more reperet: hæc rursum vinculis colliganda: omnia verò caloris & alimenti influxum, qui ab hepate per venas, à corde per arterias perficitur, postulabant, adeo ut cerebri gratia videatur omnia constructa. Obijcies, sine spiritu cordis & caloris influxu non posse functiones suas obire cerebrum. Responde, id cerebri præstantiam magis indicare, finis enim nobilior est ijs quæ ad finem: vita igitur & cor cerebro ancillantur. Addamus & hoc non inelegans argumentum, quod cerebrum figuram det vniuerso corpori: nam caput solius cerebri gratia constructum est, at ex capitis magnitudine reliquorum ossium naturam putat pendere Hippocrates, non quod oriantur ossa à

Testes corde præstantiores esse docet Galenus probabilis ratione.

Sophistica Galeni ratio.

An cerebrum corde præstantius.

Peripatetici & Stoici cor præstantius cerebro esse volunt.

Nos cerebrum corde præstantius esse existimus.

Elegans demonstratio.

Obiicit.

Respondit.

Altera demonstratio pro cerebri dignitate.

capite, sed quia ossa omnia, proportionem, ossibus, quibus articulantur, respondent: scilicet brachij ossa humero: coxendicis sacro: sacrum vertebri: vertebra spinali medulla: medulla cerebro. Que de cordis etymo afferri solent ridicula sunt. Que vero de eiusdem situ nugantur Peripatetici, nusquam pro veris admittenda putamus. Corporis enim totius centrum agnoscimus umbilicum, trunci vero medium nunquam cor ab anatomicis statuitur. Quod si à situ aliquod dignitatis argumentum peti debeat, cerebrum corde prestantius indicabitur, quia editissimum locum occupavit: sic inter elementa ignis, inter celos empyreum, beatorum sedes, principatum obtinent. Dum Hippocrates animam in sinistro cordis sinu locat, aut loquitur more vulgi, aut per animam calidum intelligit, ut fustus suo loco declarabitur. Statuatur ergo cerebrum nobilius, dein cor, tandem hepar. Nam & in æconomia partium corporis hic ordo servatur, ut que natura ordine prima sunt, dignitate sint postrema. Primum vivit factus vita, planta, mox sentit, eadem rationis sit capax: imperat ergo cerebrum, cor obsequitur. Galenus capite ultimo libri septimi methodi, trium partium principum dignitatem & necessitatem inter se confert his verbis. Maxima sane est cordis dignitas & egrotantibus eius actio omnino necessaria: cerebri vero, ad vitam quidem, par est momentum, non tamen par robur in egrotantibus requiritur: at iocinoris opus omnibus partibus pernecessarium est, non tamen parem habet necessitatem ut cordis. Sunt qui questionem hanc ita dirimendam putant, ut triplex sit principium, unum exortus, alterum dignitatis, tertium necessitatis: exortu quoad parenchyma primum est hepar, nobilitate prestantius est cerebrum, necessitate primum cor statuitur: hæc tamen partes tanta conspiratione inter se aptæ & connexæ sunt, ut mutuis egeant auxiliis, mutuâque requirant operas, & earum una intercidente reliquæ pariter emoriantur, non secus ac in bene instituta civitate videmus & sapientissimum senatum, & fortissimam militum potentiam, & multiplicem artificum varietatem, licet officiis & locis distinguantur, invicem consentire. Hæc apertissimis verbis expressit Galenus lib. de formatione factus cap. 5. Cor, inquit, ubi respiratione privatus fuerit, moveri desinit, hinc mors: privatur autem respiratione, præcisus, obstructus & interceptus nervus: ut ergo cor cerebri indiget opera, ita cerebro usum quendam cor præstat, atque his utrisque iecur. Videtur tamen huic nostre sententiæ adversari Galeni quidam locus cap. 4. lib. 2. de placitu. Sicuti (ait) motus diversi sunt generis, pulsatio & voluntarius motus, ita principiorum neutrum alterius eget opera. Sed ita interpretandus Galenus: cor cerebro animalem facultatem non transmittere, nec cerebrum cordi pulsificam, quia diversa est earum temperies, diversa forma: atque ita, ad ideam motus voluntarii, nihil conferre cor: ut nec cerebrum ad vim illam pulsatilem: non tamen propterea existimandum cordis opera cerebrum non egere.

De partibus similibus & dissimilibus: ac primum de earum numero.

QVÆSTIO V.



DE partium similiarum natura & numero in scholis satis evulgatam litteram in rudiorum gratiam dirimere placet. Sunt qui similes nullas dari particulas contendant, cum earum multiplex sit compositio. Simples enim, inquit Galenus cap. octavo, libri primi de elementis, ex humoribus fiunt, humores ex alimentis, alimenta ex elementis. & lib. 1. de semine: ex semine & sanguine generantur omnes. Sed facilius & expedita responsio est. Similes dicuntur hæc partes, non quod omnino simplices sint & incompositæ, sed quod in partes diversæ speciei fecari non possint, & ex aliis partibus non componantur. Sic Philosophus elementa simplicia, appellat corpora, quod ex aliis corporibus non componantur, licet materia consent & forma. Harum similiarum particularum numerus maxime contro-

Peripateticorum
& Stoicorum
argumenta
refelluntur.

Partium di-
gnitas & ne-
cessitas con-
feruntur.

Questionis re-
solutio.
Triplex prin-
cipium.

Obiectum.

Solutio.

Obiectum.

Solutio.

uersus est. Galenus commentariis in librum Hippocratis de natura hominis, septem enumerat, ossa, cartilagine, ligamenta, membranas, fibras, adipem, carnem. Caterum cum triplex sit caro: musculorum, quæ uera est caro: viscerum, quæ *σάρξ* dicitur: & singularum partium: triplicem hanc carnem similem esse uult, ita enim loquitur capite sexto libri primi de naturalibus facultatibus. Inter similia sunt iecoris, lienis, renum, pulmonum & cordis caro, nec non tunica ventriculi, intestinorum & cerebri proprium corpus: si namque ex singulis, uenas, arterias, nervos exemeris, reliquum corpus simplex & elementare apparebit. Capite sexto libri primi de elementis, nervos, medullam, ungues, pilos, addidit. libello de inequali intemperie tendines & cutim, libro de differentiis morborum, & secundo de elementis, uenas & arterias. Itaque apud Galenum locis citatis, hæc erunt similia corpora, os, cartilago, ligamentum, membrana, fibra, nervi, arteria, uena, caro, cutis, adeps, medulla, ungues, pili. Nos uero quia medullam, pilos, adipem, ungues, à partis definitione exclusimus, nec eas etiam similes appellandas censuimus.

Galenum lenitatis, aut obliuionis accusant multi, quod uenas, arterias, nervos, sepe similes uocet, libello autem de inequali intemperie, organicas & dissimilares. Respondet Argenterius, Galenum in similari parte duo spectare, materiam, & formam: dum neruum, uenam & arteriam similia uocat corpora, materiam respicit quæ unius modi & sibi similis est; dum organicas appellat, formæ rationem habet. Sed nulla est Argenterij solutio: neruorum enim, uenarum & arteriarum materia non est unius modi. Docet Galenus libris de placitis & de usu partium, nervos intus molles & medullosos, extrinsecus membranosos esse, ut arteriarum corpus membranæ & uillis contextum est. Vulgaris solutio magis placet: Partium similiarum duo esse genera, quædam reuera similes sunt, ut os, cartilago, aliæ sensus iudicio tantum: hac ratione, uena, arteris, nervi, similes erunt, quia primo obtutu intuentibus nobis apparet earum substantia unius modi. Verum instabit fortasse quispiam, nervos, arterias, uenas, etiam iudicio sensus simplices non esse, sed compositas: indicat enim sensus interiorum nervi substantiam medullosam, exteriorum membranosam. Nulla (inquit Galenus capite sexto libri primi de naturalibus facultatibus) methodo, aut ratione similes particulas dignoscere oportet, sed ex dissectione & *αὐτοψία*. Hunc scrupulum ita eximendum putat Montanus, ut duplex sit anatome, una exquisitissima & artificiosa: altera rudior, qualis erat Hippocratis, Dioclis & Erasistrati temporibus. Hac rudiori, uena, arteria, nervi similes, primo intuenti occurrunt. Rursum obiciet quis, plures esse similes partes quàm & Galenus, & medici omnes descripserint: Nam medulla cerebri, crystallinus humor, & dorsalis medulla, necnon reliqui humores oculi, partes sunt uerè similes. Dic similia quidem hæc esse omnia, sed ex his unicam tantum partem constitui; Galenum autem de similibus tantum loquutum, ex quibus tanquam elementis sensibilibus & communibus plures dissimiles componuntur.

An similis pars organica dici possit, & an actiones similiarum sint partium vel organicarum.

QVÆSTIO VI.

IN ARISTOTELIS & Galeni doctrina, dissimilare & organicum non distinguuntur. Verum cum essentia partis organice ex eiusdem Galeni decretis, in sola conformatione consistat, id est, figura conuenienti, magnitudine, numero & situ; hæc autem omnia in similibus etiam reperiuntur, facile in iuniorum sententiam adducor, qui similes particulas organicas etiam dici posse contendunt, ideoque similari, dissimilare organico, informe oppo-

Numerus si-
miliarum
partium.

Accusatus
Galenus.

Responsum
Argenterij
pro Galeno
nullum.

Solutio vul-
gari.

Obiectio.

Solutio Mon-
tani.

Obiectio.

Solutio.

Similes par-
tes etiam or-
ganica dici
possunt.

nunt. Id ego Galenum ignorasse non puto, sed quia in dissimilaribus ea compositionis varietas & figura concinnitas magis est conspicua, sunt enim similes uniformes, illas absolute & per antonomasiam organicas appellare voluit. Sic Philosophus primo de ortu & interitu caput, thoracem, & venter principalia appellat organa, quod horum actio & multiformis figura etiam αὐλῶσις cognoscatur. Sunt qui velint organicum duobus modis considerari, aut quatenus figuratum est, aut quatenus actionem edit organicam. Priore significatio similes ferè omnes erunt organice: nam etiam ossa figuram habent propriam, magnitudinem, numerum, situm; Posteriori autem solè dissimiles erunt organice, quia ab his solis actio editur organica. Quis in osse actionem agnoscat organicam? Usus quidem præstant, ossis figura, magnitudo, situs, sed actionem nullam; At vena & musculus, quantumvis simplicissima sint organa, actionem edunt organicam, illa sanguinem distribuit, hic motum voluntarium præstat. Ceterum quo hec illustriora clarioraque euadant, incudi illa reddere & iterum tundere consilium est. Galenus capite sexto libri primi methodi & libro de inequali intemperie, Organum definit animalis partem, quæ perfectam, id est propriam edere actionem potest. Elegantius definitur organum, pars quæ sola sibi propriam peculiaremve edit actionem: sic musculus & oculus organa dicuntur, solus enim musculus movet, solus oculus videt. Similes omnes particule perfectam quidem, sed communem, non propriam omnibus edunt actionem, nutritionem scilicet, propterea organa proprie dici nequeunt. Esse autem similem non organicam actionem, nutritionem, ex utriusque definitione patet. Similis actio ea dicitur, quæ à sola partis temperie inchoatur, ab eadem perficitur, & à qualibet partis portiuncula integra & perfecta editur. Nutritionem eiusmodi esse, clarius est quam ut demonstratione vlla egeat; qualibet enim ossis portiuncula alimentum trahit, retinet, coquit & reliquias expellit, quia qualibet ossis pars os est, totiusque formam ac naturam obtinet; forma hæc temperies dicitur; à sola igitur temperie & inchoatur & perficitur nutritio. Caro (inquit Galenus primo de usu partium capite nono) per solam temperiem est caro: nervus per suam temperiem nervus est. Et primo de facultatibus naturalibus, Qui similium partium actionem conservare studet, temperiem servet necesse est. Actio organica ea dicitur, quæ à temperie sola nec inchoatur, nec absoluitur, nec nisi à toto instrumento integra & perfecta editur: sic visio, quæ propria est oculi actio, non à crystallino tantum, nec ab optico, nec à tunicis perficitur, sed ab omnibus simul. Actionis huius organice forma non est temperies, sed laudabilis conformatio. Non videt oculus, non apprehendit manus, non progreditur pes, non movet musculus per solam temperiem, sed quia hoc vel illo modo sunt cõformata organa. Hoc loco dubitatione & rerum obscuritate æstant quidam, cõtenduntque, actiones omnes similium esse partium, nullas organicarum. Galenum huius sententia fautorem opponunt nobis, qui cap. 2. libri 7. methodi, cap. 3. lib. 6. de locis affectis & secundo de optima corporis constitutione, in omni organo particulam unam vult esse similem, quæ actionis organica causa sit princeps, reliquias usum præstare tantum. Sic visio à crystallino fit, αἰμάτωσις à parenchymate, voluntarius motus à musculi carne; tunice, musculi, nervi, humores duo, visionem aut præstantiorem reddunt, aut conservant tantum. Quin etiam scribit Galenus capite quinto libri de cõstitutione artis, actiones primo & per se similium esse, secundario & ex accidenti organicarum; huc accedit, quod functiones à facultatibus manant, facultates à temperamento, at temperies forma est similis partis. quinto de locis affectis omnium facultatum essentia, vult consistere in tẽperie. Sexto de locis affectis, actiones ex propria partium essentia manare vult, non ex positu. Nam siue cor siue iecur in alia parte ponatur, nihilominus actionem suam obibit. Et decimo methodi de frigido balneo loquens. Hec̃ici (ait) frigidi occurſu, caduntur facile, quia solida & similes eorum partes sunt denudata, à quibus omnes animantium actiones obeuntur. Aristoteli etiam sensus omnis à

similibus

Organicum
duobus modis
consideratur.

Organum quid.

Quid similem
actio.

Forma similem
vult partem
temperies.

Actio organica
quid.

Actio similis
fuit similium
tantum.

Docetur actio-
nes similium
tantum esse.

similaribus est. Hoc illi commento probabile quiddam afferre videntur, sed tamen Galeni mentem offundunt. Agnoscit sane in omni perfecto organo similem quandam particulam Galenus, quæ actionis causa sit princeps, sed actionis perfecta causam nunquam ad solam illius particulæ tæperiem retulit: sic visionis effectricem causam crystallini tæperiem agnoscit cum illius puritate, læuitate & situ, quæ sunt organica. Si enim immuetur crystallini situs, si altius vitro immergatur, seruata quantumuis tæperie, non fiet perfecta visio. Dic ergo actionis quidem principium parti similari deberi, sed perfectam actionem toti organo: & hoc docuit Galenus, cap. 6. libri de differentiis morborum, & lib. de optima corporis constitutione: vult enim à similaribus particulis actiones primo manare, perfectæ autem à toto organo.

Explicatio
Questiois.

Quid sentien-
dum.

De partibus spermaticis an ex semine generentur.

QVÆSTIO VII.

DE PARTIBUS spermaticis tria queri solent. An immediate ex semine fiant, an coalescere possint, & an sanguineis sint calidiores: quæ ordine sunt discutienda. Ac prioris quidem questionis dissolutio, quia difficilis habet explicatus, paulo altius petenda videretur: tota enim seminis natura, quæ multis difficultatibus inuolucris est implicita, explicanda esset; sed quia hæc suo loco amplius disputabuntur, libro scilicet de generatione hominis, hic ea tantum quæ ad institutum spectant, paucis perstringere placet. Conuenit inter Medicos & Peripateticos semen principium esse generationis, sed hi formale tantum & efficiens agnoscunt, illi & formale & materiale: formale, ratione spirituum, materiale ratione corpulentia: Medici itaque ex seminis crassamento spermaticas partes generari volunt, Peripatetici ex sanguine solo. Non est postrema opinio suis destituta patrocinio, sed his se fulcit rationibus. Si ex semine tanquam materiali principio spermatica partes fierent, idem esset actiuum & passiuum, idem actus & potentia, mouens & motum, materia & forma, faciens & factum; at id vera & solida Philosophia non patitur. Deinde ex Aristotelis 2. Physicor. Artifex nunquam est pars sua opificij, semen est velut artifex, & Phidiam appellat Galenus, & cap. 20. libri primi de generatione animalium, semen nulla pars est eius, qui fit, factus: ut nec à fabro quicquam ad lignorum materiam secedit, neque pars ulla artis fabrilis in eo est quod efficitur, sed forma & species ab illo per motum in materia oritur. Quin etiam theorema est medicum, iisdem nutriri nos quibus constamus, at nutriuntur singula partes sanguine generantur ergo omnes ex sanguine. Si partes principes, cor & hepar, ex sanguine generantur, carnosa quippe eorum substantia est, & utrumque viscus carnosum dicitur Hippocrati, cur non & reliquæ partes, quas posterius perfici omnes admittunt? Accedit, quod si masculinum semen efficientem & materiam præstat, cur solus mas in se non generat? Feriabiſſurne seminis natura, quam nunquam otiosam esse prædicant Philosophi? Postremo, potestne tantillum semen semel injectum, partibus omnibus spermaticis, ossibus, cartilaginibus, vinctulis, arteriis, nervis, venis, membranis delineandis sufficere? Non ergo materia sed efficiens solius & opificis rationem habet semen. Huic Peripateticorum sententiæ videtur fauere duplex Galeni locus, quorum alter secundo de facultatibus naturalibus ita scriptus legitur, semen ἀρχὴ τῶν ζώων δευσιχὴ; ἢ γὰρ δὴ ὕλην τὸ καλαμίνιον ἔσθι, id est, principium animalis effectiuum; nam materiale menstruum est. Alter eodem libro, cap. 3. rem hanc apertissimis verbis declarat. Longe (inquit) dissimilis est Phidie & nature ratio. Phidia enim ex cera, nunquam ebur & aurum effinxerit: at natura nullius materie veterem formam seruat, & ex sanguine exanguis generat partes: Os siquidem, cartilago, nervus, vena, arteria, exanguia sunt, ex sanguine tamen facta. Contrariam ta-

Peripatetici ex
sanguine om-
nes partes ge-
nerari volunt.
Ratiō prima.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Autorita-
tis Galeni.

Contraria opi-
nio, generari
spermaticas
partes ex se-
mine.
Autharita-
tes.
Ratio prima.

men tuetur sententiam Galenus: nam libris de semine, in Aristotelem inuehitur, docetque semen & opificis, & materiae rationem habere: Opificis, ratione spirituum; materiae, ratione crassamenti. Hoc admirandus Hippocrates, lib. de natura pueri, libello ὁ ἐὶ ἀρχῶν, & 4. De morbis, primus omnium protulit. Id cogitur sateri Aristoteles, 1. Physicor., & libris de gener. animal. dum partes quasdam ex seminali excremento itemque alimentario, quasdam vero ex alimentario solo fieri scribit; hoc denique rationum momenta hac suadent. Semen pariter candidum, spumofum & crassum in uteri cavitatem effusum, si conceptio fieri debeat, retinetur, statim enim ita exquisitae eius osculum intercluditur, ut ne acus quidē & specilli aciem admittat. Hoc norunt muliercula, & psalteria illa apud Hippocratem, libro de natura pueri, cum semen non effluxisse observasset, septenario saltu genituram conceptam foras eiecit. Si retinetur seminis crassamentum, nec effluit, aut in nihilum resolvatur necesse est, aut ex eo quidpiam fieri debet, aut, ut voluit Peripatetici, in status & vapores dissolvi debent. Primum non admittet Philosophus. Ut enim ex nihilo nihil fit; ita, quod est, in nihilum vanescere nequit. Postremum fieri non posse docet hac ratione Galenus, quod concepto semine contrahatur uterus & semen omni ex parte amplexetur, ita ut statui distendenti nullus relinquatur locus: adde quod si in status dissolveretur semen, distēctus uterus diris torqueretur cruciatibus: Ex una enim parte terra sunt decē aquae; & ex una aqua decē aëris: superest ergo ut ex seminis crassamento partes aliquae efformentur; eiusmodi erunt spermaticae dictae, ossa, cartilaginee, nervi, vena, arteria, membranae. Id & earum color candidus, & substantiae crassities lentorque satis indicant. Iam vero spermaticas partes ex semine fieri ita demonstratur. Ossa, cartilaginee, membrana, vincula, exanguia sunt albaque, non ergo ex sanguine sūt immediate, ut carnes, sed ex sanguine immutato, dealbato, & crassato; at tale seminis est crassamentum: frustra igitur materiam effingendis illis partibus idoneam expellet natura, & quasi sui oblita talem sanguinem efficere conabitur, quale ab initio erat semen. His Galeni demonstrationibus, quas irridet calumniator Argenterius, addemus rationes nostras. Iniecto in uteri sinum semine statim contrahitur uterus & vim seminis sopitam suscitāt, tunc actionem inchoant spiritus & nativus seminis calor: Agit ergo momento semen in materiam aliquam, non in sanguinem, quia nondum affluxit. Quis enim in coitu duplicem secretionem, seminis puta & sanguinis, simul & semel fieri dixerit? Hoc non admittet Peripateticus. Non esse autem sanguinem, qui in coitu excernatur, omnibus notum est. Agunt itaque in seminis crassamentum spiritus, cui tanquam subiecto insident, hoc vndique versant, eiusque dissimilares partes secernunt; ex crassioribus ossa & cartilaginee, ex viscidioribus membranas & vasa effingentes, quibus septimo die delineatis & rudimentum aliquod adeptis, affluit sanguis parenchymata efformaturus, & spatia fibrarum vacua quasi rimas oppleturus. Si ergo dū sit cōceptio, nullus ē venis uteri sanguis adhuc effluxit, quomodo ex sanguine prima fiet partium delineatio? Enimvero sanguinem, quo alitur fetus, & ex quo parenchymata effinguntur, per venas ferri, omnibus est notum. In eum usum constructa est umbilicalis vena, quam Embryi nutriculam vocant. Debet ergo priusquam ad semen feratur sanguis, efformari aliquod vas. Hoc autem quomodo ex sanguine, qui semini nondum permixtus est, generabitur? dices fortasse per venulas uteri effundi in sinum sanguinem; sed si id velis, cur non per easdem venulas immediate alitur fetus? quid vena umbilicali opus erit? debent fetus & matris oscula coire per interiectum vas. Postremò, generari partes ex semine ita demonstratur, quod eadem sit masculi & feminei seminis natura, idem color, idem generationis modus, vasa eadem preparantia, excoquentia, eiaculantia, sola perfectione tantum distinguuntur, quod masculium calidius sit magisque elaboratum, at femineum semen, materiale esse principium admittunt omnes: cur ergo masculi seminis crassamento id denegabimus? Sit hoc igitur ratum, utrumque semen non efficientis modò,

secunda.

Tertia.

Quarta.

Quinta ratio.

sed materialis etiam principij rationē habere. Cuius opinionis veritas ut reddatur illustrior, quæ in contrarium adductæ sunt rationes, ordine dissoluenda sunt. Dum Galenus spermaticas partes ex sanguine generari scribit, non agnoscit generationem tam immediatam, hoc est, non vult os immediatè ex sanguine rubro generari ut carnes, sed ex sanguine varie immutato & diuersas alterationes passo, dealbato incrassatoque. Hoc autem quid aliud est quam ex semine generari? Primæ rationi ita satisfaciendum puto. In semine duo spectari, spiritus & corpulentiam. Ratione spirituum, semen, Aristoteli primo de partibus anim. natura, principium & efficiens rei quæ gignitur, Galenò autem secundo de semine, formator foetus dicitur. Ratione crassamenti materiale & passuum principium dicitur. Non ergo eadem seminis pars actus est & potentia. Docet Auerrhoes in plerisque idem esse mouens & motum: sic in lapide grauitas mouet, lapis mouetur; in semine mouens, spiritus est: mobile eius crassamentum. Artifex sane sui opificij pars nō est in his quæ arte fiunt, sed in naturalibus, non ead. m est ratio. Hoc docet Aristoteles libello de spiratione, cap. 5. Differentia est (ait) artis ad naturam; nam illa tanquam instrumento calore utitur, hæc vero & ut instrumento, & ut materia. Qui enim ab arte ad opus adhibetur ignis, ipsius operis pars non est, at qui in natura habetur calor diffusus per ipsum, opus est. Docti quidā duplex statuunt instrumentum, quo & in quo: Instrumentū quo, non remanet in parte constituta, sed id in quo, id est, subiectū facultatis formatricis: alioqui daretur transitus formalis è subiecto in subiectum: nā vis illa, propriū subiectū relinqueret, semē puta, & trāsiret in sanguinē. Nutrirī ossa & partes spermaticas sanguine, nō inficiamur, sed sanguis ille, naturā seminis sibi cōparauit, crassitie, lentore, candore. Vel dic sanguinē remotū esse partium spermaticarū alimentū, semen verò aut quid semini simile, immediatum. Principum partium parenchymata ex sanguine quidem generantur, sed earum prima stamina ex semine ortum ducunt. Mas solus in se non generat, licet utrumque obtineat principiū, quia locum concipiendo, nutriēdo, & fouendo foetui accommodatū non habet: non tamen propterea otiosum dici debet semen maris, quia otiosum id est, quod cum debet, aut potest agere, non agit, at in se nec debet, nec potest agere, quia matricem non habet; sic tritici semen extra terræ sinum non agit. Postremam rationem magnificat Argenterius. Vix enim credibile esse putat, ex tantillo semine, spermaticas omnes partes generari. Itaque contra veterum omnium medicorum decreta partes nullas ex semine generari concludit. Verum nihil est hac in re quod miremur: habet enim gloriæ suæ præcipuum hoc caput Argenterius, quod nihil non corruerit antiquæ doctrinæ. Is Galenum ubique carpit, imo discerpit, cum quo iure, quaque iniuria lancinans, nunc in Hippocratem, mox in Aristotelem aculeos ac virus conuertit. Quàm bene autē, aut malè, doctiorum esto iudiciū. Hic quàm miserè Galenum erroris insimulet, audiant omnes. Non potius est (ait) ex pusillo semine, tanta ossium, cartilaginum, membranarum & vasorum moles efformari: ergo partes nulla è semine fiunt. Sed lenis argumentatio. Putat fortasse Argenterius, genituram conceptā & septimo die delineatā seminis ab utroque parēte emissā, molē excedere. Est mihi, credite, primo mense, ita pusillus embryo, licet articulatus, ut dimidiij pollicis magnitudinem non excedat. Sunt mihi præ manibus abortiui foetus duo eius magnitudinis, cuius membra omnia exquisitè discreta apparent. Si quis fidem mihi adhibendam non putet, audiat Aristotelem, prob. 36. sectio. 1. & 7. de hist. anim. disertis verbis hæc pronūtiātem. Mas qui 40. die exciderit, si in quoduis aliud mittatur, diffunditur: sed si in aquam frigidam conijciatur, cogitur consistitque veluti in membranula, qua rupta, foetus apparet magnitudine formice maiusculæ, & membra iam discreta. Quid ad hæc Argenterius? an non seminis maior est quàm formica maiusculæ moles? An ignarus es doctrinæ Aristotelicæ, maxima esse in principiis momenta perfectionis, principiorum molem exiguā, vires maximas? Si Aristoteli, tanquam parū Anatomico, nō credis, ad tribunal veritatis Hippocratē te sisto, libello, *ἔκ τῶν ἀρχῶν*,

Respondetur
singulis ratio-
nibus.

Authores
Galenī expli-
catur.

Primæ ratio-
nis solutio.

Secundæ solu-
tio.

Instrumenti
elegantia distin-
gitur.

Tertiæ ratio-
nis solutio.

Quarta.
Quintæ respo-
ditur.

Refutatur
Argenterij
opinio.

eadem afferentem. Genitura, inquit, in septem diebus habet quacunque habere debet. Meretrices autem publicæ cum sese in utero concepisse deprehendunt, tum conceptum intra se perimunt, quo perempto excidit quadam veluti caro. ταύτην τὴν σάρκα ἐς ὕδωρ ἐμβαλὼν σκεπή μύθος ἐν τῇ ὕδατι, εὐρήσῃς ἔχειν σφαῖρα μέλας, καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰς χῶρας, καὶ τὰ οὐατα, καὶ τὰ γῦα, καὶ τῶν χειρῶν οἱ δάκτυλοι καὶ τὰ στέλεα, &c. id est, hanc carnem si in aquam coniectam contempleris attentius, omnia membra habere comperies, oculorum regiones, aures, manus, manuum digitos, crura, pedes, pedum digitos, pudendum, &c. Conijcit ergo genituram iam dearticulatam & pusillam in aquam, ne partes dilabantur & ob nimiam molitiem in sese concidant, tum, ut ob diaphani crassitiem, minima quæque fiant conspicua. Si itaque primis diebus ita pusillus est fetus, cur ex semine semel iniecto singularum spermaticarum partium prima flamina non effingentur, quæ post hæc, alimentii perpetua appositione & assimilatione, incrementum & perfectionem suam capefiant? Concludamus ergo, ex seminis corpulentia, tanquam materiali principio, spermaticas omnes partes generari. Hæc porro corpulentia licet videatur homogenea, habet tamen partes dissimilis naturæ, tenuiores, crassiores, pinguiiores, glutinosiores, alias concretioni, alias tensioni opportunas.

Conclusio istius diffinitæ.

An spermaticæ partes coalescere possint.

QVÆSTIO VIII.



DE PARTIVM spermaticarum coalitu, non levis est controversia. Scio, apud multos & veteres & iuniores, hanc percubuisse sententiam, posse spermaticas omnes partes coalescere κατὰ πρῶτον σκοπὸν, vulgus primam intentionem vocat. Quam his rationibus stabiliunt; ubi (aiunt) efficiens, materialis & finalis coalitus, causæ adfunt nihil est quod coalitum impedire possit: at in adultis, iuuenibus, & proreclioribus etiam ad senium usque, triplex hæc causæ præsens est: nihil igitur coalitum impedit: Maior propositio naturæ sæpe lumine clarissima est: minor ita confirmatur. Efficiens coalitus causæ, vis est formatrix, quæ calido vititur, tanquam instrumento; facultas hæc, singulis partibus, sed solidis potius quam carnosiss, est in sita. Materia spermaticarum partium semen est, cuius, ut ad nutritionem & accretionem sufficiens est copia, ita & ad novam generationem. Quis etiam Hippocrati, Aristoteli & Galenò, semen excrementum est alimenti ultimi, at copiosum est alimentum ultimum neque unquam deficit nisi in extremo senio: non itaque illius excrementum, deficit. Sed & in doctrina Hippocratis, æne, arterie, nervi, & spermaticæ omnes partes vim habet seminis procreatricem. Neque vero finalis causæ deest: fractū enim os, dissecta vena coalitum desiderant, cum naturæ solatium in unione consistat, ut eiusdem tristitia & desolatio in solatione. Est altera eorum ratio non inelegans. Vlcera caua carne implentur nova, venulis, arterioli & nervulis contexta, sentit enim, vivit, alitur caro: ergo per nervum, arteriam, venam. Quis quæso tam delirus sit, qui dentes à partium spermaticarum censu excludere ausus? At excrecti dentes renascuntur. Triplex enim apud Hippocratem, libello πρὸς σαρκῶν, dentium est generatio. Primæ à semine in utero, altera à lacte, tertia à solidioribus alimentis. Iam vero si alimenti transmutatione augetur spermaticæ partes, cur non veniunt, cum accretio, generationis sit quadam species? Scribit Galenus, capite septimo libri quinti methodi, & 14. Method. se multas vidisse glutinatas arterias. Narrat historiam iuuenis, cui secta in cubito arteria perfectè coaluit: capite nonagesimo primo, artis parvæ & capite quinto, libri sexti methodi, puerulorum ossa coalescere posse affirmat. His rationibus urgent & pungunt quæsi aculeis concluduntque, spermaticas omnes partes, etiam κατὰ πρῶτον σκοπὸν,

Spermaticas partes coalescere docetur.

Ratio prima.

Secunda ratio.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

coalescere. Qui contra sententiam hanc iuraverunt, nunquam spermaticas partes coalescere posse, auctoritate & rationibus confirmare student. Extat Hippocratis Aphorismus 60. sectionis sextæ: Si os, cartilago, nervus, præputium præscindantur, nunquam coalescunt. Galenus, primo de semine, capite 8. & 10. necnon capite 87. artis parvæ, carnosas facile, spermaticas nunquam glutinari scribit, cap. 91. artis parvæ, fracturam in osse insanabilem putat, quod secundum primum scopum non coalescant ossa. Auctoritas ratione confirmatur. Deest efficiens, deest materia. Efficiens vis est formatrix, hæc in semine tantum inest, cuius facultas sopita ac latens à solo calore uteri excitatur: remanet quidem in solidis partibus facultas conservans partis figuram, sed novum quid efformare soli hoc semini est concessum. Deest ergo efficiens, deest etiam materia, semen puta: quod cum in solis testibus generetur, quomodo ad caput, brachium & reliquas partes ferri poterit? Nos ut è mediis pugnantium opinionum fluctibus, fluctuantes in minorum animos, in tutum & tranquillum portum transuebamus, Questionem totam tribus conclusionibus definiemus. Erunt autem conclusionum nostrarum tria fundamenta. Primum ex Galeni decretis, cap. 90. & 91. artis parvæ, depromptum est huiusmodi. Duplex partium solutarum est coalitus, unus κατὰ πρῶτον σκοπόν, alter κατὰ δεύτερον, vulgus primam & secundam intentionem vocat. Prima intentio est ἐν τῇ κολλησῇ, id est in agglutinatione, quam σύμψυον dicimus. Secunda ἐν τῇ δέσει, id est, colligatione quam ὠρόπον vocant: prima, alias sine medio fit, ut in carne, quæ secta statim glutinatur, alias cum medio eiusdem speciei, homogeneum dicunt. Secunda intentio fit cum medio heterogeneo, id est, diversi generis, ut callo, cicatrice & similibus, quæ eiusdem speciei non sunt cum parte dissecta. Ut autem coeant partes κατὰ πρῶτον σκοπόν, & per medium homogeneum, multa requiruntur. Primum, efficientis robur, facultatis quippe formatricis & nativi caloris: deinde materis dispositio, quæ copiosa esse debet, ut nutritioni, accretioni & novæ generationi sufficiat, debet non sensim, sed tota simul affluere, id est, confertim & repente alterari, ut impediatur ne aliquod tertium diversi generis, inter disjunctas partes sese interponat. Sit aliud fundamentum, Partium spermaticarum alias molles esse, ut venas, alias duriores, ut arterias, nervos, alias durissimas, ut ossa. Tertium, in infantia & pueritia spermatica omnia esse mollissima, ossaque butyro aut caseo concreto similia, ætate prolectoribus ficiora, senibus ficiissima, cum nostrum vivere nihil aliud sit quam siccescere. His ita iactis fundamentis, tria concludimus. Primum, carnosas partes facile & coalescere, & regenerari κατὰ πρῶτον σκοπόν, spermaticas difficillime. Secundum, in puerilis & mollioribus naturis, spermaticas omnes partes etiam ossa per medium homogeneum coalescere posse: in adultis quasdam tantum, scilicet venas, rarius arterias, nunquam ossa. In senibus nullam sperabilem esse νεώροον in nervo, membrana, arteria, vena & cute dissectis, nullam item χόνδρον in cartilagine rupta, exesa, avulsa, dissecta: nullam denique ὀστέον in osse perfracto. Tertium, in omni ætate, sexu, etiam ad extremum senium usque, posse spermaticas omnes partes coalescere κατὰ δεύτερον σκοπόν, seu per medium diversi generis: quod callus in osse, in cæteris cicatrix dicitur. Prima conclusionis veritas ita confirmatur: facilis est sanguinis in carnes mutatio, quia levisima & fere unica alteratione perficitur: Ruber enim, calidus humidusque est sanguis, caro rubra, calida humidaque, hoc unicum requiritur ut incrassetur. Adest itaque materis dispositio: Efficiens validissimum est, quia carnosæ spermaticis sunt calidiora: fit igitur ut statim coalescant, alias sine medio, interdum cum medio, sed perpetuo eiusdem generis & sepe tam importune crescit caro in vulneribus, unde hypercarcosis, ut cogat nos lineamentis, aut pulveribus catharticis eius incrementum prohibere. Spermatica vero difficillime coalescunt κατὰ πρῶτον σκοπόν, ob efficientis imbecillitatem, materis ineptam dispositionem & partium siccitatem. Efficiens calor est, qui debilis admodum conservationi tantum & nutritioni studet, neque effluxam solidarum partium substantiam perfecte refarcit: Satis est (inquit Gal. cap. quinquagesimo nono

Contraria opinio.
Auctoritas.

Rationes.

Quid sentien-
dum sit.

Primum fun-
damentum.
Duplex per-
tium coalitus.
Quid sit pri-
ma & secun-
da intentio in
coalitu.

Quæ requir-
tur ad primam
intentionem.

Secundum fun-
damentum.

Tertium fun-
damentum.

Triplex conclu-
sio.

Prima.
Secunda.

Tertia.

Prima conclusio
sive confir-
matio.

Spermatica
carne non coales-
cant, triplex
causa.
1. Efficientis
imbecillitas.

artis parue) si eas exsiccare prohibet: Quomodo igitur nouam generationem molietur, si eas quales natura produxit, conseruare nequit? Materia aderit fortasse copia, sed tota summa & ad opus non affluit, quia sanguinis in ossa mutatio, non nisi interiectis multis medijs, medulle quippe, glutinis & seminis, perficitur, debet ex rubro albescere, ex humido exsiccare, ex liquido incrassari, denique temperiem & qualitates omnes immutare. Propterea cum non nisi sensum ad nutricatum ossis & partium spermaticarum affluat alimentum, resultans ex nutricatu excrementum, prius sese inter disiunctas partes interponit, hinc callus; Accedit impedimentum vicinarum partium, ut carnosarum, quę partis coalitum anteuertunt vacuumque implent; Additur postrema difficilis coalitus causa, siccitas & durities spermaticarum partium. Quę enim sicca sũnt, difficillime uniantur, & in omni mixtione aqueum requirit Philosophus, ut eo velut glutino uniantur omnia. Secunda conclusio ita confirmatur. Pueri cum parum absint à principijs generationis, efficientem causam habent validissimam, calor natiuus in illis est plurimus; Materię spermaticę adest copia, eaque aptissima, quę cito & facile, ob spermaticarum partium molliem, transmutatur; in adultis venę quia molles sunt & quiescunt, facile glutinatur; arterię difficillime, tum ob perennem earum motum qui unionem prepedit, tum ob tunicarum crassitiem: sunt enim ut voluit Herophilus quintuplo vena crassiores. Annotarunt quidam quamplurimas partes etiã molles, ob prestantiam & necessitatem actionis, nõ coalescere, quod citius extinguatur animal quã ut uniri queant: sic cordis caro nõquam coalescit, quoniam interceptione officij ad vitam tuendam necessarij, statim moritur homo. Tertia conclusio clarior est quã ut probatione ulla egeat, omni siquidem tempore coalescunt spermaticę partes per medium heterogeneum. Cicatrix cuti saucię obducitur perpetuo: ferrum innatur os fractum callo nodoso. Ad huius tamen illustrationem soluenda duo problemata. Primum, cur si ossa ab ulcere excauentur, id est ossis fiat deperditio, nusquam caro poterit generari? Scripsit enim Hipp. Aphorismo 4. s. sectionis sextę. Quęcunque ulcera annua sunt, in ijs os abscedere est necesse & τὸς οὐλᾶς κὸιδας γίνεσθαι, id est, cicatrices cauas fieri. Cur in ossis deperditi cauum & locum caro non sese insinuat, aut si fit callus, cur caro supra callum non generatur? Dic in ossis cauo non posse carnem generari, quia non nisi ex carne caro, non nisi ex nervo fit nervus. At caui extrema ossa sunt. Quid molientur igitur? Sanẽ aut nihil penitus, aut os, aut callum. Si corpus nullum in deperditi locum sufficiat, nullum carni subternitur fundamentũ: Os in siccioribus & durioribus naturis regenerari nequit: fiet ergo callus. Verum cur supra callum non adnascitur caro? Quia caro viuens est & animata, callus inanimatus. At animatũ, & inanimatũ: viuens & mortuũ, specie ac forma differũt. Nõ potest itaq; inanimatus callus animatę carni subterni pro fundamẽto. Esse autem inanimatũ callũ demonstratur, quod ab ossis & vicinarum partium excremento progignatur. Obijcies, si inanimus non alitur, quomodo ergo toto vita tempore crescit & durat? Responde, accrescere per appositionem materie, ut pilos & ungues: durat autem quamdiu alimentum capessunt ossa, a quibus redundat perpetuo excrementum. Est alterum problema: cur, si ab ossis excremento fit callus, in sano osse non generatur? Quia ob vulnerati ossis imbecillitatem copiosius à vicinis partibus pellitur excrementum, non minus quã ad vulneratam partem vicinæ omnes depouunt superflua. His iam videor omnia, quę ad spermaticarum partium coalitum spectant, attingisse. Quocirca tempestiuum fuerit, ad alia sermonem transferre. Priusquã vero hinc reuelamur, nequid studiosorum animos remoretur, diluende sunt aduersariorum rationes. Prime opinionis prima ratio in puerulis tantum vera, in senibus quis non videt efficientis imbecillitatem & materie inopiam? Secunda omnino fallax est & captiosa, neque enim ubi est sensus, ibi adest nervus est necesse, alioqui totum corpus esset nervus; satis est ut ad partem feratur nervus, cuius illustratione & irradiatione eius partis particule omnes sentiant: idem de arterijs & venis sentiendum. Non requiritur ad actionem omnem contactus Mathematicus, sed

2. Materię dis-
posicio inepta.

3. Partium du-
rities & siccita-
tas.
Secundæ con-
clusionis con-
firmatio.

Tertia conclu-
sionis confir-
matio.

Problema.

Solutio.

Obiectio.
Solutio.

Obiectio.
Solutio.

Problema de
calli genera-
tione.
Solutio.

Responsio ad
obiecta.
Ad primam
rationem.
Ad secundam.

Physicus tantum. Dentium & reliquorum ossum non eadem est ratio: nam exalti dentes renascuntur & ratione finis, & ratione materie. Ratione finis, quia cibum manduci, molliunt, præparantque ventriculo, propterea ut ad extremum usque senium crescant sola urgente necessitate cum mutuo attritu minuantur; ita eadem impellente causa renascuntur: sed & si materiam generationis spectes, ea copiosissima est in maxilla utriusque cavitatibus contenta: accedit, quod à nulla parte circumdatur dens, quæ illius generationem præpediat. Ita rationi tertia satisfactum puto. Accretio (aiunt) & nutritio generatio quadam est, at crescunt ossa & nutriuntur, cur non igitur coalescent? Respondemus, natura cum esse ordinem, ut primum nutriatur pars, deinde si quid supersit, in omnem dimensionem crescat, tandem si superfluat alimentum, in partem abeat deficientem: at semen non tanta copia gignitur, ut nutritioni, accretioni, & nouæ generationi sit satis. In utero facile quidam generatur partes spermaticæ quia & copiosa est materia, & ὁ δὲ δημιουργὸς διτλὸς, id est, opifex duplex, inest enim & in semine & in uteri vasis, at nobis iam editis difficile generatur, quia alter iam opifex abest, qui semini inerat prius. Galeni autoritates nec semper, nec omnes spermaticas partes coalescere concludunt, quibus nos lubenter subscribimus: Alterius opinionis ratio, quæ vim formatricem spermaticis partibus denegat, soli semini concedit, facile conuellit: cum semen, Hippocrati, Aristoteli, Galeno & Medicis omnibus, partium omnium ideam in se contineat, & à solidis partibus excipiat. Est sane in ossibus vis ossifica, in venis venifica, modo adsit materie dispositio. Caterum dum semine ali, augeri, & coalescere dicimus ossa, non semen prolificum intelligimus, quod in solis testibus formam & perfectionem assequitur, sed quid semini simile. Hippocratis & Galeni autoritates, duriores tatum partes coalescere non posse, idque prouentioribus concludunt, quod nos secunda conclusione demonstrauimus.

Ad tertium.

Ad quartum.

Secunda opinionis rationibus satisfactum.

An spermaticæ partes carnosæ sint calidiores.

QVÆSTIO IX.

LANGVIA frigidiora esse sanguineis, toties ab Hippocrate, Aristotele, & Galeno est decantatum, ut loca citare superstitio esset vel ostentatio. Carnosas autem partes sanguineas esse, spermaticas vero exanguis, aut saltem paucò sanguine irrigatas, nemo adhuc quod legerim negauit. Quid inde sequatur videant omnes: conclusio enim satis loquitur ipsa. Sunt tamen Neotericorum quidam qui spermaticas partes, carnosæ calidiores esse sibi persuadent. Extat doctissimi Joberti Academia nostræ olim Cæcellarij dignissimi hac de re paradoxon, in quo permulta, de insito spermaticarum partium calore, veris simillima aut saltem veritatis pallio velata subtiliter disputatur. Ego tam egregij Medici doctrinam & ingenij aciem semper magnifeci, quia tamen hac in re primus veteris disciplina auctoritatem fregit, cogor ab eo discedere, & singulas eius rationes sigillatim oppugnare. Orta, inquit, attestantur principijs, id est, principiorum naturam redolent: At semen, ex quo spermaticæ partes ortum ducunt, sanguine est calidius: Erunt ergo spermaticæ partes sanguineis calidiores. Quod autem sanguine sit calidius semen, ita demonstratur. Semen Hippocrati igneum dicitur & æreum, sanguis vero, frigidus & aqueus. Quin etiam sanguis in canali continetur, semen vero vasa permeat nullis sensibilibus cavitatibus peruia, quæ tenuitatis & caloris indicia sunt certissima. Verum hæc mollior mihi videtur ratio, quam tanti medici vis grauitasque postulent: Etenim in semine duo spectari docet Galenus mille in locis, corpulentiam (deus hanc vocem Philosopho tamesi non extat apud Ciceronianos) & spiritus, quibus undiquaque perfunditur. Ratione illius, semen aqueum terreumque dicitur, ratione spirituum, igneum. Spiritus animæ sunt instrumenta, per quæ nobilis hæc architectrix sibi domicilium parat, partes effingit, efformatque: hi spiri-

Joberti opinio de calore spermaticarum partium.

Prima eius ratio.

Impugnatio rationis.

Duo in semine spectantur, corpulentia & spiritus.

tus formatrices dicuntur, horumque ratione semen, artifex dicitur & efficientis causæ rationem habet. Corpus seminis aqueum & frigidum, materia est spermaticarum partium: semen itaque totum cum omnibus suis partibus sanguine est calidius, quia magis spirituosum, sed spiritibus suis spoliatur sanguine est frigidius, propterea effusum statim vanescente calore, aëreque in algeſcente liquidum atrumque euadit. tale autem agnouiſſet Gal. spermaticarum partium esse materiã. Primam hanc rationẽ altera ratione fulcis Iobertus. Partium spermaticarum conformatio & situs, harum calorem manifestẽ indicant: nam ossa internum occupant locum, & carnibus undiquaque reguntur, ut & nervi, ne insitus eorum calor vaneſcat, & ab ambientis frigore offendatur; carnes vero externis partibus sunt appositæ. Sed non video quid cõcludas. Hæc enim omnia frigiditatem potius spermaticarum testantur: nam quia partibus illis frigidum erat infensissimum, ne languidus & debilis earum calor extingueretur, carnibus undiquaque fuit natura, & membranæ tanquam vestibus, omni ex parte munivit. Præterea non ea ratione internum occupant situm ossa, ut eorum calor conſervaretur, sed quia fulcris id postulabat natura. Quod si externa internis frigidiora esse velis, cutis quæ tẽperata est, nervus & osse erit frigidior. Tertia ratio absurdiſſima est. A frigido (inquit) facile offenduntur spermaticæ partes: ergo calidæ sunt, quia à contrarijs alteratio, à similibus fit conſervatio. Imo contra Galenus in arte parva, hanc unam tradit notam communiẽ dignoſcendi tẽperies partium, quod quæ à frigido facile afficitur, frigida sunt, quæ à calido, calidæ. Sic frigidum Hippocrati ossibus, nervis, dentibus, ſpinali medullæ infensissimũ, quia frigida sint hæc partes. Galeni extant verba hæc expressa, cap. 59. artis parvæ. In omnibus commune est temperatiere iudicium, si membrum facile frigeſcit, vel frigiditatis, vel raritatis, si vero non facile, vel caliditatis, vel densitatis. Si vero à desiccantibus offendatur, & aridum, & siccum, & non facile mobile fiat, siccitatis: quemadmodum & si ab humectantibus graviter se habeat, humiditatis.

Postremò, spermaticarum partium pleraque opera vehementissimæ caloris indicia esse concludit Iobertus. Sic ventriculus membranofus cibos quantumvis duros tenuat & coquit, in struthio ferrum mollit. Vesica membranosa lapillos cogit duriores quam renes, quod de carnosæ partibus nemo sentiet. Hæc rudioribus fortasse inexplicabilia videbuntur, quæ tamen extricare conabimur. Primum, quæ de ventriculo obijcit, erroris sunt plena. Etenim animalia, quæ interiorem ventriculi membranam carnosiores obtinuerunt, validius coquunt: & edentulis, ut aribus, annexa est caro solida calefaciens, & quod primus observavit Fallopius, interior ventriculi humani tunica, crusta cauſa, undique obducta est. Sed esto, demus illi hoc, ventriculũ membranofum validius coquere: vesicam membranofam duriores calculos cogere, non tamen calidiores: propterea esse spermaticas partes, admittemus: sed quis calor in densiore materia potentius urit? Quis ferrum candens flamma calidius dixerit? impensius quidem urit, sed gradus caloris remissior est. Sic ignis in sua sphaera & ignis in aqua vite ob materia tenuitatem non urunt: calculus vero non tam ab acri & mordaci calore generatur, quàm à diutina mora & materie visciditate, ut in senibus. Ex his palam ſunt spermaticas partes, carnosæ non esse calidiores. Neque admittendam existimamus distinctionem insiti & influentis caloris, quia inter æqualia debet fieri collatio.

An solidæ partes reficcatae humectari possint. QVÆSTIO X.



SOLIDÆ partis nomen ambiguum est. Vulgus solidam partem appellat, quæ constans est, dura, densa, compacta quæ, sic cordis caro à Galeno solida dicitur. Hippocrates sectione septima libri sexti Epidemiarum, solidas partes appellat continentes omnes: hac ratione, carnosæ, etiam solidæ dicuntur. Sunt qui per solidas partes animatas omnes intelligant, quæ circumscriptionem habent propriam, & proprio termino cobidentur. Apud Philosophos soliditas di-

solidi acceptio
multiplex.

citur, quod est τὸ ὅλον ἅτε, id est, sui plenum totum. Sic ignis & aër, in sua sphaera, dicuntur solida: sic Tullius primo de Divinatione ait, Alexandrum cum coronam auream vellet gestare, dubitasse utrum solida esset, aut extrinsecus inaurata: sic similes omnes particulae, ut iam docuimus, quia similem omni ex parte parilemque naturam sunt adepta, solida dicuntur. Sed propriè solidas partes appellant: medici, quæ sunt spermaticæ, ut docet Galenus cap. 1. libri undecimi methodi, & cap. 7. lib. 1. de naturalibus facultatibus, necnon cap. 16. lib. 1. de semine, quibus locis carnosas partes sanguineas, solidas spermaticas vocat: hæc, capite 19. artis parvæ, primas appellat: vel quod reliquarum sint fundamenta, & prima stamina corporis fabricam suffulcientia; caro autem inanis solidarum spatia infarciat: vel quod semen sit primum principium: vel denique quod spermatica prius generentur quàm carnosæ. De his verè solidis queri solet, an resiccata humectari possint, id est, an quod reponitur alimentum, eiusdem speciei sit cum eo quod effluxit. Dubitandi ansam & occasionem præbuit Galenus cap. 19. artis parvæ. Solide (inquit) corporis partes nullo modo possunt effici humidiores, satis est, si quis eas exsiccare prohibeat: & capite primo libri undecimi methodi, quantitas solidarum eadem semper manet: capite undecimo libri decimi methodi, solidarum partium siccitas sanari non potest. Nos quæstionem hanc faciliè dirimi posse existimamus, si in solidis partibus duplicem agnoscamus substantiam, unam exquisitè solidam & fibrosam, penitus exanquem; alteram villos infarcientem, quæ propria & peculiari cuiusque partis caro dicitur. Prior illa nullo modo humectari potest, id est, nec tale, nec tantum reparatur, quantum & quale decessit: posterior faciliè refarcitur. Ne autem commentitium id existimetis, aut à nobis inuentum, audite Galenum in sua medicinali arte & libris methodi ita differentem. Capite 19. artis parvæ. Solide (inquit) partes, quæ verè solide sunt ac primæ, nullo modo possunt effici humidiores, satis est, si quis eas celerius exsiccare prohibeat; at intermedia earum spatia, hæc vel illa humiditate implere, possibile. Capite undecimo libri decimi methodi, In solidis partibus, alia est fibrosa, alia velut carnosæ, sic vena, quæ tunicam habet tenuem, villos habet quamplurimos variè intertextos, quibus propria vena substantia adnascitur. Hæc nullum commune nomen est nata, sed docendi causa nihil vetat, eam carnosam substantiam vocare. Est igitur Galeni distinctio hæc. Cur autem verè solide & fibrosæ humectari nequeant, id est, nec tale, nec tantum quale & quantum erat humidum restitui possit, rationes multe sunt. Primum non a quæ coctus & elaboratus succus reponitur, qualis in principio generationis fuit. Erat in plexibus labyrinthis adumbratum, in testibus excoctum, in deferentibus vasibus & adenibus proflatis perfectum semen, ex quo partes solide conformantur; nunc non eodem semine, sed sanguine tantum dealbato aluntur. Præterea cōtinuam & perennem substantia sua iacturam patitur qualibet pars, at restauratio sensim & non nisi per varias alterationes perficitur. Non possunt nisi nutritione partes humectari; alimentum verò ut tardius in duram quàm in mollem particulam vertitur; ita ab ea magis afficitur: quare non potest alimentis humiditas tantum addere, quantum solidarum partium actio detrahit, priusquam nutrantur. Quin etiam continua actione faciscit calidum, quia agens omne naturale, agendo repatitur: itaque deterius sibi parat alimentum & licet anima vis eadem sit, eius tamen instrumentum multo usu detritum, non potest quod ab eo, iure naturæ, exigitur, perficere pensum: quo fit ut quotidiano agitata opere calor fiat victus, deinde flaccescat, postremo verò aboleatur. Ex quibus consequens fit, solide partis fibrosam substantiam refarciri nusquam posse, sed rigari tantum.

Quæ propriè
sunt solida
partes.

Cur primæ
vocentur.

An solida
partes humec-
tari possint.

Duplex solida
partis substan-
tia ex Galeno.

Cur solida
partes humec-
tari nequeant.
Præterea ratio.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

LIBER SECVNDVS

IN QVO OSSIVM OMNIVM

HISTORIA ACCVRATE DESCRIBITVR,

& quæ in ea occurrunt controuersa,
explicantur.

HISTORIA ANATOMICA.

Cur ab ossibus inchoandum. CAPVT I.



QVONIAM ex Philosophorum decretis, simplex, composito & natura & doctrina prius est: methodi nostræ ratio suo quasi iure postulare videtur, vt à simplicium partium descriptione, opus hoc Anatomicum inchoemus. Vniuersam autem earum naturam, quæ multis difficultatum inuolutis est implicita, libris quatuor, breui & dilucida oratione, explicare institui. Primus erit de ossibus. Secundus de cartilaginibus, vincu-

lis ossa nectentibus, membranis ossa & ceteras partes inuestientibus, & villis. Tertius περὶ ἀγγείων, de vasis, venis scilicet, arteriis & nervis. Quartus περὶ σαρκῶν, de carnibus, tum viscerum, tum glandularum, tum musculorum, quos σάρκες, id est, *carnes*, absolute vocat Hippocrates, quia præcipua eorum pars caro est. Cur autem ab ossibus historiæ contextum aggrediar, hæc vnica in me mouet ratio, quod, vt mirus annotauit Hippocrates, τὰ σώματα σώσιν καὶ ὀρθότητι, καὶ εἶδος παρέχουσαι, toti corpori stabilitatem, rectitudinem & formam exhibeant. sunt enim veluti pali quidam, quibus ceteræ partes affiguntur & sæpe singuntur, his omnia adnascuntur, hæc fulcri modo vniuersam corporis molem sustentant. Denique eorum figura & magnitudine, reliquarum partium figura & magnitudo æstimari debet, adde quod musculorum exortus, insertiones, venarum ductus, arteriarum diuortia, & neruorum directus, intelligere non possumus, ossium particulis ignoratis, propterea solebant veteres in Alexandrina schola rudioribus primum cadauera resiccata proponere, deinde integra corpora. Vniuersam porro ossium syntaxim compagemque ἐκ κεφαλῆς εἰς πόδας, veteres Græci σκελετὸν ὑπὸ τῷ σκελετῷ appellauerunt, quasi resiccatum & aridum cadauer diceret: σκέλλω enim idem est quod sicco, & qui de ossibus differuerunt, libros suos περὶ σκελετῷ inscribere, alij περὶ ὀσσεολογίας, alij περὶ ὀστών.

Ossis definitio, eiusdemque elegans explicatio. CAP. II.



OSA definit Galenus, animantis partes durissimas, siccissimas, maximæque terrestres: sed exquisita non est, nec philosophica hæc definitio, in tyronum & rudiorum tantum gratiam scripta: nos paulò accuratius ossa definiemus. Os, pars est similis, omnium siccissima & frigidissima, ex seminis crassamento terreo, pinguique, à vi formatrice, per caloris vim genita, ad totius stabilimen, rectitudinem & figuram. Definitio hæc quia

Methodi nostræ ratio.

Cur ab ossibus aggredendum.

Necessaria est ossium cognitio.

Quid sceleret.

Ossis definitio à Galeno tradita.

Ossis definitio paulò accuratior.

formalem, materialem, efficientem & finalem ossium causam designat, verè
ὁὐσιώδης essentialis, dici debet. Forma similarium partium apud Medicos est
 temperies, quia est *πεῶτον δεκτικόν*, primæque vis, cum qua & per quam forma
 agit & patitur quæcumque agit pars similis, ut similis; siccitas ergo & frigidi-
 tas ossis formam exprimunt. Siccum est os, ob humidi & pinguis exhaustum,
 quem fecit intensior calor; frigidum vero euasit vaneſcēte per humidi defectum
 calido. Primarias has qualitates comitantur aut subsequuntur secundariæ, duri-
 ties, grāuitas, candor. Durū est os, non concretionē, ut glacies, igne enim dissolue-
 retur, non tēſione, ut tympanum, sed siccitate, ut lignum. Graue est, tum quia ter-
 reum, tum quia aēr & aqua in eo sunt valdè densata. Album, quia spermaticum.
 Materia ossium seminis est crassamentum, crassior quippe & terrea eius pars: Ari-
 stoteles vocat *σπερματικὸν πᾶσι ττωμα*, *seminale excrementum*. Licet enim vi-
 deatur semen homogeneū, habet tamen partes alias aliis crassiores; est in eo quid
 pingue, quid glutinosum. Ex glutinosa, quia tensionis est capax, nervi, membra-
 næ & vincula efformantur: ex pinguiore, ossa. Hoc indicauit diuinus senex: *Ὁ' κου*
δὲ (inquit) *τῷ λιπαρῷ πλέον ἢ τῷ κολλώδεος, ὅσα ἐγένετο*, id est, *ubi pinguis plus*
quam glutinosi extitit, ossa formata sunt. Efficiens ossis causa vis est formatrix, quæ ido-
 lum & idæa generantis quibusdam dicitur; hæc calido vitur tanquam architecto,
 & spiritu tanquam opifice & pictore. His ordinationem, secretionem, concretionem,
 densationem, rarefactionem tribuit Philosophus. Calidum ergo pingue ab-
 sorbet, siccātque: vnde durities soliditāsque. Hanc ossium generationem primus
 agnouit Hippocrates. *τὰ ὅσα ἐκ*, inquit, *σκληρύνεται ὑπὸ τῆς θερμότητος ἀπὸ γνῆλεως*,
 id est, *ossa à calore densata indurescunt & resiccantur*. Calidum porro illud licet sit
 moderatum (nam benè temperata est caloris natui substantia) quia tamen in den-
 siore materia diu moratur, vires easdem obtinet, quas intensissimum, ut vretē vi-
 deatur; propterea ossium generationem per exustionem fieri voluit Hippocrates.
 Finalis ossium causa, quam vsum appellare solet Galenus, postrema definitionis
 particula eleganter exprimitur. Est enim primarius hic & communissimus ossium
 vsus, ut toti corpori stabilimen, rectitudinem & figuram exhibeant. Stabilimen,
 quia sunt velut propugnacula aduersus omnes impetus, & robur corpori sustinē-
 do præstant, haud secus atque bases & columnæ ædibus subiectæ. Rectitudinem,
 quia rectum stare non possent sine ossibus animal, sed vermiculorum serpentū-
 que more reperet. Legimus quidem apud Hippocratem secundo Epid. natum
 puellum *ἀνοστέον exοσσεσθαι*, præcipuis corporis partibus discretum, sed is magni-
 tudinem quatuor digitorum non excedebat, nec diu superstes remansit. Postremò,
 figuram exhibent ossa, quia ab ossibus, corporis proceritas & incrementi mera de-
 pendet: quibus enim caput magnū, his cerebrum amplissimū; quibus thorax an-
 gustum, his pulmo & viscera contractiora; quibus maxillæ paruæ, etiam muscoli
 parui. Finalis huius causæ ratione, quæ manens immobilis cæteras omnes mouet,
 teste Philosopho, substantiam, qualem cernimus, obtinuerunt ossa, duram quip-
 pe, solidam & insensibilem; duram & solidā, quia id fulcri & propugnaculi postula-
 bat natura; insensibile ad *δυσανώθειαν*, id est, *patiēdi difficultatē*. Cum enim vniuersam
 corporis molem sustentēt, & continuis agitentur motibus, tam varios motus sine
 doloris sensu ferre non possent: ita tristis semper & querula animalium vita foret.
 Cæterum sensus omnis expertia sunt ossa, non quia terrea, ita enim dentes duris-
 simi non sentirent; sed quia per eorum substantiam nervi non disseminantur. Sunt
 & alij peculiares ossium vsus, qui in particulari historia describentur.

*Explicatio
definitionis.
Formalis cau-
sa.*

Cur siccum sit.

Cur frigidum

*Quomodo du-
rum sit.*

Cur graue.

*Materia os-
sium causa se-
minis crassa-
mentum.*

*Efficiens causa
vis formatrix
calido utens.*

*Finalis ossium
causa vsum.*

*Stabilimen
præstant.*

*Rectitudinem
faciunt.*

*Figuram ex-
hibent.*

*Cur ossa dura
& solida,
Cur insensibilia.*

Ossium differentie omnes explicantur. CAP. III.

A quibus petenda sunt partium differentia.



Prima ossium differentia à duritie.

Secunda à magnitudine.

Tertia à figura.

Quarta à cœmentate solida, non solida.

Quinta à situ.

Sexta à motu.

Septima à sensu.

Ossium à generationis ordine.

ΠΟ' τῶν ἐπομέων καὶ συμβεβηκότων, id est, ab ijs quę essentiā cōsequuntur, & ijs quę accidunt, vt singularum partium, ita & ossium differentias petendas esse docet Galenus. Ossis essentiā, temperiem quippe frigidā & siccā, sequuntur qualitates tractabiles, durities, mollities, densitas, raritas; accidunt autem magnitudo, figura, situs, motus, sensus, & similia. Hęc ergo prima statuatur ossium diuisio à duritie. Ossium alia sunt durissima, vt quę lapidosa dicuntur, & dentes; alia mollia πρὸς τι, vt Ethmoidea & Epiphytes, alia dura simpliciter, vt cetera omnia. A magnitudine, ossium alia sunt magna, alia parua, alia mediocria. Magna definiunt quidam, quę & ampliter concava, & medullosa sunt. Ego magnitudinis naturam ad solam quantitarem refero, non ad copiosorem & parciorem medullam. Sic ischij & scapularum ossa nec caua sunt, nec medullosa, quę tamen magna esse nemo inficiabitur. Quantitas autem quia dimensionum est, dimensio vero triplex statuitur, longitudo, latitudo, altitudo, triplex à magnitudine ossium diuisio peti potest: Alia enim sunt longa, vt femoris os, alia breuia, vt extremorum digitorum; Alia lata, seu ampla, vt scapularum & ilium ossa, alia angusta, alia crassa, alia tenuia. A figura multiplex sumitur differentia: quędam enim sunt plana, quędam rotunda, quędam trilatēra, alia quadrilatera; sunt quę scaphæ, cubi, malleoli, incudis, stapedis similitudinem referunt. Ad figuram referre soleo, cum politionibus medicis, meatus & cavitates, læuitatem, asperitatem. Ossium ergo alia statuuntur solida, alia non solida, alia leuia, alia aspera. Solidi nō omē more vulgi accipio pro eo quod opponitur cauo. Quę ossa solida sunt, aut omnino apparent solida, nec vllas aut saltem vix sensibiles habent cauernulas, vt ossicula auricularum & nasi; aut foris quidē videntur solida, sed inus effracta multis foraminibus, spongię instar, sunt peruia: σπαραγσας vocat Galenus, vt vertebrarum corpora. Solidis opponuntur caua, quę sensilem & conspicuam cavitatem habent, κοιλίας καὶ κοιλότητα id est, ventrem appellat Galenus; in his μετέδον, id est, medullam propriē dictam, contineri volumus, in illis χυμὸν tantum, id est, succum.

A situ duplex peti potest differentia, quia situs nomine & sedem & cōnexum intelligo; si sedem spectes, alia erunt superiora, alia inferiora, alia antica, alia postica, &c. Si connexum cum aliis partibus, alia per musculos, alia per vincula, alia per cartilagine cum vicinis partibus connectuntur. A motu quędam mouentur, vt quę per diarthrosin articulantur, quędam sunt immobilia, vt quę per synarthrosin connectuntur. A sensu quędam sentiunt, vt dentes: reliqua omnia sensu carent. Addamus & eam ossium differentiam, quę à generationis ordine peti solet: alia perfectā gignuntur, vt aurium ossicula & costę: hęc quidem quia thoracis cavitatem efformare debent illa fortasse quia durissima & siccissima esse debent, vt melius resonent: alia imperfecta à primo ortu apparent, vt capitis ossa & alia quamplurima.

*Ossium partes singule, & multorum nominum explicatio, quorum in peculiari ossium
historia frequens fit mentio. CAP. IIIL.*



N ossibus duo spectanda sunt, partes ossium & eorundem cau-
tates seu sedes. Pars ossis triplex est, vel enim pars est ossis præci-
pua, vel pars ossi adnata, vel pars ossis protuberans. Pars præcipua
vnicum & peculiare nomen non obtinet, sed ossis totius donatur
nomine: pars ossi adnata propriè epiphysis: pars vero extra super-
ficiem planâ exuberans, priuato nomine, apophysis appellatur. Pars præcipua, pri-
mariû est os à natura constructû: hæc, cæterarû velut basis, mediam sedē occupare
solet, ideoq; omniû est durissima: debuit enim in ossiû generatione, vt in structu-
ra vniuersi, quod durum terreûq; est in cætro locari. Huic præcipuæ parti sæpe alia
adnascitur, quæ Græcis *ἑπιφύσις* dicitur, Latinis appendix, additamentum, an-
nexus, applatio. Quâsi enim natura sui oblita, os breuius fecerit, id Epiphysi per-
ficit & augeat: sic breuioribus columnis & trabibus lapides lignaque addere solent
artifices. Hippocrates sæpe epiphysin appellat *ὑπερόνυλον*, vt libro de locis in ho-
mine, iuxta cubitum ait, *δύο ὑπερόνυλα*, id est, *dua appendices*, supra ex osse hærent.
& alibi *ἡ δὲ τὸ ὅσῃον ὑπὸ τῶν ὀστέων ἀπὸ τοῦ ὀστέου ἀναρτῶνται*. i. *iuxta os autem appendices dua
prodeunt*. Est ergo Epiphysis os per se, toti ossi per symphysin annexû, non autem
ossis cum osse vnio, ita enim à symphysi nō distingueretur. Esse os per se id indi-
cat, quod circumscriptionem habeat propriam & in recens natis ac iunioribus fa-
cile etiam citra coctionem, aut putredinem separetur: imo sæpe obseruatum est in
puerulis ab ictu aut casu luxari & à suis ossibus auelli. Annectitur autem ossi præ-
cipuo per eam *συνφύσεως* speciem, quæ sit sine medio, quia ossis primarij ex-
trema, medijs molliora esse solent. Epiphysion autem substantia rara est laxaque.
At mollia ex Aristotele alieno termino facile continentur & cedunt. Cæterum
hic coalitûs non planâ superficie perficitur, sed mutuo capiti & sinuum ingressu,
vt videantur extremâ hæc *ἡ γειγγλυμὸς δὲ*. Epiphysion substantia rara est,
laxa, & à primo ortu ferè cartilaginea, sed prouectioribus siccior duriorq; euadit,
calore per motum & articulorum attritum nobis iam ambulanti bus excitato. Ex-
tremis autem Epiphysion cartilaginem apposuit natura, ne tam facile ictus exci-
perent: aut si frangi illa contingeret, à molli adhuc cartilagine facilius coalesceret:
senioribus ita cum ossis præcipua parte vniuntur, vt auelli vix queant, & suorum
ossium portiones esse videantur. Non omnibus ossibus adnascuntur Epiphyses.
Nam in maxilla inferiore nulla cernitur: In quibusdam vnica tantum est, vt co-
starum radicibus & puerorû dentibus: alijs duplex, vtrinque vna, vt in tibia, perone,
humero, cubito, radio: alijs triplex, vt in osse ilium: sunt quæ quatuor habeant,
vt femoris os, tres superiore parte, & vnicam inferiore: vertebrae quinque adna-
scuntur, duæ in transuersis processibus, duæ in corpore, vnica in spina. Appêdices
multæ sunt, quas vulgus apophyses esse putat, eiusmodi sunt dens, secundæ verte-
bræ, rochanter maior, styloides, &c. Epiphysion vsus varij sunt. Galenus dupli-
cem agnouit: alter, vt in medullosis ossibus, quæ *κοῖλα* sunt καὶ *χαῦνα*, id est,
cana & *laxa*, vicem gerant operculi, ne effluat medulla: *κοῖλον* enim καὶ
συχνόν, id est, *cavum* & *solidum*, vt maxilla inferior, per se medullam sine
externa apophysi claudit. Alter ad firmiorem articulationem, latioe enim basi
melius firmanantur ossa. Quod si in acutum vergerent ossium extrema, periculosa

*Duo spectan-
da in ossibus.
Ossis pars tri-
plex est.*

*Pars ossis præ-
cipua quæ sit.*

*Quid epiphy-
sis.*

*Epiphysis est
os per se.*

*Epiphysion in
puerulis de-
quendo luxa-
tur.*

*Substantia
epiphysion
qualis.*

*Quibus ossi-
bus insunt epi-
physes &
quæ.*

*Epiphysion
vsus.
Primum.*

Cur rare &
laxa epiphy-
ses.
Tertium.

Quartum.

Quintum.

Sextum.

Septimum.

Apophyses
nomina.

Quid apophy-
sis.

Apophyseon
usus duplex.

Primus.

Secundus.

Differentie
epiphyseon &
apophyseon.

Caput duplex.

Cervix.

Cervix quid.

Cavitationem
differentia.

Coryle quid.

& fallax esset articulatio, leuique de causa è suis sedibus ossa excideret. Sic colum-
narum bases & epistylia, ad sustinendi securitatem amplificari solent. Quoniam
autem latæ erant epiphyse, ne suo pondere partes premerent, raras laxasque con-
struxit natura. Addamus nos alios epiphyseon vsus, vt ex his ligamenta oriantur,
quæ vel ossa cõnectunt, vel musculorũ tendines efformant. Obseruauit Fallopius
ligamenta nõ longius extēdi quā epiphyse, vt si appendix sit breuis, etiā vinctulũ
breue appareat. Quin etiā epiphysis osse mollior & ligamēto durior, ad ossiũ sym-
physim, quasi medium quoddam, sese interponit, sic solet naturā mediis extrema
copulare. Accedit, quod epiphyseon interiectu sistitur ossis fractura, nec vltius
progreditur, vt in cranij suturis apparet. Sed & factæ sunt epiphyse ad articula-
tionis conseruationem. Nam cum ossa durissima sint, si durum dero committeretur,
facile ob assiduos motus frangerentur aut cominuerentur, vt in dentibus
cernere licet, per molliores ergo appendices connecti debuerunt ossa. Sunt qui
ex Hippocrate constructas putent epiphyse, vt sint tanquam ventres ossium, in
quibus coquatur ossium alimentum, quod sensim in eorum cauernas percoletur.

Sequitur tertia ossis pars, quam Græci *ὑποφύην* dicunt, *ἐξοχήν, ἀεθβολήν, ἐκφύσησιν*, Latini, *eminentiam, productionem, extuberantiam, proiectionem, processum*.
Definitur autem à nobis pars ossis legitima, ex ipsomet osse prorumpens, & extra
superficiem planam extuberans: sunt in singulis ferè ossibus suæ apophyses, sed in
maxilla inferiore & vertebis omnium maximè cõlpiuæ. Earum duplicem vsu
agnoscimus: Alter ad multarum partium, præterum musculorum, exortus & in-
sertiones; nam nisi extuberarent ossa colliumque ritu producerentur, nec muscu-
li, nec ligamenta ex his enascerentur. Est & alter processuum vsus, vt quibusdam
partibus propugnaculi vicem gerant, vt in vertebis & scapulis cernere licet.

Epiphyseon & apophyseon differentia à figura petendæ sunt. Nam si rotun-
do tubere promineat os, *κεφαλή κεφάλιον* caput dicitur, siue sit appendix, siue
processus; si ex gracili principio sensim dilateur cervicis instar *αὐχὴν* cervix vo-
cabitur, si autem in mucronem desinat, & acutum sinens protuberet *κοράνη*
κορανίς seu *κορανὼν* appellabitur. Triplex ergo pro figuræ varietate erit appen-
dix, vt & processus, caput, cervix & mucro. Caput rursus duplex est; alterum ob-
longum maximumque, quale in osse femoris cernitur, caput absolute dicitur: alte-
rum depressum *κονδύλον* vocant, licet Hippocrati & Galeno *κόνδυλος* interdum
caput geminum denotet: sic digitorũ extrema appellat *κονδύλης*, quod habeant
gemina capita. Cervix vnus tatum est generis; in hoc autem differt à capite, quod
caput sit vt plurimum epiphysis, cervix ferè semper apophysis. *κοράνη* autem seu
acutus processus multiplex est, alius styli, alius anchoræ, alius rostri coruini, alius
denique mammarum similitudinē refert. Primus *εὐλοειδής* aut *γραφοειδής*, se-
cundus *ἀγκυροειδής*, tertius *κορακοειδής*, quartus *μασκοειδής* dicitur. Qui autē pro-
cessus ad sinuum orbem instar laborum prominent, & sinus profunditatem au-
gent, *ὄφρυνες, αὐβρονες, χεῖλη*, *ἱτνες*, *supercilia & labra* vocantur, quod oculorum
superciliis, orificiis ollarum, labris buccarum, & circumferentiis rotarum sint simi-
les. Hæ igitur sunt ossium partes in vniuersum. Eorum vero sedes & cavitates, arti-
culationis gratia, constructæ sunt. Cavitationum duæ sunt differentia, vel enim pro-
fundæ sunt, vel superficialitæ. Profundæ magnis oris & superciliis circumdatæ
κοτύλαι & *κοτυλίδες* dicuntur, nõ *κοτυλιδόνες*, tales in ischio cernuntur & osse
scaphoide. Est autem *κοτύλη* mensura liquidorum quæ hemina Aureliano dicitur:
Homero *κοτύλη* vasculum est & poculi genus concavum. Superficialiæ cau-

rates γλῆναι καὶ γλῆνοιδαῖς appellanrur, ab ocularium sinuum forma, qui palpebris clausis apparent. Sunt autem ita obscure, vt primo intuitu dubites, an aliud os admitrat, an aliud ipse subeant. Eas porro cavitates siue sint profundæ siue obscure, Hippocrates, βαθμίδας solet appellare. Polluci autē βαθμὶς est ἡ συμβολὴ τῆς πτυχῆς πρὸς τὸν βραχίονα, cubiti cum brachio commissio. Nomina hæc sigillatim & accurate explicare placuit, quia eorum in peculiari ossium historia frequenter mentio.

De ossium structura & connexu in vniuersum. CAP. V.



OMINEM ad intelligendum & agendum natum, vt infinitas penē sensilium imagines exciperet, & varia appetitus obiecta aut fugeret, aut persequeretur, locali motu eguisse omnibus, vt opinor, est exploratum. Si enim vnico eoque continuo osse constaret, quomodo flecti, extendi, circumagi, apprehendere, progredi posset? Staret sine dubio quasi trunicus ignobilis, & cæteris ludibrio esset, vnum hoc animal omnibus imperaturum. Ad motuum ergo varietatem, ossium diuersi generis structura, eorumq; multiplici figura humanum corpus mirabiliter est efformatum. Sed & ad διασπείθειν, ne vno effracto reliqua laderentur, ad fumidotum vaporum transpirationē, partium discrimina, vasorum ingressum exitumve, necessaria fuit tam multiplex ossium structura. Hæc porro licet varia sint, est tamen tam mirabilis eorum connexio, vt vnum esse omnia videantur, & aut continua sint, aut contigua. Eorum autem vniuersa compages, quam συντάξιν, σύνθεσιν, & ἐμύληαν vocat, vnico nomine σκελετός dicitur. Modus autem συνθέσεως seu compositionis, duplex omnino est. Aut enim per ἄρθρον, id est articulationem, aut per symphysim connectuntur. Ἄρθρος nomen varium est Hippocrati & veteribus Græcis. Sæpe enim magnum denotat caput, quod in cavitatem inseritur, interdum pro coxendice solo vsupatur, idque ἄστομομασικῶς, sed propriè ossis cuiusque extremum significat. Hic ἄρθρον idem est quod συμβολή, commissura, compages, articulario, structura. Definatur ergo articulatio, naturalis ossium structura, in qua duorum ossium extrema sese tangunt, vt tota articulationis natura in extemorum contactu consistat. Articulatio hæc duplex à Galeno statuitur: alia enim laxa est, διάρθρῳσιν vocant, διὰ enim separationem & laxitatem denotat; alia stricta & ita compacta, vt nullum subsit ad motum spatium, συνάρθρῳσιν dicunt. Illa cum motu est manifesto, hæc motum nullum habet; comment. ad sectio. 2. lib. de articulis, aut saltem δυσόρεχτον, id est, vix aspectabilem. Diarthroseos tres sunt species, ἐνάρθρῳσις, ἀρθρῳδία, γιγγλυμός. Enarthrosis est, cum excipiens cavitates admodum profunda est, caputque quod in eam inseritur oblongum: talis est femoris cum ischio articulario. Arthro dia, cum cavitates est superficialia & caput depressum, vt inferioris maxillæ cum osse temporum; occipitis cum primo spondylo articulatio. Ginglymos est quando os idem & excipit & excipitur, vt in fenestris & ostiis visitur, in quibus ferramentū vtrumque, & quod vehit; & quod circumagit, mutuum habent ingressum: in ginglymo itaque vnus ossis gibba, alterius caua subintrat, & tursus vnus ossis sinus, alterius gibba admittunt. Fit autem Ginglymos duobus modis, vel enim idem os ab vnico osse excipitur & excipit simul, vel excipit vnum & excipitur ab alio. Prioris exemplum est in cubito & brachio, postetiotis in vertebra. Vertebra namque in

Car hominis corpus non vnico osse sed pluribus consistat.

Tota ossium compages sceleris dicta.

Ossium compositio duplex. ἄρθρον nomen varium.

Quid sit articulatio.

Articulatio duplex. Quod diarthrosi.

Quid synarthrosi. Species diarthroses. Enarthrosi.

Arthro dia.

Ginglymos.

Ginglymos duobus fit modis.

*Synarthrosæ
species tres,
Sutura quid.*

*Harmonia
quid.*

Gomphosis.

*Tertia articu-
lationis species
neutra &
accepta.*

*Quid symphy-
sis.*

*Symphysis du-
plex.
Sine medio &
cum medio.*

*Symphysis cum
medio triplex.*

medio sedens, superiorem excipit, & ab inferiote excipitur. Hoc voluit Hipp. 3. de articul. dum vertebrae sibi inuicem *γεννυσυμῶσθαι* scribit, quod male intellexit Columbus. Synarthroseos quoque tres sunt species, *ῥ' ὡς φη*, id est, *σutura, ἀρμολία & γόμφωσις*. Sutura, compositio est confusis rebus similis: ea duplex, lertata & ad vnguem. Prior ferrarum inuicem suis spiculis iunctarum formam refert, qualis in capite cernitur, *πριονώδης* dicitur. Posterior *εἰς ὄνυχα* duorum vnguium *σέλε* fubeuntium figuram exprimit. Harmonia, articulatio est per simplicem lineam, rectam, obliquam aut circularem; sic maxillæ superioris omnia ferè ossa iunguntur. Gomphosis est, cum os ossi clauī modo infigitur, vt dentes. Hæ sunt articulationis species duæ, diarthrosis & synarthrosis; quibus tertiam ex eodem Galeno cap. 12. libelli de ossibus, addere lubet, quam neutram & dubiam vocat, id est, nec omnino diarthrosin, nec omnino synarthrosin, sed vtriusque participem; ratione quidem obscuri motus, synarthrosin; ratione autem compositionis, id est, cavitatum & capitum, diarthrosin. Talis est costarum cum sterno & vertebrae ossium carpi & tarsi articulationis. Atque ita vindicabitur à recentiorum calumniis Galenus. Hæc totius articularionis & specietum eius natura est. Est altera ossium *συνῆσις*, quæ per symphysin fit. Cum enim videret natura nō satis tutam esse magnorum ossium articularionem (leui quippe de causa è suis sedibus exciderent) ea arctius connectere & colligare voluit. Est ergo *σύνμφωσις*, *ἔνωσις ὁσῶν φυσικῇ*, id est, *naturalis ossium unio*, per quam ossa, quæ duo erant, continuantur & vnum fiunt, addeò vt symphyseos natura in continuitate consistat, vt articulationis in contiguitate & solo extremorum contactu. Symphysis autem duplex est, alia sine medio, alia cum medio. Quæ ossa mollia sunt & fungosa, sine medio coalescunt: sic epiphyseos ferè omnes, quia molles & cartilagineæ, cum ossibus per symphysin vniuntur. Quæ vero sicciora sunt & duriora, non nisi alicuius corporis interuentu vniuntur. Medium illud corpus triplex est, neruus, cartilago, & caro; hinc tres symphyseos differentia, *συνχόνδρωσις*, *συνεύρωσις* & *συσσάρκωσις*. Exemplum synchondroseos est, in ossibus pubis & maxillæ inferioris. Exemplum syneuroseos, in omni diarthrosi: per neruum autem intelligo *πυλδεσμον*, id est, *ligamentum*. Exemplum syssarcoseos in osse hyoide & scapulis: per carnes autem intellige musculos, quos *σάρκας* appellare solet Hippocrates. Articulationis porrò & symphyseos naturam clariùs habebis expressam in controuersiis.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An simiarum tantum ossa descripserit Galenus, lib. de ossibus,
ut falsò imponunt Neoterici.

QVÆSTIO I.



SCRIPSIT *Æli Galenũ* aureolum ad tyrones libellum Gale-
nus, quem Neoterici ferè omnes ubique carpunt, imò discerpunt. Nam
simiarum tantum ossa descripsisse, nec humanum sceletũ nunquam vi-
disse impudenter iactitant, sed *Et* articulationis naturam, epiphyseon
Epophyseorum usum, symphyseos notionem perfectam omnino ignorasse,
audacter affirmant. Ego, licet hæcenus is fuerim qui nullius iurare in
verba magistri assueverim, malo tamen Preceptori Galeno probabilia
docenti assentiri, quàm novis *Et* falsis iuniorum decretis. At quàm inanes sint eorum calum-
nia, audiant omnes. Galenus primo de anatom. administ. scribit se duos habuisse sceletos, alte-
rum latronis, qui propter odium insepultus relictus fuerat, alterum cuiusdam de sepulchro per
aquarum violentiam effossi. Vidit ergo rescicata cadavera duo eaque integra. Nam peculiaris
ossa capitis, maxillæ, scapularum, vertebrarum, femoris, tibiærum penè innumera vidisse, id
inter cetera restatur, quod quid habeant hominis *Et* simiarum ossa simile, quid item dissimi-
le accuratè expresserit, *Et* libri de usu partium, *Et* libello de ossibus; ut enim in studiosorum
gratiam singula sigillatim percurram, Suturae quæ in homine pectinatim aut dentatæ more
ferre connectuntur, in simia caluaria adeo sunt obscuræ, ut harmoniam potius quàm sutu-
ræ referant. Ossa temporum nec intus, nec foris diuisa apparent, sed ex unico osse constant
in simiis. Os illud lapidosum duos in homine habet processus, quorum alter *et* ammillaris, alter
styloides dicitur, at in simia prioris nullum ferè apparet vestigium, posterior autem perexi-
guus est. Zygomaticus os quæ parte à malis procedit, in homine tenue conspicitur, *Et* sutura diri-
mitur, in simia crassum est, linea potius quàm sutura discretum. Inferioris maxillæ processus
in homine *Et* simia dissimiles sunt, fit enim genæ inferioris articulatio per arthrodiam in ho-
mine, in simia per ginglymon. In cervicis vertebris id habent dissimile, quod spina, id est, acutus
ille processus in homine sit bifidus, in simia simplex; differunt etiam forma, magnitudine *Et*
processibus. Lumbi in simia sunt longiores, septemque vertebris constant. Quod ad scapulas *Et*
claviculas attinet, simia homini maximè est similis, ut docet Galenus 13. de usu partiũ. Pectus
homini est latissimum *Et* costæ amplissima. Hæc 24. tantum in homine, in simia viginti sex
numerantur: hæc in simia spatijs vertebrarum intermedijs inseruntur, in homine magis corpo-
ribus vertebrarum attextuntur. Iam vero ossis sacri *Et* coxigis non eadem est structura, in si-
mia enim os sacrum duabus tantum constat vertebris, coxigis os longissimum est *Et* perfora-
tum. Ilium ossa deficiunt in simia eo in loco, in quo solent esse pubis ossa, ut nulla videantur
esse pubis ossa, in artubus vero maxima quidem est similitudo, sed quid habeant dissimile, docet
Gal. 2. *Et* 3. de usu partium. Si ergo quid habeant simile, quid item dissimile hominis *Et* si-
miarum ossa, expressit Galenus, cur simiarum tantum sceleton descripsisse exclamant isti ca-
lumniatores? Hoc tantum voluit Galenus, si ad manum nobis non adsint humana corpora,
simiæ ossa humanis multum similia esse substituenda.

Quam male
accusetur Ga-
lenus.
Hæc autem Gale-
nus duos sce-
letos integros.

Quid differat
hominis, *Et*
simiarum
ossa.

Galenus
ignovus quid
habeant simi-
le, quid item
dissimile ho-
minis *Et* si-
miarum ossa.

De Ossis definitione eiusque temperamento.

QVÆSTIO II.

Galeni definitio
dammatur
à quibusdam.

Excusatur
Galenus.

De ossium tem-
peramento.
Calida esse
probat.
Materia cali-
da est.

Efficiens cali-
dum advenit.

Exuberantia
est.

Frigida esse
ossa.

Quomodo ca-
lor urere dicitur.

An ossa pilis
sint sicca.

Solutio.



DAMNATUR à multis, tanquam parum Philosophica, ossis definitio à Galeno proposita, Philosopho enim quicquid est siccissimum & durissimum, idem est terreum; quicquid item terreum, idem siccissimum & durissimum: sed non vident, libellum de ossibus in tyronum gratiam scriptum, & ossis naturā eā definitione clarius exprimi, ut durum sit os; quia siccum, siccum, quia terreum. De ossis temperamento lenia quedam obversantur, quæ in rudiorum gratiam explicare placet. Empedocles ossa calida esse voluit, ut et Albertus magnus. Eorum sententiam ego his rationibus stabiliam. Orta attestantur principis, ossium materia calida est, efficiens item calidissimum. Materia pinguis est Hippocrati, libro *περὶ σαρκῶν*; pingue autem acreum est Philosopho; ideo per summa innatat. Efficiens calidum est, nō moderatum, sed intensissimum & urens. Ossium enim generationem per exustionem fieri volebant Hippocrates, Aristoteles, Galenus, Plato. Hippocratis, libro citato hæc sunt verba. *ὁ καὶ σαρκὸς αὐτῶν λιπαρὸν ἐστὶν τὰ χυμὰ ἐξ αὐτῶν*. Quando ossa constituta sunt, quod quidem in his pingue fuit celeritè exustum est, & alibi. *ὅπου γὰρ τὸ λιπαρὸν, id celeriter propter pinguedinem exustum fuit, ossaque durissima & maximè solida facta sunt.* Aristoteles ossium generationem Vulcano tribuit, id est, igni urenti. Galenus primo de semine, Ossium (ait) efficiens causa fuit caloris facultas, quia torreret ossa ac prorsus arefaceret. Idem voluit Plato in Timeo: Os (ait) ita natura cōposuit, terram atterens puram, limumque miscuit madefecitq; medulla, id postea in ignem iecit. Nos ossa frigida esse volumus. Quicquid enim in prima generatione pingue erat, id totum ab sorptum fuit: exaustu itaque humidi & pabuli defectu, frigida ex euentu sunt reddita. Efficiens autem non est calor urens, quia natiuus, qui in semine inest calor, οὐτὲ πῦρ, οὐτὲ δὲ πυρὸς ἐχρὶ τὴν ἀρχὴν, neque ignis est, neque ab igne puro ortum ducit, sed blandus ac suavis est, proportione (inquit Philosophus) respondens elemento stellarum, urere tamen dicitur Hippocrati, Aristoteli & Galeno, quia ob diutinam moram in densiorem materiam vires suas exerens vehemēter agit, ut urere videatur; sic calculus non semper ab intensiori calore generatur, sed à diuturniore, quantumvis moderato. De ossium siccitate, dissentientes Galeni locos conciliare non est difficile. Primo de temperamentis, pilos ossibus sicciores esse vult, quia eorum materia omnino est sicca excussa, ossium autem pinguis. Libello de ossibus, ossa omnium siccissima agnoscit. Dic, ossa inter vivientium animalium partes, omnium esse siccissimas, pilos autem viventes corporis partes non esse, quia legitima non est eorum nutritio accretioque.

An ossa sentiant.

QVÆSTIO III.

Sensu est quid
adventitium.

Ossa insensibilia
esse.



SENSVM non esse de essentia partis, sed quid adventitium (insultat enim à cerebro per nervos) docuit Galenus nulle in locis. Esse autem ossa insensibilia ita est clarum, ut confirmatione nulla egeat, nam & phlegmone afficiuntur, & suis membranis denudata vruntur, secantur, franguntur sine sensu; nec, ut iam demonstratum est, sentire debuerunt, quia totius corporis molem sustentant & variis agitantur motibus, alioqui esset animal in *ἀεὶ ἀσάβη*. Galeno 13. methodi, os capitis sensu caret, libro de instrumento odoratus ossi narium tantum abest, ut odorandi, ut ne tangendi quidem sensus tributus sit. Sunt tamen quamplurimi, qui

non omnino insensilia esse contendunt. Proferam ego exercitationis gratia, & grauissimorum virorum auctoritates, & rationes à veri specie non abhorrentes. Hippocrati lib. de fracturis, ossa quæ cruri iunguntur dolent, & secundo de morbis, Quum caries in osse facta fuerit, dolor ex osse corripit. Galenus 4. de placitis, In ossibus (ait) nonnulli quandoque grauitatis sensum percipiunt, qui tamen admodum est obscurus. Est apud eundem & Medicos omnes peculiaris ossium dolor ὀστέονος dictus. Aretius libro secundo de signis & causis diuturnorum morborum, Non dolent (inquit) ossa, vel minimum etiam si quis secet, aut collidat, at si quis ab ipsis doleat, nihil est eis ad dolorem citandum potentius. Auenzoar omnia ossa sentire vult, quia rationalem habent animam, & nutriuntur: at ex Aristotele secundo de anima, in rationali inest sensitiuum & vegetatiuum, ut in pentagono, trigonum & tetragonum; aut ergo due erunt anima in ossibus, aut ipsa sentire necesse est. Sed & nisi sensu tactus prædita essent ossa, maior pars animantis à planta non differret. Natura enim (ut scribit Galenus) cuique viscerum tantum sensus largita est, quantum conueniebat, ut à plantis distinguerentur, essentque animalis particula. Quin etiam per ossium substantiam arteria nullæ sparguntur, vitalis tamen facultas à corde in ea influit, cur ergo animalis, vitalis tenuior, & magis spiritalis, in ossa sine nervis non influit? Ossa itaque sentire putat Auenzoar, sed satis obscure & confuse, ideo à veteribus dici insensilia, ut gustus quidam insipidus dicitur: quod si sceti & vsti non dolent, vehementior periostei & vicinarum partium dolor minorem illum obscurat. Verum hæc omnia lenioris momenti sunt, quam ut communem & in scholis receptam de ossium sensu opinionem labefactare queant. Hippocratis locus ita explicandus, dolorem ex carie subsequi non in osse, sed vicinis partibus, & ossa quæ cruri iunguntur dolere per membranas. Sic dolor ille ὀστέονος dictus, non proprie ossium est, sed membranarum; ita enim de eo Galenus secundo de locis affectis. Quod membranarum, quæ ossibus adiacent, dolores & profundi sint, & ossium ipsorum velut dolentium inducant imaginem, haudquaquam mirandum est; nam ij à quamplurimis ostocopi, id est, ossium labores nominantur, & magna ex parte ab exercitationibus contingere solent. Auenzoaris rationes nihil concludunt: unica est, fatcor, in homine anima, sed ea variis instructa facultatibus organorum diuersitatem postulat. Naturam animalitatis in sensu consistere volumus & sensu solo à plantis differre animal, non tamen ob id ossa actu sentire putamus, quia per eorum substantiam sensilia organa, nervi scilicet non disseminantur; ab illis tamen sentiendi potentiam non excludimus, ut volunt quidam, ob duritiem & siccitatem: nam dentes reliquis ossibus duriores sensu tactus præditi sunt, quia in eorum cavitatem nervi conspiciuntur. Plura de his capite de dentibus.

Sentire ossa docentur: Auctoritates Hippocratis.

Galenus.

Aretius.

Auenzoaris opinio.

Raris probabilis.

Alteratio.

Refellitur illa opinio.

Auctoritates explicantur.

Auenzoaris rationibus satisficit.

An omnia medullam habeant, & an medulla ossium sit alimentum.

QVÆSTIO III.



DE ossium medulla, dissentientia loquutus videtur Galenus. Nam 1. de usu partium, Parua ossa, quia sinus nullos habent conspicuos, medullosa non esse scripsit. Et libello de ὀστέων, ex ossibus quedam statuit grandia, amplius concava & medulla plena: quedam parua, solida & sine medulla. Aristoteles 3. de historia animal. & 2. de partib. animal. non omnia ossa medullam habere scribit. Contrarium tamen sentire videtur Gal. 3. de facultatibus natural. & lib. de inequali intemp. dum talem ossibus omnibus medullam esse docet, qualis est carnis sanguis. Conciliabitur Galenus si dixeris, in ossibus duo reperiri, μενδόν, id est, medullam & χυμόν, id est, succum. Medulla proprie dicta, crassa est & alba substantia: succus verò liquidior est & subruber: illa in ossis ventre & cavi-

Non omnia ossa medullam habent.

Omnia ossa medullam habent.

Conciliantur Galeni loci. Quid medulla. Quid succus.

re continetur, quam κοιλίας καὶ κοιλότητα vocat Galenus: hic in caernulis tantum. Habent ergo ossa omnia, & magna, & parua, succum quo aluntur, quem communi vocabulo, medullam appellare nihil prohibet. I. l. de vsu partium & lib. de facult. natural. ait: Demonstrauimus medullam ossibus proprium esse alimentum, & ossibus cavitatē carētibz tale quiddam in eorum caernulis contineri, neminem porro mirari oportere, si medulla est crassior eo succo qui in caernulis habetur, quanquam eiusdem vsus gratia hic extiterit. Ceterum, dum Galenus ex ossibus quaedam statuit magna, concava & medullosa, quaedam parua, solida & sine medulla: putat Fallopius unicam esse diuisionem in magna & parua. Magna verò desiniri, quae ampliter concava & medullosa sunt, contrā parua, quae solida sunt & sine medulla. Sed Fallopij interpretationem non probo, quia magnitudinis natura in cavitatē & medulla non consistit: cum ischij & scapularum ossa, nec caua sint, nec medullosa, magna tamē esse omnes noriunt. Existimo ego triplicē à Galeno ossium diuisionē proponi: ut ossiū quaedam sint magna, quaedam parua, quaedam solida, quaedam non solida, quaedam medullosa, quaedam sine medulla. Vtrum verò medulla ossium sit alimentum, dubitari potest. Id negat Aristot. cap. 6. lib. 2. de partibz animal. quia medulla humida est, ossa siccissima: similibz autem singula nutriātur. Quia in frigidioribus & humidioribus naturis copiosior est, propterea excrementum potius quam alimentum dici potest. Nos medullam ossium alimentum esse volumus, ut sanguis proximum est carniū alimentum. Hoc docuit Gal. cap. vii. lib. 3. de facultat. natural. Qualis, inquit, est carnis sanguis, talis est ossibus medulla: & ante eam Hippocrates, libello de alimento, apertis verbis id pronuntiauit, μυελὸς τροφή ὀστέων, medulla alimentum est ossis.

De epiphyseon vsu & substantia: defenditur Galeni opinio contra Vesalium, Columbum & iuniores. QVÆSTIO V.



GALENVS libello de ossibus, & vndecimo de vsu partium cap. 18. duplicem appendicum agnoscit vsus, alter, ut in medullosis ossibus vicem gerant operculi, ne effluat medulla; alter ut firmiores faciant articulationes. Ridet Vesalius priorem Galeni vsus: non enim epiphyse medulla gratia constructas putat, quia maxilla inferior medullosa est & appendicem nullam habet; quin & ossis sacri lateribus & ischio ossi suae sunt epiphyse, vbi nullus sinus, nulla medulla: scapula etiam nulla ferē ex parte medullosa, plures habent epiphyse, ut & vertebrarum corpora. Sed nescio quō rapiat eum contradicendi. æstus: nunquid enim voluit Galenus epiphyse solius operculi gratia constructas: sciebat enim multas esse appendices vbi nulla erat cavitatē, nec medullosa omnia ossa voluit appendices habere: nam & ipse locis citatis inferioris maxillae exemplum proferit. Sed ex ossibus quaedam facit κοιλὰ καὶ πυκνὰ, id est, caua & solida: quaedam κοιλὰ καὶ χαλκὰ, id est, caua & laxa. Quae prioris sunt generis, non indigent epiphyse, nam densum os per se medullam sine externa epiphyse claudit. Quae posterioris, quia debiliora, indigent: efflueret enim vi motus medulla. Maxilla inferior appendice non eguit, quia solida & caua: inferne namque eius partes per symphyse ita connectuntur, ut effluere nihil queat: suprema verò in duos processus desinunt. In his ossibus, quae appendices habent sine medulla, dic appendices articulationis, motus & securitatis gratia existere. Obijcit rursus calumniator, epiphyse laxas esse & caernulas habere medulla repletas: Ergo non esse operculum alterius ossis. Respondeo, caernulas quidem habere, sed non cavitates, & laxitatem eam crassitie compensari, laxa autem fuerunt ne suo pondere partes premerent. Tertiò, Galenum accusat Vesalius, quod dixerit, magnis ossibus adnasci epiphyse, nam & paruis etiam (inquit) adnascuntur. Sed nunquam scripsit Galenus magnis tantum ad-

Fallopij de ossium magnitudinis interpretationis non probatur.

An medulla ossium sit alimentum. Aristotelis opinio, Hippocratis & Galeni opinio.

Duplex apud Galenum vsus appendicum.

Vesalius Galenum carpit.

Deposito calumnia Vesali.

Duo genera ossium cavitatem habentium.

Obijctio Vesali.

Tertia Vesali accusatio.

nasci: Grandibus (ait) plurimis in extremo adnascuntur. Aliorum osium epiphyyses, neque omnibus his, sed illis tantum quæ caua sunt & medullam habent. Columbus Galenum arguit, quod appendices osibus duriores voluerit. Non, inquit, durities epiphysearum impedit quo minus ex frequenti & valido motu ossa ledantur, sed cartilaginis lubricitas, quo fit ut non omnia ossa habeant epiphysem, sed crustam cartilagineam. Verum imponit Galeno Columbus: non enim duriores dixit, sed densiores & crassiores.

Columbus
Galenum
arguit.

De articulationis natura: defenditur Galeni opinio contra Vesalium,
Columbum & cæteros calumniatores.

QUESTIO VI.

DE osium structura & conexione operæpretium est audire exclaman-
tes contra Galenum Neotericos. Primus Vesalius, cum articulationis
naturam eleganter à Galeno expressam non intelligeret, novam συν-
θέσιν, id est, compositionis osium diuisionem commentus est.
Ossium (inquit) structura, vel est cum motu & diarthrosis dicitur, vel
est sine motu, & synarthrosis appellatur. Diarthrosis rursus duplex
est: alia namque cum motu est euidenti, & eius species sunt enarthrosis,
arthrodia & ginglymos; alia cum motu est obscuro, & eius totidem
sunt species, enarthrosis, arthrodia, ginglymos. Synarthroseos quatuor sunt species, sutura,
gomphosis, harmonia & symphysis. Hæc autem omnia committuntur aut sine medio, ut quæ
mollia sunt & fungosa, aut medij cuiusdam corporis interiectu, cartilaginis puta, ligamenti
& carnis. Hactenus Vesalius. Columbus & in Galenum, & in Vesalium inuehitur, ac du-
plicem tantum statuit osium compositionem, ἀρθρωτὶς & σὺμψυσις: sed utriusque naturam
diuerso modo interpretatur, & utriusque diuersas species statuit: ἀρθρωτὶς appellat structuram
cum motu: symphysin, connexionem sine motu. Articulationis easdem cum Vesalio assignat
species, diarthrosin cum manifesto, & synarthrosin cum obscuro motu. Vtrique rursus
enarthrosin, arthrodia & ginglymon conuenire vult. Symphyseos differentias tres agnoscit,
suturam, harmoniam & gomphosin. Galeni autem diuisionem mancā & ineptam putat
Columbus, quod variæ sint articulationes, quæ nec ad diarthrosin Galeni, nec ad eius synar-
throsin referri queant. Sic osium carpi & pedij articulatio, diarthrosis dici nequit, quia ma-
nifestus non est eorum motus, nec synarthrosis, quia nec per suturam, nec per harmoniam, nec
per gomphosin articulantur: quin & articulatio costarum cum vertebris, nec ad diarthro-
sin, nec ad synarthrosin Galeni referri potest. Esse autem suturam & harmoniam symphy-
seos, non articulationis species, docet Columbus autoritate Galeni, qui osium maxilla supe-
rioris syntaxin, symphysin vocat; eam autem per harmoniā & simplicem lineam connecti
nemo nescit. Hæc Columbus. Fallopius cōment. in Galeni libellū de osibus articulationis diui-
sionem à Galeno propositam probat, sed in suis obseruationibus dissentit aliquantulum. Ita
de osium structura, varij varia sentiunt. Quæ omnia ad Lydium (ut aiunt) lapidem reuocare,
& Philosophica ac medica statera expendere placet, & quandoquidem liberum est cuique
Philosophari, meum hac de re iudicium libenter proferam. Vesalius articulationis naturam
non intellexit: Columbus & articulationis & symphyseos notionem omnino ignorauit: Fal-
lopius nunc Galeni partes tutatur, nunc ab illo dissentit, atque ita omnia permiscet. Quod ar-
ticulationis naturam ignorauit Vesalius, demonstratur; nam articulationes compactas &
ita pressas, ut exiguum subsit ad motum spatium, quales sunt osium carpi, tarsi & costarum,
cum vertebris ad diarthrosin refert tanquam ad genus, cum diarthrosis laxam tantum arti-
culationem denotet. Id enim nomen est separationis, ut sit diarthrosis ea articulatio in qua

Nonne compo-
sitionis osium
diuisionem à Vesa-
lio tradidit.

Columbi diui-
sio.

Columbus Ga-
leni diuisionem
mutilem putat.

Fallopij opinio.

Vesalium arti-
culationis
naturam non
rasse docetur.

propter magnos motus caput ossis cavitati suæ tenaciter non adhaeret, at in ossibus carpi & tarsi non laxa est (evidentissimus enim eorum esset motus) sed ita pressa compactaque articulatione, ut obscurissimus sit eorum motus. Sed & quia symphyseos ad synarthroses refert, & proprio naturam videtur ignorasse. In symphyseos enim est unio & continuïtas, ut posthac demonstrabitur, in articulatione contiguitas tantum. Columbus dum Galenum & Vesalium erroris insinuat, in graviora incurrit incommoda, & totam articulationis ideam à maioribus nostris receptam evertit miserè. Putat articulationis naturam in motu consistere, nihilque articulare, quin ipsum quoque moueatur; at motus non est de essentia articulationis; hoc unicum ad articulationem requiritur, ut ossum & propriè, id est, extrema, committantur, & sese tangant, siue cum motu id fiat, siue sine motu. Hoc primum nominis indicat notio: & propriè enim cuiuscumque ossis extremitatem, qualiscumque illa sit, denotat: contactus ergo & connexus extremorum propriè articulatio dicitur. Os hyoides, quia alterius ossis extrema non tangit, articulare non dicitur, habet tamen cum ceteris ossibus symphyseos & continuïtatem per carnes, id est, musculos. Hoc ipsum mirus indicavit Hippocrates lib. de locis in homine.

Columbus non bene intellexit naturam articulationis. In quo consistat essentia articulationis. Quid sit articulationis.

Euchorides.

ὅσα ὅδ' (inquit) ὅσα ἐὰν ᾖ αὐτὰ συμβαλλόντων, πάντα ἀρθροποιέουσιν, id est, quæcunque ossa inter se committuntur, ea omnia articulos faciunt. Erotianus apud Hippocratem, Propriè, inquit, ossum inter se συμβολὰς commissiones ἀρθροποιέει, vocat, dum scribit, manus autem multos habent articulos. Hoc denique rustici & artifices norunt; lingua enim inuicem commissæ & iunctæ articulata vocant. Absurdum est itaque, & propriè definire compositionem cum motu: nam si laxa sit, articulatio erit cum motu, & diarthroses appellabitur; si stricta valdeque compacta, ut nullum subsit ad motum spatium, synarthroses nuncupabitur. Id apertissimis verbis docuit Hippocrates secundo de articulis. Mala, inquit, immota manet, quia στυμφορῶναι non autem διμφορῶναι, id est, stricta iungitur commissura, non laxa; ut enim διαλaxiorem, ita particula στυμφορῶναι denotat articulationem. Quod si motus de essentia esset articulationis, absurdum fuisset, & Hippocrati Laconismo indignum dicere, mala immota manet, quia iungitur immobili commissura. Scio apud veteres ἀρθρον nomen variè usurpari, & sepe pro mobili tantum articulatione. Sic Hippocrati libello de arte ἀρθροποιέειν, ἐν ὅσιν αἱ συμβολαὶ τῶν κινουμένων ὀστέων ἐγκυκλῆονταί, in quibus ossium quæ mouentur compagine ac commissuræ vertuntur. Galenus lib. de finit. medicarum, ἀρθρον definit, ὅσῳ κατὰ φύσιν κινητέον συμβολήν, id est, ossium quæ motum à natura sortita sunt coniunctionem: & in Isagoge, τῶν ὀστέων στυμφορῶναι ᾗ κατὰ φύσιν κινῆσθαι, ossium compositionem ad motum comparatam. Vnde fortasse deceptus Columbus, existimavit articulationem omnem, structuram esse ossium cum motu. Sed non observavit bonus ille vir, ab eo quod magis conspicuum est sæpe totius denominationem fieri; sic licet ἀρθρον sit ossis cuiuslibet extremum, absolute tamen & κατ' ἐξοχὴν rotundum caput significat. Dum ergo Galenus, locis citatis, articulationem definit compositionem ad motum comparatam, non negat dari aliquam articulationem immobilem, sed quia plures sunt articulationes cum motu, & illa sensibus magis conspicua, eas absolute & κατ' οὐνομαστικῶς articulationes vocat. Ceterum, quæ ad Galeni divisionem evertendam afferri solent à Vesalio & Columbo articulationes ossium tarsi & carpi, quæ nec ad diarthroses Galenicam referri possunt, cum evidens earum non sit motus, sed obscurus, nec ad synarthroses, cum nec sutura, nec harmonia, nec gomphosi committantur, eas nos admittimus, eas primus omnium indicavit Galenus, & dubias atque accipites vocavit: sunt enim synarthroses, ratione motus obscuri, & vix à spectabilibus (ita enim δυσόρατον, interpretari lubet non difficilem) sunt diarthroses, si compositionis modum spectes, capita enim habent & cavitates. Sunt hæc Galeni verba cap. 12. libelli de ossibus. Tā exiguum costatum est motus, ut synarthroses appellari queat. In multis quoque aliis partibus corporis

Motus non est de essentia articulationis.

Articulationis nomen variè usurpat apud veteres.

Quid Columbus deceptus.

Mobilis articulationes per antiquos rationales dicitur.

Articulationes accipites à Vesalio & Columbo propositas non agnoscunt Galeni.

Synthesis ossium ambigua est, adeo ut dubites, an ea per diarthrosin, vel synarthrosin iniunctam iungi dicenda sint. Propterea à nobis tres articulationis differentiae propositae sunt, diarthrosin, synarthrosin, & neutra. Ex his satis patere arbitror, quàm misere in articulationis natura Vesalius & Columbus decepti sint, dum Galenum erroris insimulant.

De symphyseos natura vindicatur Galenus à Vesalio, Columbo, Fallopio & iunioribus. QVÆSTIO VII.

SYMPHYSEOS naturam accuratè expressit Galenus libello de ossibus, dum eam definit ἐν ὅσῳ τῷ σπυκτῷ, naturalem ossium unionem. At tota in eum iniebitur, obstreptique Anatomicorum turba. Vesalius in hoc certamine signifer esto, commilitet Columbus, Fallopius, & iuniores quamplurimi aliquod agmen ducant. Putat Vesalius symphysin articulationis esse speciem, & ad synarthrosin refert, cum tamen diuersa sit apud Philosophos & medicos utriusque natura. Nam aliud est compositio, aliud unio; illius natura in contiguitate, huius in continuitate est sita. Synarthrosin ad duorum structuram pertinet, non ergo symphysis, per quam ossa redduntur unum, ad illam referri debet. Reprehendit Galenum Vesalius, quod dixerit, ossa mollia & fungosa sine medio uniri, sicca autem & dura e gere medio. In puerulis (ait Calumniator) ossa pubis & maxilla mollia sunt, quae tandem cartilaginis interiectu ununtur, adultis verò & senioribus, quorum cartilaginee sunt rescicatae & ossae, sine medio ununtur: Sed non videt, Galenum ossa conferre inter se; licet enim puerulorum ossa omnia mollia sint, sunt tamen alia aliis molliora, aut sciora; hac medio egent, illa non. Postremo, nullam symphysin per carnes fieri putat Vesalius, quia in nullo ossium connexu caro intercedit, nisi fortasse in dentium cum maxillis connexu. Sed mentem Galeni non videtur assequutus. Numquam enim existimauit Galenus carnem inter duo ossa sese interponere ut cartilaginem: sed per carnes, id est, musculos, ossa aliis partibus alligari & continuari voluit. Aperuit suam nobis διὰ νοίας Galenus cap. 13. lib. de ossibus, αὐτὸ μὴ πλάττειν καὶ τὰ ὑποὸ τοῖς ὀστέων τῷ θώρακος: συμφύοντα δὲ διὰ μὲν τῶν τοῦ κεφαλῆς ὀστέων καὶ τῶν τοῦ θώρακος ὀστέων, καὶ τῶν τοῦ θώρακος πλευραίων, &c. id est, scapulae post thoracem fixae sunt, copulantur autem per musculos cum osse occipitis, cum spinae rachaeos, cum thoracis costis & osse hyoide. Per carnes ergo, id est, musculos, ossa aliis continuantur & ante Galenum id agnouerat summus Hippocrates lib. de ossium natura, αὐτὸ δὲ σάρκες, inquit, πάντων ἐνδεσθῶν καὶ ἔνταξιν; id est, carnes omnium exhibent colligationem. Columbus à Vesalio & Galeno planè dissentit, & suturam, gomphosin, harmoniam, symphyseos non articulationis differentias statuit. Quàm benè autem vel malè, videat aequus rerum aestimator. Tota symphyseos natura in contiguitate est sita, in sutura autem, harmonia & gomphosi, contigua tantum sunt ossa, non continua: ut ergo articulationis natura in solo extremorum cōtactu consistit; ita symphyseos in continuitate; adeo ut per symphysin quae duo erant, reddantur unum. Sic Galenus lib. 15. de vsu partium, coniunctionem & continuitatem vasorum cordis, quae in fatu percipitur, arteriae quippe magnae cum vena arteriosa, symphysin appellauit. Sic libris de semine, de formatione fœtus & comment. ad Aphorism. 1. sect. 4. Coniunctionem fœtus in utero, quae per vasorum umbilicalium continuitatem fit, symphysin dixit. Et admirandus Hippocrates, per eam humanum corpus partium diuersi generis structura, & earum multiplici figura, varium, unicum esse & symphysin habere pronuntiauit. Sic per periosteum à capite ad pedes, cōtinua sunt sibi ossa, cuiusque κοινὴς συμφύσεως meminit, sect. 3. lib. de fract. Errat itaque Columbus, dum suturam & harmoniam species statuit symphyseos. Fallitur etiam,

Vesalius symphyseos naturam non intellexit.

Vesalius in Galenum calumniatur.

Defensio Galeni.

Vesalius nullam symphysin per carnes fieri putat. Non assequutus est Galeni mentem.

Columbi opinio de symphyseos divisione. In qua consistit natura symphyseos.

Commenius symphysin per cutem & membranas fit.

Varij errores Columbi.

*Motus duo est
de essentia
symphyseos.*

dum symphyfis sine motu esse contendit, nam motus non est de essentia symphyseos. Datur symphyfis sine motu, ut in synchondrosi, in ossibus pubis, & maxille inferioris; datur symphyfis cum motu, ut in symeurosi, imo in omni laxa articulatione necessaria fuit symphyfis. Quia enim non satis tuta erat magnorum ossium articulatio (leni quippe de causa à violento motu se iungata distraberebatur, & dum artus animal quocunque vult inflectit, contorquet, contrahit, ex sedibus exciderent sagax & providens natura utraque extrema vinculorum interiectu colligavit. Non recte igitur philosophantur, qui articulationi symphyfis opponunt, quasi illa cum motu sit, hæc sine motu. Datur articulatio sine symphyfi, ut in harmonia; datur symphyfis sine articulatione, ut in osse hyoide; datur articulatio cum symphyfi, ut in brachio, cubito, femore, & omni diarthrosi. Hoc docuisse videtur Hippocrates lib. de articul. & de fract. Vult enim aliquando vitari articulationem cubiti illesa symphyfi, ut dum luxatur cubitus sine vulnere, aliquando ledi symphyfis illa sa articulatione, ut si inflicto vulnere cubiti ligamenta secentur, os autem non exciderit; interdum utramque simul. Quod etiam Galenus docuit libro de morborum different. Si ligamentum (ait) aut laxum, aut tensum fuerit, aut disruptum, in ea parte articulationis motus leditur, non aliam ob causam, nisi quia partes debitam coniunctionem non servant. Abeat itaque cum suo commento Columbus, qui συμφύσεως & ἀρθρώσεως Græcarum dictionum naturam melius intellexisse se putat, quam Galenum, eloquentissimum virum & Græcum. Scio quidem sepe apud Hippocratem & Galenum symphyfis pro articulatione usurpari, & confundi has dictiones. Nam secundo de articul. maxille superioris commissuram symphyfis vocat. μὴν δὲ αὐτῇ ἐν συμφύσει ἐν τῇ κατωτέρᾳ δὲ ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ, vnica est in inferiori maxilla cōnexio, at in superiore multæ. 4. de articul. cōmissuras digitorum συμφύσεις vocat; sed si dictionis vim & propriam acceptionem exquisitè rimari oporteat, ea tantum dicuntur συμφύσεις, quæ minuuntur & continua sunt. Ita symphyseos nomen propriè usurpavit Galenus, dum eam definit naturalem ossium vnionem. Fallopius multa de symphyfici quæ obscura scriptis mandauit, sed dum carneam, cartilagineam, & nerueam symphyfis ad de articulationem refert, eadem redargutione dignus censetur.

*Non recte articulatione opponitur symphyfi.
Elegans Hippocratis locus pro illustracione symphyseos.*

HISTORIA ANATOMICA.

Brevis ossium omnium humani corporis diuisio & enumeratio.

CAPVT VI.

Capitis ossa.



Facies ossa.

Dentes.

*Trunci diuisio.
Spina quatuor
partes.*

NIVERSA ossium series, αλετὸς dicta, tripartitò à nobis diuiditur, in caput scilicet, truncum & artus. Capitis nomine caluam & faciem complector. Calua seu cranium octo constat ossibus, sex propriis & duobus communibus. Propria sunt, os frontis, occipitis, sincipitis duo, temporum item duo, in quibus tria ossicula continentur, stapes, incus, malleolus. Communia sphenoides & ethmoides. Facies maxillam vtramque, superiorem & inferiorem, continet. Superior vndecim constat ossibus, inferior duobus tantum. Vtriq; autem dentes sexdecim per gomphosim articulantur, ex quibus quatuor sunt τομῆς seu incisores, duo κροδόντες seu canini, & decem γόμφιοι καὶ μύλοι, seu molares. Truncus in spinam, costas, & os innominatum diuiditur. Spina quatuor habet partes, ceruicem, dorsum, lumbos, os sacrum. Ceruicis septem sunt vertebrae, dorsi duodecim, lumborum quinque, ossis sacri quatuor, cuius extremum coccx dicitur. Costæ duodecim sunt vtrinque, septem veræ, & quinque spuria, seu nothæ, quibus

quibus os sterni anteriore parte, clauiculæ superiore, & scapulæ posteriore annectitur. Ossis innominari partes tres sunt, ilium, ischium & pubis. Tertia superest *αελετῆ* pars, quam *κῶλα* seu artus vocant; sunt autem artus duo, manus & pes. Manus in brachium, cubitum, & extremam manum secatur: brachij vnicum est os; cubitus radio constar & cubito; manus extrema in carpum, metacarpum & digitos finditur. Carpi ossa octo sunt, metacarpij quatuor, digitorum quindecim, quibus sesamoidea addere licet. Pes in femur, tibiā & extremum pedem diuiditur. Femoris vnicum est os, tibiæ duo, perone & tibia, cum rotula. Extremi pedis, vt & manus, partes tres sunt, pedium, metapedium & digiti. Pedij ossa septē sunt, metapedij quinque, digitorum quatuordecim. His omnibus os ipsiloidea addamus, quod cum cæteris nullam articulationem habet. Hæc ossium omnium humani corporis brevis est enumeratio; singula nūc exquisito ordine describamus.

Ossis innominari tres partes.

Artus duo. Metacarpum ossa.

Pedis ossa.

De ossibus cranij eorumque suturis.

CAP. VII.



SSIVM Historiam solent quidam à spina inchoare, quod huic, velut nauium carinæ, reliqua omnia innixa cohæreant. Ego à capitis ossibus descriptionē aggrediar, quod ex capitis magnitudine, vt summus annotauit Hippocrates, ossium omnium naturam æstimare oporteat, non quod oriantur ossa à capite, sed quia ossa omnia proportionē ossibus, quibus articulantur, respōdent: scilicet

Capit à capitis ossibus magnitudine.

Quid capitis nomine intellegendum.

Quid cranium.

Capit cranium fuit osseum.

Capit osseum fuit & rarum.

Capit est velut caminus vniuersus.

Duplex cranij tabula. Duplex.

Figura capitis naturalis quælibet sit.

Capit rotunda.

et brachij ossa scapulis, femoris ischio, ischiū sacro, sacrum vertebris, vertebræ spinæ medullæ, medulla cerebro, cerebrū caluariæ. Capitis porò nomine, hic eam tantū partē intelligo; quæ cerebri est domiciliū, cuius ossēa partē Græci *κεφαλή* dixerunt, quod sit veluti *κεφάλαιον*, id est, galea cerebrū tegens, vulgus caluā & caluariā vocat. Osseum autē debuit esse cranium solius cerebri gratia: decebat enim hominis eam partē, quæ rationis particeps atq; animæ sedes erat futura, solido recto, ne lēderetur, muniri. Ad eam securitatem, aut dēsum & tenue, aut dēsum & crassum, aut crassum & rarum esse debuit: non densum & tenue, hoc enim facile relā penetrassent; non dēsum & crassum, quia pōdere suo nimis esset molestū: ergo crassum & rarū. Crassum quidē, quia crassities extrinsecus occurranribus iniuriis obstitit, rarū vero, id est, laxū & multis foraminulis peruiū, tum ne pondere graueret, tum vt succum pro alimento cōtineret, tum denique ad vaporum perspirationē. Nam cum caput sit velut caminus vniuersus, & cucurbitulæ instar (cuius figurā refert ex amplo in angustum definens) trahar cōtinuo sorbearque expirationes partium inferiorū, nisi exiguis illis cauernulis parerent ossa, assiduis vaporū haustibus cerebrum inebriaretur. Crassitiem cranij id indicat, quod duplex omni ex parte visitur, Barbari duplicem laminam, aut tabulam vocant. Raritatem media ossis substantia (*διπλὸν* vocat Hippocrates, Latini medirullium) detegit, quam venulis, arteriolis, carunculisque obsitam voluit. Est ergo rarum & crassum os cranij, sed non omni ex parte rarum laxumque; nam vtræque superficies superior, & inferior veluti corrice obducta, densa est, polita & leuis, ne membranas pericranion & crassam suā asperitate lēderet, quod Chirurgis nosse necessarium voluit Celsus. Sic enim demisso specillo si qua sentiarur asperitas, fracturæ suspicio orietur. Naturalis rotius cranij figurā rotunda est, sed quadamrenus oblonga, anteriore & posteriore parte protuberans, & ad latera vtrinque compressa. Rotunda, tum ad capacitatem, vt cerebri amplissimam molem contineat, tum ad *δυσανέθειαν*, ne tam facile ictus excipiat, con-

tinua enim est & vnilinea orbiculatis figura, nec designatum habet punctū quod sit principium dissolutionis: tum denique ad faciliorem motum, vt in omnē partem celerius circumagi possit. Oblonga est, vt cerebrum & cerebellum cōtineat; protuberans anteriore parte, ob apophyses mammillares o doratus organa; posteriore, ob spinalis medullæ exortum & cerebelli situm: comprimitur autem ad latera, sed magis anteriora versus, tum vt posterior pars stet velut in æquilíbrio supra dorsum, cum anterior pars ob maxillæ superioris ossa sit grauior; tum quia in ea figura constituitur sinus, in quem aër ex anteriore parte accedēs impingit; tum quia non sunt ossa tempotum impedimento oculis maiore circulo conspecturis, id est, in alterutrum latus. Hæc cranij in vniuersum figura est. Partium autem totius cranij figura est multiplex. Non enim eadem est interni, quæ externi cranij figura. Externi namque superior pars, æqualis & læuis mediæ sphærae instar protuberat; inferior, quæ basis rationem habet, inæqualis est, & multis quasi promontoriis exasperatur, tatione processuum mammillarium, styloidearum & ceterarum occipitis. Interni vero cranij superior pars, quæ vicem gerit operculi, licet sit solida & æqualiter ferè conuexa, habet tamen inscriptiones venarum & sinus quamplurimos, qui non nihil inæqualitatis inducunt; inferior, cui cerebrū innititur ob cavitates oculorum, sellam sphenoides, cristam galli & similia, valde inequalis est. Hæc itaque naturalis est capitis figura. Deprauati autem & non naturalis figuræ sunt multiplices. Hippocrates tres tantum descripsit, in priore anterior tantū est proiectura; definitur autem ab eodem *προβολή, τὸ τῆ ὀστέως ἐξέχον προεγγύλιον ὡς τὸ ἄλλο*, quod inter ceteras ossis partes rotundum eminet. Galenus *ἐξέχον* vocat, id est, eminentiam. In altera posterior est tantū proiectura, quæ priore peior cēsetur, debet enim anteriore parte cerebrum esse copiosius, vnde fit, vt tales homines insulsi sint & amentes. In tertia vtræque deficit proiectura & *προεγγύλη*, id est, rotūda dici potest. Galenus deprauatam omnem capitis figuram *φοξὴν* vocat, licet caput *φοξόν* propriè acutum tantum & turbinatum denotet, quale fuit apud Homerum Theritis caput. Quartam autem deprauati capitis figurā describit 9. de vsu partium, in qua longitudo in latitudinem mutatur, eam fingi quidem, sed dari non posse, animali superstiti, putat.

Cranium non vnico osse constare, sed pluribus, quæ suturis articulantur: suturarum vsus & numerus explicatur.

CAP. VIII.



CEREBRVM viscerum omnium, vt excellissimum, ita & nobilissimum, osseo tegumento (caluam dicunt) munita naturæ providētia, vt irruentibus extrinsecus iniuriis minus foret obnoxium, vndique circumseptum fuisse iam demonstrauimus; eidem nunc securitati natura consulens, non vnico osse, sed pluribus solidam illud tectum efformauit, quæ & crassitie, & raritate, & soliditate, ob functionum cerebri varietatem & medullarum substantiam differre debuerunt. Illa autem non per diarthrosin, quæ laxa est, sed per immobilem & compactam articulationem; ad visceris nobilissimi tutelam cōnecti oportuit. Sunt ergo caluæ totius ossa octo, sex propria & duo communia, quæ quia suturis determinantur, suturarum numerum & vsus ante omnia explicare placet. Suturarum non est in mare ac fœmina dispar numerus, quidquid dixerit Aristoteles,

*Cut oblonga
& protuberans*

*Cut ad latera
compressa.*

*Partium tra-
nij figura
multiplex.*

*Figure capitis
non naturalis
multiplex.
Tres figura
deprauata
apud Hippo-
cratem.
Quid pri-
etura.*

*Quid quæ-
caput.*

*Quarta figura
dari non potest*

*Cut pluribus
ossibus constet
cranium.*

*Caluæ ossa
octo.
Suturarum
duodecim.*

sed in utroque alix sunt propriæ, alix communes. Proprias appello, quæ ossa cranij à se inuicem secernunt: communes, quæ caluam à maxilla, sphenoide & ethmoide determinant. Propriarum alix sunt veræ, quæ pectinatim, aut more dentatæ serræ connectuntur; referunt varios litoris angulos & multiformes Geographorum lineas in contractiore tabella descriptas: alix spurix quæ squammarum modo & imbricatim agglutinantur. Veræ non vno eodemque se habent modo, sed præ capitis figuræ earum numerus varius est. In figura capitis naturali, quæ rotunda est & quadantenus oblonga, ad latera depressa & verticibus geminis extumescēs, tres veræ futuræ perpetuo reperiuntur. Prima anterior est, & *σφαιραία* dicitur, id est, *coronalis*, quod ea capitis parte coronæ gestari solcat. Arabes arcualem vocant & *puppis*; hæc è temporibus utrinque in summum verticem per transversum viam capeffit. Secunda *ὀβελιαία*, *ῥαβδοειδής*, & à Ruffo *ἐπιχειρῦσα*, à latinis sagittalis & virgata appellatur. Hæc in capitis longitudinem porrigitur. Tertiâ, quæ postèrior est, à figura literæ *Λ*, *λαμβδοειδής* dixere, alij *ὀψιλονδής*, sunt qui laudæ & proræ futuram vocitant; hæc à capitis imo & postèrioribus utrimque partibus sursum contendens in angulum coit. Harum futurarum figura *H*, litteræ similis est. Huius autem numeri, id est, cur tres sint futuræ, duæ transversæ, & recta vna, quæ per medium excurrit, elegans est demonstratio. Capitis longitudo, quæ à fronte ad occiput extēditur, latitudinem, quæ dextrarum & sinistrarum est partium excedit, ut ergo antiq̃ & posticæ cerebri partes essent in æquilibrio, duplex futura requirebatur, anterior vna, postèrior altera; at dextrarum & sinistrarum partium ratione, vnica sufficiebat, eaque media, alioqui inæqualibus æqualia præbuisset natura. In figura autem capitis non naturali, & numerus, & situs futurarum diuersus cernitur. Si enim anterior eminentia pereat, futura coronalis aboletur; si postèrior proiectura desit, perit lambdoides, sitque vtraque remanentium futurarum figura *T*, litteræ similis: cum enim in hisce deprauatis figuris non ita sit longum caput ob vnus proiecturæ defectum, vnica sufficit futura. Quod si vterque processus pereat, duæ erunt futuræ sese in modum *X*, interfecantes, quarum altera transuersum ad tempora perueniet, altera per medijs capitis longitudinem totam excurrat. Atque ita de futurarum verarum numero statuendum. Spurix vero, duæ sunt, quæ *πρωσκολήματι λεπιδοειδής* appellantur, id est, *squammoſe*, quod squammarum modo & imbricatim committantur; temporales etiam dici solent, quod ossa temporum circumscribant & corticales. Hippocrates, lib. de locis in homine *ῥαφῆς* appellat. Debuerunt porro squamarum modo committi, quia temporum ossa inferiore parte crassissima, nisi superiore sensim attenuarentur, suo pōdere nimis grauantur. Sunt ergo quinque cranio peculiare futuræ, coronalis, sagittalis, lambdoides & squammosæ duæ. Communes, quæ caluam à sphenoide, ethmoide & gena superiore secernunt, tres sunt. Prior, occipitis os à sphenoide linea transversa discludēs, ad caua tēporum fertur, dein rursus deorsum versâ & ad postremos dentes delata, ad palati vicinas partes vsque procedit, totumque os cuneiforme circumdat. Altera ex cauis temporum prodiens, ad oculorum sedes procedit, perque eos medios tendens iuxta nasi medium iungitur, maxillam superiorem diuidit à fronte. Tertiâ addunt recentiores, quæ frontis os à cribroso discernit. Hic itaque futurarum omnium caluæ numerus esto. Iam quis earum sit vsus, aperiamus. Sutarum vsus alij sunt primarij, alij secundarij. Primarij duo; Alter ut per has crassior membrana, quæ in penitiores cerebri sinus sese insinuat, cerebrum à cerebello discludens, & dexterâ ac sinistrâ partes dirimens, cranio firmetur & ita su-

*Propria.**Communes.**Vera futura.*
*Spuria.**Pro capitis figura varius est futurarum numerus.*
*Coronalis futura.**Sagittalis.**Lambdoides.**Cur tres sint futura vera demonstratur.**Futura quomodo se habeant in figura capitis non naturali.**Spuria futura duæ squammosæ dictæ.**Cur squamarum modo committantur.**Communes futura tres sunt.**Sutarum vsus explicatur.*
Primarij vsus duo.
Primum.

spendatur, vt cerebro eiusque vetriculis amplior et relinquatur capacitas; nisi enim futurarū ope cranio alligeretur mēbrana dura, sæpe eō comprerentur, arctarentur, grauaretur interiores sinus. Hūc autem primariū esse futurarū vsum, inde colligo, quod duæ sint tranuersæ, & testæ vnica per medium excurrentes, quia capitis longitudo latitudinem excedit; sed & validius per futuram lambdoidem quam coronalem alligatur membrana, quia cum moueatur antrosum caput, ne vacillaret cerebrum, debuit posteriore parte firmitus alligari. Alter futurarum vsum est ad liberam fuliginum transpirationem: qua expurgatione indigebat cerebrū & per se, substantiam enim habuit medullosam, temperiē frigidam humidamque, vnde *μυτρώδους τῷ ψυχρῷ* dicitur; & ex euentu ratione situs, sedet enim in editissimo, velut operculum quoddam ebullienti vasi superpositum, & cucurbitulæ magnæ figuram refert. Vnde fit vt quibus calua est *ἀρρηκτος*, hi cephalica miserrime torqueantur; & admirandus Hippocrates, lib. de locis in homine, eos capite saniores esse scribit, qui plures suturas habent. Secundarij futurarum vsum varij sunt. Primus ad vasorum, quæ cranium & periosteon irrigant, exitū. Secundus vt dura meninx fibras extorsum mittat, ad pericranij exortum. Tertius ad *δυσάρεστας*, ne vnus ossis fractura alteri communicetur. Qua ratione motus Fallopius existimauit, quintam fracturæ speciem, quam Hippocrates vocat calamitarem, recentiores *αὐτοχρημα*, in qua os altera parte finditur quàm percussū fuerit, non dari. Quartus, vt medicamentorum externorum vis altius penetraret, propterea iubet Galenus, vt topica futurarum regioni admoueantur. Agnouit Aristoteles alium futurarum vsum, vt caluæ capacitas reddatur amplior.

Peculiaris ossium cranij descriptio: ac primum de ossibus frontis.

C A P. I X.



RA N I I ossa octo sunt, os frontis, ossa sincipitis duo, ossa temporum duo, os occipitis vnum, sphenoides & ethmoides. Os frontis, *μέτωπον* dicitur à Græcis, Barbari coronale vocant, puppis os & inuete cūdum; est enim Aristoteli frons pudoris indicium, vnde frontem perfricuisse dicuntur *τὸ μέτωπον τρίψας*, qui verecundiam abiecerūt & impudentes sunt. Hoc os caluarie anteriorem & faciei superiorem partem constituit; sepius vnicū est, quibusdam geminum visitur, quibus scilicet sagittalis futura ad interciliū & radicem narium pertingit. Fallopius in pueris semper geminum esse vult, Aristoteles in feminis; sed fallitur vterque. Figuram habet semicircularem, quæ externa quidem parte leuis est & polita, interiore inæqualis, superna protuberans, inferna excauata, ad oculorum tutelam. Substantiam obinet satis crassam, occipitis quidem osse tenuiorem, sed bregmatis ossibus crassiorem; non tamen vbique similis est crassities; nam in superiore oculi orbita & supra supercilia, vbi sinus ad sunt, amplissimi veteribus incogniti, tenuius est. Circumscribitur hoc os superiore parte futura coronali, atque ita sincipitis ossibus connectitur, inferiore sexta septimaque futura, quarum interiectu ab sphenoidē, ethmoidē & gena superiore interstinguitur. Multa in hoc osse obseruanda sunt. Primum fouea duplex, valli instar, superiorem orbitæ partem constituens; dein foramina duo in superciliū sede; tertio, fossa interna duplex cerebro & processibus mammarum ritu protuberantibus continendis dicta. Postremo, sinus amplissimi inter duas squammas laminae, ad supercilia loca-

Ossis frontis nomina.

Circumscriptio

Figura.

Substantia.

Circumscriptio

Fouea duplex.

Foramina duo.

Fossa duplex.

Sinus amplissimi.

ti, fibris ossis squamulisque discreti, quibus corpus molliusculum & medullosum membrana viridi obductum continetur. Sunt autem sinus hi Chirurgi aduertendi, ne vnica tantum squamma ea in parte læsa vitamque lædi existimet, atque ita magno ægri incommodo terebrari aut modiolum admoveat. Sinus hos constructos putat quidam ad vocem, vt reddatur canora: alij vt in illis elaboretur aer odorum vehiculum, ad animalis spiritus generationem & expurgationem.

*Sunt sinus hi
Chirurgi ad-
uertendi.
Sinuum usus.*

De ossibus sinuipitis.

CAP. X.



EQUVNTVR ossa sinuipitis duo, à barbaris, Parietalia dicta, à quibusdam verticis, à Græcis τῷ ὀφρύματι, quod cerebrum sub ipsis humidissimum & copiosissimum existat. Sunt hæc Galeno quadrilatera & posteriore parte lambdoide, anteriore coronali, superiore sagittali, inferiore squammosis suturis tanquam finibus terminantur.

*Ossium sinu-
ipitis nomen.
Circumscriptio*

In puerulis anterior eorum pars, primum mēbranea est, dein cartilaginea, tandem in adultis ossa euadit, ideo Aristoteli ὀστεογενεὶς dicitur, quod non nisi nobis nativis ossis naturam induat: cum enim antè cerebrum sit humidissimum, non prius bregma, quò regitur, in os mutari potest, quàm cerebrum hac parte siccus euaserit. Sunt hæc Hippocrati omnium rarissima & debilissima, quia caput hac parte plurima indiget euaporatione, ob plures hac cerebri parte venas & arterias. Non est eorū crassities neque connexio sibi omni ex parte similis; nam qua parte imbricatim & squammarum modo committuntur, solida sunt & sensim attenuantur, ad os frontis tenuiora quàm ad os occipitis, qua vero parte cum osse frontis articulantur, adeo future hiant, vt nullibi sint laxiores, & videatur in iunioribus antè cerebrum palpitare. Solèt hac parte, quam Arabes tendik, aut fontanelam vocant, Chirugi pyrotēca admoveat, quod ego non probo, ob vasa & crassioris membranz villos quamplurēs. Est tota eorum superficies externa lævis, interna vero inæqualis, quia insertiones habet velut canales & sinulos, in quos duræ meningis vasa sanguine plena conduntur.

*In puerulis
anterior eorū
pars mēbrana-
nea est.*

*Cur rarissima
sunt.*

*Connexio dif-
finita.*

Fontanella.

*Pyrotēcarum
usus in ea par-
te suspectus.*

De ossibus temporum.

CAP. XI.



VTER hæc duo sunt, ad suam quodque auriculam, Græcis κροτάφον, κορῶν καὶ κορ' ῥ' ἂν dicta, Latini ossa temporum vocant, quia canitiæ ætatis annos produunt, vnde Homerus à temporum canitiæ, πολυόκροτάφους homines appellat. Sunt hæc Galeno trilatera, recentioribus verò circulatia. Circumscribuntur superiore parte squammosis suturis, posteriore laterum lambdoides additamentis, anteriore ea quæ capiti cum osse sphenoides est communis. Debuerunt autem cum ossibus sinuipitis squammarum modo committi, quia cum sint inferiore parte crassissima, nisi superiore attenuarentur, suo pondere nimis grauarent; sed & duriora temporum ossa cum superioribus raris imbricatim committenda erant, vt horum extrema, quæ lævia sunt, intus conderentur, illorum enim fines durissimi & inæquales duram meningem læsissent. Non est horum ossium habitus (habitum voco cum Galeno raritatem, densitatem, crassitiem, tenuitatem, læuitatem, asperitatem, molliem, duritiem) omni ex parte similis. Superior enim pars squammæ modo attenuata, squammosum os dicitur, inferior verò rupi præruptæ similis, & multis velut

*Cur ossa tem-
porum dicun-
tur.*

Figura.

Circumscriptio

*Cur squam-
marum modo
committantur.*

*Habitus dif-
finitus.
Quid habitus,
Os squam-
mosum.*

Debilissimum
est ut.

Imbecillitatis
causae quatuor.

Processus tres
in ossibus tem-
porum.
Malleolus.
Stapedius.
Tertius Zygoma-
tis.
Præter processum.

Cavitates
duæ.

Foramina
duo.

promontorii exasperata λιθωειδής vocatur, os petrosum & lapidosum, unde ob
eam substantiæ varietatem & processuum multitudinem, totum hoc os quidam
appellarunt πολυειδής. Hippocrates debilissimum esse voluit. τῶν δὲ ἄλλων (in-
quit) τὸ κατὰ τὴν προτάφους ἀσθενέστατον ἔστιν. id est inter ossa cetera, illud quod
ad tempora pertinet est debilissimum. Imbecillitatis autem quatuor causas agnoscit.
Symphysem, quæ fit per musculos temporales, quorum tanta est dignitas, utake-
rati, vel distenti caron & conuulsionem excitent; arthrodiam cum maxilla infe-
riore; meatum auditorium, qui facit ut os minus solidum sit, & vasa illa insignia
per tempora excurrentia, quæ faciunt ut earum partium vulnera sint lethalia. Adeo
ut debilissima sint hæc ossa non tam συσπλάσσει, id est, conspessentia propria, quia du-
rissima & crassissima, quàm ratione τῶν ἐχομένων, id est, adiacentium. In hisce ossi-
bus processus tres insignes, cavitates duæ memorabiles, & foramina quædam
obseruantur. Processuum primus crassiorque quia vaccini verberis papillam refert,
μασσωειδής, id est, mammillaris nomen sortitur. Alter tenuior à columnæ rectitu-
dine στυλοειδής, à calami scriptorij figura, γράφωειδής, ab acus effigie βελωσοειδής,
à calcaris similitudine πηληκτρον dicitur. Tertius portionem constituit Zygoma-
tis. Primus, musculorum caput flectentium insertioni dicatus est. Est autem intus
cauernosus & nonnihil cauus, tum ad læuitatem, tum ad audiendi commodita-
tem. Alter musculorum insertioni inseruit; nam & linguæ, & inferioris maxillæ,
& hyoidis ossis quamplures musculi ab eo processu enascuntur. In nuper natis car-
tilagineus est, non osseus, & apêdícula est. Tertius in Zygomatis historia descri-
betur. Cavitatum altera externa est, in quam maxillæ inferioris caput inseritur, al-
tera interna, quæ ὠρόρον ἀκουστικόν, id est, meatum auditorium constituit. Forami-
na autem duo sunt, alterum carotidi arteriæ ingressum, alterum nervo quintæ cōiu-
gationis exitum præbet.

De ossiculis tribus in temporum cavitate contentis. CAP. XII.



TERNA illa temporū cavitās in media ferè ossis petrosi sede
insculpta, tam eleganti artificio constructa est, ut omnem ad-
mirationis captum excedat. eius historiā suo loco accuratè de-
lineabimus: hîc ea tantum quæ ad osteologiam spectant descri-
bere institui. Cavitās ergo hæc, verum auditus organum, quatuor
quasi cameris & meatibus discernitur. Primus foris obuius sem-

Meatus audi-
torum quatuor
habet come-
ras.

Prima.
Secunda.

Ossicula tria,
stapes, incus,
malleolus.

Ossa à primo
ortu perfecta
est, sicillima.
Articulatu
ossiculorum.

perque patens, tortuosus est, rotundus, angustus, & obliquè sursum fertur. in huius
extremo septum adest non osseum, non carneum, sed membranofum. Secundus
Aristoteli cochlea, Vesalio peluis, Fallopio tympanum, ærem continet vemacu-
lum ambiēti consocialē, quem immobilem vocat Philosophus. In hoc fen-
stellæ duæ & tria ossicula, veteribus incognita, continentur, quæ à forma potius,
quàm ab officio & vſu nomina sortiuntur, primum malleoli, secundum incudis
effigiem refert, tertium stapedi antiquorum est simile, triangulare enim est, fi-
guram Græcæ literæ Δ representans. Ossa hæc à primo ortu solidissima sunt, sic-
cissima, perfectissima, ut melius resonēt, estque eorum in puerulo (quod mirum)
eadem, quæ in senioribus, magnitudo. Hæc porro ita articulantur, ut malleolus suo
processu membranæ appendeat, tuberculum autem suo incudis cavitati inarticletur.
Incus molarem dentem (ut volunt) quidam representans, duobus cruribus inniti-
tur, quorum breviorē meningi affirmatur, longiorē stapedi obligatur. Stapes basi

sua latiuscula fenestræ ouali immersus, summo & acuto apice incudis minimum tuberculum excipit. Tria hæc ossicula meningi implicantur, chordæ cuiusdam tenuissimæ ope, quæ toti membranæ, perinde ut nervus militari tympano, attenditur. Ossicula hæc externi aëris appulsu vibrata, perinde ad distinctionem sonorum conferunt, atque dentes ad vocis explanationem. Errant autem qui ossicula ita moueri putant, ut inuicem percussa strepitum edant. Nam internus ille sonus externum confunderet, & qui in magnis articulationibus vehementes eduntur motus, sine strepitu fiunt. Est ergo horum ossiculorum usus, ut species soni excipiatur, permeet ad interiora, & excrementis aurium pateat via; stapes enim superiorem fenestram claudens, ab incude mouetur, incus à malleo, malleus à membrana aëris externi appulsu percussa, ex eo motu contingit aperiri fenestram, unde & species soni in neruum, à quo in sensum communem tanquam censorem traicitur, & excrementa per canaliculum cartilagineum repurgantur: debuit autem ab osse solido claudi fenestra, quia delatus in mollem substantiam aër delitesceret. Tertia sequitur cavitas, quam labyrinthum vocant, quod multis quasi cuniculis & cōclauibus furtim agatur. Horum amfraetuum hunc usum agnoscimus, ut sonus per angusta transiens loqua, acutior fiat nec dissipetur. Postrema cavitas Fallopio cochlea dicitur, quod testæ cochleæ similis sit, sunt qui foramen cæcum vocitent. Reliqua in auris historia fusiùs explicabuntur.

Primum ossiculorum.

Tertia cavitas.

Quarta cavitas.

De osse occipitis.

CAP. XIII.

SEXTVM capitis os, occipitis, proræ & memoriæ os dicitur, Græci *ἰπὶον* vocat, διὰ τὸ ἰπῶδες καὶ νευρῶδες εἶναι, quod fibrosum sit & nervosum, multi enim ad occiput feruntur tendines, nervorum etiam exortus omnis est ab occipitio, Hippocrati libro de ossium natura. Situm est parte postrema caluariæ, totamque posticam & infernam ferè partem constituit. vnicum est in adultis, iunioribus multiplex: nunc enim partibus quinque, ut quibus sagittalis futura per mediū excurrit, nunc quantior tantum componitur. pars superior maxima est, duæ minores, foramen efformant amplissimum. Quarta ad sphenoidem usque extenditur, additamētum vocant occipitis. Huius ossis figura inæqualis est ad rhomboidem accedens proximè; quinque enim habet latera, aut circulares duas lineas, quæ in acutum terminantur. Circumscribitur omni ferè ex parte triquetra futura; inferiore verò communi illa linea à sphenoidē determinatur. Est hoc Aristoteli omnium debilissimū, Hippocrati verius scribenti omnium validissimum, quia & crassissimum, & carne copiosa tectum. Itaque licet cerebrum posticum sit siccus, tamen propter multas ad occiput carnes, quæ capillo alimentum suggerunt, hac parte nunquam, aut saltem raro caluescimus. Debuit autem esse validissimum, quia quartus sinus omnium nobilissimus in postrema capitis parte est situs, & medulla spinalis cerebri vicaria, omnesque in vniuersum nerui, ab ea parte, tanquam vnico fonte, scaturiūt. Quin etiam occipitis ictus casusque neque manibus propulsari, neque oculis præcaueri possunt, ergo crassities valli instar & propugnaculi opponitur. Non est hæc crassities omni ex parte similis: posterior enim pars carne denudata crassissima est, præsertim qua parte duo crassioris membranæ sinus sanguinem & vitalem spiritum vehentes feruntur; quæ verò carnosa est, solida quidem densaque apparet, sed multo priore tenuior est: auget autem occipitis robur, oblongum & instar lineæ

Occipitis ossis nomina.

Sinus.

Multiplex est pueri.

Figura inæqualis.

Circumscripcio

Omnium est validissimum.

Cur validissimum esse debuit.

Non omni ex parte aequaliter crassus est.

Foramina
huius ossis.

Sinus quatuor
sunt.

Processus duo.

exporrectum tuberculum per medium os excurrans. In hoc osse foramina, sinus & processus obseruantur. Foramen primum adest omnium amplissimum & vnicum, quo medulla è cerebro in spinæ fistulam delabitur. Sunt quatuor alia, quorū duo septimo neruorum pari exitum præbent, alia duo venis & arteriis cervicalibus per foramina transuersarum ceruicis apophyseon ascendētibz viam ad cerebrum patefaciunt. Quod autem neruo sextæ coniugationis & iugulari internæ dicarum est foramen, vtrique ossi, temporum scilicet & occipitis commune est. Sinus quatuor sunt; duo fouearum instar omnium maximi, cerebello continendo dicatī; sunt & laterales duo oblongi & angustī, canalium formam exprimentes, in quos durioris membranæ sinus tanquam riuī & vasorum vicarij conduntur; periculum enim erat ne dum sanguine turgent & inflantur, aut dum vehemētius agitur cerebrum, cranij duritiæ læderentur aut comprimerentur, nisi sinuarum hac parte fuisset os. Sunt postremò in occipite processus multi interni externique, superni, inferni, sed duo illi præcipuè norantur, qui in cavitates primi spondyli inferuntur. Galenus coronas vocat, licet non sint omnino acuti, vt canibus, sed instar glandium depressi. Sic scapulæ processum ancyroidi & curuum cubiti ambicum instar ζ literæ coronas sæpe appellat. Cæterum apophyses hæc in puerulis sunt epiphytes cartilagine obductæ.

De osse sphenoidæ. CAP. XIII.

Nomina ossis
sphenoidæ.



Sinum.
Circumscriptio
Cameræ.

Inæqualitas
ossis.

Processus alati.

Sella equina.

Sinum.

VPER SVNT duo ossa inrer caluam & genam supernam posita, alterum sphenoides dicitur, alterum ethmoides. σφηνοειδὲς ἀπὸ τοῦ σφηνός, nō à cunei figura, sed à modo insertionis, quod inrer omnia ferè & capitis, & genæ supernæ ossa, cunei modo, sese insinuet, ita appellatur. Barbari basilare vocant, quod in basi capitis firum sit, alij πολυμορφον, id est, *multiforme*, Arabes os colatorij, quod huic glâs pituitaria adiaceat, quæ cerebri superuacua carne sua porosa & bibula, spongiæ instar, excipit, eaque in palarum pederetum instillar. Hoc in adultis vnicum est, puerulis & recens natis nunc triplex, nūc quadruplex. Sinum est in basi & lateribus caluariæ. Tam autem latè parent illius fines, vt omnia ferè capitis & genæ supernæ ossa tangant, connectitur primum occipiti, communi illa & transuersa futura, dein longo tractu attingit ossa temporum, & supra hæc, angulum bregmatis: ossa frontis etiam transuersæ & communis futuræ interiectu dirimit; tangit præterea genæ superioris ossa maximam orbitæ parrem cōstituentia, & per processus alatos ossa palati parua attingit. Torum hoc os in habitu & cōsistentia valde est inæquale. In basi enim crassissimum est, in temporum cavitare tenuius, sed & rum interna, rum externa parte, multis processibus quasi promontoriis exasperatur, sinus etiam & foramina habet quâ plurima. Externi processus, quia vesperilionum πτερυγα, id est, *alam* repræsentant, πτερυγώδεις vocantur, in quorum medio cavitare adest, vnde oriuntur musculi in ore delitescētes dicti, genam infernam claudentes. Interni vero ob similitudinem, quâ cum inferiore lecti parte habent, κλινοειδὲς appellantur: alij sellam vocant, à sellæ equinæ forma. Hic sedet glans illa bibula, sub qua duæ latent capacitates, in quibus rete illud Galeni plenum admirationis continetur; ab his canales emergunt gemini, qui in rimas illas definūt, per quas pituita in palarum transcolatur. Foramina autem illa exigua à Galeno descripta, in quibusdam cranij repertiuntur, deficiunt in plerisque. Varia sunt

sunt in hoc osse foramina, per quæ sentientium nervorum & venarum arteriarumque propagines feruntur. Primum optico nervo exitum præbet. Secundum nervis oculum mouentibus & arteriis venulisque exiguis aditum parat. Tertium perexiguum & rotundum, portionem quinti paris in crotaphitem musculum transmittit. Quartum, tertio & quarto nervorum paribus est destinatum.

*Foramina
multa.*

De osse ethmoide. CAP. XV.

TOTUM hoc os synechdochicis nunc *ἡμιοειδές*, id est, *cribri forma*, nunc *σπογγιοειδές*, id est, *spongiosum*, appellatur, non enim totum spongiosum est, nec totum cribrosum. Situm est in media fronsi basi, & ad summam nasi radicem fertur, narium totam ferè cavitatem opplens: partes habet naturæ dissimilis, quæ varia fortuntur nomina. Prima interior est, multis foraminibus, cribri in-

Namina.

Sinu.

Cribrosa pars.

Spongiosa.

Plana.

*Cur hoc os cri-
bri instar est
perforatum.
Primus usus.*

Secundarius.

Crista galli.

*Spongiosa par-
tis vjæ.*

Error Vesalij.

star, peruia, propriè cribrosa dici debet, altera extra caluariae basim in narium cavitatem contenta, rara est & fungosa, spongiosam nominant. Tertia tenuis est, solida, lævis, planam vocat Fallopius. Ergo cribrosa parte capiti, spongiosa narium cavitati, plana verò a clata, oculorum orbitæ cõmittitur ethmoides os. Cribrosa pars foramina habet multa eaq; exigua & obliqua: exigua, ne durum aliquod corpus crassumq; extrinsecus feratur ad cerebrum; obliqua, ne impurus aer & extraneus repente irruens recta cerebri ventriculos subeat. Est & rima quædam semicircularis crassam membranam firmans. Horum foraminum usus alius est primarius, alius secundarius. Primarius duplex, alter ad aeris inspirationem, qui ad animalis spiritus generationem & expurgationem erat necessarius; alter ut odorum species cum aere in cerebrum ferri possint, unde fit ut medullares & mammillares illi processus præcipua odoratus organa in hæc foramina desinant, hæc si obstruantur, ut his qui coris laborant contingere solet, perit odorandi vis. Secundarius usus est expurgatio cerebri; licet enim per infundibulum tanquam Hippocratis manicam, in bibulam illam glandulam transeat pirituita, si tamen aliquando superiores cerebri sinus pirituitosa illiue affluant, stillat per tubercula mammarum papillis simillima in ossa cribriformia & nares. Cribrosa hæc pars acuto quodam processu extuberat, totum os septi instar discriminans, quod à forma cristæ galli vocant, admittit duræ meningis processum cerebrum dirimentem illumque firmat, discernit etiam odoratus organa. Altera ossis pars rara est, laxa, fungosa, spongiæ aut pumicis instar, unde spongiosa dicitur; opplet utrinque narium cavitatem; in ea verissimile est inspiratum cum odoribus aerem alterari, ut in auris cochlea & labyrintho aer præparatur auditorius. Tertia pars tenuis est, sed solida & plana, portiunculam constituit orbitæ. Errat ergo Vesalius qui maxilla superioris partem esse voluit.

Ossium capitis vera descriptio in puerulis & recens natis.

CAP. XVI.

NON est in puerulis & recens natis, ut adultis, caluaria dura solidaque, sed mollis & ferè cartilaginea, tum ad faciliorem partum, tum ut cerebro amplissimo & humidissimo ampla relinquatur capacitas: mollia enim & facile cedunt, & in omnem dimensionem citò extenduntur. Pluribus ossa hæc futuris committuntur; nam sagittalis semper ad narium radicem excurrit,

*Cur puerorū
caluaria mol-
lis.*

*Suturae plures
in pueris.*

sæpe per medium occiput ad spinalis medullæ foramen amplissimum fertur. Tēporum item ossa futuram habent, quæ squammosam partem à lapidosa determinat. Lambdoides vero plures habet partes, nunc quatuor, nūc quinque. Hæc potro futuræ omnes, nec more dentatæ ferræ connectuntur, nec squammarum modo agglutinantur; sed ita hianst quæ earum tam laxa articulatio, vt ad cerebri distolen moueantur. Os frontis semper duplex in pueris apparet. Sincipitis ossa integra quidem sunt & solida inferiore parte, sed superiore, vbi coronalis & sagittalis coeunt, omnium imperfectissima, cavitatem enim efformant velut hiatus, quem crassa membrana regit, Arabes Zeudeh vocant, nostri Fontanelle: membrana hæc omnium postrema densatur, siccescit & ossea euadit, vnde hoc Os Aristoreli ὑσπογενές dicitur. Temporum ossa, manifestè diuiduntur in squammosam & lapidosa partem. Mearus auditorius totus ferè est cartilagineus. Ossicula aurem tria siccissima sunt, durissima & eius ferè quæ in adulto magnitudinis. Occipitis os quatuor habet partes. Prima est maior & superior illius capacitas; duz minores ad latera foraminis illius amplissimi collocantur. Quarta additamentum illud constituit quod sphenoidi committitur. Sphenoides os quatuor discretum partibus apparet, duæ pterigoideos processus effingit, tertia sellâ equinam, quarta eam quæ opticus nervus est destinata. os ethmoides totū est in pueris cartilagineū; eius autem partes cribrosæ, spongiosæ, & planæ lineis discrete cernuntur. Inferior maxilla manifestè in medio mento est duplex. Cæterum, qui sinus à nobis descripti sunt in osse frontis, in antro sphenoides & mammillari processu, in puellis non sunt conspicui: sed hæc omnia ossa à primo ortu crassa gignuntur, non caua, vt materia extendendis & amplificandis ossibus dum cerebrum augetur præstet sit.

CONTROVERSIE ANATOMICÆ.

De figuris capitis, & futurarum varietate, Hippocratis & Galeni defensio.

QUESTIO VIII.

NIL in tota ferè ὁσολογία magis Anatomicorum ingenia torquet, quam diuersitas illa figurarum & futurarum cranij à veteribus proposita. Primus Hippocrates lib. de vulneribus capitis pro varia capitis figura, varium esse futurarum numerum prodidit. τὸν αὐτοῦ πρῶτον (inquit) αὐ κεφαλῇ οὐδὲν ὁμοίως σφίον αὐταῖς, ἰδὲ αὐ πᾶσαι τῆς κεφαλῆς πᾶσαι κατὰ ταῦτα σφύχονται. id est, Hominum capita non omnino inter se similia sunt, nec capitis futuræ in omnibus eedē. Sed quicūque in antica capitis parte proiecturam habet, in hoc futura capitis ita à natura sunt ficta, vtiliter T. pingitur. Qui verò in postica capitis parte proiecturam habet, in hoc futura contrario modo sunt ficta. Qui utrinque & antica & postica parte eminentiam habet, in hoc futura formam referunt literæ H. Qui verò neutra in parte proiecturam habet, is futuras capitis eodem modo habet, quo litera X pingitur. Sic autem natura comparate lineæ sunt, vt altera quidem transuersim ad tempora perueniat, altera per mediij capitis longitudinem excurrat. Quatuor itaque tantum describit Hippocrates capitis figuras, naturalem & tres deprauatas. Galenus libello de ossibus, & nono de vsu partium, eandem videtur sequutus sententiam, nam pro capitis figura futurarum numerum & positum variare scribit. Duas autem agnoscit figuras capitis, naturalem & deprauatam, naturalis κεφαλήν ἑ

Suturae quomodo cernuntur.

Sincipitis ossa quales.

Fontanelle.

Temporis ossa.

Occipitis ossa quatuor habent partes. Os sphenoides quale.

Os ethmoides.

Hippocratis opinio de varietate futurarum.

Quatuor figuræ descriptæ Hippocratis. Galeni opinio.

oblonga, anteriore & posteriore parte protuberans. Deprauatam $\phi\omicron\zeta\eta\nu$ vocat, adeo ut $\tau\delta$ $\phi\omicron\zeta\eta\nu$ omnes præter naturam capitis figuras complectatur. Eas autem tres tantum esse vult, quartam fingi quidem & animo concipi, sed non dari supersistere animali putat. Nam si contingeret longitudinem capitis in latitudinem mutari, & anticos ac posticos processus in utramque aurem ferri, nec superioribus ventriculis sua re. Inquireretur capacitas, nec vllus ferre cerebello & organis odoratus superesset locus, ita angusto coërciti conclauis, spiritus suffocarentur. Vtrum verò $\phi\omicron\zeta\eta\nu$ & acutum omne caput in vitio sit, dubitari potest. Nam Hippocrates sectione prima sexti libri Epid. acutum laudat caput. Acutum, inquit, habentes caput qui validam habent cervicem robusti sunt, tum alias, tum ossibus. Respondet, acuminatum seu $\phi\omicron\zeta\eta\nu$ esse caput, vel per defectum vnius, aut omnium proiecturæ, & illud semper in vitio est, vel per incrementum alterutrius proiecturæ, quale fuit caput Periclis, vel utriusque simul, quales fuerunt $\mu\alpha\chi\rho\alpha\lambda\epsilon\phi\alpha\lambda\omicron\iota$, quorum meminit Hippocrates libro de aëribus, locis & aquis, hoc modo: Si acutum sit caput, in vitio non erit, modo cetera cōsentiant. Hæc itaque esse Hippocratis & Galeni de figuræ capitis sententia. Vesalius de futurarum numero & situ vario, pro figurarum diuersitate non dissentit ab Hippocrate, sed nescio quo ambitionis stimulo & contradicendis in Galenum studio percitus, quam tam illam deprauatæ figuræ speciem, in qua longitudo in latitudinem mutatur, quam dari non putat Galenus, se & Venetiis & Bononiæ vidisse affirmat. Testem profert admirandum Hippocratem, quem figuram eam descripsisse putat. Sunt enim calumniatoris hæc verba. Quarta species non naturalis figuræ ab Hippocrate enumeratur, in qua caput in latera ad utramque aurem insignis, quam in anteriori posteriorique sede prominet: sed, heus bone vir, cur summo dictatori imponis: evolue omnia Hippocratis opera, & ad singula eius scripta diligenter attende, nunquam quartam illam figuram ab eo describi inuenies. Decipit te fortasse quod legeris, quatuor esse figuræ capitis, sed sub illis naturalem complectitur, ut vnica sit naturalis, tres tantum deprauatæ, non quatuor. Recentiores Anatomici, Fallopius, Columbus, Eustachius, ab Hippocrate & Galeno planè dissentiunt, nec figurarum capitis diuersitatem, causam esse varietatis futurarum putant. Itaque Hippocratem ex vulgi potius opinione illa adnotasse, quam ex rei veritate contendunt. Infinitas ait Fallopius, se vidisse caluarias exquiritæ rotundas cum omnibus suis futuris, multas sine alterutra proiecturæ, quibus alterutra non deerat futura, plures sine vlla futura, quibus utraque aderat proiectura. Decussationem autem illam nec vidisse, nec qui ipsam viderit, quemquam nouisse scribit. Non ergo necessaria est cōsequutio hæc, Otciput non prominet, ergo deest futura lambdoides: nam & in ossibus temporum, quæ sunt valde depressa, futura adsunt due. Columbus, sexcenta millia capitata se attrectasse, & in Florætiæ xenodochio, & Romæ in Campo sancto, nec vnum vquam cranium vidisse asserit, cui alterutra illa sutura deesset, aut in quo figura illa non naturalis esset conspicua. Eustachius, Hippocratis & Galeni acerrimus propugnator, hic tamen ab eorum doctrina recedit, & miraculi instar esse putat, si quis caluariam proferat, in qua aut coronalis futura deficiat, aut lambdoides, quia alterutra deficit proiectura. Ego quid sentiam dicam ingenuè. Non puto perpetuè esse veritatè, deficiente altera proiectura, deleri etiam alterutram futuram, sed posse aliquando id contingere, & ab Hippocrate, Galeno, ac veteribus in plerisque craniis id obseruatum fuisse non inficior: Quam enim fuerit in scribendo religiosus Hippocrates, patet ex principio sectionis primæ libri de articulis, in quo nihil nisi quod viderit se confirmare velle scribit. Neque verò anatomicis principiis aduersatur, deficiente proiectura, deleri futuram, nam cum primarius sit ille futurarum usus, ut crassior membrana cranio alligetur, ne comprimantur aut ardeant interiores cerebri sinus, quia in naturali figura longius est quam latius cerebrum, sufficit vnica per medium excurrrens linea due autem transuersæ constructæ sunt, ut cerebri portio media inter suturas æqualis

Quartam speciem deprauatæ figuræ dari non posse putat Galenus.

Ad acutum omne caput in vitio sit.
Responsa.

Quot modis acuminatum caput esse possit.

Vesalius cetera Galenum de quarta figura specie.

Imponit Vesalio Hippocrati.

Recentiores ab Hippocrate & Galeno dissentiunt, de varietate futurarum.

Nos quid sentiamus de futurarum numero pro figurarum varietate.

Quam fuerit Hippocrates in scribendo religiosus.
Cur deficiente proiectura, deleri futura.

esset; at in non natar ali figura, cum non ita sit longum caput, deficiente alceru a proiectura, sufficit unica sutura membranam firmans & alligans valide. si ergo desit anterior eminentia, deest saepe coronalis, si posterior, lambdoides. Quod autem plures & figura & sutura dari possint, quam Hippoc. Galen. & Neoterici descripserint, non inficior. Ludit saepe in ea varietate natura, unde hominem natum De ludibrium vocat Plinius, & Syllius Lambdoidem duplicem vidisse affirmat, etiam trium digitorum intervallo distitam. Ceterum, quae de suturis prodidit Aristoteles, non eundem esse numerum in maribus & feminis, falsa sunt, itemque, suturam rectam in craniis mulierum ad nares usque per mediam frontem produci, & in ea re differre à crantibus virosum.

Non est dis-
versus sutura-
rum numerus
in mare &
femina, contra
Aristotelem.

An cranium figuram det cerebro, aut cerebrum cranio.

QVÆSTIO IX,

Figuram ce-
rebrum à cra-
nio. -
Aristoteles.



DE cranijs figura & situ non est levis controuersia. Figurari cerebrum à cranio contendunt quidam, quia, ut iam annotauimus ex Hippocrate, ossa corpori èidos $\omega\alpha\pi\epsilon\chi\omicron\nu\lambda\alpha\iota$, id est, figuram exhibent. Galenus primo de anatomicis administrationibus, scribit naturam ad ossis imitationem cetera omnia in animanti effingere, ut si caluaria sit rotunda aut oblonga, cerebrum etiam tale sit. Ad damus nos, ossa esse velut bases & fundamenta, quibus reliquæ partes innituntur, at solent artifices prius iacere fundamenta. Sed & domicilium prius creatur, calua autem cerebri est domicilium & propugnaculum; nam & in prima generatione membranae foetum inuoluentes, quibus quasi sepimentis nobilior pars seminis obuallatur, prima omnium efformantur. Contrariam tamen sententiã tinetur Galenus plerisque in locis, & cerebrum cranio figuram dare, non cranium cerebro, apertissimis verbis declarat. Commentario in sectionem tertiam lib. sexti Epidem. Ut cerebrum, ait, productum magnum, ita & caput. Libro de formatione foetus, capiti os post alia omnia conceuisse scribit; ergo post cerebrum perficitur. Lib. 8. de usu part. Quicumque à cranio cerebrum figuram accipere volunt, non videntur scire à dura meninge cerebrum distare, & ab eadem cranium contingi, cui tamen connata non est. Soluit hanc questionem Cappivacius, egregius & medicus & Philosophus, vultque nec cerebrum formari à cranio, nec cranium à cerebro, sed omnium partium figuram produci à vi formatrice. Ego in allem dicere, cerebrum prius gigni, & pro eius figura cranium figurari. Non enim propter cranium constructum est cerebrum, sed propter cerebrum decuit cranium effingi, processus namque mammillares, odoratus organa, sinus illi quatuor, & cerebellam figuram totius cerebri oblongam constituunt, ut ergo prius formatur cor quàm thorax illius propugnaculum, ita prius formatur cerebrum quàm calua eius domicilium, & licet spermaticarum partium prima stamina eodem fere momento rudioribus quasi lineis simul & semel adambrentur, tres tamen ampullae quasi gutta pellucide bullis similes, quas aqua pluuiæ suo in flumen illapsu excitat principij partium, cerebri, cordis, hepatis rudimenta, prime omnium apparent.

Contraria opi-
nio, figuram
cranium à ce-
rebro.

Solutio Cap-
pivacij.

Conclusio
fuit.

An cranium cerebri gratia sit constructum. QVÆSTIO X.

Caput oculorū
gratia constructum
putat.
Galenus.



GALENUS octauo de usu partium, fusa & eleganti oratione caput oculo-
rum gratia constructum putat. Est autem Galenice demonstrationis hæc summa.
Cancris scārabæi, locustæ & vniuersum $\mu\alpha\lambda\alpha\kappa\omicron\varsigma\ \epsilon\gamma\epsilon\lambda\omicron\nu$ genus, caput non
habent, illis tamen in pectore cerebrum & omnia fere sensuum $\alpha\iota\sigma\theta\eta\tau\iota\kappa\alpha$
locantur, oculis exceptis, qui editissimum situm occupant, & supra oblongas cervices sunt col-

locati, ad oculorum ergo & actionem, & tutelam, caput videtur constructum: actioni enim, ut actio est simpliciter, primum natura consulit, deinde securitati. Oculorum actio visio est, hæc quæ noxia sunt, aut profutura eminens conspiciere debet. Hæc sola specierum sit receptione, ut ergo eminens & commodius fieret visio, visionis organa editissimum postulabant locum, ut essent velut exploratores interdum nocturne excubantes: ut autem sensilium imagines celerius reciperentur, molli nervo opus erat, nervi mollities cerebri viciniam postulabat, qui enim à cerebro distant nervi, sunt duriores. Debit ergo in capite cerebrum locari propter oculorum actionem, sed & ad oculorum tutelam capitis structura fuit necessaria. Ut enim tutiores essent oculi, & spirituum minor fieret dissipatio, in antrum quoddam, velut sinuosam vallem, recoditi, & ossibus undique quasi sepimentis obvallati fuere. Vesalius (quod mirum) non dissentit hac in re à Galeno. Columbus solius cerebri gratia cranium constructum putat, non enim tot sinibus excavatum, tot apophyseis protuberans, tot suturis & foraminibus peruium est oculorum gratia, sed ut cerebri domicilium sit ac propugnaculum. Ego cranium in perfectis animalibus solius cerebri gratia primario constructum existimo; à cerebro enim cranium figurari iam demonstratum est, sed sitam editissimam occupasse, primum propter oculos, deinde ad reliquorum sensuum commoditatem, cum Galeno statuo. Potuisset enim & in imo ventre, & in thorace animales spiritus gignere, phantasmata speculari, ratiocinari, memorari cerebrum, quia actiones hæc manant à temperie; ubi ergo illa temperies, ibi & actiones; at eminens videre & multa intueri non poterat, nisi supremum occupasset locum.

Ob actionem oculorum debuit cerebrum in capite locari.
Adeulorum tutelam caput necessarium.
Columbi opinio nostra.

De sphenoidis foraminibus: defenditur Galenus, & ab aliis plerisque calumniis vindicatur. QVÆSTIO XI.



SCRIBIT Galenus nono de usu partium, in apophyseon clinoidæon parte profundiore, exigua esse foramina, per quæ in duos specus maximos his foraminibus subiectos, & inde in palatum stillat tenuis pituita. Vesalius & Columbus foramina hæc pernegant, voluntque totum hoc os ea parte continuum esse, læve, solidum & crassissimum, alias ergo expurgationis vias agnoscunt. Ego in resicatis sæpe exigua illa foramina observavi, in recenti cadavere nunquam, quia viscida pituita infarctum opplentur. Nam cum huic selle equine glans illa pituitaria infudeat, cerebri supernacua excipiens & infarctæ ossis superficie, quæ tenuis est & stylo quovis mox penetrabilis (licet crassissimam velint recitiores) sinus appareat amplissimus ad palatum & nares pertingens; muco interdum & pituita plenus, verisimile est per exigua illa foramina sensibus non admodum conspicua, aut si malis dicere per osis huius internam substantiam, porosam, spongiosamque, sensim transcolari in sinus patentes excrementa cerebri. Satiis erat, inquit Galenus undecimo de usu partium, excrementa transcolari, quàm excidere, aliòquin cogeremur continuo expuere & os apertum tenere. Proferri ad Galenicæ veritatis defensionem, sua experimenta Sylvius, in calumnie secundæ depulsione. Si, inquit, os sphenoides, quæ sunt dicta nuper foramina, cultello, vel pugione, vel terebello perfores, deinde immisso tubulo, tenuem & calentem humorem infundas ac infles, su furro inibi multos transmeantis ex sinibus materia in nares & palatum audies: si item cranium recens supernè, quæ sunt foramina in sphenoidæ, pugni culo pertundas, & aquam per calamus infundas, spectabis eam mox nunc in nares, nunc in palati foramina pro situ vario cranij diffuere. Id cranium penitus si aperis & latius, ut totum sinuum fundum appareat, foramina quæ antè dixi spectabis. Caterum in peculiari ossium capitis historia multa imponunt Galeno recitiores. Columbus Galenum arguit, quòd dixerit ossa occipitis esse trilatera, at nunquam id pronuntiauit Galenus. Vesalius ad finem capitis sexti, aliud os caluaria à Galeno descriptum scribit; putatque esse illud

Vesalius & Columbus Galenum arguunt.
Defenditur Galenus.

Sylvius Galeni partes tue-
tur.

Columbi in
Galenum ca-
lamia melle.
Vesalius im-
pune Galen.

quod canibus inter cerebrum & cerebellum occurrit. septi modo illa discludens, sed tota res scita est & nugatoria; nam libello de ossibus de ea re ne verbum quidem ullum. Sunt hæc Galeni verba ad finem libelli: si quod autem ossiculum alicubi, utpote in corde, naso, larynge, itemque aliquo ex digitis (ut quæ sesamoides vocantur) aliudque eius generis deprehenditur, non est necessarium hoc opere pertractare.

HISTORIA ANATOMICA.

De Zygomate. CAP. XVII.



Zygoma quid.

Ossis figura.

Zygomatici mus.

Musculi temporali digiti.

Z Græcis ζύγωμα aut συζυγῶδες dictum, Latinis iugale aut iugis, non est os peculiare, ut plerique existimarunt, sed duarum tantum apophyseon coitus, quarum altera ab osse temporum, altera à maxillæ superioris osse minorem angulum constituyente enascitur. Has apophyses futura in medio obliqua iungit. Totum hoc os foris gibbum, intus cauum, vtrinque radicibus crassis prodiens, in medio gracilescit. Est autem constructum ad temporalis musculi tutelam. Cum enim musculi crotaphitæ plagæ lethales sint, & eius distensio ac alteratio caron & conuulsionem excitent, lib. de fracturis, sagax & providens natura musculi tendinem Zygomate velut lapidoso aggere vallauit. Ab eo etiam masseteres oriuntur musculi, quorum propria est actio μάσσησις, id est, manducatio. Sed & caluatiâ illic tenuem & oculotum orbitam protuberantem egregiè firmat hoc os.

De maxilla superiore. CAPVT XVIII.



Maxillarum nomina.

Cur maxilla superior immobilis.

Cur inferior maxilla moueri debuit.

Quibus futuris terminetur maxilla superior.

Figura maxilla varia.

Cauernæ & sinus in maxilla superiori.

MAXILLA Græcis γένυς δὲ τῆ γεννάειν, quod ibi primum barba prorumpat, duplex est; superior & inferior. Illam Hippocrates τὴν γένυν, hanc τὴν γνάθον appellare solet. Galenus illam τὴν ἄνω γένυν, Celsus malam; hanc τὴν κατω γένυν vocat. Illa in homine & animalibus omnibus, psittaco ac crocodilo exceptis, immobilis est. Quàm turpe enim foret & indecorum, faciem totam animi imaginem contrahi & corrugari: Fuisset illius motus & naribus odores excipietibus, & oculis maiore circulo inspectus impedimento. Hæc ad secandos, mandendos, molliendosque cibos iussu & sponte nostra moueri debuit; sic in molendinaria mola pars vna manet immobilis, altera mouetur. Illa rotundior est, nec ut in brutis prominet, hæc paulo oblongior cernitur. Illa pluribus constat ossibus per harmoniam articulatis, hæc duobus tantum per synchondrosin iunctis. Genam supernam ab ossibus capitis determinat futuræ tres; duæ communes sæpius descriptæ, & ea quæ in osse est iugali. Peculiaribus autem ossa à se inuicem lineæ quamplures discludunt, à quibus ligamenta prodeunt musculos continentia. Tota maxillæ huius figura varia est; nam superiore parte latior, inferiore angustior est; sed & nunc superiore parte protuberat, & qua nasum efformat, quod soli homini est peculiare: nulli enim animalium præterquam homini eminet nasus, & qua orbitæ marginem proceßumque in speciem orbis globatum (malum vocant) constituit, nunc inferiote extubetat, vbi radices dentium situm obtinent. Sunt etiam in maxilla superiore intus latitantes cauernæ, velut antra &

finus amplissimi, imaginibus cauis ex cera fufis non abfimiles, ad totius genæ læuitatem conftruendi. Sunt & dentium alueoli quafi locelli; nec fuâ defuunt foramina, arteriis, venis & neruis transmittendis dicata. Nam folè, vt fcribit Hippocrates, ex offibus maxillæ, ipfæ in feipfis venas habent, & ob id alimentum amplius in ipfas quàm in alia offa trahitur. Offium genæ fuperioris numerus valdè eft controuerfus. Ego miffis lubricarum opinionum fluctibus, vndecim tantum ftatuo, quinque vtraque parte, & vnicum impar. Primum minorem angulum conftruit, & portionem orbitæ, necnon zygomatis & mali partem. Connectitur offi frontis futura ea, quæ à cauis temporum per mediam orbitam excurrens, ad nâfi medium fertur, fphenoidi, per communem etiam futuram, temporum proceffui zygomatis alteram partem efformanti, obliqua futura. Secundum, omnium minimum, maiorem angulum efformat, vbi foramen eft in nares peruium, cui in fidet caruncula glandulæ inftar, pituitam à cerebro ftillantem exprimēs in nares. Hoc os tenue eft, squammæ modo & pellucidum; quod quia laxius hëret, citiffimè deperditur & in caluaris effofis rarò occurrit. Tertium, omnium maximum, omnes fui lateris dentes etiam inciforios continet, orbitam inferiorem ferè totam conftruit, rotundam etiam eam apophyfin, quam Hippocrates à forma in fpeciem orbis globata *κύκλον περισταίου* appellat, alij *μήλον malum*, tandèmq; palati maximam regionem. Hoc finus habet ampliffimos & foramina tria neruum tertij patris & venulas, arteriolâque transmittentia. Quartum iuxta palati extremum eft fitum, quâ fcilicet narium foramina ad palatum tendunt. Separantur ab offe maximo futura tranfuerfa, à fphenoidè ea lineâ quæ inter extremos dētes & apophyfin prærigoidē fertur, à fe inuicem futura palati media. Quintum eft os nâfi tenue, folidam, duram, quadrangulum. His addit vndecimum Columbis, fuprà medium intimumque palatum, cuius formâ atrii vomer imitatur, narium imam partem fep̄ti more difcludit.

*Alueoli.
Foramina ve-
nis, arteriis,
& neruis di-
cata.
Numerus of-
fium maxilla
fuperioris.
Vndecim offa.
Primum os.*

Secundum.

Tertium.

Quartum.

Quintum.

Vndecimum.

De inferiore maxilla. CAP. XIX.



GENA inferiorem intus cauam & medullosam, ad dentium nutritionem, accretionem & nouam generationem: foris solidam & deriffimam, vt in mandendo effet validior, multò elegantiore forma in homine, quàm in cæteris animalibus adornauit natura. Huius motu qui mufculorum opera perficitur, & primæ coctionis fit præparatio; manduntur enim molliunturque cibi, & fermo animi nuncius melius exprimitur. Hæc Hippocrati & Galeno duobus cõftat offibus, quæ ad medium mentum interiectu cartilaginis vniuntur. Cartilaginem hanc in pũtulis ad annum ferè feptimum facilè deprehendes, fed adultis & prouectioribus in offis naturam degenerat, nec putredine, coctione aut vi vlla feparari potest, vt vnicum videatur effe genæ inferioris os. Tota hæc inferior maxilla anteriore parte inæquâlis eft & multis quafi monticulis exasperatur, ad mufculorum exortum & insertionē: pars verò fuperior & pofterior in duos proceffus vtrinque definit. Prior in acutum vergens *κορώνη* dicitur, in quem temporalis mufculi tendo inferitur, vnde fit vt genæ inferioris luxatio apud Hippocratem plerunque fit lethalis, ob diftentionem & alterationem nobiliffimi mufculi: alter proceffus *κονδυλώδης* appellatur, cuius beneficio fit maxillæ inferioris cum offe temporum articulatio. Iuuat autem eam articulationem, cartilago mollis, quæ

*Gena inferio-
ris elegans for-
ma in homine.*

Cur mouetur.

*Duobus cõ-
ftat offibus.*

Figura.

Proceffus duo.

*Cur gena in-
ferior luxatio
periculofa.*

& ligamenti vicem gerit, & faciliorem reddit motum, efficitque ne assiduo motu confricata ossa vel atterantur, vel rumpantur. Sunt in gena inferiore sinus medullam continentes, cavitates, dentium radices excipientes Græcis *φάτνια, φαίνα, φάτνια, φάτνια* dicuntur, Latinis præsepiola, locelli, loculamenta, alueoli, fossula, mortariola, & foramina duo interius, nervo tertiæ coniugationis ad dentium radices, ramulos spargenti, & venulis arterioliisque aditum præbens, & exterius, nervus in labrum inferius diuaricandis exitum parans, quæ duo si fregeris, continua videbuntur.

De dentibus. CAP. XX.

Dentes cur ita dicti.

Definitio dentium.



N utriusque maxillæ præsepiolis dentes clavorum modo infixi hærent. Hos Græci *ὀδόντες* tanquam *ἔδοντες*, Latini *dētes*, quasi edentes vocant, mandunt enim, extenuant, molliuntque cibos. Dentium autem vniuersalem naturam elegans hæc patefaciet definitio. Dentes ossa sunt omnium durissima, intus aliquantulum caua, nervis,

Explicitio definitionis.

Ossa sunt dentes.

Durissimi sunt dentes.

venulis arterioliisque prædita, per gomphosin articulata, nervis, membranis & carne ceu vinculis alligata, mandendis, præparandisque cibis primò à natura instituta. Quæ singula minutatim excutere placet. Ossæos esse dentes, eorum temperies siccissima & frigidissima, necnon durities, soliditas, lævor, candorque (affectus ceteris ossibus communes) manifestè indicant. Durissimos esse, id inter cætera testatur, quod soli, ignibus, flammisque indomiti cum reliquo corpore non cremantur, & cum sarcophago lapide totum corpus intra quadraginta dies absumatur, soli dentes inuicti manent. Solus dens inter ossa ferri aciem respuit, & Aristoteli

3. de historia animal. *ἀδύνατον γλύφειν τὰ τῶν ὀστέων μόνον*, solus sculpturæ omnino ineptus est: debuerunt autem durissimi esse dentes, ne mutuo rerum duriorum mandandarum aut frangendarum occurso attenuentur, cum nec cartilagine,

Cur durissimi sunt.

Cavitas dentium non eadem adultis & puerulis.

nec adipe attritum prohibente superlinantur, ut reliqua ossa. Cavi sunt non ubique, sed iuxta radices tantum, nec in adultis eadem est quæ puerulis ac iunioribus cavitatis amplitudo. His enim ad septimum vsque annum ampla est cavitas, tenui squamma fauis apum simili circumsepta, albo humore velut melle repleta; illis verò indurato ossis instar resiccatoque humore, oppletur tota ferè cavitas exiguisque remanet sinus, partem illam, quæ extra gingivas erumpit, quia atterendis cibis erat dicata, ideoque solidior efformanda, vix attingens. In eam cavitatem feruntur nervuli à tertia coniugatione, venulæ etiam & arteriolæ miro artificio implicatæ in dentium partem internam diuaricantur, unde fit ut perforato dente effluat aliquando sanguis, & in affectu phlegmonode pullatorius dolor persentitur.

Nervi, vena & arteria dentium.

Sentiantur dentes.

Dentes qualitates primarias cur magis sentiant, quam secundarias.

Sentiantur ergo dentes & animalis spiritus radiis melius illustrantur quam cætera ossa, quia & molles nervos in suas cavitates admittit, & membranam tenuissimam. Interna autem pars exquisitiùs sentit ob nervi & membranæ viciniam, externa minus tum ob sensorij distantiam, tum quia ab ambiente aëre alteratur. Sentiantur porrò dentes qualitates primarias exactius, quam secundarias. Nam frigidi impulsu statim læduntur, ab asperis verò & duris non afficiuntur: secantur enim & limantur sine sensu, quia duri & molles qualitas membranæ & nervo interiori non facile comunicatur, quæ verò calefaciunt & refrigerant spiritum animale tenuissimum per dentis substantiam diffusum alterantes, membranam, nervumque afficiunt. Sentire autem oportuit, melioris usus gratia, quia externis iniuriis sunt expositi, nec periosteo, ut cætera ossa, vestiuntur, sapores etiam simul cum lingua

Cur dentes sentire oportuit.

lingua discernunt, ut reliquæ oris partes, eorum itaque quæ nocitura sunt, aut profutura, appulsum percipere debent. Sunt & dentibus sua vasa, venæ scilicet & arteriæ satis conspicuæ, unde fit ut soli ad extremum senium crescant, & euulsi sæpe renascantur, affluir namque (ut mirus scripsit Hippocrates) vberius & copiosius alimentum. Prodidit Mutianus, visum à se Samothracenū ciuem, cui renati essent dentes post centum & quatuor annos; & Aristoteles mulieribus quibusdam maxillares dentes post 80. annum denuo erupisse scribit. Accedit finalis causæ necessitas. Debuerunt perpetuò accrescere dentes, quia mutuo attritu dum cibos mandunt, attenuantur, & sanè si auellatur, aut decidat dens, qui illi ex regione responderet, alios sui ordinis semper excederet. Articulantur dentes per gomphosin, & in genarum ῥότριά καὶ φαύλια, id est, præsepiola, quasi clavi lignis infixi ita inseruntur, ut ne moueri quidem possint, laxari tamen aliquando contingit, eorum compage laxiore reddita, dum alimenti penuria tenuiores euadunt: συμφύονται verò, id est coniunguntur, neruorum, membranarum & carnis interiectu. Nerus in cavitatem insertus dentes firmat, membranatum villi dentium radicibus hærentes illos colligant, caro aurem gingivarum vndique eos circumdat, quæ excisa, aut concidunt, aut vacillant dentes. Eam carnem ὀδῶν vocant Græci; vel (ut putat Melerius) ὀδὸ τῶ ἐλάϊ, quod est inuoluere, vel quod cicatricem habere vulneris, quod ex ortu dentium factum & sanatum est, quæ Græcè οὐλὴ dicitur. Est mirabilis dentium vtriusque maxillæ symmetria, singuli enim quasi lyre clauiculi, extra gingiuas nudi prominent, & inferni supernis, dextri sinistris magnitudine, figura & numero sunt æquales, vincula vinctulis, præsepiola præsepiolis, vasa vasis omnino similia; ita autem connectuntur, ut proximi sint & sese tangerent, ne quod ab eis frangitur manditurque in medijs spatijs detineatur & putrescat. Dentium generatio non est omnibus cognita, tunc enim tantum nasci cum erumpunt, existimat vulgus; nos cum cæteris ossibus simul quidem delineati, sed in maxillis aliquandiu latitare, nec omnes simul erumpere volumus. Nam alij celerius locellos egrediuntur, & gingiuas perforant, ut anteriores, tum quia magis acuti, tum quia os ea parte tenuius; tum quia maior eorum ad suctionem & vocis articulationem est necessitas; adde quod ex Aristotele, minora & si simul inchoentur, celerius tamen maioribus perficiuntur, minores autem primores sunt quam maxillares. Visi sunt quidam nasci cum dentibus, sicut M. Curium, qui ob id Denratus cognominatus est, & Cn. Papyrium Carbonem, præclaros viros. Dentium apud Hippocratem triplex est generatio. Prima à victu in utero; secunda à lacte; tertia à solidioribus alimentis. Ut ergo triplex hoc alimenti genus differt crassitie, ita non est eadem dentium soliditas, durities, crassitiesque. Qui enim ex foetus in utero & editi puelli lactantis alimento gignuntur dentes, molliores sunt & faciliè decidunt; qui ex solidioribus, duriores & firmiores: tales autem septimo anno & decimo quarto erumpere solent; decidunt potè dentes quarto, quinto & sexto anno, quia maxillarum alueli continuò crescunt, dentes autem molles & lactei ob durioris idèoque inepri alimenti appulsum tabe quasi conficiuntur, ideo vacillant & cadunt; qui verò post primum septennarium erumpunt, à solidiore alimento geniti & nutriti, non cadunt. Cæterum, si quales sunt in prima generatione dentes, obseruare volueris, aperiatu ab ortu foetus, aut recens nati maxilla vtraque, occurrent tibi incisores, canini & molares, quasi in caueis latitantes, partim nudi, partim ossei: pars quæ extra gingiuam erumpere debet, ossea est, caua & candida, squamma instar faui mellis obducitur. Quæ verò latitare debet, mucosa est, ut in pennarum generatio-

Vena & arteria d'rimin.

Cur cantinò crescunt & renascuntur dentes.
Finalis causa.

Articularis dentium per gomphosin.

Symphysis dentium per neruos, membranas, & carnes.

Cur cornem gingiuarum illi vocent.

Mirabilis dentium symmetria & connexio.

Cur dentes sese tangerent.
Qui tempore dentes generantur.

Cur anteriores dentes primò erumpunt.

Qui nati cum dentibus.

Dentium triplex generatio apud Hippocratem.

Cur primò anni decidunt dentes.

Quales sint dentes in prima generatione.

ne apparet. Est tamen vtraque pars sibi continua, nec qui nudus apparet, dens alterius epiphysis dici debet, ut somniant Neoterici quidam, etiam si linea quadam discretus appareat. Lineam enim illam ab externis genæ & gingivarum oris efformari deprehendes, eaque detecta nullum diuisionis vestigium inuenies. Dentium varij sunt vsus. Primarius, ut cibos diuidant, mandant, præparantque ventriculo. Fit enim primæ coctionis præparatio in ore, & qui cibos bellè mandunt, hi melius coquunt. Secundus, ad vocis articulationem: vocis quippe sermonisque regimen primores tenent, concentu quodam excipientes ictum linguæ, & edentuli literas R. & S. profetre nequeunt. Tertius, ad ornatum, turpè enim est edentulum conspici, qualem Phetecratem poetam fuisse produnt. Homerus ad compescendam garrulitatem datos esse homini putat. Sunt enim velut muti linguæ oppositi. Addamus ex Aristotele, dentes ad pugnam constructos iis omnibus, quibus aut serrati aut exetti sunt, *χαυλιόδοντα & καρχαρόδοντα* vocant.

Numerus dentium, & singulorum peculiari historia. CAP. XXI.



DENTIVM numerus non omnibus vnus & similis est, eorum tamen numerus maior, minori semper anteponendus, οἱ μακρόβιοι (inquit summus Hippocrates sect. 6. lib. 2. Epid.) *πλείους ὀδόντας ἔχουσιν*, id est; *longani plurimos dentes habent*; οἱ δ' ἐλάττους καὶ ἀραιόδοντες (ait Aristoteles) *βραχυώτεροι*, id est, *quibus pauciores & rariores, hi breuioris sunt vite*. Raritas enim & paucitas dentium,

& ut signum, & ut causa damnati debet, ut signum, quia aut spermatice matris inopiam, aut formatricis facultatis imbecillitatem arguit, ut causa, quia qui paucos habent dentes, cibos bellè non mandunt nec præparant ventriculo, unde impetfectior Chylosis, ex qua sperabilis non est laudabilis hæmarosis. Sunt autem ut plurimum dentes numero triginta, aut triginta duo: quibusdam plures, aliis pauciores fuisse legimus. Euripheum Cyrenæum, Euryptolemum Cyprium, nec non Pyrrhum Epirotarum Regem vnicum tantum dentem in superiore maxilla habuisse ferunt. Prusias Bythiniorum Regis filius *μονόδους* apud Festum dicitur. Direptinam Mirhridatis filiam utinque gemino dentium septo deformatam fuisse; Timarchum Nicoclis filium Paphij duplicem dentium ordinem habuisse, Herculem verò triplicem narrant. Columbus peritissimus anatomicus triplicem dentium ordinem in filio suo Phæbo conspicuum fuisse scribit, sed rara sunt hæc. Nos eorum quæ *ὡς θητὸ πολὺ*, id est, *ut plurimum* contingere solent, historiam describimus. Sunt ergo triginta duo dētes, sexdecim in vtraque maxilla, non serrati & pectinatim coeuntes, ut piscibus & serpentibus, non exetti, ut apto, hippopotamo & elephāte, sed cōtinui & æquales vtraque oris parte sunt. Ex his alij sunt incisores, alij canini, alij molares. Incisores aut incisori; *πρόσθιοι* dicuntur, id est, *primi*, non ortu, sed occurſu & situ; anteriores etiam ea ratione vocantur & primotes à Celſo; *τομῆς* quoque *καὶ τεμνικοί* à secandi munete, *διχαστῆρες* à diuidendo; morſu enim cibos diuidunt; *κτενές*, à forma pectinis, aut à *κτενέων*; *γελέσσιοι*, quod inter tidendum primi nudetur; *ὀξῆς* ab acutis appellantur, nam gladiatorum in modum acie sunt prætenui. Sunt quaterni in vtraque maxilla. Eorum superficies extetna intus caua est, foris aliquantulum gibba; interior pars in acutum vergit. Canini Græcis *κυνόδοντες* dicti, non ram figura, quam vñ &

vsus dentium Primus.

Secundus.

Tertius.

Quartus.

Quintus.

Dentium maior numerus cui semper minori anteponendus.

Numerus dentium. Qui vnicum dentem habuerunt.

Qui plures dentium ordines habuerunt.

Incisorum dentium nomenclatura.

Canini dentium.

duritiæ prioribus ſunt craſſiores, obtuſiores; duo tantum ſunt, quia homo animal eſt manſuetum & politicum. Horum uſus eſt, ut ſi quid propter duritiem ab inciſoriis ſcindi non poſſit, id ipſi confringant; oculares vulgus appellat, quod in eos nerui oculos mouentis portiuncula feratur eorũque extractio periculofa cenſetur. Poſtremi ſunt molares decem *μύλαι, μύλῃται & μύλοι* vocantur, quod iis velut molis conteratur cibus, propterea aſpera & inæqualis eſt eorum ſuperficies, *γομφῖοι* quoque, ab inſertione clauium ſimili & *πλατῆς*, id eſt lati dicuntur, cũmque muſſitantes pueri enitentibus iis ſari ſoleant, *φρεσῖνες* appellati ſunt. Molarium autem poſteriores duo ab Hippocrate libello *περὶ ἀρχῶν, σωφρονιſτῆρες*, id eſt, *dentes ſapientie* vocantur, quod trigefimo ætatis anno & quarto ſeptenario erumpant; quo tempore *σωφρονεῖν*, id eſt, *ſapere* incipimus. Auicenna, dentes ſenſus & intellectus nominat, Ariſtoteles verò *κεντήρες* ὅππότε *κρεῖνιν καὶ ὅππότε πληρὺν τὴν ἡλικίαν*, quod *atatem perficiant compleantque*, Latini genuinos dicunt. Homini plures natura dedit molares quàm inciſorios, ferocibus pauciores, quia illi ad mandendum primariò ſunt conſtituti, hi ad pugnam etiam. Hic dentium omnium numerus eſt. Singuli dentes radices ſuas habent. Primores & canini vnica radice niſitur, maxillares binis aut ternis. Eſt tamen hoc in molarium radicibus perpetuum, quod dentium generis inferioris radices & pauciores ſunt, & minores, quia generis ſuperioris rarior eſt molliorque ſubſtantia, itaque non hærent ita firmiter dentes. Adde quod inferiores dentes in radices grauitate ſua incumbunt, ſuperiores autem pendulæ ſunt, pluribus ergo egèr vinculis. Cæterum vniuerſa dentium ſeries, *φρεσγμῶς* dicitur, id eſt, *ſepium*, quod linguam ſepiat. Pars gingiuis proxima *μαμῖλος*, ſedes qua concaui ſunt intus *ὀμῖλος*, ſummitates latæ, quibus cibum mandimus, *τρεπῖς*, id eſt, *menſe*, dentium vero interſtitia, *ἀρμοὶ* vocantur.

Can. zovum
vſus.

Molares.

Dentes ſepi-
tia.Radices den-
tium.Cur radices
dentium gena
ſuperioris plu-
res ſint.

Epilogus cavitatum ſinum & foraminum totius capitis. CAP. XXII.



N capite cavitatum differentias tres cum Syluio ſtatuiſmus, foſſam, foramen, & ſinum. Foſſa eſt velut vallis quedam oſſibus ſeu collibus vndique concluda. Foramen ductus eſt vtraque parte pertuſus, ſinus verò ab ore anguſto in amplitudinẽ creſcit. Foſſæ aliæ ſunt internæ, aliæ externæ. Internæ ſex ſunt cerebro continendo dicatæ: duæ in oſſe frontis inferno ad nares & oculos om-

Foſſa quid-

Foſſæ interna
ſex.Externæ qua-
tuordecim.Foramina in-
terna 25.

nium minimæ; duę in occipite omnium maximæ; duæ ſitu & magnitudine mediæ. Externæ quatuordecim ſunt, duæ ſub auribus maxillæ inferioris caput excipientes, duæ in apophyſi prerigoide; duæ ad ſextæ coniugationis foramen præruptum, duę ſupra, totidẽque infra palatum, duæ ſub zygomate in temporum cavitare, duæ poſtremò in oculorum orbita. Foramina alia interna ſunt, alia externa. Interna in interiorẽ caluæ baſi conſpicua numero ſunt 25, vtrinq; duo-
decim. Primum in oſſe cribroſo cernitur, quod licet multiplex ſit, pro vnico tamen hic numeratur. Hoc inſpiratur aër odorque ad cerebrum, & mucoſa cerebri illuuius expurgatur. Secundum in ſella Sphenoides apparet, quo in palatum traſcolatur pituita. Tertium optico neruo exitum præbet. Quartum neruis oculum mouentibus & arteriis venuliſque exiguis aditum parat. Quintum per exiguum & rotundum priori ſubditum, portionẽ quinti paris in crotaphitam muſculum tranſmittit. Sextum oblongum tertio & quarto neruorum paribus eſt de-

stinatum. Septimum sexto contiguum, venam iugularem immittit. Octauum velut præruptum, carotidē insignem in cerebrum ascendentem excipit. Nonum foramen anfractuosum est & in aurem peruium nervo auditorio dicatum. Decimum satis amplum, sextam neruorum coniugationem emittit, & iugularis ac carotidis portione immittit. Vndecimum septimo neruorū pari trajiciendo est destinatum. Duodecimum exile admodum & propè apophysin occipitis situm, cervicalis venæ & arteriæ reliquias immittit. Postremum & omnium maximum spinali medullæ exitum præbet. Foramina externa hæc sunt, in oculorum supercilio primum, secundum sub oculo, tertium in magno cantho, quartum in palati initio, quintum in fine palati, sextum in hiatus latere, septimum inter apophysin mastoiden & stiloïden, octauum ponè mastoiden. Adest postremò scissura longa sub zygomate neruos & vasa in temporales musculos transmittens. Sinus autem octo sunt tantum, duo in osse frontis ad supercilia, olfactui inferuire volunt quidam, duo in osse sphenoidē, piruitæ excipiendæ dicati, duo in apophysi mastoide, auditui inferuientes, duo postremò in superiore maxilla medullam ad dentium nutritionem, accretionem & generationem continentes.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

Defensu dentium. QVÆSTIO XII.



SENTIRE dentes & dolore affici, nemo, ut opinor, dubitavit; idemque quotidie experiuntur, qui cauos dentes asperius tractant, aut calidi frigidiq; contactu irritant. Meminit Hippocrates quinto epidem. doloris dentium in historia vxoris Aspasij, & filij Metrodori. Sed an dolor partem tantum dentis, an totum dentem obsideat, controuersia non caret. Sunt qui membranam tantum, quæ internam & cauam nervi partem inuestit, dolere putent, alij neruum tantum, alij corpus etiam ipsum durissimum, crassissimūque, sed non totum; externum enim aëri expositum & denudatum limari, frangi, vri, sine sensu existimant, internum non ita. Ego sentire totum corpus dentis puto, exquisitiū quidem interna partē, & quo propius ad nervos membranāsque accedit, minus externa, quia ab aëre alteratur. Id confirmo Galeni auctoritate; quinto enim de compositione medicament. secundum locos: Percepi (ait) non dolentem modò, sed etiam pulsantem dentem, ut in carnosissimis partibus phlegmone obsessis contingere solet, quare utriusque doloris sensum expertus, alium quidem in gingiuis, alium in ipsius dentis substantia esse non dubito. Est apud Medicos dentium peculiaris affectus, quem ai-mo-dia-vocant, id est, stuporem & congelationem. Huius meminit Galenus primo de symptomatū causis. Hamodia (inquit) est nomen, tum symptoma unius est tangēdi facultatis. Caterum hoc tam in ore, quàm in dentibus post acidis & acerbis cibis insidere maxime consuevit, & secundo de locis affectis: Hamodia ori duntaxat, neque ei toti, sed solis dentibus & gingiuis accidit. Sentit ergo proprium corpus dentis, non membrana tantum & nervus; ita enim de ceteris partibus dicendum esset. Sentit quidem per neruum musculus, sed musculus etiam corpus totum sentit, satis est ut ad dentem feratur nervus, qui spiritum animale in totum illius corpus, & cum eo sentiēdi facultatem diffundat. Caterum cum doloris due sint cause, intemperies & solutio continui, solutionem vix sentiunt dentes, secantur enim, franguntur, limantur sine dolore, ab intemperie sola afficiuntur, eaque frigida potius quàm calida. Vruntur sine sensu, glaciem verò nequeunt perferre. Huius rei causæ sunt obscurissimæ. Sunt qui dicant, sectos dentes non dolere, quia ob densitatem fieri asperiores nequeunt.

Foramina externa.

Sinus octo.

An totum corpus dentis sentiat an pars.

Sentire totum dentem.
Aimodia-tes.

Cur ab intemperie potius dolent dentes, quàm à solutione continui.
Paria opiniones.

Alij volunt candens ferrum unà cum temperie sensum auferre, ut in eschara. Aristoteles putat à frigido affici dentes, quòd dentium meatus caloris sint exigui, qui à frigore faciliè superantur. Existimant quidam ratione nervi frigidi impulsu magis offendi, quia frigidum nervis inimicissimum. Affertur solet & hæc ratio perelegans, ut caro ob mollietatem, quia magis sectioni patet, difficilius solutionem quàm intemperiem tolerat; ita ossa ob duritiem quia minus solutioni patent, ab intemperie faciliùs & magis leduntur; sic ferocia & robusta animalia sagacia non creavit natura, timida verò vel astu, vel pernecitate armavit. Ego à primariis qualitatibus dentes magis affici quàm à secundariis, quæ secant exasperantque, existimo, quia duri & mollis qualitas membrana & nervo interiori ob dentis duritiem ac densitatem non faciliè communicatur; quæ verò calefaciunt & refrigerant, spiritum animale tenuissimum per dentis substantiam diffusum alterantes, membranam nervumque afficiunt. Aretæus lib. secund. de signis & causis diuturnorum morborum, questionem hæc soluit eleganter. Non dolent (inquit) dentes vel minimum etiam si quis secet, aut collidat; at si quis ab ipsis doleat, nihil est eis ad dolorem citandum potentius. Causam quidem veram solus Deus novit, probabilè verò & verissimilem etiam homines. Est autem ut simpliciter dicā eiusmodi. Quod prædensum est contactum vulnerationemque non sentit, idcirco & ex tactu vulnerationemque non dolet; dolor enim est res aspera sensui, densum autem non est exasperabile, ideo quoque est indolens; at rarum bono sensu præditum est, & vulnere exasperatur. Caterum quoniam & densa ingenito calore vivunt, per hunc eundem calorem etiam sentire possunt.

Fera ratio.

Aretæi solutio.

De materia dentium, & cur continuò crescant. QVÆSTIO XIII.

EX seminis corpulentia, tanquam principio materiali, spermaticas omnes partes generari, quæ est septima libri primi, validis rationum momentis confecimus, ossa autem ex crassiore & pinguiore eius parte effingi, initio huius libri demonstravimus. Dentes spermaticas partes esse, easque osseas luce meridiana est clarius, prima igitur eorum flamina & rudimenta ex semine delineari cum cæteris partibus existimandum. Videtur tamen contrarium sentire Hippocrates. Nam libro de carnibus, diversam dentium & ossium materiam agnoscit, quia dentes ex alimento maxillarum gigni putat, quod ut triplex est, ita triplicem dentium profert generationem. Dentes (inquit) ideo posterius generantur, quia ex ofsibus maxillarum incrementum fit glutinosi, & quod ex pingui inest, à calido siccatur exuritque, & fiunt dentes reliquis ofsibus duriores, quia nihil frigidi inest. Ex primi quidem dentes nascuntur à victu in utero, & postquam natus fuerit puero lactenti à lacte; ubi verò hi exciderint, à cibis & potibus. Omnis ergo dentium generatio Hippocrati ab alimento est, quod copiosissimum supeditant amba maxilla, nam & caua sunt, & medullose, & venas habent peculiare per earum substantiam excurrentes, quod in cæteris ofsibus non apparet. Sole (inquit Hippocrates) ex ofsibus maxilla ipse in seipsis venas habent, & ob id alimentum uberius in ipsas quàm in alia ossa trahitur, ob idque augmentum ipsæ à seipsis tale reddunt, quales ipsæ existunt. Damnatur à quibusdam hæc Hippocratis opinio. Nam cur maxillæ, aiunt, potius vis illa formatrix insita est, quàm cæteris ofsibus? An non reperiuntur ossa quamplurima caua & medullosa, quibus vis illa procreatrix non conceditur? sunt lumborum & vertebra multis foraminibus peruis, quæ venas lumbares dictas admittunt. Sed & per cranij diploen venulæ percrepant quamplurima. Ego de generatione dentium ita sentio. Primariam dentis partem in utero generari ex crassa & paulo pinguiore seminis portione, quæ ideo celerius à calore siccatur, pusilla autem seminis illa portio mucum referens, & in maxillis latitans, ab earum alimento fouetur, augetur, nutritur. Alimentum illud in utraque gena copiosius est,

Dentes ex semine fieri.

Hippocratis opinio de generatione dentium.

Quid sentiant de generatione dentium.

quàm in ceteris ossibus, quia & vasa sunt magis conspicua, & sinus adsunt medullofi. In femoris canitate, medulla quidem apparet, sed vena conspicua non sunt: in lumborum vertebrae vene conspicuae sunt, sed nulla in osse est canitas, nisi interna sacra medullam continens, ad cuius nutritionem exigua illa foramina constructa videntur. Maxilla ergo ad novam dentium generationem sunt aptiores, quàm cetera ossa, tum quia illis, ut & ceteris ossibus, vis inest ossifica, tum quia uberius affluit alimentum: sic puerulorum ossa omnia concreto caseo aut butyro similia, coalescere, & denuò generari voluit Galenus, ob materiae dispositionem. Primi ergo dentes à semine fiunt, & à fetus alimento in utero nutriuntur, augenturque, at nutritio, accretioque saepe apud Medicos generationis species sunt, ideo ab eo alimento dentes generari voluit Hippocrates. Altera dentium generatio fit à lacte, quod secundum est alimentum. Tertia à solidioribus alimentis. Sunt qui existiment dentium radicem à semine generari, partem autem quae erumpit, quam additamentum esse credunt, ab alimento generari. Itaque radicem semel avulsam nunquam generari, epiphyse autem solam cadere & regenerari. Sed segmenta sunt hac & mera nugae. Totus enim dens sibi est continuus, & licet appareat linea quadam ea externa tantum est & superficialia, à genarum & cavitationum lateribus insculpta; ceterum observatione dignum est, omnia fere ossa à primo ortu esse cartilaginea, exceptis dentibus qui immediatè ex mucore resiccato, indurataeque ossi evadunt. Cur autem cum cetera omnes partes statos habeant & definitos accretionis terminos, soli dentes ad extremum senium crescant, & evulsi renascantur, causam duplicem agnoscimus, finalem & materialem. Debuerunt accrescere dentes, quia mutuo attritu dum cibos mandunt, attenuantur. Materia verò accretioni & novae generationi sufficiens, semper praesto est, eam autem utraq; maxilla medullosa, & venulis conspersa suppeditat. Prorsusquam verò hinc revellamur, problema hoc dissolvendum: Cur dentes erosi non curantur, si sibi non uniuntur, fracti callo non obducuntur, ut cetera ossa, crescunt tamen & renascantur. An quia nudi sunt dentes, & aëri expositi; itaque ab ambientis frigore impeditur calli generatio; an quia nullus à dentium calore, exiguo humor exprimi potest ob duritiem & soliditatem? an quia callus non tam ab ossis quàm vicinarum partium excremento generatur? at nudi sunt dentes, nihil ergo vicinae partes suppeditant.

Andentes sint ossa. QUESTIO XIII.



DENTES in numerum ossium adscribendos esse, praeter summi Hippocratis & Galeni auctoritatem, eorum temperies siccissima & frigidissima soliditas, durities, leuor, candorq; manifestè persuadent. Sunt tamen Sophistae quidam, qui ex ossium numero expungere illos contèdunt, his (ut audio) probabilibus & veritatis tantum fucò adumbratis rationibus fulti. Ossia (aiunt) insensilia sunt; dentes sentiunt, non sunt igitur ossa; sed ineptissima ratio; sensus enim non est de natura ossis, ut nec motus, sed quid aduentitium. Hoc solum ad ossis essetiam requiritur, ut sit pars frigidissima, siccissima, durissima; quae omnia cum dentibus conveniant, ossa esse existimamus. Secunda ratio est eiusmodi. Ossia statos habent & certos accretionis terminos, neque unquam κατὰ τὸ πᾶν οὐκ ὄν. renascuntur; dentes verò crescunt ad extremum senium & evulsi renascuntur. Sed huic rationi iam satisfactum puto. Debuerunt perpetuò accrescere dentes, quia mutuo attritu comminuuntur. Tertiò ita argumentantur. Dentes reliquis ossibus sunt duriores, ergo non sunt ossa. Ridicula sanè & puerilis cōclusio; magis enim & minus apud Philosophos non immutant speciem. Ossia Ethmoidea reliquis molliora sunt, ossa tamen esse nemo inficiabitur. Duriores sanè sunt dentes, & tales esse debuerunt, quia durissimos cibos atterunt franguntque. Obijciunt praeterea, ossa omnia

Maxilla ad
novam, dentium
generationem
sunt aptiores,
quàm cetera
ossa.

Totus dens sibi
est continuus.

Dentes statim
evadunt ossi.

Cur dentes
crescunt &
renascuntur.

Cur fracti de-
ntes callo non
obducuntur.
Solutio.

Dentes ossa
non esse.

Ratio prima.
Responsio.

Secunda.

Solutio.
Tertia.

Solutio.

Quarta.

aëri exposita μελασμὸν contrahere, dentes verò tale quidpiam non pati. Sed non videntur dentes externo aëri assuetos & denudatos non affici, à consuetis quippè (ait Philosophus) non fit passio. Et, ut docet Hippocrates 2. Aphorismorum, quæ consuetæ sunt insuetis minùs molestæ esse solent. Sic plena pocula ventriculum oblectant, liquoris guttula pulmonem infestat, minime aëre torquetur ventriculus, copiosissimum autem hauriunt eoque recreantur assueti pulmones. Virgere magis videtur summi Hippocratis autoritas. Nunquam (aiunt) fuit Hippocrates ταυτολογος, nec, ut annotauit Galenus, lac album, mel dulce, oleum pingue unquam pronuntiauit. At dentes ab ossibus secludit Aphorif. 18. sect. 5. τὸ ψυχρὸν πολεμιὸν ὅς ἐοισιν ὁ δούσι νεύρις, &c. id est, frigidum inimicū ossibus, dentibus & nervis, &c. Aut ergo dentes ossa non sunt, aut in eo aphorismo erit ταυτολογία. Respondemus Hippocratem eo aphorismo varias frigidi affectiones indicasse, diuerso enim modo ossa & dentes à frigido alterantur. Ossa vim frigidi experiuntur patiēdo tantum, dentes & patiēdo & sentiēdo simul; id est, ossa, sicut lapides ac metalla frigidi appulsu alterantur, sed illius alterationis nulla fit sensio; dentes verò frigoris vim statim sentiunt. Postremò proferunt nobis experientiam lapidis cuiusdam sarcophagi, quo totum corpus intra quadraginta dies absumentur, exceptis dentibus. Nos aut experientiam negamus omnino, aut id ideo contingere existimamus; quia dentes reliquis ossibus sunt duriores. Stet ergo Hippocratis, Aristotelis & Galeni inuicta opinio, dentes ossa esse, sed sui generis.

HISTORIA ANATOMICA.

Secunda σελετὴ pars, quæ truncum complectitur: ac primum de spina.

CAP. XXIII.



RESICCATI cadauetis truncus τριμερὴς est, id est, tripartitò à nobis diuiditur, in spinam, thoracem & os innominatum. Spina nōmine totum id cōplectimur quod à prima ceruicis vertebra ad coccygē vsque extenditur. Hæc Græcis ῥάχις πνευματοχαιῶς dicitur, quod posterior eius pars sit ἀκανθοειδής, id est, acuta & spinosa, γαστρος etiam appellatur, & eius medulla νωτιαῖος, à maiore eius parte quæ dorsum constituit. Spina hæc medullæ domiciliū & propugnaculum est, ut caluaria cerebri. Cum enim eadem ferè sit medullæ quæ cerebri dignitas (neruorum quippè omnium, si paria 7. exceperis, origo est, vnde cerebri σφαγὴς & vicaria dicitur) non minus de illius conseruatione sollicita fuit natura quàm de cerebro ipso. Vt ergo cerebrū caluariæ ossibus tanquam galea est circumseptum, ita spinalis medulla vertebri vndique quasi sepimentis obuallatur. Id autem ut commodius præstaret natura, spinam totam primum excavauit, dein processibus multis tum acutis, tum transuersis quasi monticulis exasperauit; ac cavitatem quidem amplissimam medullæ continendæ gratia construxit, qua ratione spina tota σφύγγη ἱερὴ, id est, sacra fistula à quibusdā, ab Herophilo σωλήν id est canalis dicitur; processus verò hinc inde extubetantes eam ab irruentibus extrinsecus iniuriis tutantur. Ossea ergo spina est, non vnico tamen osse, sed pluribus coagmentata compactaque, tum ad motuum varietatem, quia moueri debet animal antrosum retrosumque, tum ad δύσπνοειαν, vnius enim vertebæ luxatio Hippocrati periculiosior ceteris quàm plurium, quia in acutum penè angulum medullam cogit, vnde eam vel frangi, vel comprimi necesse est. Ossa hæc spinam constituentia σπόνδυλοι vocantur, à similitudine quā habent

Solurio.

Quinta.

Responso.

Secunda.

Solutio.

Spina quid.

Nomina.

Spina dignitas.

Spina cur canalis.

Cur processus habuit.

Cur pluribus consistit ossibus spina.

cum nodis seu verticulis vel verticillis sceminarum, *σποφῆς* quoque & *σποφῆ-
γες*, id est *vertebrae* appellatur, quod earum opera in varias partes corpus vertatur.
Plinius ossa orbiculata dixit & verterbrara. Spina totius ædificij velut basis & fun-
damentum dici potest, propterea eam veteres carinæ in nauigio primum iactæ
compararunt, cui costæ velut curuatæ trabes, brachia & ctura velut prora puppis-
que innixa cohæreant. Spinæ figuram primus omnium eleganter expressit Hip-
pocrat. sect. 3. libri de articulis & lib. de ossium natuta. Tota est *ἰστροπόλιος*, id est,
quadamtenus recta, sed ita vt nunc retrorsum, nunc intorsum inclinet. A prima
cervicis vertebra ad septimam vsque, figuram habet *λορδῆν*, id est, *intorsum incli-
nantem*, vt cæphago & arteriæ asperæ substernatur. A prima dorsi vertebra
ad duodecimam vsque, figuram habet *κυφῶν*, id est, *extorsum protuberan-
tem*, vt organis respirationi dicatis, cordi quippe ac pulmonibus, amplior re-
linquatur capacitas. Lumbi intorsum inclinant, vt cauæ descendentes & aortæ
truncum fulciant, os autem sacrum *ἰστροκύρην*, id est, *cum retiludine extorsum
protuberans*, vt amplior hypogastrii relinquantur capacitas, quæ vesicæ, intestinum
rectum & vterum continet; addamus nos eam anteriore & interna parte æqua-
lem esse, ne viscera læderet, inscriptionibus tamen trāsuerfis, toto ductu notatam,
posteriore inæqualem ob musculorum insertionem, & vasorum transitus. Spina
in quatuor partes diuiditur, cervicem, dorsum, lumbos, & os sacrum. Cervicis ver-
tebræ septem sunt, dorsi duodecim, lumborum quinque, quorum mirabilis est
articulatio & symphysis. Articulatio duplex est, antica & postica. Antica per cor-
pora vertebrarum fit; postica per obliquas apophyses: illa strictior est, hæc la-
xior, tum vt facilius fiat ad anteriora motus, mouetur enim antorsum animal,
tum ne in postica flexione distendantur, comprimantur aut rumpantur vasa. Sex
itaque sunt vertebrarum articulationes, due per corpora, & quatuor per obliquas
apophyses ascendentes & descendentes. Quæ sit per apophyses est ginglymoi-
des, excipit enim quælibet vertebra (si primam & vndecimam exceperis) superio-
rem, & ab inferiore excipitur, adeo vt ad ginglymon tres requirantur vertebrae.
Symphysis vertebrarum non fit per cartilagineas, licet earum extrema cartilagine
obducantur, sed per vincula validissima, tum ab ossibus orta, tum à cartilaginibus,
tum à membranis ossa inuestientibus. Habent omnes spinæ vertebrae multa in-
ter se communia. Primum, quælibet vertebra suum habet corpus in interna parte si-
tum, reliquo osse crassius & fungosius, cui & apophyses adnascuntur, & cartilagi-
nes, latius est superiore & inferiore basi ad articulationis securitatem, ne promptè
in latera luxari possit. Deinde, quælibet vertebra foramen habet amplissimum
medullæ continendæ dicatum, quod ferè omni ex parte æquale est, non enim in
superioribus amplius, in inferioribus angustius obseruauit: nam licet medullæ in
propagandis neruis mira fecunditas sensum minuatur, implent tamen infernas
cavitates membranæ crassiores, vertebrarum corpora crassiora arctius colligates.
Tertio, in qualibet vertebra tria apophyseon genera obseruantur. Sunt processus
obliqui, trāsuerfi & acuti. Obliqui quatuor sunt, duo superiore parte, totidem in-
feriore. Illi ascendentes, hi descendentes dicuntur, per eos vertebrae *γυγαλλο-
μῶσθαι* scripsit Hippocrates, vnde articulatorij dici possunt. Trāsuerfi duo sunt,
ad securitatem & musculorum varias insertiones exortusque constructi. Acutus
vnicus est posteriore parte situs, qui toti spinæ nomen dedit, *ῥάχις* & *ἀκρωτις*
dicitur, deest in prima vertebra. Quarto, in qualibet vertebra, quinque sunt epi-
physes; duæ in corpore, totidem in trāsuerfis processibus, vnica in spina. Postre-
mo,

Cuius vertebra
dicantur.

Spinae figura
eleganti.

Spinae partes
quatuor.

Articulatio
vertebrarum
duplex.

Symphysis
vertebrarum.

Quid habeant
commune
omnes verte-
brae.

Primum.

Secundo.

Tertio.

Quarto.

Quinto.

modo, spondylus quilibet cum altero articulus foramen ex se se prodit, quod nervi à medulla productis exitum præbet, non est tamen in vertebribus omnibus huius foraminis eadem ratio, nam in cervicis vertebribus magis insculpta est inferior, quam superior, in vertebribus dorſi æqualis est semicirculus superioris & inferioris, in lumborum spondylis totus ferè sinus à superiore efformatur. Cæterum omnium vertebrarum cæcus vocatur *ὄσθον*, sulcus ad lumbos vsque porrectus *ὀπίσθον*. Hæc vertebribus omnibus sunt cōmunia, nūc quæ sunt cuique peculiariora explicemus.

De cervicis vertebribus. CAP. XXIII.



OLLI totius vsum & mirabilem structuram hic describere non est huius loci, tantum quæ ad osteologiam spectant inquirere dæcrevimus. Cervicis itaque seu colli (*τῆς χιλιῶν ἢ αὐχένος*) voces nihil interest vertebres septem sunt, quæ præter ea cuncta à nobis descripta, hoc habent peculiare, quod bifida sunt earum omnium apophyses transversæ, ad musculorum exortum & nervorum, qui ad diaphragma & brachium disseminantur, tutelam. Sunt etiam eadem apophyses perforatæ, ut viam dent venis & arteriis cervicalibus in cerebrum ascendentibus. Quin etiam vertebrarum cervicis spina omnis bifida est, ad musculorum exortum & insertionem. Priores autem duæ vertebres, proprium aliquid & peculiare habet. Prima nonnullis *ἀτλας* dicitur, quod Adantis & baui cuiusdam instar, totum caput sustinet, ab aliis *ἐπὶ σπονδύλῳ*, à vertendo. Hæc spinam nullam habet, ne dum extenditur caput, parvi duo musculi à secunda vertebra pronati lædantur. Excipit & nullo modo excipitur. Corpus habet prætenue & latissimum, intus cavum, ut dentem excipiat, foris gibbum & protuberans. Secunda vertebra peculiarem habet apophysin eamque acutam, quæ *ὀδὸν*, seu dens à dentis similitudine, aut *ὀδοντοειδὴς*, ab aliis *σπονδοειδὴς ἀπόφυσις*, à nuclei figura, appellatur. Hippocrates totam vertebream *σπονδοειδὴς* ab eo processu *ὀδόντι*, id est, *dentem*, appellare solet, vultque à dentis luxatione anginam sæpè fieri insanabilem secundo epidem. In duabus his vertebribus multa occurrunt admiratione digna. Nam & dissimilis earum est articulatio, & symphysis, quæ per propria ligamenta fit, multo validior. Inferiores omnes spondyli sibi in vicem articulantur & corpore suo & obliquis processibus; at superiores duæ vertebres nusquam corpore suo committuntur, vel sibi vel capiti, sed prima suis cavitatibus coronas occipitis excipit, & secunda dentem transmittit; secunda condylo duplici primæ qualitates glenoides excipit. Symphysis verò per ligamenta fit validissima, eorum alterum maximum & latissimum uniuersum articulum in orbem amplectitur, alterum à dentis superficie aspera & acuta enarum dentem alligat occipiti. Tercium transversum & quasi rotundum primæ vertebree sinum excipiendo denti dicatum circumdat, & dentem firmans spinalem medullam tegit, ne ossi nudo & errabundo occurrens lædatur. Enimvero particularem hanc articulationem & symphysin solius motus gratia comparatam existimo. Debuit enim caput, ut infinitas sensilium imagines exciperet, variis motibus expedire moveri. Diuersi autem motus & faciles multa postulabant, vnicam scilicet articulationem, eamque laxam, capita exquisitè rotunda & cavitates semicirculares. Sed tam nobile membrum & diuinitatis particeps simplici laxæque articulationi committere non erat tutum: sagax itaque & prudens natura securitati consulens, quod vnius articuli laxitate præstare non debuit, duobus parvis artioribus, & varietate musculorum cōpensauit. Quamob-

*Quid habeant
peculiare cer-
uicis vertebra.*

*Quid prima
vertebra ha-
beat peculiare.*

*Articulatio
duarum pri-
marum ver-
tebrarum dis-
similis.*

*Symphysis
duarum ver-
tebrarum.*

*Ligamenta
tria.*

*Causa parti-
cularis illius
articulationis
& symphy-
sios.*

Capitis motus
duo.
Recti duo.
Obliqui duo.

rem simplices omnes & proprios capitis motus super duobus spondylis perfici voluit. Sunt autem proprii capitis motus duo, rectus & obliquus. Recti duæ sunt partes, flexio & extensio; flexio fit annuendo, extensio renuendo. Obliquus motus fit dum in latera, ad leuam quippe aut dextram caput circumducitur. Dum vero in humeros inclinatur, iam non proprius est capitis motus, sed illi cum ceruice communis. Motum qui annuendo & renuendo fit, à capite & secunda vertebra fieri. Obliquum vero à capite & primo spondylo cum Galeno statuimus, quidquid clamitent Neorerici, ut in controuersis demonstrabitur.

De vertebra dorsi & lumborum. CAP. XXV.

Quid differat
dorsi vertebra
à ceruicis ver-
tebris.



Nomina ver-
tebrarum dor-
si.

Lumborum
vertebra.

DO R S U M Græci ὄστρον, Latini tergum vocant. Duodecim constat vertebra, quibus duodecim costæ articulantur: harum & corpora, & apophyses nonnihil à corporibus & processibus vertebrarum ceruicis differunt. Ceruicis corpora longa sunt, lata & æquabilia, ut firmius eis incubent cesophagus & arteria aspera. Dorsi corpora rotunda sunt, conuexa, crassiora, & minus solida. Spinales ceruicis processus bifidi sunt, dorsi vero longi sunt, simplices & deorsum tendentes. Transuersæ ceruicis apophyses latæ sunt & perforatæ; dorsi vero crassæ, solidæ & rotundæ, ad firmiorem costarum articulationem, exceptis vndecima & duodecima, quibus postremæ costæ omnium breuissimæ connectuntur, ut hepatis, lieni & subiectis partibus cederent. Prima dorsi vertebra, λοφία à veteribus nominatur, quia præ aliis eminet, secunda μασχαλισήρ, id est, axillaris, reliquæ πλευνῆται, id est, costales: vndecima ἀρ' ῥ' ἐπ' ἡς, quod eius spina recta sit, neque sursum aut deorsum inclinet. Hæc primæ ceruicis vertebra aduersatur omnino; excipit enim & non excipitur prima, excipitur & non excipitur vndecima. Spondylus hic ἀρ' ῥ' ἐπ' ἡς, clauis instar, nutantes sursum aut deorsum alios spondylos figit & firmat. Habent singulæ dorsi vertebrae sinus duos articulationis costarum gratia, alterum in transuersis processibus, alterum in corporum lateribus; uterque exiguus est costarum capitibus respondens. Lumbi tertiam spinæ partem constituunt; quinque tantum vertebrae constant, in quibus nihil obseruatione dignum, nisi quod crebris foraminibus peruiæ sunt, quia earum corpus crassissimum, earumque obliqui processus superiores quidem sinuum speciem referunt, inferiores autem paululum eminent. Transuersæ lumborum apophyses cæteris oblongiores sunt, sed tenuiores costularum vicem gerentes, exceptis primæ & quintæ; hæc enim ob illic cum sacro osse connexionem, illa vero ne motum diaphragmatis impediret oblonga esse non debuit. Acuti vero processus reliquis crassiores sunt, latiores, & circulari linea definiti. Apophysis postremæ mespilorum officulo similis, spondylis lumborum quædam adest, interdum omnibus, interdum superioribus tantum.

De osse sacro & coccyge. CAP. XXVI.

os sacri no-
mina.



SACRUM Græci ὄστρον dicunt, non quod sacri & arcani quidpiam in se contineat, ut voluerunt quidam, sed ob magnitudinem: est enim omnium totius spinæ ossium maximū. Sic Homerus pisces magnos sacros vocat, & Hippocrates ea ratione os sacrum, vertebra magna appellauit (sect. 4. lib. 2. Epidem. ἡ σάκρινος) inquit ἐν ὀσφύϊ μέγχι τῇ μεγάλῃ σπονδυλῷ.

καὶ τὸ βεβυδ est, iecoraria vena per lumbos ad magnam usque vertebra[m] deorsum fertur. πλατὺ etiam id est, latum os dicitur, alias ὑποσπόνδυλον, quasi subvertebrum. Efficit sua latitudine velut triagulum, ex lato principio in angustum sensim definens. Cavum est anteriore parte, semicirculi instar, ut amplior hypogastrii relinquatur capacitas, quæ vesicam, rectum intestinum & uterum continet; posteriore gibbum. Constat os sacrum quinque ossibus, alias sex, quæ in puerulis separantur facile. In adultis verò ita interdum coalescunt, ut vnicum appareat os. Ossa hæc in numerum vertebrarum adscribuntur; non quod vertebrarum usum præstent, quia immobilia sunt, sed ob similitudinē, processus enim habent vertebrarum instar & foramina transmittendis nervis dicata, licet aliquantulum dissimilia; processus acuti exigui sunt, transversi, obscuri admodum & in cavitatem parum profundam, inæqualem, asperam, excipientem ossa ilium, definunt. Solum inter sacri ossa primum, apophyses habet ascendentes, quibus cum descendentes ultimi lumborum spondyli articulat. Foramina autem dissimilia dixi, quia non sunt ut in vertebris lateralia, sed antica & postica; os namque ilium latera occupabat; sunt verò antica posticis maiora, quia maiores nervi in anticas quàm posticas distribuuntur partes. In lateribus trium superiorum ossium sinus exculpti sunt, quibus ilium ossa ita hærent & articulantur, ut videantur connasci. Ad ossis sacri extremum os apparet, quod à similitudine, quam cum cuculi rostro habet, κόκκυξ dicitur, ab aliis ὀστέον ὀστέον ὀστέον. Tribus constat ossiculis, interdum quatuor, quæ partus tempore cedunt & retrahuntur, ut amplior relinquatur capacitas: absurdum enim est existimare in ipso enixu pubis ossa disungi. Huic appendicula subdidet cartilaginea.

Figura.

Processus ossis sacri.

Foramina dissimilia.

Coccyx.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

De motu capitis defenditur Galeni opinio, contra Neotericos.

QVÆSTIO.



NIL in tota ossium historia me magis exercuit, quàm natura motus capituli: & articulationis, quæ fit cum superioribus vertebris, ratio. Galenus multa & præclara ea de re scriptis mandavit duodecimo de usu partium; sed tota ferè in eum inuehitur Anatomicorum turba. Ego totius disputationis summam breui contrabam. Capitis motus alij sunt proprii, alij communes: proprii duo, alter rectus, alter obliquus. Recti due sunt partes, flexio & extensio; flexio fit annuendo, extensio renuendo: obliquus motus fit dum in latera ad laevam quippe aut dextram caput vertitur. Communis motus capiti & cervici est, dum humeros versus inclinatur; non enim potest caput immota ceruice in scapulam & humeros ferri. Proprii omnes motus super prima & secunda vertebra perficiuntur, ideoque pluribus vinculis ab occipitationis alligantur, nam nobile membrum & maximum simplici articulationi laxæque committere non erat tutum. Eum qui annuendo & renuendo fit à capite & secunda vertebra perfici vult Galenus libello de ossibus & 12. de usu partium; cum verò quo ducitur vertiturque caput in latera, super prima vertebra. Recentiores contra, motum qui annuendo & renuendo fit pendere volunt ab articulatione capitis cum prima vertebra; motum verò, quo in orbem agitur caput (ita enim loquuntur) ab articulatione occipitis cum dente. Si enim (aiunt) moueretur caput ad latera super primam vertebra[m], da-

Capitis motus

Proprii duo sunt.

Galeni opinio de motu prima & secunda vertebra.

Recentiorum contraria opinio.

Recentiores eorū.

Opinio Gale-
ni defenditur
& confirmat-
ur.

Galenus elegans
demonstratio.

Juniorum
argumenta
conuoluntur.

Male Galenū
intelligerent
Neoterici.

Galenū nihil
de circulari
motu.

Obiectū re-
centiorum.

solutio.

retur vacuum, & quoties in orbem mouetur caput, toties luxaretur, quia quæ veris & circu-
magari debent, rei vni velut axi inniti solent, non duabus oppositis partibus, at apophysis py-
renoides est velut axis. Ego Galeni sententiæ malo assentiri: namque, ut rem in paucis con-
traham, rectum motum super prima, obliquum super secunda fieri, & vertebrarum structu-
ra, & articulationis modus, & musculorum caput mouentium insertio satis indicant. Pri-
ma vertebra suis inferniis cavitatibus ita secundam complectitur, ut omnia huius latera ab-
leantur, apparet etiam in ea articulatione cavitatum labia, ne si quando in magnis motibus
exiguum quiddam aberrare contingeret, eminentiæ foras exciderent. Elegans sane est hæc
Galenī demonstratio. Videamus (ait) cur labia cavitatum primæ vertebrae & ligamentum
dentis construxit natura, nec voluit ut ex inferniis partibus aut transuersis processibus ner-
uus manaret. An non quia periculum erat, ne in violentis motibus, in quibus ea vertebra
suum mutare potest, ille exiguum aberrarent, hic verò diuelleretur, aut comprimeretur: at in
recto motu nec nervus comprimi, nec situs vertebrae multum immutari potest, sed in eo tan-
tum quo vertitur caput in latera: ergo verisimilissimus est cavitatum labia quæ in primæ verte-
brae conspiciuntur obliqui motus gratia constructa. Quod si rectorum motuum gratia eas ca-
uitates fecisset natura, aliam quidem in anteriore, aliam in posteriore parte locasset. Secun-
da autem vertebra structura rectum motum super ea perfici testatur; habet enim superiore
parte dentiformem processum, inferiore totum illius corpus, non plana basi, sed in priora de-
cliuū & recuruata, semicirculi in modum deficiens, in tertijs spondyli cavitatem inseritur.
Quod si obliquus motus super secunda vertebra fieret, ut contendunt Neoterici, oporteret pri-
mam vertebra in inferna parte, & secundam superna esse planas, & hanc solum habere den-
tem, super quem velut ad axem circumageretur caput. Musculorum etiam insertio nosse
fauet sententiæ. Nam rectorum quatuor duo maiores à spina secunda vertebra orti, & in
occiput lati, caput ad secundam vertebra trahunt, quod est reuere; obliqui verò duo à spi-
na secunda vertebra orti, in transuersas primi spondyli apophyses inserti, illum obliquè mo-
uent. Neotericorum aduersus Galenum argumenta nullius sunt momenti. In idem enim lu-
xationis & vacui periculum incidunt, quod effugere conantur, quia si super apophysi denti-
formi vertatur caput, an non pari modo vertebrarum extrema deficiunt? Præterea de circulari
motu contra Galenum disputant, de quo ne verbum quidem vllum. Decepit eos, ut
opinor, Græca dictio *ᾠειδῶν*. Non enim *ᾠειδῶν*, est in orbem agi, sed detorquei in
latera; nunquam verbo *κυκλοφῆραν* vititur Galenus. Sunt hæc ipsius verba 12. de vsu
partium. *ἔστι δὲ κοινὰ μόρια τετραγίλου καὶ κεφαλῆς δι' ὧν ὀπνεύομεν καὶ ἀνα-
νεύομεν καὶ ἀεὶ γομεν αὐτὴν εἰς τὰ πλάγια* id est, Sunt autem partes colli &
capitis communes eę, per quas caput ipsum deprimimus atque attollimus & in la-
tera vertimus. Et alibi. Quum totius capitis duos oporteat esse motus genere, alterum qui-
dem dum annuimus & renuimus, *ἐτέρον δὲ εἰς τὰ πλάγια ἀεὶ περιστρέφον αὐτὴν*, al-
terum dum in latera detorqueamus. Cur ergo de circulari motu contra Galenum Co-
lumbus? Obijciunt Neoterici, si flecteretur caput super secunda vertebra, spinalem medul-
lam periculi experiem non futuram: comprimeretur enim sapissimè aut frangeretur. Sed vi-
deant qua arte huic incommodo natura prouiderit. Excavauit scilicet eam primæ vertebra
partem quæ dentem excipit, & ligamentum apposuit dentem omni ex parte ambiens, ne le-
deretur medulla. Concludamus ergo, proprios omnes capitis motus fieri per articulum ad pri-
mam & secundam vertebra, rectos quidem secunda, obliquos verò prima diarthrosi; non
ita tamen ut non inueniatur, illi quidem prima, hi verò secunda. Cur enim rectos musculos,
ut acutè disputat Syluius contra Vesaliū, breuissimos à primi spondyli parte po-
stica in occiput inseruisset, nisi hæc prima diarthrosis motum capitis rectum adiuturæ fuisset,
faciendum tamen præcipuè à rectis duobus alijs musculis maioribus à spina secundi spondyli

in occiput tendentibus? Cur item obliquos musculos affixisset duos apophysi transversa primi spondyli & spine secundi, nisi motum capitis obliquum à prima diarthrosi præcipue fieri voluisset, à secunda tamen iuvari?

HISTORIA ANATOMICA.

De thoracis ossibus. CAP. XXVII.



ALTERA trunci pars *θώραξ* appellatur, aut *στόμα* *τοῦ θώρακος*, id est, *salio*, (cor enim in ea contentum perenni agitatur motu), aut, ut volunt Stoici, *τοῦ τοῦ θένον ὁρῶν*, quod mentem diuinam animi partem concludat. Ratione ergo contenti visceris nobilissimi, & ad vitam omnium maximè necessarij, ossibus ceu propugnaculis thoracem obuallauit natura, sed quia respirationis gratia continuo illum distendi & cōtrahi oportebat, non osseum omnino, sed aliqua ex parte carneum construxit. Carnium historiam suo loco describemus, hīc ossa tantum inquirere consilium est. Thoracem circumscribunt ceu fines, superiore patte clauiculæ, inferiore cartilago illa ensiculata. Præcipue autem eius partes aut antice sunt aut postice, aut laterales. Anterior pars *σῆθος*, id est, *sternum*, *pectus*, lateta *πλευραὶ* dicuntur, & *στέφυρα* seu costæ: postetior pars *νότον* appellatur & *ὕποπερὶ* *χρῆλον*, Latini dorsum vocant & tergum, cuius superna lateta *ὠμοπλάται* καὶ *πτερύγια*, scapulæ & alæ dicuntur, quæ singula breuiter describenda sunt. Clauiculæ Græcis *κλειδές*, quod vniuersum thoracem claudant, aut quod humetum & ceruicem concludant, clauisque modo firmant cum sterno omoplatam, & per hanc brachium, Celso iugulum à iungendo dicuntur. Soli homini & simis sunt datæ, quia solus homo manum habuit, cuius cum varij sint motus iūque expediti, facile antrosum & deorsum præcipitaretur brachium, difficile sursum & retrorsum moueretur, nisi hoc osse tanquam palo stabiliretur. Figuram habet S, R omni, omnino inæqualem, nam sternum versus introrsum caua est clauis, extrorsum gibbata; versus scapulam introrsum conuexa, extrorsum concava. Voluit autem clauiculam in semicirculos formare natura, quia vasa quamplurima erant transmittenda, quæ comprimi non oportebat. Duo autem fuerunt semicirculi non vnicus, ad robur, ne tam facile frangeretur. Connectitur scapulis cartilaginis interiectæ, quæ tamen illi minimè adnascitur; ut in brachij & scapulæ motibus aliquantulum cedat. Cartilago hæc quibuldam *ἀκρόμιον*, sed verius *κατακλεις* quasi clausura vocatur.

Thorax cur ita appellatur.

Cur thorax partim osseus, partim carneus.

Circumscripsit thoracem.

Partes thoracis.

Clauicula.

Clauium vsus.

Figura.

Cur semicircularis figura.

Connectio.

De Sterno. CAP. XXVIII.



ANTERIOR thoracis pars *σῆθρον* appellari solet, quod ibi sit *τὸ σῆρρον* *ὁν τοῦ νοῦ*, id est, *mentis firmitas*, quando eo loci cor est, καὶ *τὸ ζωτικόν*. Hippocrati *σῆθος* dicitur, Latinis pectus, licet varia sit dictionis huius apud eundem acceptio. Nam sæpè *σῆθος* totam anteriorem thoracis partem denotat, sic in Aphorismis, Prothetico & coacis *σῆθος* *ἀνόνον*, *σῆθος* *ἀλγνημα* Galenus interpretatur thoracis dolorem; interdum *σῆθος* mediam tantum pectoris partem indicat, quam vulgus sternum vocat; nonnunquam synecdochicè pro extrema sterni parte, quæ cartilaginea

Sterni nomen.

Sterni varia apud Hippocratem acceptio.

est, & ensiculata vsurpatur, aliquando metonymicis pro orificio superiore ventriculi, quod sub ea cartilagine vsurpatur. Sic in coacis prænotionibus στήθος δὴ ξὶν καὶ καρδίᾳ στήθι μορφήν & amarorem dixit, id est, oris ventriculi, ut idem sit eo loco δὴ ξὶς στήθι, quod καρδίᾳ μορφήν. & in Epid. στήθεα κατακορέα, *pectorabile abundantia* dicuntur. Ossium sterni numerus incertus est pro ætatum varietate; nunc enim septem apparent, nunc quinque, nunc tria, interdum unicum, ita vindicari poterit à recentiorum calumnia Galenus. Quomodo autem in diversis ætatibus se habeant illa ossa, paucis accipite. Puerulorum sternum in prima generatione totum est cartilagineū, ubi autem in os formari incipit, celerius ossis speciem superiores quàm inferiores, & mediæ quàm extremæ partes assumunt, nunc totum sternum sex particulis constat, quas linea transversa secludit, interdum septimum reperias os, sed tarò, quia cum inferiores costæ semper minus distent, dum inferuntur, quàm superiores, sexta adeo septimæ est vicina, ut quia ipsam attingit, nulla prorsus aut divisio, aut linea remaneat. In adultis nunc quatuor, nunc tria tantum apparent sterni ossa, hoc tamen ferè perpetuum est, prius aboleri lineam in infernis quàm supernis partibus. Primum os amplum est & crassum; sinum habet utrinque superiore parte, cui claviculæ caput inarticulatur; habet autem in medio velut foueam, quam superiorem furculam vocat vulgus. Secundum angustius est & multos habet sinus, qui costarum tertiæ, quartæ, quintæ & sextæ cartilagines protuberantes excipiunt. Tertium exiguum est, desinitque in cartilagineam mucronatam, cuius historiam suo loco describemus. Quia verò tota sterni figura ξίφος, id est, *gladio* similis est, sternon ipsum xiphocides nonnullis appellatur, licet vulgus extremæ tantum cartilagini nomen id tribuat. Cæterum dum Galenus septem ossa sterni attribuit, non ad transversas divisiones respicit, sed ad eos sinus in quos costarum fines cartilaginei inferuntur.

De costis. CAP. XXIX.



THORACIS latera πλευράι dicuntur, quod latera efforment, & στήθι, quod remorum in morem sint collocata, vulgus costas appellat. Earum duplex est articulatio, altera cum spondylis dorii, altera cum sterni cartilaginibus. Articulatio hæc ambigua dicitur & neutra à Galeno; nam ratione obscuri motus synarthrosis dici potest; ratione autem compositionis, quia & sinus & capita ad sunt, diarthrosis. Cæterum costarum omnium non est omnino eadem articulatio. Superiores namque novem posteriore patte duplici cōnectuntur articulo, altero ad vertebrarum corpus, altero ad transversam apophysim. Inferiores simplici tantum, quia superioribus costis maius à vertebribus quàm à sterni robur accedere debet. Superiores septem perfectam cum sterni habent articulationem, inferiores quinque neutiquam ad os pectoris perveniunt, sed inchoatæ & quasi mutilæ in cartilagines finiuntur, quæ sursum retortæ inter se quasi conglutinatæ cohærent. Costæ, figura sua arcum referunt; in exortu angustiores sunt & subrotundæ, deinde paulatim laescunt, postmodum angustiores redduntur. Partes earum extremæ sursum spectant, mediæ deorsum, & mediatum partium, quæ pars inferior est tenuior, quæ superior crassior apparet. Prima omnium est latissima, inferiores omnium angustissimæ, mediæ medium tenent. Costarum pars latior palmula dicitur πλάτη Polluci; angustior quæ spinam attingit κακώτις, *remulus*.

Ossium sterni
numerus.

Qualis sint
puerulorum
ossa.

Primum os
sterni.

Secundum.

Tertium.

Cur xiphocides
dicitur.

Costarum no-
mina.
Articulatio
costarum du-
plex.

Figura costarum.

Partes costarum.

Sunt costæ vbiq̃ læues, nisi qua exasperatæ musculorum intercostalium inflectionem aut exortum recipiunt, aut qua parte tubercula efformant, quibus vertebrarum sinibus articulatur. Sunt etiam inferiore parte cauæ, vt venam, arteriam, & neruum suscipiant, sinus ille canalis effigiem refert, & inferiorem costæ partem magis acutam reddit. Hic discant Chirurghi thoracis apertionē à summō ad imum, non ab imo ad summum administrandam. Costæ partim ossæ sunt, partim cartilagineæ: ossæ, qua parte cum vertebris connectuntur & circa latera; cartilagineæ, qua parte cum sternō committuntur, tum vt thoraci sese contrahenti & distendenti facilius obsequantur, tum vt magis resistant fracturis. Cartilaginee porro costarum superiorum duriores sunt, quia cum ossibus, inferiores molliores, quia cum cartilaginibus committuntur, ita molliora cum mollioribus, duriora cum durioribus copulantur. Costarum duæ statuuntur differentiæ, aliæ enim sunt *γνησιαι* id est, *germanæ*, veræ & legitimæ, quia sternō articulatur, septem sunt, quarum duæ superiores *ἀντιστροφολοι* Polluce vocantur, quasi tetortæ, duæ sequentes *σπεραι* id est, *solidæ*; tres vltimæ *σπυριδεις*, id est, *pectorales*. Aliæ sunt adulectinæ, spurix, illegitimæ, quia non habent perfectam cum sternō articulationem, dicuntur *ὀδοι*, *πλευραι*, *μικραὶ αἰχῆς*, *χονδρῶδεις*, *ἀκαθαῖαι*, *κλέες*. Celsus *ρῶας* appellari putat & abdomini in hærescere. quinque numero sunt, minores & breuioribus, quarum posterior verè non ulla appellari debet, quia nulli adhæret. Id autem mira naturæ providentia factum puto, vt iecori, lieni, & superioribus intestinis, dum aliquando distenduntur, amplior et relinquatur locus.

Observatio
Chirurgica.

Cur costæ cartilagineæ.

Costarum differentia.
Veræ costæ.

Spuria.

De scapulis. CAP. XXX.



TO T A scapula Græcis *ὀμοπλάτη* dicitur, quasi humeri latitudinem constituens, à Cello scoptulum opertum, à Batbati spatula; proprio tamen & angustiore significato omoplata, pars est lata totius ossis, quæ posticas costatum partes tegit. Scapularum triplicem vsum agnoscimus, costarum robur, musculorum implantationem, ab ea enim ferè omnes brachium mouētes musculi oriuntur, & brachij ac clauium articulationem. Omoplate figura trapezia est, id est, propemodum triangula & inæqualis: eius articulatio duplex est, altera cum iugulo per acromion, altera cum brachio, per ceruicem & cavitatem glenoidem; symphysin verò habet, id est, cōtinuitatem cum occipite, spina, costis & osse hyoide per carnes, id est, musculos. In omoplata multa observantur, quæ ad musculorum historiam cōferunt. Primum eius basis, quæ per dorsi longitudinem & vertebrarum spinas exporrigitur, in qua angulus adest superior & inferior; deinde costæ apparet duplices, superior & inferior: tertio pars caua seu interior, & pars gibba, seu exterior, quæ à testudinis forma *χελύνιον*, id est, *testudo* dicitur, hæc in macilentis alarum instar prominet, dorsum scapulae vocant quidam. Adest præterea spina à basi sursum ascendēs, cuius extremum *ἀκρώμιον* dicitur, licet Hippocrati acromion sit ipsa articulatio clauiculæ cum parte superiore omoplatæ, aut os cartilagineosum instat vinculi hæc duo ossa connectentis. Quin & duplex observatur cavitas, altera supra, altera infra spinam: vtramq; *μεταχένιον*, id est, *interscapulum* vocant. Adest etiam acuta apophysis, quam ab anchoræ similitudine *ἀγκυροειδῆ*, aut à rostri effigie *ροστροειδῆ* appellant: deinde *αὐχῆν*, id est *ceruicē*, in cuius extremo cavitas apparet, in quam brachij caput infertur, ea gle-

Omoplata nominata.

Scapularum vsum triplicem.

Figura omoplate.
Articulatio duplex.
Symphysin per carnes.
Partes multæ in scapula observanda.

noides est, quia tamen cartilagine labra eius cauiratis coronante, sed lubricata augeatur, vt profunda appareat, *ὠμοκότυλον* dicunt. Postremò appendices quinque sunt, tres ad latus intetnum iuxta spinæ ductum, duæ ligamenta suppeditant, quibus humerus cauirati & clauicula acromio alligatur: est & sinus in summo latere scapulæ, per quod neruus, vena & atteria feruntur.

De ossibus ilium, ischijs & pubis. CAP. XXXI.



OSTREMAM trunci partem constituit os, quod Oribasius *ἀνώνυμον* vocat, sunt tamen qui à maiore parte ilium appellant, Rufus *ἰσχίον*, id est, *os coxæ*, nuncupat. Vnicum apparet vtrinque sacro ossi commissum; in iunioribus verò triplici linea distinctum cernitur, propterea quæ tres eius partes statui solent. Prima omnium larissimæ & superior, quæ cum osse sacro committitur, *os λαγόνων*, id est *ilium*, dicitur, quod ileon intestinum cõtineat. In hoc osse pars gibba & caua obseruatur, nec non apophysis summa, spina appellata. Est etiam costa quasi pars quædam eminentior & curua, vbi id os est crassissimum. Secunda ossis innominati pars *ὀστέον ἱλίου* *os pubis & pectinis* vocatur; connectitur cum altero per synchondrosin ita validè, vt ea in partu disungi sit difficile. Ossa hæc in mulieribus ampliora & capaciora sunt, quàm in viris; habent autem foramen amplissimum ostij instar, laxitatis gratia factum, quod muscoli duo, obturatorores dicti, implent. Tertia innominati ossis pars *ἰσχίον* nominatur, seu os coxendicis, in quo cavititas profunda *κοτύλη*, vocant seu acetabulum, conspicitur, femoris capiti excipiendo dicatum; processus item adest cartilagineus, quo femoris caput comprehenditur, supercilium dicunt. Tria hæc ossa constituunt velut basin, qua immota totum corpus mouetur; sed & peluim efformat cum osse sacro, quæ vesicam, vterum, & intestina continet; addunt quidam eorum anteriori partem tanquam scopulo penem inniti, ne quicquam, dum in vteri ceruicem intromittitur, cedat.

Tertia osseæ pars, quæ artus complectitur, ac primum de humero.

CAP. XXXII.



TERTIA superest *ὀστέον* pars, quæ artus cõplectitur. Sunt autem artus duo, manus & pedes. Manus à scapula ad summos vñq; digitos protenditur. Diuiditur in brachium, cubitum & extremam manum. Brachium Græcis *βραχίον*; Celso humerus, vñco constat osse, eoque magno & validissimo, in quo hæc obseruanda, pars superior, inferior, interna, externa, anterior, posterior. Superior, caput habet magnum ossi adnatum, quod in scapulæ cavitatem inseritur. Ea cavititas superficialia quidem est, vt brachium in omnes partes expedite moueretur; sed cartilagine multa amplificatur ad firmiorem articulationem. In huius capitis anteriore parte scissura quædam conspicua est caput in duas portiones diuidens, per quam bicipitis musculi cubitum flectentis portio, à scapulæ acetabulo prædiens, tanquam per trochleam fertur. Inferior pars, quæ cubito & radio articulatur, processuum & sinuum varietate elegans est. Processus duo sunt insignes. Alter externus, alter internus; ab illo musculi ferè omnes carpum & digiros extendentes oriuntur, ab hoc qui flexioni sunt destinati. Sinus etiam sunt totidem, trochleam rotulamue

Os innominatum.

Os ilium.

Os pubis.

Ischijs os.

Manus in tres partes diuiditur.
Brachij partes

Caput brachij

Processus inferni.

Sinus.

lamve ad quam funes voluuntur referentes, qui eo artificio sunt constructi, ut cubitum in acutissimum angulum flecti sinant, nec ultra rectam lineam eundem extendi patiantur. Est etiam ad externum huius orbitæ latus oblongum, rotundumque caput, radij articulationi inserviēs, cuius graria in primum, supinumque movetur. In anteriore & posteriore, interna & externa brachij parte nihil effatum dignum animaduertimus, nisi quod brachium ante & foris gibbum est ad securitatem, intus verò sinum.

De cubito & radio. CAP. XXXIII.



VBITVS Græcè *σῆχυς καὶ ὀλένη*, duobus costat ossibus, quorum alterum maius & inferius totius nomine *σῆχυς* dicitur, Latine ulna, cubitus, Arabes *foçile maius* vocant, alij *σῆχηχιον*, alterum minus & superius *καρκίς*, radius & foçile minus appellatur, aut *σῆχηχιον*. In priore hæc aduertenda sunt, pars superior, inferior, antica, postica, interna, externa. Superior per ginglymon

Cubiti nomen.

Radij nomen. Cubiti partes.

cum brachio articulat, firque per eam articulationem flexionis & extensionis motus. Cum autem ad ginglymon & capita & sinus requirantur, in hoc osse processus duo apparent & sinus. Processus in acutum vergentes *καρῶναι*, id est, *rostra* seu glandes vocantur, anterior minor est, posterior maior, ampliorque in obtusum angulum desinens, Græci *ὠλέκρον* dicunt *κύβητον*, nonnulli *ἀγκῶνα*. Adest etiam sinus seu cavitās à figura literæ C, *σγμοειδής* vel *σγμοειδοειδής* dicta. Itaque cavitās hæc brachij apophyses excipit, processus verò à brachij sinibus excipiuntur, unde ginglymos. Inferior cubiti pars cum carpo articulat, tum per mediam cartilaginem, tum per acutam apophysin, quæ à columnæ figura *συλοειδής* vocatur. Sed & in inferiore cubiti parte epiphysis adest foris gibba, intus caua. In anticis, posticis, internis & externis cubiti partibus, nihil dignum obseruatione, nisi quod externæ protuberant, anteriores sunt simæ. In altero osse, quod radium diximus appellari, eadem partes considerandæ. Superior quidem cum externa brachij apophysi per diarthrosin articulat, à qua articulatione motus supinus & pronus depēdet; inferior per epiphysin cum carpi osse maximum digitum respiciente connectitur. Interna protuberat, anterior sima est. Cæterum duo hæc ossa in suis partibus superioribus & inferioribus contrariō se habent modo; nam superior pars cubiti crassior, inferior renuior: contrā superior radij renuior, inferior crassior est. Rursum hæc duo ossa in suis extremis ita inter se connectuntur, ut os radij superiore parte recipiatur à cubito, contrā os cubiti inferiore parte recipiatur à radio. Media verò omnino dehiscunt, ut musculis cedant, & motum qui in primum ac supinum fit adiuuent.

Articulationis cubiti.

Radij partes.

Duo hæc ossa contrariō se habent modo.

De ossibus extreme manus, carpo scilicet, metacarpo & digitis.

CAP. XXXIII.



SUMA & extrema manus Græcis *ἀκρόχειρ*, in tres partes diuiditur, in carpum, metacarpum, & digiros. *Καρπός* seu Brachiale, Hefychio, *ἄλεις*, Arabibus *rafetta*, octo constat ossibus, quæ propriis carent nominibus. Eorum figura inæqualis est, nunc gibba, nunc sima, partim recta, partim rotunda. Connectuntur vinculorum & cartilaginum interiectu. Eorum verò inter se articulatione ad eam referenda est, quam neutram & dubiam ex

Corpi ossa.

*Duos ordines
ossium corporis.*

*Metacarpij
ossa.*

*Digitorum
ossa.*

Galenus appellauimus. Nam ratione obscuri motus synarthrosis, ratione autem compositionis diarthrosis dici potest. Sunt ossa hæc duplici ordine distincta, ut manus expedite moueri possit; posterior quidem radio & cubito articulatus, quatuor ossibus constat, quorum tria externa ita simul iuncta, ut vnum esse videantur, radij cavitati & vlnæ interiectu cartilaginis iunguntur, quantum omnium minimum & interius sub minimo digito est positum. Anterior ordo totidem constat ossibus, quæ quatuor postbrachialis ossibus adnectuntur. Altera manus pars μετακαρπιον dicitur, alijs ποικιλριον, ἀνδρον & στήθος, Latine postbrachiale, palma: quatuor tantum ossibus constat, oblongis & gracilibus, quæ inferiore parte cum carpo per dubiam articulationem, superiore cum digitis per ginglymon connectuntur. Habent singula ossa superna & inferna parte epiphyfes; hæ in extremis partibus sese tangunt, ut vlna & radius, in medijs vero dehiscunt, ut musculis interosseis dictis suis relinquatur locus. Sunt ossa hæc intus sima, foris gibba, cavitatem etiam habent medulla plenam. Terciam manus partem constituunt digiti, qui ossibus quindecim constant, triplici ordine dispositis. Eorum scierim totam Græci φάλαγγας, id est, acies & agmina vocarunt; quia eo ordine sunt disposita, ut veluti in acie stare videantur, πνυταλιδες etiam dicuntur Rufo, à πνυταλιν, id est virgæ forma. Articulantur omnia per ginglymon, & eorum tubercula κινδύλοι, id est nodi, vocantur. Fuit porro ad motuum varietatem & facilitatem hinc numerus necessarius, quia manus organum erat δ'όσας χεῖρας λήψας, quo damus pariter & accipimus. Sunt digitorum ossa extrinsecus gibba, intus sima & velut plana, tum quia interna parte apprehendimus, tum quia plures ad internam quam externam partem feruntur tendines. Cæterum licet horum ossium non eadem sit magnitudo, æqualia tamen cōspiciuntur, cum mutuam ad sphericum corpus apprehendendum operam conferunt. Reliqua quæ ad ossium manus figuram, situm, numerum crassitiem spectant, fusiùs persequemur, dum mirabilem totius manus organi nobilissimi historiam describemus. Ea igitur inderepetat studiosus lector.

De pedis ossibus, ac primum de osse femoris. CAP. XXXV.

Pedis divisio.

Oss femoris.

Figura.



Superior pars.

Caput femoris

*Trochanteres
duo.*

PES sicut & manus in tres partes diuiditur, in femur, tibiam & extremum pedem. Femur Græcis μηρός καὶ τὸ μηρόν omnium humani corporis ossium longissimum & maximum, figuram habet rotundam & rectam, sed non exquisitè, nam anticæ & externæ eius partes gibbæ sunt, posticæ & internæ simæ, ad cursum, ambulationem & firmam stationem. In eo hæc obseruanda sunt, pars superior, inferior, anterior, posterior, interior, exterior. Superior per enarthrosin cum ischio; inferior per ginglymon cum tibia articulatur. In superiore tres ad sunt apophyses, caput scilicet femoris, & trochantères duo. Caput omnium quæ in corpore sunt maximum, Hippocrati καὶ ἐξοχλὺν ἄρθρον, articulus dicitur. Caput hoc rotundum ab epiphyysi totum efformatur, & in profundam ischij cavitatem inseritur, cui etiam tereti & validissimo vinculo alligatur, propterea in medio sinuatum apparet. Trochanteres duo (ἀπὸ τῶ τροχάων sic dicti, quòd femoris motus, cursusque per musculos his apophysebus insertos perficiantur) ex inferiore ceruicis parte velut nodi educuntur. Eorum alter externus est μέγας τρο-

μαστήρ, magnus rotator & γλετὸς dicitur, vel à natium similitudine, vel quod natium musculi ibi inferantur. Alter internus minor trochanter appellatur, quorum idem est usus qui reliquorum processuum, ad musculorum scilicet exortum & insertionem. Tres hi processus epiphyses etiam sunt, nam in puerulis & recens natis faciliè separantur. Inferior femoris pars cum tibia per ginglymon articulatur; non fit autem ginglymos nisi & capita & sinus adsint; sunt itaque in inferiore femoris parte capita duo & sinus. Caput aliud internum est, aliud externum. Internum crassius est; externum latius, magisque depressum, ne obliquus motus impediretur. Reliquæ ossis partes anticæ, posticæ, internæ, externæ, inæquales sunt, multisque exasperantur processibus, ad musculorum exortum & insertionem. Totum hoc os insigniter cavum est, ideo medullam habet pro alimento.

Inferior pars.

De ossibus tibiæ & rotulæ. CAP. XXXVI.



TIBIA duobus constat ossibus; maius totius nomen retinet, & κνήμη dicitur, Latinis absolute tibia: Arabibus facile maius; minus verò περόνη, fibula, facile minus. Tibiæ superior pars cum femoris osse per ginglymon articulatur: sinus itaque habet duos, capita femoris excipientes, & processum in medio, qui à femoris cavitate excipitur. Inferior tibiæ pars sensim attenuatur, in cuius extremo appendix prominens & gibba cernitur, σφυρόν id est, malleolus internus dicitur. Anterior verò tibiæ pars in acutum & oblongum angulum producta δ'ανθα, id est spina, vocatur. Alterum os περόνη seu fibula dictum & minus, superiore parte genu non attingit, inferiore processum emittit, quem σφυρόν, id est, malleolum externum vocant. Duo hæc ossa radij & cubiti instar in extremis contigua sunt, in medio dehiscunt. Femori & tibiæ communem præstat operam os rotundum, quod femoris & tibiæ articulationi adhæret, μύλην vocant, id est, molam, à similitudine. Hippocrati Ἰπποκράτης καὶ μυλακὲς dicitur, ab aliis Ἰππογονατὶς, quia genu incumbit, vulgus rotulam & parellā appellat. Huius hunc usum agnoscimus, ut tibiæ & femoris articulum laxiorem firmet, ne ambulanti bus per declivia aut genu multum flectentibus luxatio in anteriora fiat, tum ut in rectum angulum genu flecti queat.

Tibia m.

Malleolus.

Fibula.

Rotula genu.

Rotula usque.

De ossibus extremi pedis. CAP. XXXVII.



EXTREMI pedis πόδες propriè ὄργανον μεταβατικόν, instrumentum progressionis, tres habet partes, ut manus, tarsum, metatarsum, & digitos. Tarsi ossa septem sunt, ex quibus quatuor propria habent nomina, tria nomine carèc. Primum ἀστέρι γαλός ἀστὴρος dicitur, Latinis talus, os ballistæ, ab imis tibiæ & peronæ processibus comprehenditur. Appellatur etiam τέτραρος, id est, quatrio, à quatuor ipsius lateribus, dextro, sinistro, antico, postico: Pars superior in medio caua, utrinque superciliofa, trochleæ similis est, inferior inæqualis est, ter gibbosa, bis cauata. Secundum ἡέριον, id est, os calcis, calx, calcaneum dicitur, omnium maximum & crassissimum, in quod trium musculorum tendines chordam efficientes inferuntur. Tertium à scaphæ & cymbæ similitudine σκαφοειδὲς, id est, os naviculare, habet in gibbosa parte tres superficies planis proximas. Quattum à forma cubi κν-

Tarsi ossa.

Astragalus.

Calcis os.

Naviculare. Cuboides.

Ροειδὲς dicitur, os tesseræ, quadratum est. Reliqua tria innominata sunt, à Fallopio ramen *χαλκοειδῆ*, quod cuneum referant, id est *cuneiformia* dicuntur. Metatarsus, quod *μεταίον* dicere malunt quidam, alij plantam, quinque ossibus constat. Eorum extrema appendicem habent cartilagine obiectam, estque eorum similis ferè ac metacarpij structura. Digitorum ossa quatuordecim tantum sunt, eadem acie disposita, excepto pollice, qui duobus tantum constat ossibus, reliquis terni sunt articuli. Connectuntur autem per *ginglymon*, suntque breuiora internodia quàm in manu, supernè gibba, infernè lima.

De sesamoideis ossibus. CAP. XXXVIII.



N manu & pedum internodiis, ossicula reperiuntur, quæ quia sesamini seminis figurâ eleganter exprimiunt, *σισαμοειδῆ* appellatur, vulgus ossa sesamoidea vocat. solida sunt rotundaque, sed aliquantulum depresso, & sub tendonibus digitos flectentibus, extendentibusque latent, ligamenti ita implexa, ut nisi in repurgandis ossibus accuratè cauere, ea cum ligamenti abiciantur. Eorum numerus incertus creditur. In manu enim alij duodecim, alij sexdecim obseruunt, alij multo plura. Ego ossicula hæc & in manu interna, & in externa deprehendi, sed in interna multo plura. In pollicis priore articulo, nullum os reperies: in secundo bina, in tertio vnicum. In reliquis quatuor digitis, ad primos quidem articulos bina, ad alios autem singulos singula inuenies, ita in manu interna erunt decem & nouem. In externa manu pauciora sunt minora & minus dura. In pedum digitis idem ferè est numerus. Vsum horum ossiculorum præcipuum hunc agnosco, ut firmetur articulus, & ita prohibeatur luxatio: Nam quæ internis manus articulis insunt ossicula, hos intro luxari prohibent, dum inanum vehemètiùs extendimus, quæ verò externis manus articulis sunt locata, ne in flexione extrema foras luxentur, impediunt. Sunt autem (ut eleganter obseruat Syluius) ita sita interna sesamoidea, ut digitos flectentibus sursum in ligamentum recurrant, nec amplius sint articulo opposita, ne flexionem extremam impedian. In pedum articulis quæ subsunt ossicula, eundem vsum præstare videntur, faciunt enim vt pes stantibus nobis & ambulantibus, etiam per aspera loca, sit firmior, & ne digiti lapidibus, vel re alia quauis altiore velut euerfi, dum stamus, aut ambulamus, promptè luxentur.

De osse hyoide. CAP. XXXIX.



S & A omnia aut esse continua, aut contigua voluit Aristoteles, cui nos cum Galenò assentimur: quæ enim per *ἀρθρον* connectuntur, contigua sunt, quæ per *σύνφυσιν*, continua. Ossis hyoidis extrema aliorum ossum extrema non tangunt; nulla igitur huius cum aliis articulatio esse potest, ideo nec in nostris celestis demonstratur, nec à Galenò libello de ossibus describitur. Quia tamen cum vicinis partibus mirabilem habet pectus carnes continuitatem, aligatur enim mento, sternò, scapulis, occipiti per musculos (quam *συνέφυσεως* speciem Galenus vocat *σύνσάρκασιν*) ne quid intactum & prætermisum à nobis videatur, huius ossis historiam breuiter enarrabimus. Os ergo ad linguæ ra-

Pedij ossa.

Digitorum ossa.

Ossa sesamoidea cur dicta.

Numerus ossiculorum incertus.

In manu interna sunt 19.

Vsum horum ossiculorum in manibus.

Vsum sesamoideum in pedum articulis.

Cur in seculo non describitur os hyoide.

dicem sitū Græcis ὀψίλοειδές aut λαμβδοειδές à figura T vel inuerso λ simili appellatur; ab aliis pharyngætron, os gutturis dicitur. Figuram eam obtinuit, vt liber & aëri, & cibis ac potibus pateat aditus. Solius linguæ & laryngis gratia constructum est, ideo musculorum linguæ & laryngis firmamentum dicitur; nisi enim huic ossi tanquam basi hæreret lingua, non posset tam variis & expeditis motibus angulæ ac murenę in modum agitari. Multis totum hoc os particulis cōstat, quarum media, quæ maxima est & latissima, basis dicitur, antica parte ad securitatem est gibba, postica linguam spectante caua. A basi hæc quatuor educuntur processus (cornua vocant) duo vtrinque; inferiores duo, breuiores, vnico osse constantes, & superiores totidem, graciliores, rotundiores, longiores, ossiculis nunc tribus, nunc quatuor inuicem colligatis, & ad stiloëidis radicem ascendentibus conflari. Desunt hæc aliquando, tuncque gerit eorum vicem vinculum validissimum. Est ergo solum hoc os pensile, & ab aliis separatum, musculorum tamen & ligamentorum opera vicinis partibus validè alligatum.

Nomina huius ossis.

Os ossis hyoidis.

Partes huius ossis.

FINIS LIBRI SECVNDI.

N iii



LIBER TERTIVS DE CARTILAGINIBVS.

VINCVLIS, MEMBRANIS, ET VILLIS.

HISTORIA ANATOMICA.

Quid cartilago. CAPVT I.



Cur de cartilaginibus post ossa differendū

Cartilaginis definitio.

Explicatio definitionis.

Efficiens causa

Eadem ferè cartilaginum quæ ossium natura. Cur non sentiant.

In quo differant os & cartilago.

QUIA ossa ferè omnia in primo ortu apparent cartilaginea, & cartilaginee quamplurimæ ætatis progressu siccæscientes evadunt ossæ. Quia etiam ossium omnium, præsertim mobilium, extrema cartilagine incrustantur, doctrinæ ordo postulat, ut ossium descriptioni eam subiiciamus quæ est de cartilaginibus. Cartilaginum autem naturam, usum, differentias omnes prius aperiā, deinde singulorum historiam enarrabo. Cartilago pars est similis, frigida & sicca, ex crassa seminis parte, quæ caloris vi concrevit, genita, ad motuum varietatem securitatēque, & ad externos impetus eludēdos. Partem esse similem, quia tota sibi est similis, minimūque eius fragmentum totius naturam, temperiem & nomen retinet, omnibus est notum. Hæc, si Galeno fides habenda, in numerum earum partium debet ascribi, quæ à seipsis reguntur, nec aliorum gubernationi præfunt. Frigida est & sicca, ab exhaustu humidi & calidi vanescentis inopia, ideoque etiam dura, sed minus quàm os. Materia, seminis est crassamentum. Efficiens, calor, procreatricis facultatis (cui alteratrix & formatrix inferuiunt) immediatum organum, non extendens, ut in membranis, nec perforans, ut in venis arteriisque, sed cogens. Finale causam exprimit ultima definitionis particula. Licet enim varij sint cartilaginum usus, ut posthac demonstrabitur, sunt tamen hi duo præcipui, ossium diarthrosi iunctorum motus faciliores, securiores, diuturniores reddere, & ab iniuriis foris occurrentibus subiectas partes tutari. Non est cartilaginis & ossis natura valdè dissimilis. Nam Aristoteli, quæ animalia ossibus carent, illis cartilago ossiū vicem gerit. Temperiem ferè eandem obtinuerunt. Sensu etiam carent, ne sit animal in *ἀναισθητῶν*, & quia per eorum substantiam nervi non sparguntur. Ut autem in ossium genere quædam sensu prædita sunt, ut dentes, ita cartilaginee quædam sentire videntur, ut palpebrarum, quia exigui nervuli eas attingunt. Distinguntur tantum κατὰ τὸν καὶ μᾶλλον, secundum magis & minus, duriora enim sunt ossa, sicciora & frigidiora. Differunt etiam, quia cartilaginee omnes pellucidæ sunt, læves & politæ: ossa autem quamplurima inæqualia & aspera. Sed & nullam habent medullam cartilaginee, ut nec cavitates, nec cauernulas ossium instar, quia cum non eadem sit crassities, soliditasque, faciliè illorum substantiam permeat alimentum. Est autem cartilago mediæ naturæ inter os & ligamentum, osse quippe est mollior, & ligamento durior.



CARTILAGINIS varij sunt vsus iique mirabiles. Primus & communissimus, vt ossium laxa articulatione iunctorum motus iuuet. Eius enim opera & faciliior est, & securior, & diuturnior motus; faciliior quidem, quia læuis & polita cum sit, ossium asperitates læuigando, lubricandóque eorum capita ad motum propriora reddit; vnde fit vt mobiles omnes articuli cartilagine incru-

Præf. cartilaginum.

Primus ad motum. Faciliior est motus.

stentur, & ossium capita ac sinus qua parte sese tangunt læui cartilagine illinantur. Securius est etiam motus, quia ossium sinus adauguet cartilago, ne promptè luxetur articulus, vt in articulatione humeri cum scapula & aliis plerisque cernere licet. Tandem cartilaginis interiectu conseruatur motus & diuturnior fit; ossium enim extrema cum sint durissima, mutuo contactu & vario eo motu contererentur, atque ita cessaret aliquando motus, nisi cartilagine molliore obducerentur. Secundus cartilaginis vsus est, vt extrinsecus occurrentes iniurias imperiusque cōtundentes, quassantes, frangentes, molliter cedendo eludat; cum enim sit mediæ naturæ inter durissima & mollissima, non facile comminui & rumpi potest, vt dura & friabilia, nec facile aut incidi, aut contundi, vt mollia & carnosa. Sic multoties ossium extrema externis iniuriis exposita, cartilagine habuerunt, vt nares & aures, & hi quidem sunt meo iudicio cartilaginis vsus duo primarij. Sunt & alij quamplures; nam cartilagine quædam ossium instar aliquas partes sustentant, iis & musculi affiguntur, & vasa firmanantur: eiusmodi sunt laryngis & arteriæ asperæ cartilagine, nec non palpebrarum, quibus tanquam firmioribus scopulis pili parui infiguntur. Quartus additur vsus, vt sint velut propugnacula ad subiectas partes tuendas, sic sterni & costarum cartilagine, ad cordis pulmonumque defensionem, & ad faciliorem motum, vt thoraci sese contrahenti, distendenti que facilius obsequantur, constructæ sunt; sic cartilago ensciculata ad diaphragmatis & oris ventriculi dum distenditur tutelam constructa creditur. Quintum, collige ex Galeni libello de ossibus, vt per eam ossa quædam glutinis instar coalescant. Sic ossa pubis & genæ inferioris interiectu cartilaginis vniuntur, eaque symphyseos species, synchondrosis appellatur. Sextum proferam ex Gal. xj. de vsu partium, vt ossa dura & densa cum laxis & raris iungat. Sic enim cauernulas ossis laxi resatcit, & asperitates læuigat. Sunt denique peculiare cartilaginis vsus quamplurimi, vt alię visioni, alię auditui, alię odoratiui, alię deglutioni, alię respirationi, alię apprehensionī, alię progressionī inferuiāt, vt in peculiari cuiusque historia declarabitur.

Securitas motus à cartilagine.

Diuturnitas motus à cartilagine.

Secundus vsus.

Tertius vsus.

Quartus.

Quintus.

Sextus.

Peculiare vsus multi.

De cartilaginum differentiis. CAP. III.



CARTILAGINVM differentiæ, vt & ossium, sumi debent à substantia, magnitudine, figura, situ, vsu, connexionē. A substantia, vel potius his quæ substantiam consequuntur, duritiæ, & mollior. Cartilagine, aliæ sunt duræ, quæ tandem euadunt ossæ, vt quæ laryngem efformant; alię mediocres, quæ nunquam in ossis naturam degenerant, vt epiglottis; aliæ molles articulos colligantes, & ligamentorum naturam referentes *χονδροειδεις* vocant. A magnitudine, aliæ parvæ sunt, aliæ magnæ. A figura multiplici varia etiam sortiuntur nomina cartilagine: sic ensciculata, anularis, scutiformis, aritenoides cartilago appellatur.

Differentia.

1. A substantia.

2. A magnitudine.

3. A figura.

4. *Ad situ.*
5. *Ad vfu.*

6. *Ad vfu.*

7. *Ad vfu.*

A situ supernæ, infernæ, anticæ, posticæ, internæ, externæ, dicuntur. Ab vfu varias collige differentias, prout varij sunt vfus iam explicati; aliæ motus gratia constitutæ sunt; aliæ ad externos impetus eludendos; aliæ ad quarundam partium utilitatem; aliæ solius fulcri gratia. Quæ à connexionem sumuntur differentię magis sunt necessariae, ideóque paulò accuratiùs explicandæ sunt. Cartilago vel ossibus connascitur, vel solitaria est, id est, partem per se constituit. Quæ connascitur, vel ossa inuicem connectit, idque aut interiectu communium ligamentorum, vt in extremis ossium quæ per diarthrosin connectuntur: aut immediatè, vt in ossibus pubis & sterni, vel ossibus tantum appèditur, vt nasi cartilago, xyphoides & quæ coccygi connascitur. Quæ autem cartilago ab ossibus non dependet, partem per se constituit, & solitaria dicitur à quibusdam. Talis est ciliorum, laryngis, artienæ asperæ, auricularum cartilago & epiglottis. Ego facilioris doctrinæ gratia, totam cartilaginum historiam ad tria summa capita refero, vt aliæ sint capitis, aliæ trunci, aliæ extremorum: capitis cartilagines sunt aurium, nasi, palpebrarum, maxillæ inferioris. Truncus *τεμεως* est, id est, *tripartitò* diuiditur, in spinam, thoracem, & os innominatum: spinæ partes sunt ceruix, dorsum, lumbi, sacrum os: ceruicis seu colli cartilagines sunt aut posticæ, quæ vertebrae connectunt, aut anticæ, larynx, arteria aspera, epiglottis. Thoracis cartilagines in extremis costarum & sterni conspicuæ sunt. Extremorum cartilagines sunt, tum excipientium, tum receptorum ossium, aliæ manus, aliæ pedis.

Peculiaris cartilaginum descriptio: ac primum de palpebrarum cartilaginibus.

CAP. IIII.

Palpebrarum
cartilagines.

Cur cartilagineæ
suerint.



ALPEBRÆ à palpitando sic dictæ, Græcis *βλέφαρæ*, quasi τὸ τῷ βλέψας φᾶρος, hoc est, *visus tunica, operculumve*, ὁμαλόφουλα καὶ καλύμματα, Aristoteli *ἔλντορες*, quod sint oculorum tegumenta & folia, maxima ferè ex parte sunt cartilagineæ, tum ad motum faciliorem, sit enim cartilaginis opera æquabilis, oculorum apertio, occlusioque, tum vt foris occurrentibus iniuriis obstant; tum vt illis tanquam firmioribus scopulis pili parui infigantur, qui externorum occursum prohibeant, si molliores fuissent palpebræ ex carne sola aut membranæ contextu, leui de causa conciderent. Mollia enim citò flaccescunt. si duriores & ossæ, non ita facile mouerentur, & sua duritie interiores oculi tunicas quæ sunt exquisitissimi sensus læderent: cartilagineæ ergo sunt, & debuerūt esse, sed cartilago illa tenuis est, tum ad leuitatem, tum vt externi luminis exiguam vmbra transmittat. Cartilagines hæ ab ossibus liberæ sunt & figuram habent semicircularem, eas autem inuestiunt intus quidem membranula, foris verò cutis. Geminæ sunt, superior & inferior. Illa maior homini & iis animalibus quibus inferior manet immota, aui- bus contrà inferior superiori est maior. Vtraque cartilago exigua habet foramina ad pilorum exortum, qui eleganti ordine dispositi *ταρσοι* dicuntur, vnde etiam ab illa pilorum serie remorum in longis nauibus similitudinem referunt: has cartilagines *ταρσῆς* vocant. Est & cartilago quedam in maiore oculi angulo sita, trochleæ figuram & vsum referens, quam primus eleganter descripsit Fallopius. Hæc canalem habet, per quem musculi oculum in orbem mouentis chorda currit, de qua fusius in oculi historia.

Figura
Geminæ sunt.

Cartilago trochleæ
similis
in magno oculi
angulo.



EXTERNÆ aures auriculæ dictæ mediam inter ossa & carnes naturam obtinuerunt, cartilagineam quippe & paucò sanguine irrigatam. Si enim fuissent ossæ, leui de causa frangerentur & dormienti animali essent impedimento: si molles & carneæ, non seruarent figuram fornici, vel conche, ætisque ingressum prohiberent, facile enim concidit caro, contuditur, nec sonum repellit. Quia ergo sunt cartilagineæ, & occurrentium eludunt impetum, & cauum satis amplum efformant, quod irruentis æris, si fortè audienti meatum præterfugerit, sonum excipit. Sic Hadrianus Imperator vt acutiùs audiret, manus cauas auribus obtendebat: & quibus ex vulnere, aut alia quauis de causa præcisæ sunt aures, ij sonos & articulatas voces fluitantis aquæ aut resonantis cicadæ in modum exaudiunt. Sunt cartilaginee hæc supernè crassiores & duriores, intus extrâque partes habent tum limas, tum gibbas. Tota earum circumuolutio $\epsilon\lambda\iota\zeta$, id est, *voluula* dicitur.

Cur aures cartilagineæ.

Res aurium larem.

De nasi cartilaginibus. CAP. VI.



NASI extrema sunt cartilaginea, vt commodiùs emûgi, vt faciliùs inspirantibus nobis dilatari & expirantibus scdòsque odores auersantibus celerius occludi, vt denique externos impetus quassantes contudentesque tutius effugere possit. Cartilaginee nasi quinque sunt, duæ elatiore, nasi ossibus asperis adnatæ, & tres inferiores, quarum duæ laterales inter respirandum mobiles $\pi\epsilon\rho\upsilon\gamma\iota\alpha$ Græcis dicuntur, Latinis autè pinnæ, Rufo $\upsilon\pi\eta\gamma\alpha\iota$; media verò septi modo utramque discludens $\delta\iota\alpha\phi\epsilon\rho\gamma\mu\alpha$ nuncupatur.

Cur tres cartilagineæ.

Nasi cartilagineæ quinque.

De epiglottide. CAP. VII.



ARTILAGO elegans est & figura & vsu, quam Græci $\epsilon\pi\iota\gamma\lambda\omega\tau\iota\delta\iota\alpha$ dicunt, Hippocrates $\kappa\lambda\iota\sigma\tau\epsilon\rho\upsilon\varsigma$ vocat, Latini laryngis operculum, opertorium causæ pulmonis, minorem linguam & lingulam, quia linguæ formam refert, licet veriùs epiglottis dicatur, quia laryngis rimæ incumbit, quam $\gamma\lambda\omega\tau\iota\delta\iota\alpha$ Galenus appellat, est enim $\gamma\lambda\omega\tau\iota\varsigma$ rimula ex duabus arytænoideis pro celsibus efformata, ligulæ similis, quam ex arundinum laminis inuicem compactis tibiis accommodati videmus; hæc ad vocum modulationem mirum in modum confert, & Galeno præcipuum creditur vocis instrumentum. Epiglottis ergo glottidi incumbens, hederæ folium exprimit, ex lata & ampliore basi in mucronem non valde acutum sensim desinens. Basis in superiore & interiore tiroides cartilaginis regione visitur, mucro ad palatum vergit. Cartilagineum porro debuit esse hoc operculum, non osseum, nec membraneum, vt celerrimè deprimi, dum cibi & potus in ventriculum illabuntur, & statim erigi ad æris inspirationem possit: mollis, vt carnosa & membranosa facile quidem concidunt, sed semel depressa difficile attolluntur; ossæ semper erecta manent; cartilago vtrumque præstat commode. Sunt huius cartilaginis vsus duo; alter, vt laryngem operiat, ne in epulando tibi & potus in arteriam & pulmones ferantur, alter, vt ærem à pulmonibus vi &

Epiglottidis forma.

Quid propriè glottis.

Epiglottidis figura.

Cur epiglottis cartilaginea.

Epiglottidis vsus duplex.

impetu pulsus percutiat ad vocis modulationem. Cartilago hæc inspirantibus nobis & expirantibus semper hiat, neque vnquam sponte deprimitur, vt voluerunt quidam, sed solo alimenti pondere, non tamen ita exquisitè obseratur in deglutione, quin portiuncula quædam potius per rimam in arteriam asperam deeret.

De laryngis cartilaginibus. CAP. VIII.



*Cuius larynx
cartilagineus.*

T epiglottis laryngem operit, ita larynx arteriæ asperæ operculum & caput dici consuevit. Laryngis historiam integram, vt & arteriæ asperæ libro de organis spirabilibus describemus, hic cartilaginea tantum persequimur. Laryngis ergo corpus ferè totum est cartilagineum, tum quia organum est spirandi (debet itaque ingredienti & egredienti aëri semper patere,) tum quia vocis est instrumentum, at quod sonat læue, id est, politum & solidum esse oportet, quia vox aëris est percussio, non frangitur autem aër nisi ad solidum, durum & læue. Tribus constat cartilaginibus, aut potius (si verum amamus) quatuor, quæ ita connectuntur, vt earum opera dilatari & constringi, claudi & aperiri facile possit. Primam latissimam & maximam *ὑποειδῆ* vocat, id est, scutalem & scutiformem, quod referat scutum quadratum; anticam etiam dicunt, quod anteriori tantum parte sit sita, foris est gibba, intus caua: hæc gemina interdum est præsertim mulieribus, quibus non ita vt viris antrorsum prominet. Secunda veteribus in nomen recentioribus *κακοειδῆς*, id est, *annularis* dicitur, quod similis sit Terciam annulo, quem dextro imponunt pollici dum sagittas iaculantur, hæc ima & antica parte angustior, posteriore latior est, annuli palam referens, basis est reliquarum, & cum tota sit circularis, apertam seruat fistulam, impeditque ne in laryngis motibus reliquæ, quæ sunt semicirculares, comprimantur. Tertiam *ἀρυστοειδῆ* vocant, quod vasis figuram referat, quo abluendis manibus aquam effundimus, aut vasculi oleacei os imitetur, id enim denotat *ἀρύταινα*; postica etiam dici potest, quod posteriore parte sit sita. Ea Anatomicis ferè omnibus simplex creditur, sed nobis semper gemina visa est. Eius partes membranarum & vinculorum opera connectuntur, & simul iunctæ eam efformant rimam, quæ voci modulandæ accommodata est, & propriè *γλωττις* dicitur. Hæc vocem acutam & grauem præcipuè facit, adiura tamen epiglottide arytenoidem magis minùsve claudente. Erat porro Columbus dum cartilagines has in ossium adscribit numerum, nam licet in senibus quibusdam appareant ossæ, reliquo vitæ tēpore sunt cartilagineæ.

*Quatuor consti-
tuit cartilagi-
nibus.
Scutiformis
cartilago.*

Annularis.

Arytenoides.

Error Columbus

De aspera arterie cartilaginibus. CAP. IX.



*Cuius arteria
cartilaginea.*

*Cuius cartilagi-
nes integram
non absoluunt
circulum.*

A RTERIA aspera vocale organum & spirabile, quia fistulæ instar aërem in pulmones deducit, & fumidos vapores spirituum recrementa ab eodem excipit, magna ex parte cartilaginea constructa est, vnde *τετραχῆα* dicitur, quod cartilagineis annulis sit asperata: cartilago namque ad vocem edendam aptissimum est instrumentum, quia mediam inrer durum & molle naturam obtinet: molliora præ imbecillitate aërem remissiùs percutiunt, duriora faciliè ipsum euerunt. Cartilagines hæc annuli figuram exprimunt, sed integrum non absoluunt circulum, nam posteriore parte, qua œsophagum tangunt, in membranas desinunt, vt

femicirculares sint earumque figura literam C repræsentent, vnde *στυμοειδής* dicuntur. Feruntur autem non ad iugula tantum, vt somniant quidam; sed cum toto arteriæ canali & ramis in vniuersam pulmonum carnem diuariantur, aerem deferentes. Cur autem cartilaginee hæc citulum non perficiant, id factum puro, tum ne arteriæ duritiæ læderetur œsophagus, tum vt liberior esset deglutitio; dura enim, aspera & intracta sæpè deuoramus, quæ noxam afferrent nobis, nisi arteriæ, œsophago cederet. Obiiciēs, laryngis corpus totum esse cartilagineum, œsophago tamen non esse impedimento. Sed vide quàm sit dispar ratio. Nam in deglutitione deorsum trahitur œsophagus, larynx verò sursum recurrit, itaque eorum partium situs mutatur, vt œsophagi quidem initium ad asperam sit arteriam, larynx verò sursum ad fauces recurrat. Sunt porro semicirculares tantum superiore parte ad iugulum vsque, nam ubi œsophagum non tangunt, & ad pulmonem feruntur, circulum absoluunt, quia oportuit in pulmonibus semper arteriam patere, ad aeris tractionem expulsionemque.

Obiectio.

Solutio.

De spina cartilaginibus. C A P. X.

IN spina cartilaginee multæ sunt, ad firmiorem articulationem & faciliorem motum. Cervicis omnes vertebrae supra, infraque cartilaginee habent, si primam exceperis. Dorsi vertebrae eodem se habent modo, vt facilius torqueri & inflecti possit, nec dispar est laborum ratio. Ossis sacri cartilaginee reliquis duriores & sicciores sunt, quia totum hoc os est immobile. Est autem ossis sacri extremum cartilagineum, & coccyx dicitur. Figuram habet rostri cuculi modo ex lato angustatam & incuruatam. Firmat rectum intestinum, & vteri ac vesicæ ceruicem. Parturientibus flectitur in posteriora, non sine magno dolore.

Cervicis & dorsi cartilaginee.

Coccyx.

De thoracis cartilaginibus, & Xiphoides. C A P. XI.

IN THORACIS partem aliquam decuit esse cartilagineam, vt inspirantibus & expirantibus nobis facilius obsequeretur. Sternum ergo suprema & ima parte cartilagineam habuit. Suprema parte inter primum & secundum os cartilago apparet, ligamenti vicem getens, inferna verò conspicua est illa, quam xiphoidem vocant, aut ensiculatam, alij mucronatam, scutiformem, Arabes malum granatum. Varia est huius cartilaginee forma, non enim semper est acuminata, sed non raro in fine lata & sæpè bifida apparet, vnde furcella à quibusdam dicitur, sæpè rotundam vidimus, epiglottidis instar, aliquando minorem partem maiori incumbentem habet, vt hypoglossi folium. Hæc media sui parte foramen habet exiguum, quod pauci obseruauerunt, transmittendis neruo & vena dicatum. Cartilaginee huius idem est vsus qui reliquarum, ossium finibus appensarum; vt scilicet sua mollitie rerum extrinsecus occurrentium iniuriis cedendo resistat, subiectasque partes tueatur. Sunt qui ad diaphragmatis, quod eo loco nerueum est, propugnaculum constructam velint, alij ad oris ventriculi tutelam, ideoque cartilagineam hanc introflexam os ventriculi premere, vnde nausea. Rident Neoternici quidam postremum hunc usum, quia distate volunt longo intervallo ab ore ventriculi quod dorso applicatur, sed falsum est in viu entibus ita distare. Nam &

Cur thoracis pars cartilaginea.

Xiphoides.

Figura.

Foramen in media xiphoides à paucis obseruatum. Vfus xiphoides.

Contra recentiores de vfu huius cartilaginee.

*non decidit
hæc cartilago.*

vomituri dolorem sentiunt ad hanc cartilaginem, & Hippocrates sect. 3. lib. de articulis, istam ventriculi ad partes anticas distentionem agnouit, cum dixit ventris repletionem esse directionem costarum fracturarum. Quinetiam in coacis os ventriculi sternum appellat, dum sterni morsum & amarorem dicit. Cæterum absurdum est, quod aniculæ iactitant, cartilaginem hanc decidere & obmurmuratis precibus vel attrectationibus in suum locum restitui. Costæ singulæ suas habent cartilagines, & postica parte qua vertebris articulantur, & antica qua sterno committuntur; sed antica posticis maiores sunt & crassiores, quia anterior thoracis pars distenditur contrahiturque. Spuriatum item costarum cartilagines longiores sunt quàm verarum.

De articularum cartilaginibus. CAP. XII.

Cartilago maxillæ inferioris

Claviculæ

Scapulæ

Cubiti.

Pubis.

Femoris.



Nomni ferè articulatione cartilagines reperiuntur, ad facilitatem & securiorem motum comparatæ. In maxillæ inferioris articulo cartilago est lubrica & mobilis, quæ impedit ne temporum & maxillæ ossa mutuo attritu minuantur, aut nimio labore fatigata tandem moueri desinant. Claviculis duæ insunt cartilagines, altera cum scapulæ acromio, altera cum sterno iungitur ad brachij & pectoris expeditiorem motum. In scapulæ cavitare cartilaginem apposuit Natura, quæ ossis sinum adauget, ne in violentis motibus tam faciliè luxetur articulus. In cubiti parte inferna, quæ acutum habet processum, cartilago apparet vacuum implens locum. Prohibet ne manus, dum ad latus ducitur, in acutam illam apophysin impingat. Inter ossa pubis cartilago est crassissima & durissima, ea ita vniens, ut in partu disiungi non sit credibile, ut suo loco demonstrabitur. In ischij cavitare cartilago est sinum adaugens. In femoris capitibus infernis duæ reperiuntur semicirculares sinuum supercilia amplificantes. Denique vix vlla datur articulatio, quæ non cartilagine incrustetur, ut faciliior, securior, & diuturnior sit motus.

DE LIGAMENTIS.

Quid sit ligamentum. CAP. XIII.



OS A vniuersi corporis molem firmantia & fulciantia, ad animalis (cuius essentia in sensu, motuque est posita) perfectionem variè moueri debuerunt, ut autem faciliior esset motus, læui cartilagine ossium omnium extrema lubricauit sapiens Natura. Eadem nunc articulationis & motus securitati consulens, singula arctissimis firmissimisque vinculis colligauit, quæ ea non sistant motus agitatione diuelli. Ossium mirabilem structuram & cartilaginum singulate artificium iam descripsimus, nunc ligamentorum contextum explicare placet. Ligamenti acceptio duplex est, altera amplior, pressior & angustior altera; fusiore significato quidquid partem partem colligat ligamenti nomine dignamur. Sic membranæ omnes vincula dici possunt, sic cutis Hippocrati *ἀντὶ τῶν ἑσθῶν* & *καρνεὶ*, & carnes libro de ossium natura *πάρταρ ἑνὸς ὅσιν* omnium exhibent colliga-

Ligamenti acceptio duplex.

tionem: sic venæ, arteriæ & nervi sæpe à veteribus ligamenta appellantur communia. Pressiore & proprio significaro ligamentum appello corpus satis durum & firmum, laxum tamen & flexibile, sensu vacans, quod articulos circumligat, devincit, continet. Huius non illius naturam hîc inquirere consilium est. Ligamentum ergo propriè dictum, Græcis σύνδεσμος, Latinis copula & vinculum dici cōsuevit. Hippocrates & Galenus inrerdū νῦν ἐξ vocār. Ille quidem libro de locis in homine, dum hæc scribit. τὰ δὲ νῦν ἐξ ἀνέχουσι τὰ ἄρθευ καὶ πρὸς τὰς ὀστέων σφύξεις. id est, nervi colligāt articulos & ossibus adherēt. Hic verò dum libello de ossibus eam symphysys speciē, quæ fit per ligamēta, appellat συνέφυσιν. Ligamēti natura brevis hæc patefaciet definitio. Ligamentum pars est simularis frigida & sicca; mediā inter neruū & cartilaginē naturā obtinens, ex seminis portione lēta caloris vi genita, varios in colligādo, continendo, tegendo & musculis cōstituendis vsus pręstās. De ligamenti tēperie, quæ forma est simularis partis, cōuenit inter omnes, frigida enim est & sicca, licet peculiaria articularū ligamenta mucoso quodā lenroque humore oblinantur, de his verò quæ eam comitantur, consequuntur, eique accidunt, dubitarunt quidam; sequuntur tempetiem durities, mollities, accidunt autem sensus motusque. Nos ligamenta mediæ esse naturæ inrer cartilagine & nervos putamus, duriora enim sunt nervis, ne in vehementioribus motibus disrumpantur, & molliora cartilaginibus, vt musculis ossa mouenibus facili obsequantur. Sunt autem ferè omnia insensilia, tum quia nervos non excipiunt, tum quia ob perpetuos eorum motus semper tristis & quæula animalium vita fuisset. Quod si obiciat argutiolus quidam ex Galeni lib. 3. de facultat. naturalibus, ligamenta ex fibris sensibilibus constare; hoc illi responsum dabo, per sensibiles, non sensitiuas, sed sensui conspicuas intellexisse: nihil ergo hæc mutantur à cerebro, qua de causa nec sentiunt, nec seipsa mouere possunt. Cæterum, vt inter ossa dentes sentiunt, & inter cartilagine eæ quæ palpebras cōstituunt sensu prædita sunt, ita in ligamentorum genere dantur quædam tactu sensus prædita: eiusmodi sunt ligamenta duo penem constituenta & linguæ frenum. Matéria ligamentorum seminis est portio lenta & ductilis, quæ caloris vi tensionem facili admittit; vnde fit vt & in angustum adduci, & relaxari possint. Eorum potrò alimentum non puto esse medullam, vt voluerunt quidam, sed sanguinem per capillares venas delatum, quæ ob exilitatem, oculorum aciem effugiunt. Vfus ligamentorum, qui finalis causę rationem habet, tandem exprimitur; aut enim colligant pârtes, aut continent, aut tegunt, aut musculos efformant, vt sequenti capite declarabitur.

Proprium ligamentum significatur.

Ligamenta nervi appellantur.

Ligamenta sunt.

Cur insensilia sunt.

Obiectis.

Solutis.

Materia ligamentorum.

Alimentum ligamentorum.

Vfus ligamentorum omnes explicantur. CAP. XIII.

LIGAMENTORVM varij sunt vsus. Primus, sique communissimus, vt ossium & cartilaginum articulationes præsertim laxiores firmenr, & luxationem impedianr. Periculum enim erat ne motu violēto ossa seiugara distraherentur, nisi prudens Natura arctissimis vinculis eorum extrema colligasset; quæ vsum hunc præstant, aut communia sunt vndique articulum cingentia, aut priuata. Illa tenuia sunt & membranosa, hæc crassiora sunt & ferè rotunda. Secundus vsus est, vt ossa ipsa etiā, qua parte non articulantur, devinciāt. Sic radius cubiro & tibiam per one qua interhiant hæc ossa & spondylorum spinas colligāt tenuia quædam ligamenta. Tertium vsum agnoscit Galenus, vt indumentis instar

Primus vsus ligamentorum.

Secundus.

Tertius.

*Quartus.**Quintus.**Sextus.
Septimus.**Octauus.
Nonus.*

extrinsecus apponantur ad tendinum tutelam; sic tendines digitos flectentes & extendentes secundum longitudinem vinculis, membranisque reguntur. Quartum adde, vt tendines suis contineant locis, eos firment & tutò transmittant, tabia sunt transuersa illa carpi, anulo cuidam similia, ideòq; anularia dicta. Quintus est, vt inter os & tendines interiecta prohibeant, instar strati, quominus tēdo ab ossis duritie ledatur. Sextus, vt musculos dextros à sinistris, anticos à posticis aliisque partes discriminēt, vti in cubito & radio tibia & perone cernere licet. Septimus, vt augeant non secus ac cartilagine ossium acetabula. Octauus, vt viscera suspendāt ne pondere nimio decendant, alia sunt hepatis, vesicæ, vteri ligamenta. Postremus, vt ad musculi structuram concurrant, ex fibris enim nerui & ligamenti inuicem permixtis fit tendo.

Differentia ligamentorum. CAP. XV.

*Differentia
prima.**Secunda.**Tertia.**Quarta.
Quinta.*

DIFFERENTIÆ ligamentorum perendæ sunt à substantia, magnitudine, figura, situ, ortu, insertionē, vſu & partibus præcipuis. A substantia, alia sunt mollia, alia dura, alia membranosa, id est, membranis similia, quia lata, alia nervica neruorum instar rotunda, alia cartilaginea, quæ ideo *νευροχονδρῶδη* dicuntur. A magnitudine, alia parua, alia magna, alia lata, alia angusta. A figura, alia lata, alia rotunda, alia cōtinua, alia perforata, alia transuersa & annularia, alia longa. A situ, superna, inferna, dextra, sinistra, antica, postica. Ab ortu & insertionē elegans est diuſio, alia ab ossibus oriuntur, alia à cartilaginibus, alia à mēbranis, quæ ab osse oriuntur, aut in os inferuntur, aut in cartilaginem, aut in musculorum capita, aut in aliam partem. Quæ ab osse orta in os inferuntur, alia firmant articulos, alia ossa ambo sine articulo colligant, alia tendines muniunt & induunt. Quæ ab osse nata, in cartilaginem inferuntur, apparēt in genu, vnum à condyli interni radice interna, alterum illi subditum. Quæ in musculorum capita inferuntur, varia sunt: sunt quæ ab ossibus enata in alias partes feruntur, vt gemina illa maximam penis partem constituentia, ex ossibus pubis orta. Ligamēta quæ à cartilaginibus oriuntur, alia in cartilagine inferuntur, vt quæ laryngis cartilagine connectunt, quæ sunt in imo sine cōccygis, & quæ bronchia arteriæ colligant. Alia in musculorum capita inferuntur, vt quæ in proprios laryngis musculos feruntur. Quæ à membranis nascuntur vincula, pauca sunt. Ab vſu varias collige differentias, vvarij sunt vſus iam descripti. Postremò, à partibus præcipuis hæc sumi poterit ligamentorum diuſio, instituto nostro valdè accommodata, vt alia sint capitis, alia thoracis & dorsi, alia extremorum.

*Sexta.**Septima.*

LIGAMENTORVM PARTICVLARIS HISTORIA.

De ligamentis capitis. CAP. XVI.

*Capitis ligamēta tria.
Primum.*

CAPITIS ligamenta, alia sunt totius, alia partium, vt maxillæ tam superioris, quàm inferioris. Totum caput super prima & secunda vertebra mouetur, debuit ergo arctissimis vinculis colligari, aliqui periclitaretur tam nobile membrum, laxæ articulationi commissum. Ligamenta hæc tria sunt in genere, quæ in plures particulas diuidi possunt. Primum maximum & latum, primam vertebra capitis connectens, totum articulum in orbem cōplectitur, duas habet por-

tiones; altera, crassam membranam referente, ad internam primæ vertebræ partem fertur; altera, extemum articulum ambit. Oritur à basi occipitis, quæ ideo exasperatur & in recens natis multifida est. Aliud ligamentum apophysin secundæ vertebræ dentiformem capiti alligans, tribus constat particulis; duæ ab externa dentis sede ortæ in coronas occipitij internas inferuntur; tertia nervi instar rotunda ab anteriore dente enata, in foramen amplissimum medullæ sacre dicatum desinit, eique adhæret validè. Tertium ligamentum nervi figuram referens, & miro artificio contextum, primæ vertebræ cavitatem denti suscipiendæ dicam circumdat, & processum pyrenoidi constringens, ita eum firmat, vt in neutram partem inclinè, medullam etiam tuetur, ne nudo & errabundo ossi occurrens lædatur. His tribus addunt recentiores quartum, quod extra & intra obductum, secundam vertebram cum prima deuincit. Maxillæ superioris ligamenta inter suturas & harmonias, tenuia sunt & membranosa, ad musculorum exortum cōstruēta, ab illis enim musculorum faciei & vicinarum partium tendines oriuntur. Inferiorem verò genam cum osse temporum, colligat ligamentum commune, membraneum, totum articulum obuoluens.

Secundum.

Tertium.

Ligamenta
superioris ma-
xillæ.
Inferioris ge-
næ vincula.

De ligamentis ossis hyoidis & linguae. CAP. XVII.



MAIORIBVS ossis hyoidis processibus, ligamenta duo oriuntur, quibus summa linguae pars deuincitur. In ossis eiusdem cornua duo alia inferuntur, quæ totum hoc os cum suis musculis ita suspendunt, vt huic velut basi lingua innitatur. Est & proprium lingue vinculum satis validum, cuius auxilio suffulta lingue molities, facilius vibrari ac produci potest. Hoc ad dentes vsque anteriores exporrigitur, & nisi obstetricis manu perfringeretur, vix voces articulas proferre possemus.

Ligamenta
hyoidæ.Ligamentum
linguæ.

De spinæ & thoracis ligamentis. CAP. XVIII.



SPINÆ varij sunt motus; vinculis ergo vertebræ colligari debuerunt. In vertebra, & corpora, & apophyses obseruantur, ligamenta itaque duorum sunt generum; alia vertebrarum corpora, quæ superna & inferna parte epiphyfes habent cartilaginibus obductas, connectunt; referunt hæc lunarem figuram, suntque fibrosa, crassa, mucosa & valida, vt violentos motus & grauissima pondera perferre possint. Alia à processibus oriuntur, tum transuersis, tum acutis; transuersis quidè, ob musculorum & costarum compagem; acutis verò, vt vertebræ firmitus colligentur. Talia autem spondylorum spinas deuincientia, à supernæ spinæ medio quodam canaliculo exorta, & in supposito spinæ velut lineam quandam inserta, eas continuant tanquam vnum os esset. Thoracica ligamenta varia sunt. Costæ enim quæ parte cum vertebra articulantur, validis & ferè cartilagineis connectuntur, quæ à vertebrarum transuersis processibus enascuntur. Quæ verò parte cum sternō articulantur, ligamenta habent tenuia. Pectoris item os cum clauiculis alligatur proprij ligamenti interiectu.

Spinae lig-
menta.Thoracis lig-
menta.

Brachij &
omoplate li-
gamenta.



BRACHIVM cum omoplate ligant vincula communia & propria. Communia vndique articulum cingentia tenuia sunt & membranosa. Propria crassa & rotunda quatuor sunt, vnumlatius à fine acromij in finem coracoidis; alterum angustius & brevius, à radice acromij, in radicem coracoidis. Duo reliqua bicipitis musculi maximam partem constituunt. Oriuntur, alterum

Cubiti & ra-
dij vincula.

ex coracoidē processu, alterum à scapulæ acetabulo. Brachium cum radio & cubito ligant communia ligamenta. Cubitus autem & radius superna infernaque parte qua interhiant, tenuia habent vincula. Est & ligamentum membranetum secundum ossis vtriusque longitudinem extensum, inernos & flectentes musculos ab externis & extendentibus septi instar discriminans.

De ligamentis carpi & digitorum. CAP. XX.

Carpi liga-
menta.



N carpo duo obseruamus genera ligamentorum, alia ossa colligant rantum, alia articulationi non inseruiunt, sed firmandis, munientis, & tutò transmittendis tendonibus sunt dicata. Illa ab inferiore radij & cubiti processu orta, in octo carpi ossicula duobus distincta ordinibus, sese ita insinuât, vt eorum articulationē compactam firmamque seruent. Hæc duo sunt, alterum internum, alterum externum, ambo transuersa. Inernum ab osse carpi pollicem spectante, transuersim ad os carpi minimum digitum attingens fertur, annulo cuidam simile, continet musculorum digitos flectentium tendines, ne dum contrahunturè propriis sedibus exiliant; externum, musculorum extendentium tendines continet. Hæc porro transuersa & annularia vincula, licet vnum videantur esse, sitamen accuratiùs intuearis, sex esse comperies. Habent & singuli digiri, sua ligamenta parte interna, secundum longitudinem ducta, velut canalem quandam referentia, quæ tendines continent & alligant digiris. Hoc ligamentorum genus membranam vocare potes duram, vel ligamentum membranofum.

Interna vin-
cula.

Externa.

Digitorum
ligamenta.

De ligamentis ilij, pubis, femoris, tibiae. CAP. XXI.

Ilij ligamēta.



LI V M ossa cum sacro colligant, membranæ ligamenta, pubis etiam ossa cartilagine iuncta, firmius connectunt vincula communia. Sunt & peculiaria duo ligamenta rotunda, quæ ex sacri ossis ima parte in acurum coxendicis processum feruntur, huncque ossi sacro validius stringunt, & rectum intestinum, eiusque sphincteres musculos sustinēt. Adest etiam membranæ ligamentum ossis pubis foramen occupās. Femur ischij acetabulo copulant, vincula duo; alterum commune, latum, crassissimum, rorum articulum ambiens; alterum priuatum, quod à coryles fundo, in medium femoris caput figitur, rigidum id rotundum ac breue est, vt neruus cartilaginosus censerī possit. Tibiam cruri alligant præter communia illa & lara, tria valida & rotunda ligamenta. Primum in genu inerno paruum, rotundumque, ex canali inter condylos medio prodians, in partem acutiorem definit; alterum cartilagineum, ex re-

Pubis & sa-
cri ossis vin-
cula.

Tibiae liga-
menta.

liqua canalis asperitate, in tibiæ eminentiæ mediam apophysin definit. Tertium cartilagineum vtrique tibiæ cavitati vndique circumdatum, in canalem medium, quod inter duos est cruris condylos, inseritur, totumque articulum in duas partes diuidit. Tibiam cum talo colligat, vinculum commune. Inter tibiā & peronem qua parte dehiscunt, ligamentum est tenue latumque, quod superas inferasque horum ossium partes deuincit, & tibiæ internos musculos ab externis secernit.

De pedis ligamentis. CAP. XXII.



VT pedis & manus eadem ferè est compositio, ita vinculorum, quæ ossa connectunt, musculosque continent & firmant, non dissimilis est structura, nec numerus valde dispar. Ossa itaque tarsi vicinis colligant, communia ligamenta; inuicem verò connectunt, vincula peculiaria. Sunt etiam transversa ligamenta, interna, externa, quæ tendines digitos flectentes extendentesque continent. Habent quoque singuli digiti vinculum membranaceum, tendinem firmans. Tandem sub planta pedis ablata cuti & adipe ligamentum latum validum ab ima perna in omnia primæ phalangis sesamoidea inseritur, ad maximam totius pedis firmitatem. Ligamenta porro hepatis & pudendi suo loco describentur à nobis.

Ligamenta
tarsi.

Ligamenta
digitorum.

DE MEMBRANIS.

Quid sit membrana. CAP. XXIII.



IN Hippocratis, Galeni, & omnium ferè Medicorum doctrina, *ὑμὴν, χιτῶν, μὲνινγξ*, membrana, tunica sæpè vnum idemque denotant; interdum etiam ita distinguuntur, vt *ὑμὴν* seu membrana, à substantia simplici, neruea, tenui, densa, lata, quæ distentionem & contractionem admittat faciliè, nomen sortiat. *χιτῶν* verò seu tunica, ab usu ita appelletur, quod partem aliquam tegat & in-

Quid differat
membrana &
tunica.

uestiat. Sunt qui vasorum & instrumentorum corpora, tunica nomine dignentur, membranam autem vocent illud corpus, quod extrinsecus ambit. *μὲνινγξ* libello de carnibus, nunc pro omni membrana sumitur, nunc à tunica distinguitur, quod *μὲνινγξ* ex sicciore & tenuiore materia fiat, *χιτῶν*, ex crassiore. Sic *ὑμὴν μὲνινγξ*, id est *crassam cerebri membranam*, temporis successu *χιτῶνα* euadere, in tunicam transire scribit. Propriè Hesychio *μὲνινγξ* cerebri est membrana, & Anatomicis ferè omnibus solæ, quæ cerebrum subtus superque velant membranæ, meninges appellantur. Nobis, qui aucupes verborum non sumus, nihil interest membranam, meningem, an tunicam voces. Sic Galenus decimo quarto de usu partium, de peritonæo loquens, Nihil refert (ait) peritonæum tunicam, an membranam voces. Præstat membranæ essentiam definitione explicare, quod in hunc quidem modum tentabimus. Membrana pars est similis, frigida & sicca, ex seminis portione lenta & ductili genita, idèque lata, tenuis, & densa, sensus tactorij organum, partes subiectas custodiens, colligans, determinans. Similarem esse particulam id indicat, quod sit vniformis, & licet villis texatur, nusquam ta-

*μὲνινγξ & χιτῶν
quomodo dis-
tinguantur.*

Membrana
definitio.

*Explicatio
definitionum.*

*Materia mem-
branarum.*

*Cur membra-
na lata est, de-
sa & tenuis.*

*Officium mē-
branarum.*

*Membrana
immediata
est organum
tactu.*

Obiectum.

Salutis.

*Tres membra-
narum usus
communes.*

*Peculiares
membranarū
usus.*

men sensibus sunt conspicui. Loquor hūc de veris membranarum, non de corporibus membranosis, vtero, vesica, ventriculo, intestinis, quæ partem per se constituunt, & in quibus tria villorum apparent genera. Frigidam esse & siccam docuit Gal. lib. de temperament. sed tendine, vinculis, cartilaginibus, ossibus minus est frigida siccaque: arteriis autem, venis nervisque frigidior est & siccior. Materia membranarum seminis est portio lenta, quæ caloris vi tenditur, vnde fit vt dilatari cōprimique citra noxam facillè possit; solæ (inquit Galenus) membrane, tuto distendi & contrahi possunt, ideoque partes omnes quæ contrahi & distendi debuerunt, membranosa constructæ sunt. Lata est membrana & extensibilis, vt partem vestiatur custodiaturque; densa, ad robur; & ne tam facillè humorum influxum excipiat; tenuis, ne pondere sit molesta; licet autem tenuis & simplex appareat, est tamen membrana omnis duplex, quia per eam nervi ad sensum, venæ ad nutritionem, arteriæ ad vitam feruntur, quæ vasa inter duas tunicas necessariò excurrunt. Commune membranarum officium est, vt sensus tactorii organum sit, vt oculus visionis; ideo sensu exquisitissimo prædita est. Nervus spirituum quidem est lator, & animæ desert imperium; sed vt in musculo non est primariū motus organum, vt in oculo visibiliū imagines non suscipit, ita nec qualitates tractabiles primarias, secundarias, excipit. Solæ est membrana quæ tactus organum debet statui, & si partes suis spoliaveris membranarum, eas insensiles reddes; sic pulmonum, hepatis, lienis, & viscerum caro insensilis est. Vt autem tactus per totum animalis corpus diffusus est, quia vbique necessarius; ita membranæ per totum ferè corpus internum & externum sparæ sunt; externum corpus ambiunt, cutis & membrana nervosa; internum, peculiares penè infinitæ. Si obiciās ex Galeno in sua Medicinali arte, membranas insitas tantum habere facultates, nullas influentes, influere autem sensum. Respondebit Conciliator, Galenum de membranarum & latis ligamentis ab ossibus ortis loqui. Tres ultimæ definitionis particule, tres præcipuos membranarum usus eleganter exprimunt. Inuestiunt partes subiectas indumenti instar, vnde tunica dictæ; fibras custodiunt, vt validius firment carnes; partium substantiam continent, ambiuntque vndiquaque, ne fusa dissipetur; sed & partes colligunt partibus, vnde mirabilis partium *superiorum* societasque. Sic per periosteum, continua sibi sunt ossa, per membranam communem musculi omnes vniuntur, per cutem vniuersum corpus partium diuersi generis structura varium, symphysin habet. Tandem membranarum opera partes à partibus separantur, vt in musculorum sectione cernere licet. Sunt & alij peculiares membranarum usus, vt partes aliquas sustentent, vt in mediastino apparet, vt orificiis vasorum præpositæ valvularum instar refluxum humoris impendant, vt in corde, venis maioribus, meatu cholydoco & cæco intestino; vt vasa in partes alias distribuenda, deducant, firmentque, vt in mesenterio, epiploo & membrana carnosa dicta.

Differentiæ membranarum.

CAP. XXIII.

*Membranarū
differentiæ.*

Prima.



MEMBRANARUM multiplices sunt differentiæ, quæ à substantia, magnitudine, situ, figura, contextu & partium quas inuestiunt continerique natura petendæ sunt. Si substantiam, quæ domicilium est determinatæ facultatis, spectes; membranæ aut sunt legitimæ & veræ, quibus conuenit definitio illa à nobis tradita; eiusmodi sunt membrana cerebri, peritonæum, pleura, periosteum; &c. aut sunt illegitimæ, quæ verius membranosa corpora di-

ci debent. Eorū tria sunt genera; alia ex ossibus oriuntur, lata sunt, infensilia, articulos colligantia, membranæ ligamentales, aut ligamēta membranosa dicuntur; alia ex musculorum tendinibus dilatatis, atque ita membranam potius, quā tendinem referentibus, constituuntur; eiusmodi sunt musculorum abdominis obliquorum & transversorum aponeuroses, necnon tibiā abducentis muscoli tendo, quem fasciam latam vulgus appellat. Ad tertium genus refero membranæ illa corpora, partem per se constituentia, quæ licet tunicis vestiantur, corporibus tamen membraneis tota constituuntur, ut sunt vesicæ geminæ, biliaria & vrinaria, ventriculus, intestina, uterus. Rursum membranarum, quas dixi legitimas, substantia aut tenuis est, latis aranearum telis simillima, qualis in aracnoide cristallinum ambiente, tenui meninge cerebri tegmine & proprio velamine, & in pulmonis ac hepatis tunica conspicitur; aut crassa, ut in crassiore meninge & vesicæ membrana apparet; aut carnosæ sunt, ut in facie, aut tota nervosa. A magnitudine, aliæ sunt latæ, aliæ longæ. Figura membranarum multiplex est, pro varietate partium quas inuestiunt. A situ, aliæ sunt internæ, aliæ externæ, aliæ supernæ, aliæ infernæ. A contextu quædam villos habent, aut omnis generis, aut duplicis, aut vnius tantum. Aliæ villis carent, suntque in omnem partem papiri modo diuiduæ.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Brevis membranarum fere omnium aut saltem præcipuarum enumeratio.

CAP. XXV.

MEMBRANARUM numerus penè est infinitus: nostamen vniuersam earum historiā in certam summam contrahemus. Membranæ aliæ sunt foetus, aliæ edicti animalis. Foetum inuoluentes tres sunt, chorion, amnios, allantoides. *χωριον, ἢ χόριον* sic appellatur, aut quod foetum contineat, aut quod circuli & coronæ instar foetum ambiat: tota vtero adhærescit, venarum & articularum umbilicalium interiectu. Amnios seu agnina, sudoris est receptaculum. Allantoides, à farciminis figura sic dicta, puellum cingit instar zonæ cuiusdam, aut fasciæ latæ, urinæ est receptaculum. Edicti animalis membranæ, aut sunt vniuersales, aut particulares. Vniuersales, vel totum corpus inuestiunt, ut cutis & panniculus ille carnosus dictus, aut omnes eiusdem generis partes, musculos quippe & ossa: musculos omnes tegit membrana communis musculorum: ossa omnia inuestit à capite ad pedes periosteon. Particulares membranæ, aut particularem regionem inuestiunt, aut simplicem aliquam partem. Regio triplex statuitur, suprema, media, infima. Supremam regionē cerebrum quippe velant meninges duæ, crassa & tenuis, nec cerebrū modò, sed etiam spinalem medullam eius vicariam, & nervos omnes, velut caudices. Regionem mediam cingit omni ex parte membrana, quæ costis subtenitur, à qua pericardium, mediastinū, cordis, pulmonum, venarum, articularum & partium omnium, quæ thorace concluduntur, tunica oriuntur. In imo ventri peritoneum instar sacci partes omnes in eo contentas complectitur, singulisque communem largitur tunicam. Habent & singule fere corporis partes peculiāres membranas. Oculorum tunicae sunt, coniunctiua, cornea, vvea, aranea, ciliaris, reticularis. Linguam vestit & sapores discernit, propria tunica, à tertia quartaque coniugatione, ut œsophagum, os, palatum, fauces, ea quæ ventriculo est communis. Cor suum habet inuolucrum, pericardium vocat; habet & peculiāres tunicas, tum externas à basi ortas, tum internas, quæ sinus am-

Membrana
foetus.Edicti anima-
lis membra-
nae.
Vniuersales
membranae.

Particulares.

Singularium
partium me-
branae.

biunt. Pulmo renuem habet. Sunt etiam in thorace interfepientes membrane, mediastinum vocant. In imo ventri quælibet pars membrana tegitur: hepar, lien, ventriculus, intestina, uterus, vesicæ, vasa omnia. Sed renes proprium habent involucrium & crassum, fasciam dicunt. Adest quoque epiploon, ex duplicato peritoneo, & mesenterium. Musculis omnibus suæ sunt tunica, ex nervorum tunica exorta, aut ex periostiis ligamenta in musculos deducuntibus. Est denique infini-ritus penè tenuium membranarum, quæ nomine carent, numerus. Nos earum omnium, quæ propria habent nomina, historiam suo loco describemus; capitulis quidem, libro 10. thoracis, libro 9. ventris inferioris, libro sexto.



DE VILLIS SEV FIBRIS.

Definitio Villorum.

CAP. XXVI.

Villorum nomina.



Definitio fibrarum.

Fibrarum usus duo.

Primum ad motum. Motus triplex, animalis, vitalis, naturalis.

Villi ad officialem, non priuatam actionem sunt necessarii.

Secundus villorum usus.

ILLI seu fibræ, Græcis *īves* dicuntur; licet nomen hoc etiam nervis & tendonibus accommodari possit; nam occipit *iviv* appellarunt veteres, *διὰ τὸ ἰνῶδες καὶ νευρῶδες εἶναι*, quod nervorum ferè omnium ortus sit ab occipitio. Sunt qui villos *κλιδόνας* vocant, quod sint velut striz & segmenta, quibus membranz intertextuntur. Sic Theophrastus, in arboribus *κλιδόνας* vocat, tenues in earum pulpa lineas, aut filamenta eas discriminantia. Villi ergo *īves*, καὶ κλιδόνας, definiantur à nobis, partes similes, frigide & siccz, genitz ex semine, ideoque albe, solide, oblongæ, exilium filamentorum instar, ad motum & carnis custodiam destinatz. Priores huius definitionis particula, ita sunt notæ, ut nulla egeant in interpretatione. Posteriores, quæ vsui seu finalem causam villorum indicant, paucis aperiendæ sunt. Duo sunt fibrarum vsus præcipui, motus & custodia carnis. Motus apud Medicos, triplex, animalis, vitalis, & naturalis. Animalis seu voluntarius, musculorum opera perficitur, mouetur autem musculus, dum eius fibræ aut intenduntur, aut principium versus retrahuntur. Propterea scribit Galenus 8. de anatomicis administratione. Si fibras omnes transuersim secueris, musculos statim motu omni destitui: vitalis cordis est & arteriarum; habet ergo cor suos villos, quorum ministerio, & distenditur, & contrahitur, & quiescit. Sunt & arteriis suæ fibræ, in tunica quidem interna transuersæ plurimæ, in externa, oblique & rectæ. Naturalis motus in attractione, retentione, expulsionem conspicuus est: omnes ergo motus à villis sunt, eorum autem propria actio est contractio. Cæterum non ad peculiarem tractionem, retentionem expulsionem que organa naturalia villos obtinuerunt, sed ad cômunein & officialem tantum. Sic ventriculus, intestina, venæ, arteriæ, uterus, vesicæ, cor, non ad priuatam nutritionem villis eguerunt, cum & ossa, & cerebrum, & cartilagine, & parenchymatum carnes sine villis proprium alimentum trahant, sed ad officialem quandam actionem. Cor ad vitalis spiritus generationem; arteriæ ad caloris natiui moderationem; venæ, ad sanguinis transiissionem; ventriculus ad chyli perfectionem; intestina ad chyli distributionem & fæcum excretionem; vesica ad mictionem, uterus ad conceptionem & partum. Alter villorum vsus est custodia carnis, & musculosæ, & eius quæ propriam partis substantiam constituit. Sunt enim villi velut prima stamina, quorum inania spatia, caro infarcit,

velut rimas oppletura. Sunt & alij peculiares fibrarum vsus in venis & arteriis, ad *duarū vias*, vt ad omnes sanguinis violentos occurfus extendi possent.

Villorum differentia.



ILLO RVM differentię petendę sunt à situ, duritię, sensu, texturā, & organorum varietate. A situ, recti, transuersi & obliqui dicuntur, nam si secundum longitudinem ferantur, recti erunt & longi, si secundum latitudinem rectos inrersecantes, transuersi, rotundi, circulares. Si situm medium obtineant & ambos inter-

secent ad angulos inæquales, obliqui vocabuntur. Rectorum munus est trahere, transuersorum expellere, obliquorum retinere. Si soli recti agant, minuitur longitudo, vt fiat attractio. Si soli transuersi cōtrahantur, minuitur latitudo, vt fiat expulsio; quod si omnes simul villi & recti, & obliqui, & transuersi tendantur, tota cōtrahitur particula, firque retentio, quam etiam amplexum vocant. Fit ergo retentio non vnico villorum genere agente, sed omnibus, ita enim cum quid manibus firmiter retinere volumus, vndique coercemus, dicuntur tamen obliqui peculiariter retinere, quia contracti complectuntur tantum, vndique enim partes ambiunt, & vndique eas constringunt occluduntque. At recti & transuersi si cōtrahantur, non retentioni tantum, sed illi tractui, hi pulsi inferuiunt. Secunda villorum differentia à duritię sumi porest, alij duriores sunt & valentiores, vt cordis; id enim exigebat vis illa feruens innati caloris, & perpetua necessarij motus agitatio; alij molliores, vt musculorum fibrę. Tertia à sensu petenda: Villorum alij sunt sensiles, vt qui à neruis oriuntur, alij insensiles, vt qui à ligamentis ossium. Si fibrarum texturam spectes, alię ita sunt permixtę, vt continuū efficiant corpus; sic verę membranę suas habent fibras, imò nihil aliud sunt, quàm fibrę inuicem coniunctę; alię separatę sunt à substantia partis, aliūque habent vsum quàm pars ipsa, & hæc vel simplices sunt, vt in musculis, qui omnes, si paucos excipias, vnicū villorum genus, rectum puta, aut transuersum, aut obliquū obtinent, vel multiplices & ita intertextę, vt nulla arte separari queant. Sic cordis caro triplici villorum genere texta est, & in organis naturalibus, quę morui naturali inferuiunt, si pars vnica habeat propriam tunicam, vt vena, vterus, vesicę ambæ, in ea fibrę omnes sunt collocatę; si autem duę sint tunice, interna & externa, in externa transuersę, in interna, rectę & obliquę locantur: excipe intestina & arterias, quia illa, distributioni & excretioni, hæc, cordis expurgationi inferuiunt, at natura de noxij expulsionē magis est sollicita, quàm de vitilis tractione. Postrema villorum differentia ab organorum varietate sumitur. Alij animalibus inferuiunt organis, vt musculis, neruis, ligamentis, tendonibus: alij vitalibus, vt cordi & arteriis; alij naturalibus, vt œsophago, ventriculo, intestinis, vesicis, vtero & venis. Quid autem agant singuli, & quomodo sint locati, in particulari singularum partium historia describemus.

*Villorum differentia.
Prima differentia à situ.*

Recti, obliqui, transuersi, quid agant.

Quomodo fit retentio.

Secunda differentia.

Tertia.

Quarta.

Quomodo locentur fibrę in organis naturalibus.

Quinta villorum differentia.

quendi sanguinem, arteriis nulla, cum perfectam in corde elaborationem is consequatur. Sed iam venarum naturam definitione explicare aggrediamur. Vena duobus modis considerari potest, aut ut similis pars est, aut ut organica. Similarem esse voluit Galenus secundo de Elementis, si non reuera, saltem sensus iudicio. Organicam esse docuit libro de morborum differentiis: venas enim, arterias & musculos, organa appellat primi generis & simplicissima. Si venâ speciet quatenus est similis, defines per temperiem, quæ forma est similaritatis, partem frigidam & siccam, ex lenta & ductili seminis portione genitam: frigidam dixi naturæ temperie, nam sanguinis contactu & spirituum perfusione calidissima est; & primo de Temperamentis, cute dicitur calidior. Si venam consideres quatenus est organica, defines vas oblongum, rotundum, fistulæ modo excavatum, simplici & prætenui tunica, omni villorum genere texta, instructum, ab hepate ortum, continendo, distribuendo & coquendo sanguini à natura dicatum. Habes hac definitione organi figuram, compositionem, ortum, usum & actionem eleganter descripta. Vasis rotunditas & cavitas figuram exprimunt organi, quæ vena à nervo distinguitur. Nervus enim poros tantum *χρηστέυται*, non sensiles cavitates habent. Erravit ergo Praxagoras, falluntur etiam nunc, qui nervos venas appellant continuatas. Vnica eaque tenuis tunica structuram vasis denotat; venamque ab arteria discriminat; nam duplicem habet tunicam arteria, extetnam & internam, & si Erophilo fides habenda, quintuplo vena crassior est, quia tenuiorem & sanguinem & spiritum continet, qui nisi densiore concluderetur pariere, facile vanescerent. Hæc autem simplex tunica villos habet omnis generis, rectos, obliquos, transuersos, non ad priuatam nutritionem, cui attractrix, retentrix & expultrix famulantur, sed ad communem quædam usum, ut sanguinem naturæ thesaurum retineant, trahant, à vicinis venis, aliæ ex aliis transmittant ad alias, ut fiat distributio, purum denique ab impuro secernant. Sed & ad *δυσσάφεια* villos constructos puto. Cum enim nimia copia luxuriâs sanguis, venas sæpè impetat, nunc rectis, nunc obliquis, nunc transuersis extensionibus, ut ad omnes sanguinis violentos ocursor sitisque extendi posset vena, multiplici villorum eguit genere, alioqui rumperetur. Hæc venarum fibræ, primæ sunt, simplicissimæ & verè solidæ venæ particulæ; quæ verò fibrarum spatia opplet infarcitque substantia, carnosâ dicitur *ἀναλογικῶς*. Venarum fibræ, ait Galenus secundo de Temperamentis, cute sunt frigidiore, interiecta autem caro calidior. Hinc patet, diuersam esse venarum tunicam, à natura reliquarum membranarum, ut peritonei, pleuræ, peritonij: hæc enim verè simplices sunt, villis separatis carentes, suntque in omnem partem papyri modo diuiduæ; at venarum tunica est dissimilis, quia villos & carnem habet. Propriam hanc venarum tunicam, inuestit sæpè altera, communis dicta, quam à vicinis partibus mutuuntur, à pleura quidem in thorace, à peritonæo, in ventre inferiore. Dixi sæpè, non enim venæ omnes communem habent tunicam, ut quæ per viscus aliquod sparguntur, quæ per musculi corpus oberrant, quæ denique paribus sunt insertæ, & in illis propagantur, impediret enim mœbana illa, quo minus sanguis promptè exudaret. Illæ tantum, quæ aut longo tramite ducuntur, aut duriori corpori incumbunt, aut alicubi suspenduntur, communem tunicam obtinuerunt. Hæc itaque venæ est structura. Principium venarum in mea definitione agnosco hepar, non quidem *γενέσεως*, id est, *originis*, omnes enim partes simul conformantur; sed *ρίζωσως* *καὶ* *διοικήσεως*, id est, *radicationis* & *dispensationis*; radicationis quidem, quia & portæ & cauæ radices per

Vena duobus
modis conside-
ratur.

Vena defini-
tio, quatenus
est similis.

Vena defini-
tio, quatenus
est organica.
Explicatio de-
finitionis.

Figura vasis.

structura.

Cur simpli-
cem tunicam
habet vena.

Cur villi in
tunica vena-
rum.

Fibræ primæ
sunt, & verè
solidæ vena-
rum particu-
læ.

Tunica vena-
rum commu-
nis non omni-
bus inest ve-
nis.

Hepar quomodo
venarum
principium.

vnuerſum iecoris parenchyma ſparguntur, vnde illud Hippocratis libello de alimento. *ῥίζωσις φλεβῶν ὑπάρ*, radicatio venarum iecur. Diſpenſationis verò, id eſt, diſtributionis & officij, quia ab eo communis materia, ſanguis ſcilicet, commune partium alimentum, in venas fertur, ideò Hippocrati *ἐνμαλὲς* dicitur, ſons & origo gratioſi humoris. Poſtrema definitionis particula, communem venarum uſum & actionem designat, deducendo enim, diſtribuendo & coquendo ſanguini ſunt dicatæ: id autem cur & quomodo fiat, iam explicare aggredior.

De venarum uſu & actione.

CAP. II.



VONIAM quæ ſingulis partibus innata eſt, à generationis noſtræ primordiis, ſubſtantia triplex, perennem ſui iacturam patitur, Natura ſui diligens & conſeruatrix, continuo alimentum affluxu, quod effluit reſarcire ſtudet. Commune partium alimentum eſt ſanguis, quem ab hepate, tanquam communi officina, ſingulæ hauriunt: non poterat autem ſanguis, ab hepate ad diſtantiſſimas partes ferri, niſi earum partium cum ſuo fonte eſſet aliqua continuitas. Conſtituendi ergo & effingendi fuerunt canales, velut aqua ductus, continendo, conſeruando & deducendo per vnuerſum corpus ſanguini, accommodari. Eiufmodi venę ſunt, quas Ariſtoteles ſanguinis vaſa appellat & conceptacula. Continetur itaque ſanguis in vena, tanquam in *φλάξ*, id eſt propria caſtodia, & extra venas ſtatim putret, aut concreſcit, quia locus, loci eſt conſeruatio; de mortuo autem animali, etiam in cordis ſinibus (quod mirum) concreſcit, in venis verò nunquam. Habent ergo venę inſitam à natura vim ſanguinem continendi & conſeruandi, qui primus eſt earum uſus. Eſt alter venarum uſus, ſanguinem diſtribuere. Diſtributio hæc actione perficitur, attractione ſcilicet à vicinis venis, & tranſmiſſione ad alias, propterea conſtructi ſunt recti & circulares villi. Tertium agnoſcit Hippocrates lib. de alimento, vt calorem & ſpiritus deferant in ſingulas corporis partes; vnde ſit vt ligatis arteriis, partes non ſtatim emoriantur, quia per venas influat adhuc calor ſpiritusque duplex, vitalis ſcilicet & naturalis: vitalem accipiunt venę, à corde, per mirabiles arteriarum anastoſes; naturalem ab hepate hauriunt. Hoc influente ſpiritu, inſitus ille, quem Stoici *ἐνλίκον* vocat, ſuſcitur, eoque quaſi vectore & duce fertur in vnuerſum corpus ſanguis. Poſtremus venarum uſus, qui ad communem etiam earum actionem referri debet, eſt ſanguinis alteratio; venis enim conceſſa eſt facultas coquendi & immutandi ſanguinem, aliis quidem præparandi, vt venis meſenterij, aliis perficiendi, vt maioribus venę cauę ramis: vim autem eam habent ab hepate per *ἐκρίρρον*, quaſi itradiationem, vt vaſa ſeminaria vim *σπερματικὴν ἐνλίκον* reſtibus. Sunt & alij peculiare venarum uſus, vt emulgentium, ſerofum humorē deducere: ſpermaricarum, ſemini rudimentum conſerre: meſaraicarum, chylum in hepar transportare & altetare: vaſis venoſi, melancholicum ſuccum in ventriculi cauitatem reſundere; ad excitandam appetentiam: venarum vteri, ſanguinē certis & ſtatis periodis excernere: ſplenicarum, ſœculentum ſanguinem expurgare: atque ita de cæteris, quarum uſus in particulari venarum hiſtoria deſcribetur. Maxima apud Hippocratem ex venarum habitu & ſtructure petuntur indicia, ad totius dignotionem. Quibus enim venę ſunt lætæ, iis venter & oſſa læta ſunt; quia cum ſanguis per eas in totum corpus feratur, ex earum multiplicitudine & anguſtia,

tum

Communis
venarum uſus.

Venarum
conſeruat.

Primus venarum
uſus, ſanguinem
conſeruare.

Secundus uſus
eſt, diſtributio
ſanguinis.

Tertius uſus,
calorem &
ſpiritus de-
ferre.

Quartus uſus,
ſanguinis al-
teratio.

Peculiare ve-
narum uſus
multi.

ſt. i. lib. i.
Epid.

Maxima ex
venarum petun-
tur indicia.

tum copia, tum temperies sanguinis æstimari potest: Quibus itaque copiosius in venas influit sanguis, hi calidi censentur; venas habent διαφανέας, ἐσφλεβοῖς etiam dicuntur: qui verò angustas & exiles habent venas, frigidi censendi sunt. Aristoteli 3. de parti. anim. Quibus multum est carnis, iis venæ arctiores, sanguis rubentior, venter ac viscera parua: contrà, quibus parum carnis, iis venæ ampliores, sanguis atrior, viscera magna & venter auctior. Per venas vniuersum corpus σὺμφορῶν habet, vnde ligamenta appellantur communia.

Venarum differentia.

CAP. III.



VENARVM innumeri quidem sunt & penè infiniti furculi, omnes à quinque velut caudicibus & stipitibus manare dicuntur, vt quinque ab Anatomicis describatur vasa venę nomine insignita, caua, vena portę, vena vmbilicalis, vena arteriosa, & venosa arteria. Vena caua, omnium amplissima, ex gibbis hepatis prodians, in omnes ferè corporis partes tuos diffundit. Porta ex cauis emergens, in ventriculum, lienem, intestina, epiploon, tota diuaticatur. Vmbilicalis embrij nutricula ab hepatis scissura ad vmbilicum fertur, & puello adhuc in vtero latitanti alimentum deferret; edito autè animali, tota vieta & emerita degenerat in ligamentum. Vena arteriosa, venę quidem & nomen & officium obtinuit, sed reuera arteria est, totaq; in pulmonē assumitur. Venosa autè arteria venę tunicam habet & structuram, veriusque venę, quàm arterię nomen meretur; huius rami omnes multifariam scissi, per totam pulmonum carnem sparguntur. Quinque ergo numerari solent venę, quas ego veritatis studiosus ad duas tantum refero, cauam & portam; nam vmbilicalis, portę est propago, eiquę ita continuatur, vt ramum esse existimē portę; venosa autè illa arteria, soboles est venę cauę, vt indicat mitabilis illa in fœtibus anastomosis, cuius historiam libro 7. describemus. Vena arteriosa suam habet cum aorto continuitatem, per vas arteriosum; & arteria potius quàm vena dici debet, quia tunicam habet duplicem & crassissimam. Sunt igitur due tantum venę insignes, porta scilicet & caua. Vtriusque radices per iecoris carnem confuse sparguntur, ita tamen, vt longè plures radices portę incedant per caua iecoris, pauciores per conuexa; contrà longè plures radices cauę ferantur per conuexa, pauciores per caua, vt verisimile sit, sanguificationem in cauis potius fieri, distributionem & perfectionem in conuexis. Sunt autem admirandę eorum radicum anastomoses à paucis animaduersę; extrema enim radicum venę portę, in medias venę cauę radices infiguntur, & venę cauę extrema, in medias portę radices coeunt, vt à porta in cauam, & à caua in portam facillè meet remeetque sanguis. Vera igitur scripsit Aristoteles 2. de partibus animal. dum venas omnes continuas dixit, quod primus annotauerat Hippocrates, libro de locis in homine. Communicant (inquit) omnes venę & cōfluunt inter se mutuo. Hoc ego in recens natis aliquando sum expertus. Si enim in venam vmbilicalē immitas tubulum, videbis & intestina distēdi, & cauę ramos, & cor, & ipsam etiam pulmonum carnem, quia vmbilicalis in portam definit, portę autem & cauę quamplurimę sunt in ipso hepatis parenchymate anastomoses; caua etiam cum venosa arteria peculiari pulmonum vase, continuitatem habet per foramen amplissimū. Atque hæc prima esto, eaque generalissima, venarum diuisio. Peculiares venarū differentia petēdę sunt à magnitudine, numero, situ, officio, & partium ad quas

Quinque vasa
sunt venarum
nomen indicium
est.

Due tantum
sunt venę caua
& porta.

Quomodo vena
caua & porta
radices in
hepate im-
plicentur.

Mirabiles ra-
dicum caue
& porta ana-
stomoses à pa-
ucis animadu-
uersę.

Observatio no-
ua de venarū
continuitate.

Peculiares ve-
narum diffi-
rentia.

Prima, à magnitudine.
Quid sit vena magna.

Quid parua.

Secunda diffinitione, à natura.
Observatio.

Tertia diffinitione, à situ.

Quarta, ab officio.

Quinta, à partibus.

feruntur nomine. Si magnitudinē spectes, venarum alię sunt magnę, alię mediocres, alię parvę. Magnas & insignes venas, Hippocrates vocat κοίλας, καὶ αἰμάριες, *cavas & sanguifluas*, quod sanguinem copiose effundant, si secentur, rumpantur aut conuellantur. Paruas autem quidam τριχισμούς, id est, *capillares* dicunt, quibus sectis, sanguis parua copia effunditur, statimque comprimitur. Quę partes copioso egent alimento, quę item continuo agitantur motu, maiores venas obtinuerunt: sic pulmo insignia habuit vasa; sic carnes & calidę omnes humidę quę partes, venas habent magnas; ossa verò, cartilagines, ligamenta, exiguas. A numero, venarum alię sunt sine pari, vt quę in thorace azygos dicitur; alię parem habent, vt reliquę ferē omnes; alię solitatie sunt, id est, comitem non habent atteriā, vt humetaria; alię comitem habent atteriā. Est autem hoc obiret obferuandum, & plures esse venas, & maiores quàm arterias, quia alimentum continent crassius & spiritum νεφελώδη. A situ, vena dicitur supetior, inferior, ascendens, descendens, dextra, sinistra, interna, externa. Sic ramus splenicus, sinister, mesentericus, dexter vocatur. Sic venam basilicam Hippocrates libro de victus ratione in acutis τὴν εἰσὼ φλέβα, *venam internam* vocat, quod per internam cubiti pattem feratur, & humetariam, externam. Ratione officij, venę dicuntur emulgentes, quod ferofum humorem emulgeant secernantque; spermatica, quod seminitudimentum conferant. Ratione partium quās petreptant, iugulares, phrenicę, tenales, iliacę, hypogastricę, epigastricę, axillares, humetarie, cruales, popliteę, malleoli, appellantur.

Vena portę & ramorum eius elegans descriptio.

C A P. IIII.

Vena portę
nomen est
nina.



CONCAVA hepatis parte, vena oritur insignis, quam aliquando Galenus μεγάλην vocat, id est, *magnam*, vt cauam μεγάλην, interdum σελεχιδαν, quod sit σελέχει, id est, *trunco* cuidam plantę similis, vel quod sit veluti caudex earum quę vesiculę bilarię, ventriculo, lienī, intestinis, epiploo, implantantur. Nonn unquam τὴν πρὸς τὰς πόλεις, id est, *venam quę ad portas est*, nominat; vulgus venam portę, aut portam & ostiariam dicit; sunt qui iecotis manum vocent, quod ea tanquam manu ad chyli attractionem vtatur hepar: Arabes venam lacteam dicunt, non quod candida sit, aut lacteo succo conferta, (rubescit enim momēto chylus affluentis sanguinis permissione) sed quod cremorem lacti persimilem allicit. Huius venę ditemptus arborum diuisionibus est similis. Quemadmodum enim arboris radices variis capillamentis humi sparsę, in vnū cōeunt caudicem, qui paululum profiliens, in duos insignes disparilēsq; ramos diffinditur, hi rursus in alios atque alios disperguntur, donec in minutissimos abeant. Ita venę portę radices innumeris furculis per vniuersum hepatis corpus sparsę, in vnum desinunt truncum, qui statim fetē vt ab hepate profiliit, bipartitō finditur, quasi in duos pregrandes ramos diremptus: eorum alter splenicus, alter mesentericus dicitur, hos tamen ramos insignes priusquam spargat, quatuor emitit furculos. Primus cysticus dicitur, ex antica & suprema trunci parte ortus, qui mox in vesiculę felleę ceruicem & corpus distibuitur, furculis capillorum modo tenuibus. Secundus Gastricus nominatur, quod in ventriculum & pylorum prætenues conspergat venulas. Tertium liceat nobis cum Syluio gastrēpipoicam appellare; fundo enim ventriculi dextro, & epiploo inspergitur, furculis illum su-

Venerunt &
arborum eleganti
similitudo.

Diuisio venę
portę.

Remi quatuor
à trunco pro
deuntes.
Primus.
Secundus.

Tertius.

pernè, hoc infernè, adeuntibus. Postremum intestinale vocant, quod per duodeni longitudinem excurrat. Posteriores hos ramos sæpè à mesenterico emergere observauimus. Postquam exiles hos quatuor venarum portarum truces diffudit furculos, totus in duos insignes ramos finditur, quorum elatior, tenuior & sinister splenicus dicitur, quod ad lienem ferè totus feratur; alter humilior, amplior, dexterque mesentericus appellatur, quod totus penè in mesenterium & intestina exhauriatur. Splenicus ille quatuor quasi furculis fruticatur, gastrico minore, epiploico dextro, coronario stomachico, & epiploico posteriore. Gastricus non admodum frequèti ramorum serie, in gibbam ventriculi partem distribuitur. Epiploicus dexter, in dextram inferioris epiploï regionem furculos aliquot deriuat, & quibusdam ramulis colon intestinum irrigat. Coronarius stomachicus omnium crassissimus, dum ad summam ventriculi partem peruenit, bifariam dissecitur, priorè ramò, orificium ventriculi superius coronarum instar cingit, altero ad pylorum descendit. Epiploicus posterior, epiploico postico toti & coli parti dorso commissa, id est, in eam coli intestini partem quæ epiploï, quasi alterius mesenterij beneficio, dorso alligatur, ramulos emittit suos. Quod reliquum est rami splenic, in duas abit venas, illæ in alias atque alias, donec numerosa ramorum serie in cauam lienis partem implantentur, atque infinita sobole venulas quàm exiles nimiumque implexas per vniuersam lienis substantiam spargant. A summo tamen propè lienem ramo, furculus in ventriculi latus sinistrum effertur, quæ vas breue aut venosum dicunt, hoc vasculo effanditur in ventriculi fundum & os melancholicus succus, ad excitandam suo sapore acerbo & acidò appetentiam. Hæc totius rami splenic fidelis est descriptio, quem in eum usum comparauit Natura, vt ventriculo & lienì alimentum suppeditaret, & crassum ac feculentum sanguinem deduceret ad lienem, non quidem purum & impermixtum, sed multo laudabili succo perfusum. Alter ramus amplior multò, mesentericus dictus, in mesenterium & intestina infinitos diffundit riuos, sed tres præcipui obseruantur, his nominibus insigniti, hæmorrhoidalis, cæcalis, mesentericus. Hæmorrhoidalis, per coli extrema & recti intestini longitudinem ad anum vsque prorepat, quem exilibus ramulis orbiculatim amplectitur. Hunc ideo cõstruxit Natura, vt dum ob lienis obstructionem melancholicus sanguis expurgari nequit, saltem huius rami beneficio, certis quibusdà interuallis excerneretur, hic internas & occultas hæmorrhoidas patit, vt hypogastricus descendens cauarum ramus externas; illæ cacochymia vacuatrices, hæ plethoræ deplettrices dicuntur; ramus hic sæpè à splenico oritur. Cæcalis ramus ad cæcum intestinum fertur. Postremus totius nomen retinens, complurès & penè infinitos furculos ex se profert ac diffundit, qui obliquo ductu inter duas intestinorum tunicas feruntur, non autem ad cavitates intestinorum hiant, hi chyli tenuiorem portionem ab intestinis sugunt vehuntque ad hepar conferuntque quasi rudimentum quoddam sanguinis, iidem confectum & elaboratum in hepate sanguinem ad intestinorum nutritionem reuehant, vt non sint aliæ venæ distribuendo chylo, aliæ deferendo sanguini dicar, sed omnes simul vna eadèque seruitutis conditione vtantur. Has potrò mesenterij venas ambiunt omni ex parte glândulæ, tum ad vasorum ditemptus, tum vt impediant ne vasorum ductus comprimantur, tum vt sint velut ligamenta venarum, ne in violentis motibus disrumpantur. Membranulæ autem illæ chyli refluxum impediètes, quas se inuenisse gloriatur Columbus, mera figmenta sunt. Eanimitum est omnis venarum portarum dispersio.

*Quartus.**Splenic rami distributi. Gastrica. Epiploica dextra.**Coronaria stomachica.**Epiploica posterior.**Vas breue.**Usus rami splenic.**Rami mesenterici distributi. Hæmorrhoidalis.**Cæcalis. Mesenterij venarum usus duplex.**Glândula mesenterij.**Inuentum C. l. in a. n. n. n.*



PRÆPARATVS in portæ ramis, excoctus in eius radicibus, & expurgatus amaro ac lutulento recremento sanguis, iam ruber, purus & sincerus, tum per mirabiles eas anastomoses à nobis descriptas, tum per diapedesin (sunt enim venarum quæ per hepatis carnem sparguntur tunica tenuissimæ) in radices venæ insignis & maximè perlabitur. Venam hanc veteres καίλην, καὶ μεγάλην

appellatunt, id est, *cauam* & *magnam*, ob insignem cavitatem. Galenus sæpè τὴν φλέβα μεγάλην vocat, id est, *maximam*, rariùs τελεχιαίαν. Hippocrates secundo epidem. ἡ πατίνην, id est, *iecorariam*, illius enim ramis quasi riuus vniuersum corpus irrigatur. Hic fons est humanæ naturæ, hoc microcosmi flumen amplissimum. De cauz distributione multa eaque obscurissima scriptis mandauit Hippocrates, libris, De locis in homine, De sacro morbo, De ossium natura, De natura hominis, vbi quatuor venarum fontes deriuat à cerebro: sed hæc spuria esse & additicia putat Galenus, commentariis in librum de natura hominis, cui nos libenter assentimur. Elegantiùs multo venæ huius insignis historiam adumbravit sectione quarta libri secundi epidemidi, quem locum germanum esse putat Galenus sexto de placitis & commentario tertio in librum de articulis. Ἡ πατίνης ἐν ὀστέι μεγάλῃ τε μεγάλῃ ἀπονδύλῃ κάτωθεν, μετέωρος δὲ ἡ πατος καὶ διὰ φρενῶν ἐς καρδίαν, καὶ ἡ ἄρ' εὐζεία ἐς κληίδας, id est, *Iecoraria per lumbos ad magnam vsque vertebram deorsum fertur; ex hepate verò sublata, per diaphragma cor rectè, deinde iugula petit*. Habes hic vtriusque trunci veram imaginem; ascendens enim ad iugula vsque fertur, descendens verò ad ilia & os sacrum, quod magnam vertebram vocat, excurrit. In ramorum autem distributione omnia permiscet, & ita obscurè loquitur, vt quid sibi velit, ignorem penitus. Sed diuinum Hippocratis ingenium excusandum, erat enim eius temporibus inculta secandi ars, & vix ante Herophili tempora explorata erat Anatomies cognitio, tantæ molis erat anatomicam condere artem. Liceat tamen mirari hac in re Hippocratem, quod & si peculiarem venarum historiam accuratè non delinearit; nihil tamen eorum quæ ad artis vsum spectare videntur, omiserit. Nam venarum omnium, quas Medici secare solent, meminit, vt libro primo docuimus. Nos ex Galeni monumentis & obseruatione nostra, venam cauam paulò accuratiùs describemus, omnes eius ramos & furculos propriis accommodatisque nominibus (quorum primus author fuit Syluius) designantes. Vt portæ radices per caua iecoris magis incedunt, ita venæ huius insignis radices per conuexa magis sparguntur. Hæ autem in vnum omnes caudicem definunt, qui truncus venæ cauæ dici solet. Truncus hic ab hepate exiliens, in duas partes diuiditur, inferiorem & superiorem; illa descendens, hæc ascendens dicitur. Vtriusque trunci rami sunt multiplices, qui ratione partium, officij & situs diuersa sortiuntur nomina. Descendens truncus magnæ arteriæ accumbens, ad ossis sacri initium & ilia vsque excurrit; ibi in ramos finditur amplissimos, iliacos dictos; hos tamè insignes ramos priusquam spargat, quinque quasi furculis vtrinque fruticatur, adiposo, renali, spermatico, lumbari, musculoso. Adiposus ad anteriorem renum tunicam adipi copioso circumfusam fertur, hanc ab emulgent aliquando pronasci obseruauimus. Renalis, quod ad renem feratur; emulgens, quod eo serosum humorem prolecent renes, omnium qui à trunco oriuntur ri-

Vena caua
magna.

Multa Hip-
pocrates de
vena caua
scripsit.

Cauæ deseri-
ptio ex Hip-
pocrate.

Excusatio
Hippocratis,
& eius laus.

Vena caua,
distributio.

Descendens
truncus.

Vena à trun-
co manans:
Adiposa.
Emulgens.

uulorum amplissimus, per rotam renum substantiam infinitos conspergit ramulos. Primum enim in duos finditur ramos, horum rursus uterque in duos, omnes demum in quamplurimos disperguntur, donec in capillares abeat. Venam hanc emulgentem vtrinque duplicem & triplicem sæpè obseruauimus. *Spermatica*, venæ, sic dicta quod seminis materiam ad testes deferat, dextra quidem à trunco immediatè, sinistra verò ab emulgente emergit; qua ratione dextrum semen calidius & fecundius est, sinistrum serotius & frigidius; hinc vulgatum illud, mares à dextris & in dextris procreari: foeminas, à sinistris & in sinistris. Feruntur ambæ hæ venæ ad testes in maribus, ubi miro artificio implicatur, vt *διπτυοειδὲς πλέγμα*, id est, *velut retiformem plexum* effingant, vt fusius in partium procreationi dicatarum historia demonstrabitur. In foeminis non eadem est ratio, altera enim portio ad testes fertur, altera ad vteri fundum spargitur. Quarta sequitur vena, quam lumbarem vocant; hæc multiplex esse solet, lumborum vertebrae & spinalem medullam irrigat laudabili succo, per hanc ferri à cerebro & spinali medulla semen copiosissimum existimarunt quidam, sed meræ sunt nugæ. Postrema omnium, musculosa dicitur, quod in lumbares & abdominis musculos, plurimos proferat riuos; hæc interdum ab iliis emergit. Has igitur propagines effundit caux truncus descendens; postea in duos insignes ramos tanquã stipites, iliacos dictos, finditur. In ea diuisione, cedit vena arteriæ magnæ tanquam digniori, eique subiicitur, ne ossis sacri duritie & dorsi cõtinuo motu læderetur. Ab utroque ramo quatuor pares nec dissimiles venæ scaturiunt, his nominibus insignitæ, sacra, hypogastrica, epigastrica, pudenda. Sacra, per ossium foramina, in sacra, id est magnæ vertebrae medullam fertur ad eius nutritionem. Hypogastrica omnium amplissima, omnes ferè partes in hypogastrio contentas alit; ab hac rami quamplures multifariam fissi longè latèque se pandunt; nam alij ad vterum eiusque ceruicem festinant, alij ad vesicam, alij ad recti intestini extrema, quæ hæmorrhoides externas plethoræ depletices pariunt. Epigastrica in epigastrij musculos disseminatur, maior tamen eius pars per recti musculi longitudinem, sursum ad vmbilicum fertur. Occurrunt autem istius propaginis tenues quidam rini, extremis venarum, quæ mammaria dicuntur, sique præclara illa anastomosis, quam ad cõsensum mammarum & vteri conferre multi existimarunt. Epigastrica hæc sæpè à crurali ramo emergit. Postrema, pudenda dicitur, quod ad virorum genitalia feratur, & ad pudendi muliebris carnem. Idem ramus iliacus extra abdominis cavitatem delatus, & ad inguina cruræque descendens, cruralis appellationem sortitur; ab eo plures emanant furculi, per femur, tibiam & extremum pedem numerosa ramorum serie sparsi: sex tamen maximè conspicuis & à Syluio eleganter descriptis ramis fructatur. Sunt autem hæ omnes propagines, saphæna, ischias minor, muscula, poplitea, suralis & ischias maior. Saphæna seu malleoli vena, ad inguinis glandulas nata, per internam cruris partem inter cutem & membranam carnosam delata, ad malleolum externum descendit, & in pedis superni cutim variè absumitur. Ischias minor è regione saphænæ in anteriorem ischij cutim & eius loci musculos distribuitur. Muscula in duos finditur ramos, minor, in tibiæ musculos extensores, riuos diffundit maior profundior, in omnes ferè femoris musculos diuasicatur. Poplitea ex ramis duobus cruratis cõeuntibus conflata, furculis aliquot in cruris cutim posticam sparsis, per medium poplitem delapsa, nunc in furæ cutim absumitur, nunc ad calcem vsque descendit, nunc per externum malleolum fertur. Suralis in suræ musculos & cutim tibiæ internæ disseminata, circa malleolum infernum

*Spermatica.**Lumbaris.**Musculosa.**Rami iliaci diuasicati.**Sacra.**Hypogastrica.**Epigastrica.**Pudenda.
Cruralis rami
distributus.**Saphæna.**Ischias minor.**Muscula.
Poplitea.**Suralis.*

Ischias maior.

reflexa, latus internum pedis & cutim pollicis, raro alios digitos adit. Ischias maior portione maiore, per suræ musculos delata, absumitur in furculos decem, singulis scilicet digitis binos, minore autem, inter peronem & calcem cessante, interdum perforato medio ligamento in musculum digitum pedis abducentem & cutim spargitur. Hæc rami cruralis est omnis dispersio.

Vene caua ascendentis distributio. CAP. VI.



VENA caua ex gibbis hepatis emergens, diaphragma perneans, prægrandi stipite, quem ascendentem truncum vulgus vocat, ad iugulum vsque fertur. Toto autem eo ductu satis lato amploque periclitaretur vas insigne, sanguine turgens, nisi vicinis partibus firmiter alligaretur. Natura itaque sagax & prouida, vnam cauam ascendentem, diaphragmati primum, per foramen proprium, dein membranis intersepientibus, per communes tunicas, cernò cordi per auriculam dextram & membranas tricuspidales alligauit: superiore autem parte ne ossis duntie læderetur venas, & ad tutam ramorum diuificationem, glandem apposuit mollem & maximam puluinaris aut substerniculi instar, thymum vocant. Ita ergo ascendens caua truncus ad iugulum vsque extollitur. Ab hoc trunco quatuor emanant rui, phrenicus, coronalis, azygos & intercostalis. Phrenicus per vniuersum diaphragmatis corpus excurrit, & ad cordis inuolucrum ramos spargit, nec non ad membranas *diaphragmatis*. Coronarius *separatus* dictus, vniuersam cordis basim instar coronæ cingit, sæpius simplex, raro geminus visitur, & per totam cordis substantiam, hinc inde ramos diffundit, ad viscera nobilissimi nutritionem: plures autem eius rami in sinistra cordis parte apparent, quam dextra, quia densior, crassiorque, copiosiore eget alimento. Hic venæ caua amplissimum os obseruare licet, latus enim veluti lacerum cordi adaperit caua, vt in dextrum sinum tamquam cisternam effundat sanguinem, ad pulmonum nutritionem & vitalis spiritus generationem. Partes autem eius lateris, tanquam laceratas trifariam diuisas in dextro ventriculo insternit, eique ita alligatur, vt nulla arte separari possit. Tertius ascendens trunci ramus Azygos dictus, id est, omnis coniugij exers, quod in dextro tantum lateris reperiatur, octo furculis fruticatur, qui in sinistram partem non secus quam in dextram feruntur, octoque inferiores costas & earum spatia alunt, oesophago interea exiles, sed numerosos ramulos distribuendo. Huius solitariae venæ duplicem obseruauit recentiores Anatomici communionem. Prior est cum thoracis venis, quæ ab axillari prodeunt, vnde fit vt in pleuritide eiusdem lateris sectio mirè cõferat. Alter est cum adiposa & emulgente per ramulum exiguum, vnde puris in thorace collecti expurgationem per vias fieri voluit Fallopius. Quas autem in azygos ramis, somniauit membranulas velut hostiola sanguinis refluxum impediencia Amatus Lusitanus, nobis, nec cuiquam adhuc vidisse contigit, propterea meræ sunt nugæ. Postremus ramus intercostalis dicitur, quod tria aut quatuor superiorum costarum spatia nutriet, hunc sæpius deficere obseruauimus, sed fungitur tunc illius munere azygos, rami quoque ad superiores costas mittit. Postquam quatuor hœ venæ caua ascendens truncus diffudit furculos, totus in duos insignes ramos finditur, qui à situ & natura partis subclauij appellantur, quod infra clauis & iugulum sint. Horum ramorum pars intra thoracis cavitatem recondita est, pars altera è thorace exiliens, ad axillas

Ascendens truncus quemodo alligatur vicinis partibus.

Thymus. & trunco quatuor prodeunt venæ. Phrenica.

Coronaria cordis.

Quemodo caua ore patensissimo aperitur cordi.

Azygos.

Duplex azygos communio à recentioribus obseruata.

Communio Insitum de valvulis. Intercostalis.

Rami subclauij distributio.

fertur, & axillaris dicitur. Ab illa quinque oriuntur venæ, mammaria, thymica, capsularis, ceruicalis & muscula. Mammaria per anteriorem sterni partem fertur, ramulos thoracis musculis & mammae exiguos spargens; maiore verò sui portione ad inferiorem recti musculi partem emergit, furculis aliquot suis totidem epigastriæ ascendentiæ riuulis paulo supra umbilicum occurrentes. Thymica per totum glandosum corpus, quod Thymum vocat, distribuitur, necnon per intersepientes membranas. Capsularis à paucis deprehensa, per cordis inuolacrum fertur, occurratque phrenicis ascendentibus, ut eadem vasa penitus videantur. Ceruicalis per foramina apophyseon transuerfarum ceruicis emicat in cerebrum, ramulis obiter in vicinos musculos dimissis. Postrema omnium est muscula, quæ in musculos rachytas, tum ceruicis, tum summi thoracis fertur. Altera rami subclauij pars, ubi cavitatem thoracis egreditur, & ad axillas peruenit, axillaris dicitur. Ab hoc axillari ramo tres oriuntur venæ, thoracica, basilica, & cephalica, posthac describendæ. Idem ramus dum supra clauas emerfit, superclauus dicitur Syluio (cuius nomina eleganter & ex rei natura imposita in nostra musculorum & vasorum historia retinere placet.) Ab hoc ramo superclauio, duæ oriuntur venæ σφαγιτιδες dictæ, id est, *inguulares*, quarum vna externa est, altera interna. Externa, in brutis maior, in homine minor, per latera ceruicis inter cutem & membranam carnosam lata, in vicinos musculos furculos spargit quamplurimos. Vbi vetò fauces attingit, in duas partes diuiditur, quarum altera in musculos laryngis, hyoidis & linguae absumitur; altera subcutanea, in labra vtraque, pinnas narium, frõtem, faciem ferè totam, maiorem oculi angulum & partes aurium posteriores riuos diffundit. Inguularis interna insignior multò in homine, ob cerebri amplitudinem, dum per latera ceruicis ad cerebrum extollitur, multas vicinis partibus, musculis quippe laryngis & lingue, emittit propagines; tandem per cranij foramina in duræ menyn-gis sinus ascendit, à quibus infiniti venarum furculi prodeunt, menyn-ges duas, & totum cerebri corpus alituri. Quomodo autem per sinus crassioris membranæ feratur, libro decimo explicabitur.

*Mammaria.**Thymica.**Capsularis.**Ceruicalis.**Muscula.**Axillaris ramus.**Ramus superclauus.**Inguularis externa.**Inguularis interna.**Axillaris rami diuaticio.*

CAP. VII.



Ab axillari ramo tres oriuntur venæ, thoracica, basilica & cephalica. Thoracica gemina est utrinque; earum vna in mammas & anteriores thoracis musculos, ut pectoralem & serratum minorem; altera, in posticos distribuitur. Harum venarum tres rami, interdum quatuor, cum tribus aut quatuor venæ azygos ramis coeunt, quæ observatio noua est & pulcherrima: basilica per anteriorem, cephalica per posteriorem brachij partem fertur, propterea illam Hippocrates internam vocat, hanc externam. Basilica hepatica etiam & iecoraria dicta, in profundam & subcutaneam diuidi solet. Profunda axillari arteriæ & tertio neruorum pari attensa, ad medium cubiti flexum effertur, & ramo altero secundum radium, altero secundum cubiti os per anulum, quod musculorû colligat tédines, delabitur. Priore ramo in furculos quamplures, pollici duos, indici totidem, medio vnum, dirimitur; posteriore in riuos totidem, medio vnum, medico duos, auriculari duos, absumitur. Subcutanea per cutem excurrit, & dum ad cubiti articulationem peruenit, in duos finditur ramos, quorum alter ad internum cubitum delatus, cum humerariæ ramo vnitur, & ex

*Axillaris rami distributio. Thoracica.**Basilica diuisa. Profunda.**Subcutanea.*

Mediana vena.

Cephalica.

Saluatella.

Ostiola in maioribus vasis recentioribus deprehensa.

Venarum quæ plurimæ communiones, à nobis sæpe observantur.

eo coitu communis vena enascitur, quam medianā vulgus vocat; Arabes autem venam nigram. Errant ergo, qui medianam peculiarem & tertiam brachij venā agnoscunt; nam riuulus est ex cephalicæ & basilicæ in cubiti articulatione coitu emergens. Alter basilicæ subcutaneæ ramus, per infernum brachij latus descendit, ramulis in vicinam cutem & partes subiectas dimissis. Hæc omnis basilicæ est distributio. Cephalica sic dicta, quod in affectibus capitis tundatur, Hippocrati externa, quod brachij exteriora perreptet; ab aliis humeraria, quod per humerum feratur, non ab externa iugulari, ut in canibus, sed ab axillari ramo emergit. Hæc inter deltoideum musculum & pectoralis tendinem superficie tenus delapsa, dum ad cubiti flexum peruenit, in duos dirimitur ramos, quorum alter, in interiorem cubitum oblique latus, cum basilicæ ramo coit, & communem venam parit; alter insignior, per radium ad eius ferè medium descendit, hinc oblique ad carpum excurrens, manum externam ferè totam irrigat, & conspicuo ramo inter paruum digitum & annularem definit. Venam hanc Arabes saluatellam vocant, quam in melancholicis affectibus, lienis obstructionibus, & quartanis febribus felicissimè secant. Obseruarunt recentiores quidam in brachiorum & crurum maioribus venis, ostiola quædam, valvularum & membranularum instar, quæ sanguinis ad inferiores partes ἀπόδος confluentis impetum sistant, truncus autem venæ cauæ ob ἀνάδοτον semper est patens peruiusque. Obseruandæ sunt etiam quamplurimæ venarum communiones. Nam quæ per cutem diuaticantur, vniuscuiusque partis oppositæ, tandem inter se copulantur; dextæ sinistris, ut in facie, supernæ infernis, ut in musculis epigastrij; internæ externis, ut iugularis internæ rami quidam cum ramis externæ coeunt; externæ thoracicæ cum internis myrgos; externæ mammarum cum internis pectoris; externæ capitis cum internis quæ per membranas excurrunt. Sunt & quamplurimæ venarum & artieriarum anastomoses.

CONTROVERSIE ANATOMICÆ.

DE VENARVM ORTV EXERCITATIONES.

Varie de venarum ortu opiniones proponuntur: ac primum quæ fuerit Hippocratis sententia.

EXERCITATIO PRIMA.



Orini à capite venas videntur quidem.

Rex iudex illorum.

DE ortu venarum tam varie sunt, & inter se dissentientes Philosophorum ac Medicorum sententiæ, ut si quis eas omnes velut apud censorem aliquem profiteri, ac ordine recensere vellet, magnum, & (ut Poeta loquitur) improbum subiret laborem. Sunt qui venarum ortum à capite & cerebro deriuant, ut scribit Aristoteles capite secundo & tertio libri tertij de historia animal. Eius sectæ authorem fuisse Persarum Philosophum, quem Arabes Syamor Cabronensem vocant, Auicenna Thescum, narrat Albertus magnus libro tertio de animalibus. Annotauit Galenus sexto de placitis Hippocratis & Platonis, Pelopem publicè docuisse, vasa omnia à cerebro ortum ducere. Hippocrates ad finem lib. de natura hominis, quatuor venarum fontes à capite manare scribit, sed addititia esse & spuria illa putat Galenus, quæ Polybij potius, quàm in Hippocratis doctrinam redeant. Rationes eorum nec legi, nec audiui vllas: sed existimo, in eam sententiã fortasse adductos, quod obseruarint sinus multos tanquam canales, sanguine plenos, in dura meningis duplicatura, à quibus

à quibus tanquam è torculari exprimitur sanguis in venulas quamplurimas & universam cerebri substantiam. Herophilus se ortum venarum ignorare fatetur. Sydenensis medicus Cypricus & Blemor quidam Arabicus ab oculis venarum omnium propaggines derivant. Diogenes Apolloniata à ventriculo; sed harum opinionum leuitas, nec redargutione nostra eget, nec fusforem hùc disputationem desiderat. Quis enim omnia hæc à sensu & ratione alienissima esse non videt? Eorum tantum sententias expendere placet, qui verisimilia proferunt, quique aut in re medica excelluerunt, aut nature arcana accuratè illustrarunt. Hi porò in duas sectas distracti sunt; alij enim à corde, ut Peripatetici, alij ab hepate, ut Galenici & Medici ferè omnes, venas oriri contendunt, quorum rationes singulas sigillatim excutere lubet, non populari quadam trusina, sed exacta, id est Philosophica & Medica statera. Et quandoquidem multa de venis sparsim annotauit Hippocrates, quæ fuerit illius de venarum ortu sententia, videamus. *Varia & dissentientia ea de re scripsit admirandus Senex; nunc enim cor venarum statuit principium, nunc hepar, interdum nullum esse earum principium affirmat. A corde venas oriri voluit multis in locis, libro de carnibus. δύο γὰρ εἰς κοίλας φλέβες ὁπὸ τῆς καρδίας; duæ sunt venæ caux à corde, alteri nomen est arteria, alteri verò caua, ad quam cor situm habet. Eodem libro καὶ λόταται αἱ πρὸς τὴν καρδίαν, cauissimæ venæ sunt prope cor. Deinde, cor ad caput venæ caux situm est, libro de locis in homine. Venæ caux à corde diaphragma permeans ad hepar trāsīt. Quarto de morbis, cor sanguinis fontem vocat, lib. de corde, sinus duos fontes vocat, venas autem & arterias flumina, quibus totum corpus irrigatur. Contrariam tuetur sententiam multis in locis, quibus hepar venarum agnoscit principium. Libro de alimēto, ῥῖζωσις φλεβῶν ἢ καρ, ῥῖζωσις ἀρτηρίων καρδίαν, Radicatio venarum hepar, radicatio arteriarum cor. Libris de ossium natura, de locis in homine, secundo & sexto Epidem. Venam cauam ἢ κοιλίαν, id est iecorariam vocat. Aliquando nec hepar, nec cor venarum esse principium voluit Hippocrates, sed partes omnes simul gigni existimauit, libro de ossium natura. Venæ quæ per totum corpus diffusa spiritum, fluxum, motumque exhibent, ab ima multæ gignuntur, atque hæc una ubi oriantur, & desinat nescio, circulo enim factò principium non inuenitur. Libro de locis in homine, statim initio. Mihi quidem videtur principium corporis humani nullum esse, sed omnia similiter principium, & omnia similiter finis, circulo enim descripto principium non inuenitur. Hæc Hippocrates de venarum ortu, quæ est dissentanea multis videantur, ita tamen conciliari poterunt, ut hepar sit principium radicationis & distributionis, cor conservationis: originis autem nullum sit, cum omnes partes spermaticæ simul generentur.*

*Varia opinio-
nes.*

*Hippocratis
de ortu vene-
rum sententia
varia.
A corde oriri
authoritates
Hippocratis.*

*Ab hepate
oriri, authori-
tates Hippocr.*

*Venas nul-
lum agnoscit
principium
Hippocrates.*

*Conciliatio lo-
rum Hippo-
cratis.*

ARISTOTELIS DE VENARVM ORTV OPINIO.

Peripateticorum rationes omnes proponuntur.

EXERCITATIO II.



QUICUM in animalium corporibus agnouit principium Aristoteles cor, primum ζῷον, κινῆζον, αἰσθητικόν, καὶ αἰμαλωτικόν, harum omnium facultatum communia organa ab unico corde nasci, multis, non tamen necessariis argumentis probare studet. Itaque cor venarum esse principium, primo, secundo & tertio de partibus animal. secundo de generatione animal. tertio de historia animalium, lib. de som-

no & vigilia, & libello de respiratione, contendit. Hunc sequuti sunt Auerroes, Alexander, Themistius & Philosophi ferè omnes; ex Medicis physicis Erasistratus, Aponēsis, cetero-
uersarum medicarum Conciliator & Turisannus, ex Anatomicis solus Vesalius. Ego de posita

*Qui Aristote-
lis senten-
tiam scitari
suerunt.*

Rationes Peri-
pateticorum.

Prima.

omni contradicendi & calumniandi prurigine, Aristotelis & eorum qui in illius dogmata iuraverunt, rationes primum proferam, illustrabo, amplificabo; deinde ad veritatis regulam examinabo. Prima Peripateticorum ratio hæc est. Cor nativi caloris fons est & sanguinis officina: venæ organa sunt deferendo sanguini & calori dicata: debent igitur à corde ortum ducere. Cor nativi caloris fontem esse uberrimum, nemo inficiabitur. Quod autem sanguis sit officina, ita demonstratur. In dextro cordis sinu, sanguis continetur, tanquam in fonte, sisterna & conceptaculo; in hepate verò ut canali & riuolo, quia nulla est in hepate cavitās,

Illustratio ra-
tionis.

venarum tantum apparent plexus. Hanc Philosophi rationem ita illustro. Vbiunque nova sit & officialis coctio, ibi requiritur cavitās; sic in ventriculo ad chylosin cavitās adest insignis, in corde ventriculi duo sunt, in cerebro ad spirituum generationem sinus quatuor: in hepate nulla est cavitās, nulla itaque coctionis officina. Secunda ratio afferri solet: Cor primum

Secunda.

est vivens; ergo primum nutriendum, vita namque definitur nutritione; nutriuntur autem singula partes sanguine, sanguinem deferunt venæ caue rivi, quem à corde accipiunt. Est ergo cor sanguificationis & venarum principium. Sed & nullibi continetur sanguis extra

Tertia.

venas in ventre, præterquam in corde, statim enim extra venas putret aut concrevit. ergo sinus cordis propria sunt sanguinis conceptacula; quod si concedas, venam inde enasci, consequens fiet, cum venæ deducendo distribuendoque sanguini tantum dicatae sint. Præterea in

Quarta.

animi pathematis, ut metu & tristitia, refugit sanguis ad cor, non hepar, non cerebrum; ergo ibi fons sanguinis; si sanguinis officina in corde, ergo & venarum principium. Accedit

Quinta.

quinta ratio non inelegans. Ibi venarum est origo, ubi earum apparet terminus aliquis; at venæ caue terminus aliquis in dextro cordis sinu apparet, estque illius eadem implantatio, quæ arteriæ magnæ; eius verò rami per hepar tantum disseminantur, reliqua viscera pertrā-

Sexta.

seunt, aut in capillamenta abeunt. Quin & vena caua cordi ita firmiter heret, ut nulla arte citra cordis distractionem diuelli possit; ab hepate autem radices ille illacere & à cæ-

Septima.

teris partibus rami omnes separari possunt. Quid? annon maior venis cum corde, quam cum hepate intercedit similitudo? hepatis namque caro mollis est, cordis durior, densior & quasi coriacea, qualis est venarum; cor cauum est, venæ caue sunt. Sed & in cordis basi vasorum

Octava.

quatuor insignium apparent ostia, eadem planè ratione hiantia; sunt autem vasa hæc, aorta, arteria venosa, vena arteriosa, & vena caua: at convenit inter omnes, priora tria à corde or-

Nona.

tum ducere, cur non igitur caua, quæ similem habet cum arteria venosa structuram, ab eodem fonte scaturiet? Addam ego rationes Francisci Rosseti Medici Regij, cuius ego singula-

Decima.

rem doctrinam & miram in disserendo subtilitatem semper magni feci. Similitudo val-
vularum (ait) aut epiphyseon cordis in venæ caue principio ad cor positarum, collocata cum aliis tribus vasīs à corde medio orientibus, arguit venam cauam à corde oriri;

Undecima.

membrana enim illa, veluti fores ostiis venarum apposita, videntur esse quasi venarum capita, in hepate nihil tale cernitur. Præterea venæ omnes cordi continuæ sunt, & à caua tanquam matrice prodeunt, ut & porta & umbilicalis, caue à corde in hepar descen-

Dodecima.

dentis, sint propagines: si enim in umbilicalem editi fatus mortuique venam tubulum im-

mittas & infles, videbis moveri cor & pulmones. quod ego aliquando expertus sum. Postremo debuerunt venarum & articularum proxima esse principia, ob necessitatem per-

petui comitatus & mutue eorum vasorum presentie, alterum enim vas sine altero, inutile est. Eius coniugij quasi fraterni ratione, ambæ à priscis venæ dictæ fuerunt; hæc quidem pul-

santes, illæ verò quietæ. Vesalius hæc Aristotelis & Peripateticorum sententiam rationibus aliquot fulcit, calumniandi potius stimulo, quam veritatis studio percitus. Sed quàm fatiles sint & inanes proprio capite mox disputabitur. Iam alterius sectæ argumenta in publicum expromamus.

Galenī & Medicorum sententia, quæ hepar venarum principium statuit.

EXERCITATIO III.



GALENVS sexto de placitis Hippocratis & Platonis longa oratione in Aristotelem inuehitur, & venas omnes ab hepate nasci, non à corde, multis iisque validissimis rationum momentis conuincit. Primum eius argumentum à similitudine petitur. Quemadmodum arboris radices variis capillamentis humi sparsæ, in unum coeunt caudicem, qui paululum profiliens, in duos insignes disparilescque ramos diffunditur, hi rursus in alios atque alios

disparguntur, donec in minutissimos abeant, ita vena caueg radices innumeris surculis per vniuersum hepatis parenchyma sparsæ, in vniū desinunt truncū, qui statim ferè vt ab hepate profiliit, bipartitò finditur, quasi in duos pregrandes ramos diremptus, eorum vnus ascendens, alter descendens dicitur, vterque rursus innumeris quasi surculis fruticatur. Similis est veng portæ per hepar dispersio. Quia ergo venarum omnium radices in hepate sunt, hepar earum principium dici debet. Improbatur à quibusdam Galenica hæc similitudo. Non enim ex radicibus truncus arboris nascitur, aut alitur, sed potius ab vberima corticis viuacis basi, quæ in medio est, arborei trunci & radix & rami pendent. Quod autem planta non habeat ex capillamentis radicalibus originem, ex eo patet, quod ex alterius plantæ seminibus radice omni carentibus, vel ex taleolis, aut palmitibus in terram depactis radicem nullam habentibus, vel ex surculis radices exeunt deorsum, vt rami sursum. Sed non videntur hi, Galeni mentem assequi. Noluit enim venas plantæ modo ab hepate germinare, dein paulatim auclas tandem in partes ferri, sed in hepate tantum ceu terra, venarum omnium radices infixas voluit, quæ in truncum & ramos omnes sanguinem vi parenchymatis alteratum excoctumque effundant. Secunda ratio à sanguinis colore sumitur. Sanguinem venarum omnium simplicem tunicam habentium si inspicias, à sanguine in hepatis vasis contento, nec colore, nec substantia, nec temperie differre videbis: contra, sanguinem in dextro cordis sinu elaboratum tenuiorem, calidiorem & magis spumantem reperies: non igitur venosi sanguinis officina est cor: quare nec venarum principium, vel ita liceat argumentari. Sanguis in vena caua & ramis portæ contentus, ruber est, colorem hepatis referens: qui autem in corde elaboratur flauus est & spumosus, si ergo in hepate colorem hunc accepit, verisimile est hepar sanguificationis esse principium: & per consequens venarum. Rident quidam Galeni hanc rationem, quia & sexum, & pituitam, & bilem gignit hepar, quæ tria rubra non sunt. Quin & hepar à sanguine rubescere potius quàm sanguinem ab hepate putant, quia suo colore flauo uesticulam felleam tingit bilis, vt & totum corporis habitum eadem bilis diffusa. Sed non videt homogenea sola, quæ possunt assimilari, contactu hepatis rubere, heterogenea verò non partis transmutatis colore sed solius materis & caloris efficientis dispositione sequi. Sed pergamus Galeni rationes proferre. Quæ animalia pulmone carent, vnicum habent in corde sinum, sinistram scilicet, at quomodo in illis à corde orientur veng? Poteruntne ab unico sinu, cuius unica est temperies, nec dissimilis structura, duo distincti spiritus sanguisque duplex temperamento diuersus, venosus scilicet & arteriosus, per duo vasorum genera distribuendus manare? Aliunde ergo in illis animalibus quàm à corde orientur veng, eritque in illis hepar venosus, vt vnicus ille cordis sinus arteriosus sanguinis, officina. Preterea duæ tantum sunt veng rubrum sanguinem deferentes, porta & caua: at porta cor non attingit, habet tamen radices per hepatis carnem sparsas: si itaque portam ab hepate oriri admittunt Peripatetici, cur caua, quæ structuram habet omnino similem, quæ sanguinem eiusdem coloris substantiæ & temperamenti continet, quæ denique radices variis capillamentis eodem modo infixas habet, ab eodem principio, hepate scilicet, non oriatur? Si dicant aduersarij quasdam esse

O denice rationes.

Primariis à similitudine.

Improbatio similitudinis.

Explicatur Galenus.

Secundaria ratio.

Illustratio huius rationis.

Improbatio à quibusdam Galenitatis.

Defensio Galeni.

Tertia.

Quarta ratio.

Obiectum qua-
randa[m] sa-
tisfit.

Quinta.

Sexta.

Septima.

Validiora ar-
gumenta.

Octava ratio.

Nona.

Decima ratio
elegans.

Undecima.

Responsum
quorundam
nullum.
res mem-
branularum
cordis.

Pro argum-
tationi na-
stra.

in hepatis substantia radicum caue & portę anastomosēs Galeno & veteribus Anatomici incognitas, ideoque portam cordi esse continuam & a caua oriri; hoc illis obtrudam, diuersas esse caue & portę radices, varięque implicatas, vt altera alteri ortus sui principium acceptum non referat: sic venarum & arteriarum quamplurime sunt anastomosēs; nammen venas ab arteriis, aut has ab illis oriri sapiens quis dixerit. Quid si dicam vtrasque venas principio tantum suo, iecori scilicet, non cordi consociatas apparere? Factum dissectio satis indicat; sanguinem ex hepate mitti ad cor: umbilicalis enim vena, sanguinem in hepar refundit. Oporteret (ait Galenus) si a corde oriretur caua, eam pulsare vt arterię pulsant, pulsaret enim totum cor, nec minus dexter quā sinistēr sinus. Quin & vena caue in cor insertio, eam a corde non oriri manifestē indicat, latus enim velut lacerum adaperit cordi, nec ab eo egreditur: id quod luce meridiana clarius apparebit, si venam in longum per thoracem sectam sanguine expurgaueris; eius enim corpus continuum ascendere ad clauas vsque spectabis, nulla in dextrum cordis ventriculū facta totius cœui trunci infertione. Sed leniora befortasse multis videbuntur; stabiliamus ergo Galeni sententiam firmiter demonstratōnibus. Ibi venarum principium statui debet, vbi venosi sanguinis est officina. At hepar, non cor venosi sanguinis officinam esse multa suadent. Vbi enim excrementorum sunt receptacula, ibi verisimile est coctionis officinam adesse, aut saltem non lōge abesse: at in hepate & non longē ab hepate supernacuorum hematoseos, apparēt omnia receptacula, vesicula, lien, renes; est igitur hepar, potius quā cor, venosi sanguinis officina. Certissimum est nunquam labefactari sanguificationem nisi hepate leso; nunquam sit hydrops, Galeno teste, nisi hepar afficiatur, at hydrops scēpnos est siue priuatio sanguificationis. Hepar preparare tantum, per autem perficere & distribuere sanguinem contendunt Peripatetici; sed nos distributionem & perfectionem in hepate fieri volumus. Est autem huius rei hac elegans demonstratio. Ministri officium est vt prepararet solum, non distribuat, materia verō nondum perfecta distributioni nutritionique inepta est: si itaque securi cordi sanguinem prepararet tantum, sanguinem distribuendum relinqueret cordi; at distribuit ipsum per se, statim enim expurgatus a suis excrementis in cauis hepatis sanguis, ad venam eam in signem perlabitur, tuncq; maxima eius portio, priu squam cor attingat, ad ramum descendens fertur, inferas omnes partes perfecte aliturus. Quia ergo distribuitur ad alendum, iam perfectionem aliquam est adeptus, ideoque non a preparante ministro, sed ab opifice extremam operi manum imponente absoluitur. Si inchoatum tantum nec planē confectum sanguinem exciperet cor, vt ad alendum accommodatum redderet, vasa aliquot construenda essent; que in dextrum sinum tanquam cisternam primum effunderent sanguinem imperfectum, deinde eundem elaboratum distribuere diffunderentque in omnes corporis partes: at vas nullum inuenies, quod sanguinem venosum distribuere queat; quatuor enim tantum in cordis basi vasa obseruamus, venam cauam, venam arteriosam, arteriam magnam, & arteriam venosam; vena arteriosa & arteria venosa solius pulmonis sunt vasa, totaq; in pulmones diuancantur, arteria magna vitalem spiritum & spumantem sanguinem defert: sola ergo relinquitur vena caua; at preclusos habet hac vena sanguinis exitus, membranulis tribus foris intro hiantibus: frustra igitur a corde oriatur amplissima vena, si a dextro sinu confectus sanguis in eam effundi ad partium nutritum nequeat. Scio quid respondeant aduersarij, membranulas illas constructas esse, non vt nihil omnino intret egrediaturque, verum ne simul ac semel & tumultuose, sed subsultim & vicissim ingreditur egrediaturque sanguis, ideoque tres illas epiphytes in orificio venę caue sitas, esse quasi laceras, aut laceris similes, ne prorsus sic orificium dextrum ocludant, quin ex interiore caua aliquid sanguinis in venam cauam remeare possit. Verum vt hoc illis concedam, non tamen argumentationis vim effugient, debere a δπόας & conferim, non sensim paulatimque a cordis dextro sinu, in

venam cauam effundi sanguinem, qui vniuersum corpus alere debet. Obijcient fortasse arteriam venosam, quæ & aëri ingressum, & fumido vaporum spirituique egressum præbet: sed videant quàm sit illius arteriæ & venæ causæ dispar ratio: aliud est pelli fuliginem cum spiritus portiuicula, aliud sanguinem, qui vniuersum corpus alere debet: potest fuligo, ob tenuitatem vasa etiam capillaria & penè insensilia permeare: at ea sanguinis copia quæ ad totius corporis nutritum requiritur, patentissimum ostium postulat. Valida sanè est hæc demonstratio, quæ tamen sequenti roborabitur. Cur in orificio arteriæ venosæ valvulas tantum duas apposuit natura? an non quia non omnino intercludi oportuerat illius ostium, ut fumido vaporum & vitali spiritui tenuissimo exitus præberet? Si ergo per causæ ostium sanguis in dextro sinu excoctus & perfectionem adeptus egredi debuisset, vnica opus fuisset membranula, quæ impetum tantum egredientis sanguinis sisteret, aut æquius fuisset duas tantum in orificio causæ valvulas, & tres in orificio venosæ arteriæ locare, quia sanguini crassiori etiam paulatim exeunti amplius & magis patens debebatur ostium, quam vaporum & spiritui tenuissimo. Sed demus nullas esse in orificio venæ causæ membranulas, cum tamen sensibus sint conspicuæ, aut in eum fortasse usum, quem veteres agnouerunt, constructas non esse: saltem fateantur Peripatetici necesse est, per venam cauam sanguinem crassum adhuc, nec planè elaboratum dextrum ingredi cordis sinum, ibi accuratius excoqui, coctum in venas remeare, ab his in vniuersum corpus distribui. Hæc si vera sunt, duo erunt perpetuo vno & eodem tempore in eodem vase motus contrarij. Nam per venam cauam haurietur sanguinem in diafole, & in eandem venam dum contrahitur effundet sanguinem, ita perfectus cum imperfecto, crudus cum excocto semper miscebitur, & motus erunt continui (perpetuus enim est nec vnquam interruptus cordis motus) sanguinis ab hepate ad cor ascendentis, & eiusdem à corde in hepar descendentis, quod sanè diu natura non patitur. In venis mesenterij diuersi quidem apparent motus chyli & sanguinis, sed perpetui non sunt, & trahentium partium diuersi appetitus id præstant: nam hepar per mesenterij venas chyli sugit, intestina per easdem sanguinè prolestant: at venæ causæ vi ea non pollet quæ à dextro sinu sanguinem prolestat. Non solet, inquit Galenus, natura vnico vase materiam nondum elaboratam introducere, & eandem elaboratam educere. Hæc sunt Galeni & Medicorum demonstrationes.

Obiectum.

Solutio.

Duodecima.

Decima & tertia.

ARISTOTELIS OPINIO EXAMINATUR, & Peripateticorum singulis rationibus satisfuit.

EXERCITATIO IIII.

DIRECTAS utriusque sectæ hinc inde acies vidistis. Ego utramque tueri partem non possum, non enim duo simul sustinet contraria veritas: malo igitur Galeni & Medicorum dogmata tutari. Galeno enim tanquam præceptorum semper faueo, licet is meo non egeat patrocinio, satis per se magnus: ut ergo Galenice opinionis veritas reddatur illustrior, quæ à Peripateticis propositæ sunt rationes singula expendantur. Obijciunt, cor sanguinis esse officinam. Nos duplicem agnoscimus sanguinem, venosum, quo singule partes nutriuntur, & arteriosum, quo singularum partium calor susciatur. Cor arterioso tantum, non venoso sanguinis officinam agnoscimus, quia à dextro sinu in venam cauam resfluere non potest sanguis ob tricuspides illas membranas, & rationes iam à nobis allatas. In hepate (aiunt) nulla est cavitatis, nulla igitur officina. Respondet Galenus, quarto de usu partium, nullam in hepate cavitatem constructam, quia hepatis parenchyma princeps hæmatoseos organum, sanguinem omni ex parte attingere debuerat, ut eo contactu, formam, ruborem, &

Prima Peripateticorum ratio examinatur.

Respondetur primæ rationi. Cur in hepate cavitatis nulla.

Secunde ra-
tionis saluti.

Car non est
primum nu-
trient.

Tertia ratio
fuit.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Septima.

Octava &
nona saluti.

Decima.

Undecima.

perfectiorem imprimeret. Neque verò ad omnem coctionem requiritur perpetuo sinus. In-
stibus seminis fit generatio, at ibi plexus multi, cavitas nulla; in mammis plexus multi, cavi-
tas nulla. Ea tantum quæ vel receptura erant, vel mandatura, confertim uberem copiosam-
que materiam, cautate indiguerunt. Cor volunt primum esse vivens, ergo primam nutrien-
tem, quia vita nutritione definitur. Nos primum vivere cor insciamur, ut libro de formatione
factus demonstrabimus; sed demum primum esse vivens, non propterea consequens fiet, primum
esse nutrien-tem; nam primum nutrien-tem duobus modis intelligi potest, aut quod primum nutri-
tur, aut quod ceteris omnibus partibus alimentum suppeditet, at utrumque falsum. Nutrien-
tem enim à sanguine est, sanguis non nisi per venas fertur, umbilicalis autem vena sangui-
nem prius in hepar refundit, quam cor, non ergo primum alitur cor, neque etiam primum est nu-
trien-tem, quia alitur fetus materno sanguine per umbilicalem venam in portam, & ab eo in
cauam, tum descendentem, tum ascendentem delato. Erat tertia Peripateticorum ratio, san-
guinem extra venas statim concrefcere, præterquam in corde. Sed neque etiam in hepate con-
crefcit, quinimo animali extincto concrefcit in sinibus cordis, nunquam in vasis hepatis. Ob-
ijciunt, refugere in animi pathematis sanguinem ad cor, non hepar. Sed nihil concludit hec
ratio, docet tantum cor sedem esse pathematum. Terminum venarum, in corde esse volumus,
ramos autem per hepar disseminari: sed numquid arterie coronarie rami per totam cordis
substantiam sparguntur, ut & coronaria vena, quæ per uniuersum cor propagatur? Cordi
venam ita herere dicunt, ut nulla arte diuelli queat. Hoc ego sciens volensque admitto, de-
buit ob perpetuos cordis motus ita firmiter alligari. Quapropter est potius venæ causæ in cor
inexplicabilis insertio, quam eius à corde emanatio. Quæ de venarum & cordis similitudine
afferunt, nullius momenti sunt: nam nec eam similitudinem nos agnoscimus, nec venas à cor-
dis substantia, aut hepatis parenchymate oriri sapiens quis dixerit, cum venæ cordis hepa-
tisque carne priores sint, & spermatica partes prius generentur quam sanguineæ. Octauam
& nonam rationem à valvularum & vasorum similitudine peritâ, ita soluere placet; non
oriri tria illa vasa à corde, sed utrasque tantum arterias, aortam & arteriosam venam:
venosam autem arteriam causæ esse propaginem, ut mox contra Vesalium disputabitur.
Neque verò eodem modo hiant quatuor vasorum ostia, alia enim ingrediuntur, alia egre-
diuntur: venosæ arterie, quæ reuera est vena, quæque cum venæ causæ communione habet,
membrana tricuspidales sunt; arterie autem magnæ & arteriosæ venæ, quæ aortæ continuæ
est, in sætu epiphyfes sunt semicirculares. Continuitas illa venarum, non arguit cor earum
esse principium, sed potius hepar, quia nulla porta & causæ apparet communio, nisi in hepa-
tis substantia. Postremo, quæ de necessario venarum & arteriarum comitatu & coniugio
quasi fraterno afferunt, non concludunt cor esse venarum principium, imò potius diuersos
esse horum vasorum fontes conficiunt: nam si ab unico fonte manarent venæ & arterie,
non opus fuisset tot venarum & arteriarum anastomosis.

Vesalij de ortu venarum sententia examinatur & refellitur.

EXERCITATIO V.

Excursio A-
ristotelis.



XCVSANDVS sanè in iis quæ ad Anatomem spectant, summus
ille naturæ genius & interpret Aristoteles, erat enim eius temporibus
inculta & sere sepulta Anatomica cognitio: sed satis mirari non possum,
præclarum nostræ ætatis Medicum Andream Vesalium, in sectioni-
bus exercitatisimâ, ita misere hallucinatum fuisse, ut Aristotelis potius,
quam Medicorum sententiam sectari maluerit. Contra hunc, Leoninam (ut aiunt) indu-
mus, & Hercules more, omnia quæ contradicendi studio peperit monstra, perdomemus: ita

arrogantia & ingrati in præceptorem Galenum animi pœnas luet. Maiora (inquit Vesalius) minorum sunt principia; at vena causa insignior & amplior multò apparet circa cor: erit igitur cor, non hepar eius principium. Nos ampliorem esse venam circa cor, absolute inficiamur. Ampliissimam quidem esse admittimus; & insigniorem multò apparere quàm sit, tum propter auriculam dextram, quæ excavata est, tum ob perennem cordis distolent omnia amplificantem, sed gracilior est quàm in gibba hepatis parte. Verum demus ampliorem esse venam causam circa cor, san propterea cor illius principium statui debet? Sunt in arborum & plantarum genere quedam in summo ramo crassiores quàm in trunco. Docet Philosophus, res naturales non tam ex materie necessitate, quàm ex necessitate finis metiendas: debuit necessario ampliissimum esse orificium venæ causæ iuxta cor, quia ad vitalis spiritus generationem, & pulmonum nutritionem; debuerat copiosissimus sanguis adpropius, & assatim irrumpere, quod non nisi per ampliissimum & patentissimum ostium fieri poterat. Est altera Vesalii ratio contra Galenum. Si venæ ab hepate ortum ducerent, venæ omnes attingerent hepar, essentque ei continuæ, aut contiguæ; at venæ arteriosa hepar non attingit, venosæ arteriæ, quæ structuram & tunicam habet venæ, & reuera venæ est, nulla est cum hepate continuitas, nulla cum eo intercedit communio. Quomodo igitur ab hepate orientur venæ? Sed heus bone vir, in re tam aperta ilane hallucinatus es, ut infinitos laqueos non prævideris, quibus te miserrimè interimi mox senties? Venam illam arteriosam, venamne, an arteriam esse putas? Sanè si oculatus es, arteriam iudicabis; tunicam enim habet densam, crassissimam & quintuplò vena crassiolem. Hæc in prima conformatione arteria magna continua est, per canalem satis conspicuum multis incognitum, ut putem ego, arteria magna esse propaginem, propterea illius valvule similes sunt & semicirculares. Si ergo vas illud arteriosum est, non debuit ab hepate ortum ducere, sed à corde. De venosa arteria obscurior est difficultas. Nam hæc tunicam habet simplicem, & si structuram spectemus, reuera venæ est; hæc tamen hepatis non est continua Vesalio. Ego venosam hanc arteriam hepatis & veng causæ continuam esse in prima partium conformatione assuero, & in factu semper observavi: desert enim quandiu vivit in utero fetus, sanguinem ad pulmonum nutritionem, quem eò effundit ostium venæ causæ contiguum, ut venæ arteriosæ, spiritum vitalem & arteriosum sanguinem, quem ab aorta mirabili canaliculo excipit, & in pulmones diffundit. Sed hanc vasorum cordis novæ varietatē seu communionem ignorarunt multi Anatomici, quam tamen primus omnium eleganter aperuit divinus Galenus, capite sexto libri decimi quinti de usu partium, & nos in factis Anatome & historia cordis fusius patefaciemus. Postremo ita in Galenum insurgit Vesalius. Non quia ad hepar fertur venæ umbilicalis, ideo venarum principium statuendum est hepar, quia arteriæ umbilicales cor non attingunt, quarum tamen origo est cor. Nobis non eadem venarum & arteriarum umbilicalium videtur ratio. Non enim poterant ad cor ferri umbilicales arteriæ, tum quia non satis tutum erat iter, tum quia hepatis moles erat obstaculo. Abest igitur cum suo commento Vesalius.

Prima Vesalii ratio.

Oppugnatio ratio.

Cur debuit esse ampliissimum causa ostium circa cor. Secunda Vesalii ratio.

Oppugnatio ratio.

Tertia ratio.

Impugnatur.

Epilogus totius disputationis, & quid sentiamus de venarum ortu.

EXERCITATIO VI.



A Ergo, cum ex his quæ fusa verborum serie differuimus, cuilibet planum & apertum sit, non cor sed hepar venarum esse principium, quomodo principium illud intelligi debeat, paucis explicemus: est enim principium apud Medicos acceptio multiplex, & pars una ab alia oriri dicitur multis modis. Est apud Galenum principium $\nu\epsilon\sigma\epsilon\tau\epsilon\omega\varsigma$, id est, originis, à quo tanquam à materia aut principio oriri quidpiam dicitur. Est principium $\delta\iota\omicron\chi\eta\tau\epsilon\omega\varsigma$, id est,

Principium apud Medicos multiplex est. Principium originis, Principium effectus.

Principium
radicationis.

Principium
originis nullū
est, sed sperma-
tica omnes
partes simul
delincentur.

Hepar que-
modo prince-
pium est ra-
dicationis.

Hepar prin-
cipium est officij

distributionis, dispensationis, officij, à quo aut facultas, aut communis materia manant. Est & principium p' i' cōcreas, id est, radicationis, in quo vasorum radices, quæ nutritionis principia sunt, apparēt. Si priorem significationem spectes, nec hepar, nec cor, venarum principium dici potest: non enim pars alia ab altera oritur, sed spermaticarum omnium prima flamina simul & semel incubantur, adumbranturque, non tamen perficiuntur. Absurdum est itaque quod proferunt Peripatetici, cordis carnem duram esse, densam & coriaceam, ab eaque venas oriri. Ridiculum etiam quod Medici quidam affirmant, venarum tunicas mollem esse, quia hepatis caro mollis est: nam & cordis, & hepatis carne, vena sunt priores, quia parenchyma ex affuso & concreto fit sanguine, quem deferunt vena, ut iecur potius & venis quæ ipsi intexuntur oriatur, quàm vena ab ipso. Sic hepar ab umbilicali vena & nasci, & gigni in utero, à Galeno probatur libro de formatione fetus. Principium ergo originis nullum est: & hac fuit admirandi Hippocratis sententia libro de locis in homine, & de officij natura. Vena (inquit) ab una multæ gignuntur, atque hæc una ubi oriatur & definit nescio: circulo enim factō, principium non inuenitur. Dum ergo de venarum principio disputatio instituitur, de radicationis, aut dispensationis principio questio explicanda est. At hepar utraque ratione, non cor venarum principium esse volumus. Radicationis quidem, quia portæ & caue radices in hepate solo apparent variis implicatis, & in hepate tantum, tanquam in matrice propria communionem habent, non quod plantæ modo ab hepate germinant, deinde paulatim autē tandem in partes ferantur: nam tota simul vena, arteria, & nervus, ut & radices, caudices, ac rami gignuntur, sed quod in hepate cœu terra quadam infixæ sunt: atque ut à terra, per radices cœu principia, alimentum libant plantæ: ita ab hepate, per caue & portæ radices, alimentum hauriunt singula partes. τὰ φύτᾶ, ait Aristoteles secundo de partibus animalium, ἐχουσι δὲ τῆς γῆς τὴν τροφήν. Plantæ à terra alimentum habent, quod in radice excoquitur. ὡς περ ἐν τῇ κοιλίᾳ τῶν ζώων, ut in ventre animalium. Extat præclara illa Hippocratis sententia lib. de alimento. p' i' ζωῶν πλεονῶν ἢ ὥσπερ, radicatio venarum hepar. Est etiam hepar principium officij & dispensationis, quia ab hepate communis materia, sanguis scilicet, commune partium alimentum, per venas, tum descendentes, tum ascendentes, in uniuersum corpus diffunditur, ut hepar non præparet tantum, ministri instar, sed etiam distribuatur.

An venæ vim habeant sanguificandi.

QUESTIO II.



VENIS insitam esse vim continendi, conseruandi & distribuendi sanguinem, omnibus (ut opinor) est exploratum. Sed an innatam habeant coquendi & alterandi facultatem, controuersia non caret. Sunt qui venis, non carni, actionem totam tribuunt: alij venis vim illam αἵματος ποιητικὴν omnino denegant, & soli parenchymati concedunt: nonnulli & venis & carni, sed carni primò & per se, venis secundariò & vi à parenchymate influente. Primæ opinionis auctores sunt Andreas Vesalius, libro tertio, & Laurentius Iobertus, decadis primæ, paradoxo quarto; parenchymatis enim hunc tantū agnoscunt vsum, ut vasis affundatur ne cohereant, ut puluinaris instar & mollioris subterniculi vasa fulcias stabilitatque, ut denique calore suo venarum hæmatosin promoueat, non secus ac epiploon, lien, & circumiectæ partes ventriculi coctionem iuuant. Venas verò non ὑποδοχὰς tantum, sed etiam αἱμοποιητὰς, non ἀναδόχους tantum, id est distributioni, sed sanguificationi & coctioni perfectæ inservire volunt. Confirmatur hæc opinio Galeni auctoritatibus & rationibus satis validis: ex cuius locis multis pauca quidem hic retulisse sat erit. De naturalibus facultatibus libro primo ita scriptum reliquit, ubi chylus sanguis fit,

Vena sola
sanguinem
coquere va-
lens, ut Vesalius
& Iobertus.

Auctoritas
ter Galeni.

nem in vasis fieri, coctionem verò in peculiari parvis substantia. Semen in spermaticis vasis preparatur, coquitur in testium substantia, ibique seminis formam & prolificam vim consequitur: animalis spiritus, in plexibus arteriarum labyrinthis preparatur, coquitur in sinibus & substantia cerebri: tertia coctionis preparatio in venis fit exilibus; coctio in parvis substantia: propria autem hepatis substantia carnosae est, unde carnosum viscus dicitur Hippocrati & Galeno; huic igitur princeps debetur actio, venis verò secundario & per exip-
 ρολω id est, influxum aut irradiationem. Hæc sunt gravissimorum virorum de sanguificatione placita omnino inter se dissidentia. Nos ut e mediis dubitationum fluctibus, intuitissimum portum nos recipiamus, duo cum doctissimo Keiga in hæmatosi spectanda volumus, elaborationem & rubificationem. Quæ quoniam multis obscuriora videbuntur, illustranda sunt nobis. Elaboratio coctionis quædam species, quia similis est actio, à temperie sola perficitur, rubor non à temperie immediatè, sed ab iis quæ temperiem sequuntur, ut colore, immediatè pendet. Sic chyli candor non à temperie, sed colore ventriculi: puris & hypostaseos albedo, non à temperie venarum, sed à colore; seminis & lactis candor, à solo glandosarum partium colore candido manant. Venis omnibus præsertim hepatis proximis, vis insita est coquendi, alterandi, immutandi; aliis quidem preparandi, ut venis mesenterij, aliis perficiendi, ut maioribus venæ cavae ramis; sed sanguini ruborem imprimere, soli carni & parenchymati concessum volumus, quia sola caro rubra. Sic itaque hæmatosi fieri existimamus. Exiunt mesenterij vena tenuiorem chyli portionem, quam præparant hepatis, eamque ad portæ truncum & radices per hepatis corpus numerosa serie sparsas transportant; in illius venarum plexibus attenuatur & læve quasi rudimentum, non coloris, sed substantiæ & qualitatum adeptus sanguis, facile ob venarum tenuitatem (sunt enim tenuiores in hepate quàm alibi vssiam venarum tunice) exudat & per mediâ visceris carnem transcolatur, quo carnis contactu statim & quasi momento ruborem consequitur; hinc aut per διαπύδνον, aut per eas anastomoses à recentioribus deprehensas in cavæ radices fertur, à quibus in truncu & ramos tanquàm per tubos & aqueductus in uniuersum corpus excurrit. Hæc itaque nostra est de sanguificatione sententia. Ne quid verò fluctuantes rudiorum animos remoretur, diluenda sunt in contrariis adductæ rationes. Primæ opinionis rationibus ita satisfaciendum puto. Galeni autoritates, coctionem & alterationem tantum sanguinis, non rubificationem probant, quibus nos libenter assentimur. Prima autem eorum rationi nihil concludit. Licet enim venæ in prima conformatione hepatis parenchymate sint priores, non tamen sanguinem prius generare fatebimur, quia maternum sanguinem deferunt tantum & distribuunt; adde quod in fetu nulla est communis & officialis actio, ventriculus non chylicat, hepar non sanguificat, cor vitales spiritus nullos generat, pulmo non movetur, thoracis nulla est actio. Secundæ & tertiæ rationi unico responso satisfis. Non remanet in vasis perpetuo sanguis, sed per medias hepatis carnes transcolatur. Annon seri sit per venâ carnes transcolatio, & sanguinis à dextro cordis sinu in sinistram per septum medium, lactis per mammas, seminis per testium substantiam? Ea igitur transcolatione sanguinis ferè omnes particule ab hepatis parenchymate alterantur & rubescunt. Postremam ab soluti negamus, neque chylo ali intestina & epiploon volumus. Quæ de venarum colore obicit Argenterius, docent tantum eas sanguini ruborem non indere, sed vi alterandi & coquendi eas non pollere, nullomodo cõficiunt. Dum verò pus venarum opus & hypostasin carumdem excrementum esse docet, non videt venarum duplicem esse actionem, unam peculiarem & priuatam, cuius excrementum est hypostasis; alteram communem & officialem, quam ab hepate mutantur, sanguinis quippe præparationem, coctionem & elaborationem. Stabit igitur inuicta opinio nostra, carnem hepatis principem esse sanguificationis partem, eamque solam sanguini ruborem & formam indere.

Coctio omnis à peculiari sit partis substantia.

Opinio nostra.

Alteratio à temperie, rubor à colore.

Quomodo fit sanguificatio.

Prima opinionis rationibus satisfis. Ad primam.

Ad secundam & tertiam.

Rationibus Argenterij respondetur.

Soluuntur tria problemata priorem quaestionem illustrantia.

QVÆSTIO III.

TRIPLEX hic problema excutendum. Primum si vena non rubescant, cur rubens perpetuò mesaraica, neque unquam candidus succus in eis apparet? Dic proleptum à mesaraicis chylum quâsumvis cãdidum, statim rubere, non quod vena ruborẽ indat, sed permixtione sanguinis ab hepate eò confluentis ad intestini nutritionem, cuius guttula cremorem totum suo colore inficit; sic sanguinis guttula, urina & lactus libram inficere potens est. Ergo inquires si chylo permiscetur sanguis, eo sanguine crudo nutriuntur intestina, & hepar non purum ac impermixtum, sed adulteratum cremorem trahet. Dic trahentium partium diuersa desideria permixtos succos secernere. Verum curiosus quis sciscitabitur. Cur si permixtione sanguinis rubet in venis chylus, non rubet etiam in intestinis? Expedita responsio est; Quia non hiant venarum oscula ad cauitates intestinorum, sed obliquo ductu inter duas tunicas feruntur. Secundum problema. Cur si venarum pituita per in medias in sanguinem verti potest, ut docet Galenus commentario secundo libri De ratione victus in morbis acutis, venis vim rubefaciendi denegamus, cum pituita candida sit, sanguis autem ruber? Fatemur sanè pituitam in sanguinem verti posse, sed mutationem illam hepatis, non vasis acceptam referendam putamus. Trahit enim fœmelicum hepar pituitam & crudos succos, non modò à maioribus venis, sed etiam ab exilioribus, ut docet Galenus cap. 13. libri tertij de facultatibus naturalibus. Nam si ventriculus famè tempore, scilicet idum succum interdum trahit ab intestinis: cur hepar pituitosus & crudos succos à venis non proluciet? Tertium problema. Cur si rubor sit ab hepatis carne, quæcumque in hepate generantur, non sunt rubra, sed quædam flaua, quædam atra? Dic caloris proprium esse homogenea cogere, & heterogenea separare. Homogenea ergo sola, quia assimilari possunt, contactu hepatis rubent: heterogenea verò solius caloris & materiæ, non transmutantis partis dispositionem sequuntur: quod enim in chylo est dissimile & tenuius, à calore flavescit, quod & assius, à calore adustum, nigrescit. At hi sunt caloris & ignis gradus, ut ex flauo nigrescit quidpiam, ut in prunis apparet candentibus. His iam videtur vniuersam hematoideos naturam attigisse.

Problema primum, cur tunc rubet mesaraica. Responsio.

Cur non rubet chylus in intestinis. Responsio. Secundum problema.

Responsio.

Tertium. Cur non omnia rubent in hepate. Solutio.

De venarum sensu, motu & villis. QVÆSTIO IIII.

DE venarum sensu & motu, leuiss est controuersia. Galenus 2. de locis affectis, & lib. de morborum differentiis, in sensiles putat esse venas; decimo sexto de vsu partium, vasis omnibus sensum denegat. Arteriae, inquit, & vena parvis cuiusque sensus omnino sunt expertes, siue illas rumpas siue vras, siue incidas, siue laqueis excipias. Contrà in Aphorismis, renum affectus si vasa occupent, dolores vehementes inducere affirmat: secundo de locis affectis, necnon libris methodi, in venis & arteriis doloris quãdam speciem agnoscit. Libro de plenitudine, Cum vena (ait) aut arteria nimis distenduntur, affectus pertinent ad continentia vasa; cum autem vas grauatur, pertinet ad sentientem facultatem. Sed dissidentes hos locos conciliabis, si dixeris, sentire quidem venas & arterias, sed admodum exiliter, vel eas quæ membranis teguntur communibus sentire, eas autem quæ per viscus oberrant, aut parti alicui hærent, non sentire. Quæ de renum vasis obiciuntur, de vteribus membranosis & exquisitissimi sensus intellige, non de arteriis, aut venis renum, in quibus calculi non generantur, ut in sinu illo renum nervoso. Moueri vult aliquando Galenus venas, aliquando esse immobiles. Responde,

Venis sensum denegat Galenus.

Vasa sentire docetur.

Conciliatio locorum Galeni.

An moueantur venæ.

Solutio.

An flote ve-
narum ad mo-
tum sine con-
tracta.

Quid sentia-
mus.

Quid sit &
xal' i'g.

Quid rectitu-
da.

Villi ad recti-
tudinem nihil
conferunt.

ex Galeni libro de tremore & palpitatione, motuum alios esse sensiles, eosque vel animales, ut musculorum, vel vitales, ut arteriarum & cordis; alios insensiles, quales venarum sunt motus. Ceterum non moventur venę, quia in illas non influit vis cordis σφυγμική. De venarum villis obscurior est difficultas. Non enim motui inferuire existimantur quidam, quis venas continuo moveri, contrahi scilicet ac dilatari cerneremus: contractis enim longis, dilatari ambas fibras dum trahunt, contractis vero transuersis ad expellendum constringi eas & oculis, & tactu cerneremus, quos motus nemo unquam obseruauit. Sed & exacte secantibus fibrę ille in venis non conspicuntur, aut si apparent, ita intertextę sunt, ut moveri non possint. Ego non ita esse conspicuos hos motus, nec villos etiam ita sensiles esse puto, non tamen & villos, & motus omnino nego; nec est quod eorū texturā nobis obiciant; nam & cordis fibrę varię sunt textę, non minus tamen eorum opera moveri cor desinit. Trahunt ergo vena sanguinem alię ab aliis, & transmittunt alię ad alias fibrarum miniflerio. Precipuum tamen villorum, vsum puto esse cum Fallopio ad δυνάμειαν, ut ad omnes sanguinis violentos occursus extendi possent vena. Vtrum verò vacuatio illa, quę xal' i'g sit, per harum fibrarum rectitudinem fiat, breuiter inquirendum. xal' i'g idem est quod ē regione, & ē directio, idēq; sonat quod xar' εὐθύμεχαν id est, secundum rectitudinem. Huic opponitur τὸ ἀνὰ πλάγιον, id est, ē diuerso. Eius autem quod xar' i'g suscipitur, magna est vis inercitici excretionibus. Huius rectitudinis multiplex est interpretatio, alij enim ad fibrarum rectitudinem referunt; alij ad partium continuationem; alij ad partium situm & rectitudinem. Prioris scēte author est Fernellius cap. 5. libri 2. Method. Humores enim sponte recto fibrarum cursu defluere scribit, & Gal. 13. Method. Laborante crure sanum scarificare iubet, seruata villorum rectitudine. Sed villos ad vacationem nihil aut certe parum admodum conferre existimo. Nam si natura duce suscipitur vacuatio, ea excretionē perficitur, excretioni autem non recte, sed transuersę fibrę dicatę sunt. Si rectos venarum villos humorem noxium trahere velis, cur ad vulneratam & debiliorem potius trahēt partem, quā ad aliam? Quin etiam recti villi ubique protensi sunt, & per venarum longitudinē excurrunt, inflammato ergo hepate pariter aequaliterque trahent dextra & sinistra partes. Qui Hippocratis xal' i'g, ad partium societatem & continuationem referunt, dextra dextris, sinistra sinistris continua esse putant, non dextra sinistris. Sed facile est eos conuellere; nam cum vnicus sit caue truncus, eius rami per aequē hepate erunt continui. Referenda est igitur vacationis rectitudo, ad partium rectitudinem, quia dextra dextris, sinistra sinistris sunt ὁμόφυλα. Est enim maior vis in forti contentione obsessę partis, quā in venarum situ. Sed hac fortasse παρέρχως. Plura enim ex medendi methodo & reuulsionis legibus sunt repetenda.

An eadem venę mesenterij simul & semel chylum vehant, & reuehant sanguinem.

QVÆSTIO V.



VE AD MODVM venę portę truncus, in duos pyramides ramos, splenicum & mesentericum diffunditur; ita in venę portę historia duo obseruantur implicita. Primum, an per splenicum ramum expurgetur faculentus sanguis, alterum, an per mesentericum chylus feratur ad hepar, & sanguis ab hepate remeet ad intestina. Priorę questionem agitabimus capite de liene, posterior hęc breuiter excutienda. De mesaraicarum usu multiplex est opinio. Sunt qui velint me-

De usu vene-
rum mesente-
rij multiplex
opinio.
Prima opinio.

sentierij venas chylum tantum ad hepar vehere, cui statim rudimētum aliquod sanguinis conferant, nihil autem per eas, resuere ad intestina, tum quia sanguine ea non aluntur, sed chyli tenuiore portione: tum quia rectā feruntur omnes venę hiāntque ad intestina, nec eorum los-

gitudinem permeant; oportebat autem si sanguinem deducunt ab hepate, expandi per alenda membra, non hiare ad primum membri contactum: tum denique quod mesaraicarum osculis valent, sunt appositae quasi ostiola, quae chyli & sanguinis refluxum ad intestina prohibeant. Verum huius opinionis leuitas ex eo conuellit, quod nec ventriculus, nec intestina chylo aluntur, ut suo loco demonstrabitur, sed sanguine vi parenchymatis alterato, & quamuis hient venarum oscula, excurrunt tamen per omnes intestinorum tunicas. Valuula verò ille, quam primus author fuit Columbus, mera figmenta sunt, mera nugae. Quomodo enim si nihil per venas in intestina fluit, prauis humoris in vacuatione naturali & arte facta per intestina expurgantur? Est vacuatio hac natura maximè consueta & familiaris. Sunt loca hæc Hippocrati primo Aphorismorum & Galeno *Ἐμφύεσθαι*, conferètia; huic diarrhois criticæ, dysenteria hæmatides. Est altera quorundam opinio existimantium per venas, mesenterij & chylum transportari ad hepar, & sanguinem reuehi ad intestina, sed diuersa esse vasa, diuersis his officiis dicata. Nisi enim (aiunt) discreta essent vasa, sanguinem purum intestina ad sui nutritionem non prolectarent, sed chylo adulteratum; hepar verò non chylum, sed sanguinem traheret, ita permisti essent in vasis succi, neque perfectæ unquâ fieret nutritio. Quintiam nisi distincta essent vasa, duo essent contrarij motus, fluxus chyli, & refluxus sanguinis, quod sanè natura non patitur. Verum cum in anatome flos autopsie sit adhibenda fides, qua arte venarum hæc discrimina obseruarint, non video. Intuere quæso tu quisquis es, etiam oculis plusquam lynceis mesaraicarum riuulos omnes, eorum insertionem, exortum, structurâ, colorem contèta, similia omnino ubique obseruabis: quod si vena quedam vehendo soli chylo essent dicata, alia sanguini deducendo; ille aliquando candida apparerent, aut saltem non ita colorate, harum verò insertio esset dissimilis. At quis unquam venas mesenterij cremore & lacteo succo confertas vidit? Lacteam fateor, & albam venam appellarunt veteres portam, non ea ratione quod succo candido esset conferta, sed quod album succum cremori persimilem traheret. Quæ autem de contrarietate motuum obtrudunt, leuissima sunt; sunt quidem duo hi motus numero distincti & diuersi, sed specie non differunt, nec contrarij sunt: mouetur chylus ad hepar, mouetur sanguis ad intestina, trahit utraque pars familiarem succum, sed diuersa sunt obiecta, diuersi termini, à quo & in quem, unus idemque terminus per quem fit motus. Tertia opinio eorum est qui per easdem venas, & ferri chylum ad hepar, & reuehi sanguinem ad intestina sibi persuadent, sed diuersis id contingere temporibus volunt, quia diuersa distributionis chyli & sanguinis sunt tempora, quæ partium tractum non impediunt. Primum enim fit chylosis in ventriculo, mox eiusdem perfectio in intestinis, in quorum anfractibus dum moratur tenuior chyli portio, cremori persimilis, à venis mesenterij sugitur, & ad hepar transportatur, ubi sanguinis formam consequitur, statimque in venas relegatur & à singulis partibus trahitur. Itaque cum diuersa sint collisionis tempora, diuersa erunt etiam distributionis, nihilque impedit per eadem vasa ferri & chylum & sanguinem diuersis temporibus. Sic arteria venosa in diastole cordis aërem in sinistrum sinum deferit, eademque fumidos vapores per systolen expellit. Quis fieri potest (aiunt) ut ab iisdem villis, eodem tempore, in diuersa rapiantur chylus & sanguis: nam si potentius sit iocur, sanguinem cum chylo simul ad sese proliciet: si intestinorum facultas attractrix valentior sit, chylum cum sanguine trahent: si villorum equalis sit contentio, nullus fiet tractus. Hæc est de mesaraicarum officio & vsu quorundam Philosophia, quam bonus nunquam admittet Medicus, quia nutritionis veræ & tractus nulla sunt certa & definita tempora, trahit toties pars, quoties exhaustum sentit: poterunt ergo eodem tempore & intestina, & iecur esse famelica: quare eodem tempore, hoc chylum, illa sanguinem allicient. Non est earum partium appetitus animalis & cum ratione, ut hæc obsequatur, illa imperet, trahit sua quamque partem voluptas, nullisque in tertiâ cõctione alendarum partium ordo obserua-

Cmuelitur.

Valuula in
venis mesen-
terij nulle
sunt.

Secunda opinio.

Diuersa esse
vasa.

Cmuelitur.

Non sunt dis-
tincta vasa
chyli deduc-
endi & san-
guini.

Tertia opinio.

Cmputatio
huius opinio-
nis.

*Opinis infra.
Omnes mē-
terij venas
eadem vi et
dicione serui-
tutis.*

tur. Superest, ut nostram hac de re sententiam aperiamus. Omnes mesenterij venas una-
demque conditione seruitutis uti, id est, & chylum in iecur transportare, ut & ex hoc in in-
testina sanguine refundere existimamus, interdū diuersis tēporibus, interdū simul & semel
urgente necessitate, neque ob id permistos & adulteratos succos intestina, ac iecur trahere
volamus, quia diuersarum partium trahentium diuersi sunt appetitus, diuersa desideria; sit
sanguinis portiones quatuor, unica massa, & unico vase conclusa, à singulis partibus synce-
ra trahuntur & secernuntur: pulmo tenuiorem, cerebrum frigidiorē, ossa crassissimam
prolestant sanguinem. Quid: annon per criticas excretiones succorum permistorum secreti-
onem quotidie obseruamus? Lac è mammis ad venas sæpè refluit, indeque per vterum & vesi-
cam expurgatur purum sincerumque, cum tamen sanguini permistum fuisse nemo inficitur:
empyicorum, pleuriticorum & peripneumoniorum pus, per perirrhiam & diarrheam sæpè
expurgatur, sanguine nullo adulteratum, cum tamen per arterias aut venas, ut libronio
disputabitur, feratur, quia pellitur tanquam noxium à natura pus, retinetur autem sangui-
nature thesaurus. Sunt sanè natura discretivis vires maxime, quas mirari magis debemus,
quàm sperare ut eas possimus peruestigando assequi. Quis enim non obstupescat, vnam
omnibus momentis, ex toto corpore per easdem venarum vias à renibus trahi, per quas san-
guis ille contrario transitu vi partium nutriendarum attractus ad ipsas permeat? Quis non
miretur, non modò in ventriculo, sed in quavis parte, contrarios inter se humores, non
modò placidè una eademque in parte stabulari, sed contrariis inter se occursibus, huc illuc-
que ad sibi dicata queque loca ire & redire? Sic ergo intestina, sanguinem à chylo secernunt,
quia solus sanguis vtile est partium alimentum; hepar quem iam excreuit sanguinem tan-
quam reliquias non trahit, sed chylum tantum, cuius familiaritate gaudet & oblectatur.
Hac Galeni est sententia tertio de facultatibus naturalibus, & quarto de usu partium.

*Nature dis-
cretivis
excretionis vi-
res mirabiles.*

De azygo & iugularibus, contra Vesalium. QVÆSTIO VI.

*Iugularem
internam me-
ntem esse ex-
terna, contra
Vesalium.*



N vena ascendens historia, insignes aliquot Vesalij errores animad-
uerto. Ac primam de iugularibus id sentit, Externam ampliorē esse &
maiorē internā: quod sensui aduersatur omnino & rationi. In hominē
enim internā multo amplior est, in canibus, simiis, & ceteris animalibus,
externa maior apparet. Cuius rei hæc ratio est, quod iugularis externa
externas tantum colli & faciei partes alit, interna omnes cerebri mem-
branas & totum cerebri corpus irrigat: at externa partes in ceteris animalibus crassiores
sunt, hominē verò ob animalium functionum præstantiam & varietatem amplius cerebrum
à natura concessum est. Debit ergo in hominē iugularis interna insignior efformari. Ab
externa iugulari humerariam derivat Vesalius, quod in plerisque quadrupedibus verum,
in hominē falsum: nam ab axillari oritur. De vene coniugij experte, azygon vocant, novum
dogma promulgavit. Pleuritides omnes veras ab eius ramis excitari vult, propterea quod
omni pleuritide dextram cubiti venam perpetuò tundendam, quod azygos in dextro tan-
tum sit latere, hic error multiplex. Primum non omnis pleuritis, quæ inflammatio est mem-
brane costas succingentis, ab azygo eiusque ramis excitatur, quatuor enim agnoscit Hippo-
crates libris de morbis, & de vitæ ratione in a cutis pleuritidis differentias, intercostalem,
quæ superiorum est costarum; hypochondriacam, quæ inferiorum est & notharum; anticam,
quæ sterni est & intersipientium membranarum; tandemque thoracicam, quam dorsoalem
appellat. Quatuor hæc pleuritidis species à quatuor venarum riuis, velut aquæ ductibus ir-
rigantur, prior ab intercostali ramo, secunda ab azygo, tertia à mammaria, quarta à thora-
cicis, non ergo pleuritis omnis ab azygo. Sed demus hoc Vesalio, an propterea secunda cri-

*Humeraria
non oritur à
iugulari, ut
voluit Vesali-
um.*

*De azygo,
contra Vesali-
um.*

*Pleuritidis
quatuor differ-
rentia.*

*Non omnis
pleuritis ab
azygo.*

in omni pleuritide siue dextrum, siue sinistrum latus obsideat, dextri cubiti vena, quoniam à dextro latere prodiit azygos? Annon totidem rami è dextro in sinistrum latus sparguntur, unde & vacuatio, & reuulsio, & deriuatio celerior tutiorque speranda, si sinistrum latus occupet inflammatio? Breuior erit à sinistro latere ad sinistram basilicam via. At in doloribus proximum ventrem secut diuinus Senex sect. 6. lib. sexti epid. ὁ δὲ ὕψων τὴν ἐν γύρῳ τοῦ κοιλίου καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος διὰ τοῦ κοιλίου διαίρειν. Quin etiam ramorum vena azygos maxima est vtraque parte cum thoracicarum riuus communio, quam ignorauit Vesalius. Tres enim & interdum quatuor thoracicarum rami, cum quatuor vena coniugij expertis ramis cōeunt. Primus quidem inter tertiam & quartam costam; alter inter quartam & quintam; tertius inter quintam & sextam, postremus inter sextam & septimam. Breuior ergo à sinistro latere ad sinistram basilicam, quàm ad dextram est via, ob eam quam descripsi communionem, quia thoracica ab axillari prodiit, à qua emergit etiam basilica. Explodatur itaque nona hæc de vena sectione in pleuritide Vesalii opinio nullis rationibus stabilita, & Græcorum vestigiis insistentes ab eodem latere venam secemus, non omnem quidem, sed basilicam tantum, ex mandato summi Hippocratis lib. de victus ratione in acutis (quam τὴν εἰς τὸν φλέβα, id est internam venam vocat) idque vacuationis, reuulsionis & deriuationis ergo. Quas autem describunt quidam vena azygos membranulas sanguinis refluxum impediētes, non admittimus, neque doctissimi Holerij ea de re obseruationem chymericam fictitiâque probamus. De ramulo eo Fallopij, qui ad adiposam & emulgentem excurret, disputabitur suo loco, dum vias expurgationis empyicorum, pleuriticorum & peripneumonicorum per vrinas patefaciemus. Errant porro qui ascendentem canam in duos insignes ramos diuidunt, quos axillares vocant; non enim axillares dicendi sunt, nisi cum è thoracis cauitate exiliunt, & ad axillas perueniunt. Elegantius Sylui subclauij dicuntur.

Non in omni pleuritide secanda est dextera cubiti vena.

Communio thoracicarum cum ramis azygos.

Ab eodem latere vena secanda.

Vascula nula sunt.

HISTORIA ANATOMICA.

DE ARTERIIS.

Quid sit arteria. CAPVT VIII.



Veneranda hepar venarum, ita cor arteriarum est πύλωσις, Hippocrati libello de alimento. Arteriam, Græci nunc ἀόρτην dicunt, quod sit velut arcula & conceptaculum arteriosi sanguinis. Aristoteles tertio de historia animalium aortam dictam putat ἐκ τῆς τε βῆσται καὶ ἐν τοῖς τεθνηκόσι τὸ νεύρωδες αὐταῖς μορῶν, eo quod nervosa eius pars conspici vel in mortuis potest, alijs ἀρτηρίων τὸ ἐκ τὸν αἶρα τυρεῖν, quod est aerem ducere, vel τὸ ἐκ τὸ ἀίρεσθαι, quod est attollere, dilatarado enim sese arrollit; Hippocrates arterias sæpè φλέβας vocat οὐχ ἰδρυμένας, id est, venas micantes, Arabes quidam netuos pullatiles, Auicenna venas audaces; alij αἵ γὰρ σφύζοντα; Rûfo arteria dicitur στήρην, κένωμα, πνευματικὸν αἷμα; Plinio spiritus semina. Ego tria vasa arteriæ nomine insignita reperi. Adest arteria aspera, arteria venosa, & arteria magna; sed illæ duæ cum addito arteriæ dicuntur; prior quidem ab asperitate, τριχέα, tota enim cartilaginea est; altera à structura, venosa, quia tunicam habet perrenuem venarum instar: posterior absolute ἀόρτη dicitur, arteria magna; arteria hæc vt & vena cōsideratur, aut vt similis est pars, aut vt organica. Quatenus similis, definitur pars frigida & sicca ex seminis

Arteria venosa.

Tria vasa nomine habuerit arteria.

Arteria duplex consideratur.

Definitio arterie vt similis est parti.

portione lenta & ductili genita. Frigidam dixi natura sua, nam ex euentu calidissima est ratione contentorum, & vena dicitur calidior, quia ex Hippocrate libro de carnibus plus continet caloris: sicca est, sed minus tendine & magis neruis. Quod si obiicias neruofas partes magis esse siccandas arteriosis, Galeno teste secundo ad Glauconem: ergo sicciores esse. Respondebo, per neruofas partes Galenum non intelligere neruos propriè dictos, sed neruofa corpora, vt ligamenta & tendines. Si arteriam spectes quatenus est organica, definies, vas rotundum, oblongum, fistulae modo excauatum, duplici tunica fibris intertexta constans, deducendo sanguini spirituofo, nec non temperando, reficiendo, & expurgando singularum partium calori à natura dicatum. Rotunditas & cauitas, figuram expriment organum, habent enim arteriae sensiles cauitates. Tunicarum numerus & villorum textura, structuram designant. Totum namque arteriae corpus membranosum est, vt faciliè & distendi, & contrahi possit: erat enim quandiu viuere animal, perpetuò dilatanda & constringenda arteria, sed membrana illa simplex non est, atque ita à vena distinguitur, quia vena simplicem habet tunicam, arteria duplicem, externam & internam: externa tenuis est, interior quintuplò crassior Herophilo, quia spirituosum ac spumantem sanguinem continet: vnde Aristoteles eam *νευρωδὲς ἀρτηρία* appellauit: externa villos habet rectos quamplures, & quosdam obliquos: interna multos transuersos, paucos obliquos & rectos, quia distributione & transmissione sanguinis feruidissimi multum egebat arteria, minus attractione, minimum retentione. Interior haec tunica, habet quasi cuticulam & crustulam, latius aranearum telis per similem, quae tertiam mentitur tunicam propriam. Praeter proprias has tunicas habet interdum communem, quam à vicinis partibus mutuatur: à pleura quidem, in thorace; à peritoneo in ventre imo; huius opera alligatur, suspenditur, firmatur vicinis partibus: dum verò per viscus aliquod oberrat, communi ea priuatur tunica. Reliquae definitionis particulae usum actionemque arteriarum denotant. Deferunt enim spirituosum sanguinem, & spiritum vitalem, insitum singularum partium calorem, perenni suo diafoles ac systoles motu conseruat, refrigerant, expurgant: denique arteriarum ministerio, foras introque separtabile est totum corpus Hippocrati sexto epidem.

De arteriarum vsu.

CAP. IX.



PRIMUS est ergo arteriarum vsus. Primus spirituosum sanguinem in sinistro cordis ventriculo elaboratum continere, distribuere, transpirare, tum ad perfectam singularum partium nutritionem: (non enim sufficere putant venosum, nisi arteriosi splendor affluerit) tum ad animalis spiritus nutritionem & generationem; arterioso enim sanguine in plexibus labyrinthis contento fouetur animalis spiritus. Alter arteriarum vsus est influentem cordis calorem cum vitali facultate in vniuersum corpus diffundere; diffunditur autem non per cauitates tantum, vt vulgus putat, sed etiam per tunicas; vt quamuis vinculo constringantur, non tamen subiectis partibus adimatur calor. Hos autem duos vsus praestant arteriae, quatenus sunt canales. Tertius arteriarum vsus est caloris natui temperatio, nutritio, expurgatio, quem perenni suo diafoles & systoles motu consequuntur. Nam per contractionem quicquid in ipsis humidum est

Obiectum.
Solutio.

Definitio
arteriae
vt organica
est.

Explicatio
definitionis.

Due tunicae
arteriae.

Villi arteriarum
quomodo
se habeant.

Tertia tunica
communis.

Vsus arteriarum.
Primus vsus
arteriarum.

Secundus vsus.

Tertius.

est, exprimendo elidunt; ira caloris insiti suffocatio prohibetur; per dilatationem autem trahunt; externæ quidem arteriæ, aërem & per insensiles poros, & per oscula in curam desinentia; quo ventilatur & conseruatur calor; calidum enim omne (ait Hippocrates) frigido moderato fouetur; internæ verò & spiritum & vaporem & sanguinem trahunt; spiritum à corde, ut sit caloris influentis vehiculum; vaporem, ut sit pabulum vitalis spiritus, & sanguinem à vicinis venis per occultas anastomoses; ad sui nutritionem. Sunt ergo arteriæ venis nobiliores, ideoque rariorem locum & profundum lumborum obrinuerunt; nam venis substratæ sunt & sub ipsis reconditæ, nisi quid impediatur, ut iuxta os sacrum; ibi enim ne ab osse excarnitæ dereretur, arteria venam, sub qua prius latebat, conscendit, & rursus postquæ os superauit, sub vena occultatur. Maxima ex artieriarum motu, quem *σφυρμόν* id est *pulsus* vocant, petuntur indicia ad salutem aut morrem. Quomodo autem moueantur arteriæ & à qua faculare; disputabitur lib. 9. in cordis descriptione.

Quid & quomodo trahant arteriæ.

Arteriæ venis nobiliores.

Arteria ascendens descriptio.

CAP. X.



ARTERIA è sinistro cordis sinu profiliens, statim ramulum in cordis basim & ambirum reflectit, quem coronarium dicunt, hic raro simplex, sæpius geminus à nobis est visus; mox rota bipartitò finditur, quasi in duos prægrandes stipites dirempta; alter deorsum secundum lumborum vertebrae contorquetur; alter minor, sursum ad iugulum effertur, vbi in duos insignes ramos diuiditur subclauios dictos. Ab subclauio dextro, quinque emergunt arteriæ, intercostalis superior, quæ ad superiores costas fertur, spatia tria aut quatuor vicinòsq; musculos alens. Mammaria per interiorern sterni partem fertur, ramulos mammarum exiguos spargens; occurrunt autem eius quidam riuuli eisdem epigastriæ ascendentis paulo supra umbilicum. Muscula in ceruicis posticos musculos distribuit. Cervicalis per foramina trāsuerforum ceruicis processum ascendens, duriorem membranam, quæ spinalem medullam inuestit, perforat, & caluariæ cavitatem ingressa, mox iungitur cum sua coniuge oppositi lateris, vnâque facta sub media cerebri basi repit, donec ad sellam sphenoides, in qua glandula illa spongiæ instar porosa & bibula insidet, peruenit; ibi bipartitò finditur; portio alia in dextram; alia in sinistram fertur. vtraque variè diuarcatur, per membranas duram & tenuem, ascenditque ad superiores ventriculos, vbi rere illud plenum admirationis effingit, quem *χρυσόειδῆ* dixerunt, cum portione etiam caroidum, ut videatur re-re illud ex quatuor arteriis efformari. Malè igitur Vesalius ceruicales arterias in sinus illos crassioris membranae ferri cum venis annotauit. Postrema est carotis, *ληνερυακή* & *αποπληκτική* dicta; quod caron & apoplexiam excitet, si interceptiatur, denegato aditu virali spiritui, qui animali materiam subministrat. Hæc vnâ cum iugulari interna ascendens, priusquam cranium ingrediatur, innumeris fruticatur surculis, in vicinas partes miro artificio distribuendis: alij enim ad laryngis & hyoidis musculos vicinâsq; glandes feruntur; alij ad maxillam inferiorem, in mentum & labia excurrunt; alij ad processus mamillares & musculos vicinos; alij in linguæ radicem, masseteres, temporales musculos, cavitatem dentium, narium amplitudinem diuariantur. Quod reliquum est caronidis per proprium foramen, quod inrer sphenoidem & os temporis est situm, ad sellam ascendit, vbi sub dura membrana adhuc latens, ut rectè obseruarunt Fallopius & Co-

Arteria ascendens distributa.

Rami subclauij intercostalis.

Mammaria.

Muscula.

Cervicalis.

Plexus choroideus quemodo sit.

Carot.

lumbus, in brutis animalibus infinitas propagunculas à se dimittit in hominibus non ita conspicuas, quæ retis speciem ita exprimunt, vt Galeno plexus mirabilis existimetur; hinc altius conscendens, & crassiotem membranam perforans, primum arterias ad oculos mittit, opticis nervis, musculis oculos mouentibus vitalem spiritum subministrantes, necnon temporalibus musculis; deinde supradictam sellam tenui membrana suffulta, posteriora versus, supra infraque, necnon ad latera distribuitur, tandem ad superiores ascendens ventriculos varic implicatur, plexum labyrinthicum cum ramulis cervicalis efformans. Similis est fere subclauig sinistra distributio, nisi quod carotidem non emittit; videtur enim carotis sinistra à trunco oriri. Quod reliquum est rami subclauij, cum primum thoracis cauitatem euicit, & ad axillas peruenit, axillaris dicitur, à quo thoracica & basilica prodeunt. Thoracica duplex est, vna in thoracis musculos anticos, altera in posticos fertur. Basilicam etiam duplicem obseruamus, profundâ & subcutaneam; vtraque varios ex se diffundit riuos; est tamen subcutaneæ furculus quidam in carpo conspicuus, quo loci pulsû differentias admota manu explorare solemus.

Arterie magnæ descendentes distributio.

CAP. XI.

Arterie descendentes rami.



ARTERIA magna diaphragma permeans, in ventrē inferiorem, mesentericum & intestina excurrit, vt scribit Hippocrates libello *de epid.* Eius truncus ad læuam paulum declinans (vt vena cava per lumbos incedenti det locum) priusquam in ramos iliacos diuidatur, nouem profert ac diffundit propagines, intercostalem maiorem, phrenicam, cœliacam, mesentericam superiorem, renalem, spermaticam, mesentericam inferiorem, lumbarem & musculam. Intercostalis maior, in octo inferiorum costarum spatia fertur. Phrenica per diaphragma excurrit, ramulos etiam ad pericardium spargens. A cœliaca multi rami defluunt: vnus frequenti lobole in ventriculum, pylorum & omentum inferitur, alius in hepat & vesiculam telleam sese applicat; tertius insignior, obliquo & flexuoso ductu in lienem contendit, multis enim hoc viscus arteriis conspergitur, quia expurgatione maxima indigebat. Mesenterica superior in superiorem mesenterij partem, quæ tenuia continet intestina & coli maximam partem, fertur. Renalis seu emulgens, in renum substantiam inferitur, non tam vt vitalem spiritum deferat, quàm vt serum in arteriis contentum expurget; plus enim seri in arteriis, quam in venis contineri sensus docet. Spermatica vtraque à trunco prodiens, in testes flexuoso ductu & labyrinthicis plexibus inferitur. Mesenterica inferior, in mesenterij partem inferiorem, & colon ac rectum intestinum arteriis prætenues conspergit. Lumbaris in lumborum vertebra per meat spinalem medullam alitura. Postrema omnium muscula dicitur, quod ad lumbares feratur musculos. Postquam septem hos arteriæ descendentes truncus diffundit riuos, totus in duos insignes ramos diffunditur, qui ratione partium quas perreptant, iliaci dicuntur. Vterque rursum quinque quasi furculis fruticatur. Primus sacer dicitur, quod ad ossis sacri medullam feratur; secundus hypogastricus omnium amplissimus, quod hypogastrij partes omnes irriget. Tertium, vmbilicalem vocant, quod ab vmbilico emergat; hoc viuit & transpirat foetus in vtero; eo autem in lucem edito, totus vietus & emeritus apparet hic ductus, vt ourachos & vmbilicalis vena. Quartum epigastricum dicimus, quod per epigastrij musculos excurat.

Intercostalis maior.
Phrenica.
Cœliaca.

Mesenterica superior.

Renalis.

Spermatica.
Mesenterica inferior.

Lumbaris.
Muscula.

Rami iliaci.

Sacer.
Hypogastricus.

Vmbilicalis.
Epigastricus.

Epigastricus.

Postemum, pudendum, quod ad pudenda & duo illa penis corpora caua feratūr *Pudendum.*
 mirè implicitum vt velut plexum efformet. Hæ arteriæ dum spumoso sanguine
 aut flatulento spiritu turgent penem distendunt. Idem ramus iliacus ad crura de- *Cruralis ra-*
 latus cruralis dicitur. Est autem cruralis arteriæ similis ferè ac venæ distributio: *mus.*
 nisi quod pauciores eius rami per eum feruntur. Emitter enim in cruris muscu-
 los ramos quamplures, deinde ad genu & poplitem distribuitur, radem & in an-
 ticos tibiæ musculos, & in posticos, omnesque pedis digitos variè diuaticatur.
 Hac distributione arteriæ omnes disiectæ disparitèque sunt.

De vasis umbilici, vena arteriosa & arteria venosa.

CAP. XII.

VASA vmbilici quatuor sunt, vena vnica, arteriæ duæ & ourachos. *Vena vmbili-*
 Vena embryj nutricula ab hepatis scissura ad vmbilicum fertur, *calis vnica.*
 non ab vmbilico ad hepâr; est enim portæ propago, vt iam do-
 cuimus; vbi autè vmbilicum permeauit, quæ prius solitatis erat,
 bipartitò finditur duosque statim diffundit riuos; hi in alios spar-
 guntur, & membrana illa quam chorion vocant suffulti, cum venarum vteri of-
 culis coeunt, in quadrupedibus per acetabula vmbilici figuram exprimentia, in
 homine, per molem illam carneam, quam vterinum, iecur & carnem placenta
 recentiores Anatomici vocarunt. Arteriæ duæ sunt, vna vtrinque, à ramo ilia-
 co ortæ & per chorion variis furculis diuaticatæ, tandemque cum vterinis arteriis
 coeunt; trahit vena quod dulcissimum est ex venis vteri, trahunt arteriæ ma-
 ternum spiritum & arteriosum sanguinem; atque ita horum vasorum beneficio
 alitur, viuit, transpirat foetus. Ourachos vas cauum & membranofum, à vesicæ
 fundo ad vmbilicum fertur; eo canali vrinam effundit foetus in allantoidem mē-
 branam. Quatuor hæc in vmbilico coeuntia, foetū in lucem edito tanquam eme-
 rita & vieta in ligamentum degenerât, hepârque ac vesicam suspendunt. De his
 fusiùs in historia foetus disputabitur. Superfunt duo vasa, vena arteriosa, & arteria
 venosa; illa in dextro est cordis sinu: hæc in sinistro. Vena arteriosa tunicam ha-
 bet arteriæ, & in prima conformatione arteriæ magnæ continua est: vt in foeti-
 bus & stucturam habeat arteriæ, & illius etiam fungatur officio, quia arteriosi
 sanguinis portionem ab vmbilici arteriis in iliacos ramos, & ab iis in aortæ trun-
 cum delatam, per canalem arteriosum excipit & in pulmones diffundit. At edito
 animali non amplius vitalem spiritum, sed attenuatum in dextro cordis sinu san-
 guinè defert, vt non arteriæ, sed venæ fungatur officio. Arteria venosa tunicam
 habet venæ, & venæ cauæ continua est, per insignem anastomofem, sed foetū in
 lucem edito occæatur foramen illud, & aëri à pulmone in cor deducendo, sumi-
 dis vaporibus expurgandis, spiritusque vitalis portioni in pulmones exportandæ
 tota inferuit, vt iam arteriæ, non venæ fungatur officio. Horum vasorum histo-
 riam libro 9. describemus.

Arteriæ vmbilicales duæ.

Ourachos.

Vena arteriosa.

Arteria venosa.

DE NERVIS.

Quid sit nervus. CAP. XIII.



VERE AD MODUM naturalis facultas cum sanguine & spiritu crassiore, per venas; vitalis cum sanguine & spiritu tenuiore per arterias, tanquam canales & aqueductus, in singulas corporis partes diffunditur; ita animalis, sensifica & motrix, cum solo spiritu tenuissimo, per nervos tanquam funiculos, in partes motus sensusque capaces fertur. Venarum & arteriarum natu-

turam, usum & diuortia iam exposuimus, nunc nervorum structuram, differentias & συζυγίας seu paria describere placet. Nervos Græci τόνους καὶ νεύρα dicunt.

Nervi acceptio multiplex

Est tamen apud Medicos τῶν νεύρων καὶ τόνων acceptio multiplex. Putat Erotianus τόνους dici apud Hippocratem de venis, arteriis & nervis. τὰ τεταταμένα, inquit, σώματα ταῖς σαρξίν, οἷον φλέβας, νεύρα καὶ τὰ ὅμοια, τόνους ὀνομάζει. Δὲ τὰ τετατάμενα, id est, carnibus circumfusa corpora, velut venas, nervos & similia, tonos vocat, eo quod circumtendantur. Galenus primo de motu musculi. initio libelli λέγει, ὅς ἐσιν, & plerisque in locis, nervorum tria statuit genera, quæ & exanguia, & sine

Nervorum tria genera apud Galenum.

carientia apparent. Eorum nervorum alij ex ossibus prodeunt, alij ex musculis; alij è cerebro & spinali medulla deriuantur. Qui ab ossibus & ossium epiphysebus prodeunt, σύνδεσμοι, vincula, copule, ligamenta dicuntur; hi omnem diarthrosin continent expeditam & ossa connectunt ossibus, sitque ea symphysis species, quam σινευρώσεις vocant. De illis libro de locis in homine hæc scripsit summus Dictator, τὰ δὲ νεύρα κατέχουσιν τὰ ἄρθρα καὶ πρὸς τὰ ὀστά περιέχονται. Nervi colligant

Nervi vicerula dicuntur.

premiuntque articulos & ossibus adherent. & libro λέγει τὰ χυμῶς, νεύρα καὶ τὸν ὀστέον καὶ τὰ τεταμένα σινδυσμός ἐστι τῶν ἄρθρων, id est, Nervi ad ossa præcænti ligamentum sunt articulorum. Qui nervi à musculis manant, musculorum partes sunt, σινευρώσεις καὶ τένοντας dicunt, id est, nervosas propagines & tendines. Est autem tendo nihil aliud quàm ἔκφυσις quædam fibrarum ligamenti & nervi, quæ per carnes sparsæ, in unam velut chordam coeunt, qua omnes ducuntur articuli, ut

Tendo quid.

voluntari visum est. Est tertium genus nervorum, quos νεύρα καὶ τόνους propriè appellant Medici, idque ab officio; νεύρα enim dicuntur διὰ τὸ νεύειν, quod est nutare siue flectere; Τόνος διὰ τὸ τείνειν, quod est tendere. Oriuntur hi à cerebro & spinali medulla; eosque Galenus τὰ οργανα vocat, instrumenta sensus & motus voluntarij, quia per eos animalis facultas, & ea quæ intus cient, videlicet τὰ ἐν ὀστέωντα veluti per funiculos in singulas ferè partes feruntur. Avicenna latrores vocat. De his scripsit Hippocrates libro de locis in homine. τὸ μὲν σῶμα πᾶν ἑμπλῆον νεύρων. Corpus omne nervis est plenum, id est, pervniuersum corpus ex-

Nervi propriè dicti.

currunt nervi à cerebro & spinali medulla. & lib. de arte, νεύρα appellat ἐν τῇ σαρξὶ καὶ μετέωρα, quod per carnes, id est, musculos spargantur. Galenus primo de motu musculi hæc tria nervorum genera ita inter se confert, ut ligamentum insensibile sit, nervus voluntarij exquisitissimi sensus, tendo mediæ naturæ, non omnino insensibilis, quia nervorum habet filamenta, nec ita acerrimi sensus ut nervus. Sunt & alia multa in corpore, quæ ob nervorum similitudinem, nervosa dicuntur, cum

Nervorum cellulario.

tamen ad nullum horum genus referri possint; sic vterum, vesicam, intestina nei-

uola dicimus; sic vterque meatus, cholidochi ductus, & vasa eiacularia, nervi dicuntur. Hoc loco nervi nomen propriè usurpamus, pro organo, à quo animalis facultas & spiritus per vniuersum corpus influit. Huius naturam brevis hæc aperiet definitio. Nervus pars est spermatica, à cerebro aut spinali medulla exorta, interiore parte medullaris, exteriori membrana, spiritus animalis delector, ad sensum & motum. Partem esse spermaticam & exagum nemo inficiabitur, si & substantiam, & colorem, & temperiem attentius inspexerit. A cerebro autem & spinali medulla nervos omnes deriuari posthac cōficiemus. Substantia nervi duplex est, interior & exterior; interior medullaris est, alba & mollis, qualis est ferè cerebri & spinalis medullæ; sed durior, ac si intelligas densatum & duriusculum factum cerebrum, de cuius autem molliori esse cerebrum, vt sensilium species omnes reciperet; exterior membrana est, vt enim cerebrum duplici velatur & tegitur membrana, tenui & crassa, ita & nervus: crassa medullam continet ne diffuset, & munit, vel si pluribus constet funiculis nervus, eos simul colligat. Interior illa præcipua est nervi pars, per quam nervus mouendi ac sentiendi facultatem deferret, vt enim cerebrum per medullarem substantiam, non per membranas cerebrum dicitur, ita nervus per medullam est nervus. Sic mammillares processus, licet duabus tunicis non tegantur, odoratus organa non minus dicuntur & sentiendi facultatem deferunt, quia medullares. Si præscindas (ait Galenus) nervi medullam, statim pars in quam nervus inseritur motu sensuque priuatur. Interior nervi substantia tota est quidem *συνεχῶς καὶ ἀσπῆγῶς*, sed sensilem & conspicuam cavitatem nullam habet, quia spiritum solum deferret, non sanguinem, ideo spirituum lator dicitur. Est porro spiritus ille animalis omnium tenuissimus, qui in plexu illo admirationis pleno rudimentum, in ventriculis verò perfectionem consequitur, indeque per totam cerebri substantiam ad functiones principes, & in medullam spinalem ac nervos ad sensum motumque diffunditur.

Nervi definitio.

Explicatio definitionis.

Substantia nervi duplex.

Interior nervi pars præcipua est illam partem.

Nervi cavitatem conspicuam non habent.

De usu nervorum. CAP. XIII.



QVONIAM tota ferè animalis natura in sensu & motu est posita, sensus autem motusque omnis, non in situ est, sed aliunde influens, debuerunt necessariò effingi organa, quæ vim eam ab vno fonte tanquam cōmuni principio, in singulas partes motus sensusque capaces deferrent: eiusmodi nervi sunt, animalium spirituum latores & facultatis à cerebro manantis continuitatem seruantes. Non enim foris per se & substantia sua sensum ac motum affert partibus, sed quatenus perfusus est facultatis radiis, quos tam non licet à continuitate cerebri detruncare, quam non licet nobis solis radios ab eodem diuisos interceptos seruare. Erit ergo communissimus hic nervorum usus, animale facultatem cum spiritu tenuissimo deferre, à quo duo alij peculiare manant, sensum quippe & motum communicare, propterea à Medicis sensus & motus organa dicuntur. Ac sensus quidem instrumenta esse hæc indicant, quod nulla sentio sine nervo perficiatur. Non fit visio sine optico, non fit odor, sapor, soni & qualitarum quæ tactum sentiunt perceptio sine nervo, sed & ligatis, sectis, obstructis, refrigeratis nervis fit sensus priuatio. Motus autem voluntarij gratia comparatos esse nervos docuit admirandus Hippocrates libro de ossium natura *τὰ δὲ νεῦρα καὶ μύη, καὶ ἔννεαν, καὶ ἔλαον πλεῖστον αἰδ*, est, Nervi flexionem, contractionem ac distensionem præstant.

Nervorum necessitas.

Communis nervorum usus.

Nervi organa sunt sensus.

Nervi organa motus.

*Nervi non sunt
immediata or-
gana motus.*

*Tria organa
motus, cere-
brum, nervus,
musculus, ex
quomodo.
Elegans simi-
litudine.
Sensus pecu-
liaris à nervis.*

*Communis
est à nervis.*

*Tertius ner-
vorum usus,
ad secundum
referri potest.*

*Cum tactus de-
tus animalibus.*

*Alii nervo-
rum.*

Nulla pars (ait Aristoteles tertio de historia animalium) stupore, paralyti & convulsione tentatur quæ netuo caret: at stupor diminutio est sensus, paralyti sensus motusque privatio, convulsio inuoluntarius motus. Nolim tamen existimes, nervos motus esse organa immediata, id est, membrorum vastissimas moles contrahere, flectere & extendere; hoc enim soli musculo concessum est; sed hoc velim tibi persuadeas, varia esse organa motus, cerebrum, nervos, musculos: cerebrum appetentis & ficticis facultatis sedes, imperat, nervus imperiū defert, musculus obsequitur: & ut eques habenis equum impellit, ita facultas animæ appetens in cerebro pro tribunali sedens, nervis quasi habenis, musculos equis simillimos movet. Sensum potè impertiuntur nervi & peculiarem vnicui organo; & communem multis partibus: peculiarem, visus, oculis: auditus, auribus: odoratus, naribus: gustatus, linguæ: tactus, ori ventriculi & pudendis; ori ventriculi, ad appetentiam animalem, quæ sit suctionis sensu, sola enim hæc pars reliquarum omnium exhaustum & suctum sentit: pudendis, ad voluptatis illecebras, ut eo libidinis cestro percita animalia, in amplexus venereos tuant. Communis autem tactus, quo tractabiles qualitates primarias & secundarias percipimus, per vniuersum ferè corpus & membranas diffusus est: sed cutis quia membranarum omnium est temperatissima, & ea præsertim quæ summam manum integit, tactus index & æstimatrix censetur. Agnoscit Galenus tertium nervorum usum, ut eorum opera quæcunque partibus molestiam noxamque inferre possunt sentiantur: sicut testinis & organis nutritioni dicatis nervi sunt dati. Sed hic usus ad priorem referri debet. Quæcunque enim intestina, aut alias partes vellicant, ad primarias aut secundarias qualitates quæ tactum feriunt sunt referenda. Et tactus ob id præcipuè datus est animalibus, ut eius opera se continuo consuetent declinentque ea quæ vel vnitatem naturæ ac temperamenti subito & violenter destruant, vel continuitatem partium aut contiguitatem solvant. Habent etiam nervi præter usum, actionem animalem: afficiuntur enim ab obiecto, ideò molles ad sensum, duri ad motum aptiores sunt.

De nervorum differentiis.

CAP. XV.

*Vnus est idem
nervus sentit
ac movet.*

*Differentia
nervorum.*

*1. A substantia.
Molliores ner-
vorum à tri-
bus pendet.*



V N I C A M, si verum amamus, statuere oportet nervorum differentiam: nec alios motui, alios sensui, destinatos esse existimandum: vnus enim idemque nervus, eadem mouendi & sentiendi facultate est præditus, sed pro varia partium in quam inferior conditione, nunc sentit, nunc movet: sentit, si in sensibiles partes movet, si in organa motus feratur. Variæ tamen clarioris doctrinæ gratia nervorum differentia constitui possunt: quæ à substantia, magnitudine, usu, orru, insertionem, textura & ductu petendæ sunt. A substantia, vel his quæ eam consequuntur, nervi aut molles sunt, aut duri. Mollitiei, aut duritie ratio ad tria refertur debet, ad ortum, usum & ductum. Ratione exortus, qui à cerebro oriuntur, molliores sunt, qui à spinali medulla, duriores, quia cerebrum medulla est mollius. Si usum spectes, qui sensui sunt destinati, molliores esse debent: qui motui, duriores, quia motio actione, sensus passione perficitur: at mollia facilius recipiunt. In ductu, longitudo, rectitudo, obliquitas & corporum contactus observari debet: quo longius à cerebro absunt nervi, eo sunt duriores, quo propius, molliores: si obliquo & anfractuoso ductu ferantur, duriores sunt: si recti

inferantur, molliores: si durum attingat corpus, vt ossa, cartilagines, membranas, duritiem comparant. A magnitudine, nervi alij maiores, alij minores, pro actionis dignitate, intensione & vsus assiduitate; sic optici amplissimi sunt. Ab vsu, alij sensiles, alij motrices dicuntur. Ab ortu, alij à cerebro, alij à spinali medulla derivantur. Ab insertione, alij in organa inferuntur naturalia: alij in organa vitalia, vt cor, pulmones, arterias: alij in animalia, eaque, vel sensus, vt oculos, aures, nares, linguam, membranas: vel motus, vt musculos. nunc rectà, nunc obliquè, nunc transversim, pro vario musculorum situ, nunc sursum, nunc deorsum. Si texturam spectes, alij sunt continui, & hi integri in aliquam partem feruntur, vt optici, alij in plures dirempti furculos quasi funiculos in plures ducuntur partes. Ratione ductus, quidam membranis adhaerent, alij carnibus, quidam ossium foramina permeant vel canales oblongos, vt in auribus & maxilla inferiore, dum ad dentium radices feruntur.

2. A magnitudine.
3. Ab vsu.
4. Ab ortu.
5. Ab insertione.

6. A textura.

7. A ductu.

De nervis qui à cerebro oriuntur, de prima nervorum coniugatione.

CAP. XVI.



NERVORVM alij à cerebro, alij à spinali medulla oriuntur, nulli à cerebello. A cerebro anteriori septem paria derivari existimantur veteres. Ego cum Neotericis à posteriori cerebro, qua parte sacra illa medulla ortum ducit, oriri omnes puto: cum enim facultatis animalis & spirituum sint latores, debuit eorum principium prope spirituum officinam locari: at in tertio & quarto ventriculo perfectionem consequitur spiritus. Hoc voluit fortasse diuinus Senex, libro de ossium natura. *νεῦρων, inquit, ἐκ ποσὶς ὑπὸ τοῦ ἰσθμοῦ ἀπὸ τοῦ ἰσθμοῦ ἐστὶ.* Nervorum exortus ab occipitiō est.

Nervorum ortus amicus à posteriori est cerebro & spinali medulla.

Vsq̃ue ad spinam, coxendicem, pudendum, femora, brachia, pedes, tibias. A cerebro igitur posteriore, tanquam à communi principio & spirituum fonte, nervi quamplures scaturiunt, qui coniugati omnes sunt, nec impar vilis inuenitur, ideo Latinis nervorum paria seu cōiugia, Græcis *συνδυασμοί* dicuntur. Septem describi solent à veteribus. Fallopius acutissimus Anatomicus plures agnovit, cui nos, oculari demonstratione, quæ omnium est certissima, edocti libenter assentimur. Primum nervorum par, omnium mollissimum & amplissimum, in ortu separaturn, dein antrosum obliquè protensum, in medio ferè progressu iuxta sellam sphenoides coit, non per *χιασμὸν* & intersectionem, nec per contactum simplicem, sed per medullæ confusionem, vt alterum ab altero nulla arte secernere queas. Coire autem debuerunt nervi optici; tum ad robur, ne ob molliem longum iter perretantes flaccescerent; tum vt eandem planitiem in pupilla obserarent. Secederent enim aliquando sine eo amplexu, atque ita delusi oculi simplex obiectum duplex iudicaret; tum vt visibilium formæ & spectra vnirentur; tum vt commodè per foramen à calvaria prociderent & ad oculos rectà ferri possent; postremò vt visibilis spiritus ab altero oculo in alterum momento permearet ad visus perfectionem; sic enim clauso aliterutro oculo, acutius videmus. Ira ergo confusi optici & coeuntes, mox separantur & per calvariae foramen in oculi centrum feruntur; inerior quidem eorum substantia mollis ac medullosa, dum ad crystallinum pervenit, dilaturatur & per oculum visibiles diffundit spiritus, sitque ex ea dilatatione reticularis tunica: exterier verò, quæ duplici velatur tunica tenui & crassa, in vneâ & corneam absūmitur, vnde fit vt per optici

Septem paria.

Primi paris descriptio. Quomodo coeunt optici.

Cur debuerint coire.

Opticorum insertio.

Tres oculorum tunicae ab optico dilatatae sunt.

continuitatem animalis spiritus ad pupillam vsque momento feratur. Hos nec-
uōs *ὁπρὸς ὁπρὶν*, id est, *meatus visorios*, vocat Herophilus; nos sensilem &
conspiciam eam cauitatem nunquam obseruauimus, sed omnium mollissimos
& magis *ἀποσπῶδες* esse volumus, quia visilem spiritum copiosissimum deferit,
hi si obstruantur, vt in Arabum gutta serena, perit videndi actio.

De ceteris neruorum paribus. CAP. XVII.



ECVND A propagatio, neruorum est oculos mouentium, ab hac
ramuli emergunt quamplurimi. Primus in musculum palpebras
aperientem & oculos attollentem dispergitur; secundus in depri-
mentem; tertius in adductorem; quartus in circumagentem. Sunt
etiam prætenues horum neruorum fibræ, quæ ad exteriore oculi
tunicas feruntur. Nulli ad temporales musculos ab hac coniugatione excurrunt
neruuli, vt scribunt multi. Motorij hi nerui in suo exortu cōtinui sunt, vt vnicum
quasi funem constituent, vnde fit vt si oculum in latus moueas, alter illius motum
sequatur necessitatio, quæ obseruatio noua est & pulcherrima, vt in controuersis
oculorum demonstrabitur. Tertia societas in linguæ tunicam princeps gustatus
organum inseritur, & Galeno dicitur Gustatoria. Priusquàm tamen cōferatur,
plures de se promit surculos, quorum alij in quosdam oculorum & frōtis muscu-
los disseminantur, alij in musculos faciei, etotaphitas & masseteres, vnde oculorum
& temporalium musculorum ram mitabilis sympathia, alij ad narium tunicam &
dentium radices diuariantur. Quarta coniugatio, huic proxima, sed minor, por-
tione quadam in palatum, quadam in tunicam linguæ subtenfam decurrit, & gi-
stui inseruit, vt tertia. Quinta *συζυγία* per meatum auditorium in auris tympa-
num fertur, ibi ramulos conspergit quamplures, è quibus vnus ad laryngis & ossis
hyoidis musculos excurrit, vnde mira auium & linguæ ac laryngis sympathia;
nam qui à prima conformatione surdi sunt, obstructo quippe, exoluto & refrige-
rato neruo quintæ coniugationis, hi pariter obtumescunt, & si acuto stylo auris
membranam atrectes, statim sicca excitabitur tussis. Sextum neruorum par am-
plissimum vagatur & excurrit per omnia ferè viscera. Hoc extra caluariam egre-
diens, arteriæ carotidi contiguum, dum ad iugulum accessit, in tres maxime con-
spicuos finditur surculos. Eorum vnus, dexter quidem, axillarem arteriam ample-
ctitur, & per eam reflexus instar ductarij funis, qui per trochlearum orbiculos tra-
iicitur, sursum ascendit, in laryngis musculos, exiles, sed numerosos spargens ra-
mos; sinister ob axillaris arteriæ rectitudinem, ibi non reflectitur, sed maximæ ar-
teriæ truncum, qua parte in dorsum detorquetur, circumplicat. Hos neruos, recur-
rentes vulgus appellat, *παλινδρομούντες*, & vocales, quod vocis præcipua sint or-
gana: illis namque aut interceptis, aut sectis *ἐκφανοί* statim redditur animal, vt in
plerisque sæpè sumus experti. Secundus sextæ coniugationis ramus per latera co-
stiarum excurrit, costalem vocant. Tertius insignior ad ventriculum fertur, sto-
machicus dictus; huius beneficio tam exquisito sensu pollet stomachus, vt vete-
res *καρδία* appellarint, & Medici omnes appetentiæ animalis sedem in eo loca-
runt. Septimum par ferè ab occipitio & spinali medulla exortum in linguæ ac la-
ryngis musculos effertur, & linguam mouere dicitur, addunt his duo paria recen-
tiores. Processus autem illi mammarum ritu protuberantes, præcipua odoratus
organa inter neruorum paria numerari non solent, quia extra caluariam non fe-
runtur,

*Opri mani-
feste eas non
sunt.*

*Secunda con-
iugatio di-
uariantur.*

*Obseruatio
pulcherrima
de motu ocu-
lorum.*

*Tertia societas
gustatoria de-
bita.*

Quarta.

*Quinta audi-
toria.*

Sexta vixit.

Ductio sexta.

*Nerui recur-
rentes.*

*Costali ar-
terias
sympathicus.*

*Septima con-
iugatio.*

*Processus ma-
mularum.*

runtur, nec duplici velantur tunica. Cæterum si quis exquisitâ horum nervorum descriptionem postulet, consulat Fallopij observationes.

Quomodo nervi à spinali medulla oriantur. CAP. XVIII.

IN exortu nervorum à spinali medulla prodeuntium, dubius & anceps diu hæsi. Videbam enim Anatomicos penè omnes, medullæ corpus totum continuum nobis delineare, & à cervicali medulla, cervicales tantum nervos: à dorsali, dorsales: & à lumbali, lumbares derivare. Hoc cum in privatis sectionibus falsum esse deprehendissem, & funiculos quampures à suprema medulla ad lumbos vsque excurrere sæpius cum Cabrollo nostro observassem, venit mihi in mentem affirmare, nervorum omnium vnicum esse principium, & à superiore medulla omnes quasi ab vno fonte nasci, non secus ac in cauda equina, pili ferè omnes à superiore parte orti, alij in supremam caudæ partem, alij in mediam desinunt, alij ad extremam vsque feruntur. Nunc rerum vñu & à vno vsq; peritior factus, mutavi consilium; & lumbarium quidem nervorum, plurimos à dorsali medulla manare, quosdam à cervicali, non omnes, vt credebam; observavi. Qualis autem sit verâ & medullæ, & nervorum ab ea prodeuntium historia, paucis accipite. Spinalis medulla cerebri caudex, tenui membrana immediate velatur, à dura autem & crassa distat aliquantulum; per tenuem illam excurrunt venulæ & arteriolæ vario modo implicatæ, medullam nutriendes, & vitæ spiritum affundentes. Medulla autem è calvariæ rotundo & amplo foramine prodiens, primum amplissima & crassissima, sensim attenuatur, id est, medullarem substantiâ paulatim amittit, non corpoream molem, quam eandem vbique servat; tandem cum ad dorsum fines peruenit, tota in funiculos & filamenta caudam ferè equinam referentia, absumitur. Nervus autem à sacra illa medulla prodeuntis, infiniti quidem sunt, sed quia dum vertebrarum foramina egrediuntur, simul coeunt vnicum corpus effingunt, tot esse nervorum paria, quot sunt vertebrarum foramina, voluerunt Anatomici. Nervus ergo omnis in exortu suo fibrâs habet multiplices, ex medullari substantia, & tenui membrana conflatas, quæ descendentes sensim à medulla sepatantur, & dum ad foramina vertebrarum accedunt, crassa membrana vestiuntur, & in vnum coeunt, vnum constituunt nervum, qui postquam foramen egressus est, rursus in funiculos eosdem diuellit. Quanto autem magis spinalis medulla descendit, tanto altius fibræ illæ nervorum ortus sui principia ducunt, vt & dorsales & lumbares quidam nervi, si paulò attentius inspexeris, à cervicali medulla oriantur. A lumborum principio ad ossis sacri extremum & plures sunt & crassiores funiculi, eadè tamen ratione circa vertebrarum foramina coeutes,

Vera spinalis medulla descripta.

Nervi quomodo oriuntur à medulla.

Observatio pulcherrima.

De nervis cervicis. CAP. XIX.

MEDULLÆ extra calvariâ prodeuntis, mira est in nervis propagandis fecunditas; sed triginta eorum paria præcipua observantur Anatomici; septem cervicis, duodecim dorsis; quinque lumborum; sex ossis sacri: extra cervicem igitur, nervorum septem paria egrediuntur. Prima & secunda coniugio, in exortu peculiare quid habent & admirandum. Non enim nervorum vnus aliorum in morem, à dextra, alius à sinistra oritur parte, sed ab anteriore alter, alter à poste-

Septem cervicis paria.

Prima & secunda coniugio habent quid peculiare

riore, quia diuersa erat primæ & secundæ vertebræ articulatio, ad motus securitatem. Prima coniugatio, posteriore ramo in paruos occipitis & vertebrarum musculos inseritur, anteriore in musculos œsophago substratos & colli disseminatur. Secunda societas, priore ramo in cutem ferè totam faciei absumitur, posteriore in musculos irrepit secundæ vertebræ & occipiti communes. Tertium par ex communi foramine quod inter secundum & tertium spondylum intercedit erumpens, statim in duos discinditur ramos, quorum anterior, in musculos collum flectentes, posterior in musculos caput & collum extendentes, disseminatur. Quartum par, minore tiuo & posteriore ceruicis musculos irrigat; maiore & anteriore in musculos brachium & scapulas attollètes, necnon ad diaphragma fertur. Quinta *συνγυια* ex communi quartæ & quintæ vertebræ articulo prodiens, minore ramo in posticos ceruicis musculos, maiore in diaphragma, brachium & scapulæ musculos deriuatur. Sextæ coniugationis series eadem ferè est quæ quintæ; nam posteriore ramo ad ceruicis & scapularum musculos fertur, anteriore ramulos promit varios, alios quidem in brachium, alios in diaphragma. Septima coniugatio maiore ramo in brachium disseminatur, nonnumquam etiam in diaphragma; minore in posticos musculos: ex quibus collige à quarto, quinto, sexto & septimo pari, ferti ad diaphragma neruos quatuor, vnde mira eius & cetèbri sympathia. A quinto verò, sexto, & septimo pronasci multos brachiorum neruos. Per brachium etgo & manum totam, sex paria neruorum disseminantur. Primum par, à quinto ceruicis spondylo prodiens in deltoidem musculum & cutim illi incumbentem absumitur. Secundum à sexta vertebra scaturiens in bicipitem musculum primum fertur, in ox musculo cubiti longissimo, ramulum largitur, eadem vbi flexum cubiti attingit, in duos secatur ramos, quorum minor per radiū, maior per cubitum membrana carnosa suffultus, in totam cubiti cutim & manum absumitur. Tertium secundo permistum, in brachij musculum bicipiti substratum riuos diffundit, deinde vbi ad cubiti articulationem peruenit, cum quinto pari confunditur. Quartum omnium crassissimum, sub eodem musculo cum basilica profunda & artetia interna delapsū, postquam in musculos cubitum extendentes, & cutim internam brachij, externamque cubiti sutculos aliquot diffundit, tandem iuxta cubiti articulum in duos scinditur ramos; quorum alter secundum radij, alter secundum cubiti longitudinem excurrit. Ille furculus quinque, pollicis duobus, indici totidem, medio vnico fructatur; hic in carpo cessat. Quintum par, inter musculos cubitum extendentes & flectentes delatum, pone internam brachij apophysin præteruectum, tertioque permistum pari, in digitos absumitur, minimo neruulos duos, medico duos, medio vnum distribuens. Sextum par, inter cutem & membranam carnosam per internam brachij apophysin delapsū, in cubiti cutim desinit.

De neruis thoracis, lumborum, ossis sacri, pedis. CAP. XX.

Duodecim paria thoracis.



VERTEBRIS thoracis duodecim emergunt paria. Prima coniugatio anteriore ramo in brachium fertur, posteriore in thoracis musculos. Secunda eodem modo in brachij & thoracis musculos distribuitur. Reliquæ decem coniugationes, anteriore parte ad singula feruntur costarum spatia, posteriore ad musculos thoraci subiectos & spinatos in vertebra latitantes. Lumborum quinque sunt coniugationes; quarum posteriores rami in ra-

Lumborum quinque paria.

chitas feruntur musculos; anteriores verò in abdominis femorisque internos musculos ac testes. Ossis sacri paria sunt sex, quæ partim in femur, partim in musculos vicinos & cutem disseminantur, necnon in collum vteri, sphincteres, musculos ani, vesicæ & penem. Per totum autem pedem nervi quatuor insignes disseminantur, qui ex tribus infernis partibus lumborum, & quatuor superioribus ossis sacri nascuntur. Primus & summus sub peritoneo ad parvum trochanterem delapsus, in cruris musculos, eiusque internam & externam cutim priusquam genu attingat, absumitur. Secundus & inferior cum vena & arteria crurali, per inguen in crur descendit, ramumque insignem cum vena malleoli per internum femur ad pedem usque demittit, cuti vicinæ interea ramulos largitus; maior autem pars cum vena & arteria in internos cruris musculos dispergitur. Tertius his inferior, furculos musculis penis & quibusdam cruris, necnon cuti inguinali largitur, dein in propinquos musculos supra cruris medium desinit. Quartus nervorum omnium crassissimus, siccissimus, validissimus, ex quatuor supernis partibus ossis sacri ortus, inter os sacrum & ilium elapsus, ramulos vicinis partibus, ut cuti natium, & cruris, necnon substratis musculis largitur, deinde in duos abit ramos: eorum minore secundum peronem delapso, in pedem superiorem, digitis singulis binos dat furculos: maiore autem per tibiæ & pedem protenso, digitis singulis binos quoque dat ramos: sed ambo hi rami musculorum capita, & cutim tibiæ & pedis obiter adeunt & texunt.

Ossis sacri paria sex.

Pedis quatuor nervi.

Primus.

Secundus.

Tertius.

Quartus.

CONTROVERSIE ANATOMICÆ.

De ortu nervorum contra Peripateticos. QVÆSTIO VII.



De ortu nervorum certant Peripatetici & Medici. Aristoteles 3. de historia animalium, lib. de somno & vigilia, lib. de respiratione: Alexander, lib. de anima: Auerroes 2. Collig. & omnes Peripatetici, nervorum omnium propagines à corde derivant, his (ut audio) persuasi rationibus: Ibi facultas organum statuendum, ubi facultatis apparet principium at movendi & sentiendi vis in corde magis lucet, quam in cæteris partibus. Primum enim movetur cor, estque perpetuus illius motus: cerebrum verò solo cordis & arteriarum motu cietur. Deinde

Peripatetici cor nervorum principium affirmant. Ratio prima.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Septima.

Octava.

ibi est principium motus, ubi inest appetitus; tertio de anima, at in corde est appetentia: nam lætitia, tristitia, spes, motiones sunt cordis, in quibus consistit appetentia persequendi aut fugiendi: Si in corde facultas est appetens & movens, ergo & organum tale est nervus. Præterea cum vehementem motum perficere volumus spiritum, quem in inspiratione accepimus, retinemus: at quid faceret huiusmodi nixus circa cor, nisi continuus esset à corde meatus ad organa motus, per quem spiritus multus intromitteretur? Quin etiam cor exquisitissimo sensu est præditum, nec graviorem noxam fert, cerebrum omnino est insensibile. Adde quod ligatis carotidibus, quæ sunt arteriæ à corde prodeuntes, fit sensus ut & motus interceptio, hinc caros & apoplexia: (cf. Aristotel. lib. de somno, Quibus vena intercipiuntur, insensiles fiunt. In syncope proprio cordis affectu, præceptis facultatum omnium lapsus percipitur. Si itaque cor sensus & motus auctor est, nervorum etiam, quæ sensus & motus sunt organa, principium dici debet. Altera Peripateticorum ratio à substantiæ similitudine desumpta est. Vasa ferè omnia cordis, ut aorta & arteriosa vena, dura sunt ac nervea, & uterque cordis sinus innumeris propemodum nervulis ac fibris nerveis confectus apparet. Postremo, certissi-

mum est cor prius generari & conformari quam cerebrum: at per cordis substantiam sexa
 coniugationis nervulus disseminatur, antequam cerebrum constructum sit, non ergo à cerebro
 oriuntur nervi, sed à corde. Sunt qui Aristotelis sententiam ita interpretantur. Plures qui-
 dem in cerebro nervorum riuulos apparere, sed eorum omnium fontem & scaturiginem esse
 cor, itaque ex basi cordis nervulum exilem admodum ascendere ad cerebrum putant, ibi pos-
 hac multiplicari, ut maxima sit & penè incredibilis fecunditas cerebri; quippe quod, cum
 unicum ob cordis perexiguam molem suscipiat nervum, septem statim de se promat & pau-
 dat nervorum parva: adeo ut nervorum radix in corde sit, propagatio autem & exercituum
 magis luceant in cerebro. Sic ex montibus parvi scaturiunt fontes, ex quibus tandem latissi-
 ma flumina propagantur: sic optici nervi dum crystalloidem attingunt expanduntur, & in
 tunicam reticularem abeunt; sic vena & arteria umbilicales in exortu simplices, tandem
 extra umbilicum per chorion sparsa, innumeris fruticantur rami. Princeps Arabum Aven-
 cenna, de nervorum exortu varia sentire videtur. Nam tertio de animalibus, Aristotelis
 sententiam tuetur, at sen prima primi nervos omnes à cerebro derivat. Erasistratus inquit, ut
 scribit Galenus cap. 3. lib. 7. de placitis Hippocratis, & Platonis, nervos à cerebri medulla
 ortum ducere existimavit: fortasse externam tantum nervorum substantiam, qua membra-
 nea est, animadvertens, verum etate provecior usuque rerum doctior, & interiorum ner-
 vorum substantiam mollem ac medullarem inquit, à prioris sententia discessit. Avicenna
 cor nervorum vult esse principium mediante cerebro. Aponensis à corde tanquam radice &
 formali principio oriri nervos putat, sed cum medio à cerebro. Alij pro Aristotele cor pri-
 mum esse motus, sensusque principium, idcirco etiam nervorum, existimant; sed cerebro uti
 ad sensuum commoditatem, quia caloris agitatio officium sentiendi intercipit, & cerebrum
 sua frigiditate temperiem illam sanguini & spiritibus conciliat. Medici nervos omnes à ce-
 rebri substantia, aut eius vicaria medulla ortum ducere, & cerebrum nervorum esse princi-
 pium; tum γενέσθωσ, id est, originis, quia eadem cerebri & nervorum substantia est; tum
 διοικήσθωσ, id est, dispensationis & officij, quia animalis spiritus à cerebro in nervos in-
 fluit, contédunt. Hoc primus omnium voluit Hippocrates, lib. de visum natura, νεῦρον ἔστι
 σῖς ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ καὶ τῷ πρὸς τὴν καρδίαν ἐστὶν ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ καὶ τῷ πρὸς τὴν
 καρδίαν, id est, Nervorum exortus ab occipitio est usque ad spinam, cox endicem, puden-
 dum, femora, brachia, humeros, pedes, tibias. Galenus toties id inculcavit primo, 2. &
 7. de placitis Hippocratis, primo, 12. & 16. de usu partium; lib. de nervorum dissectione, in
 arte parva, & lib. de constitutione artis, ut loca integra citare superfluum esset. Prestat sen-
 tentiam hanc rationibus stabilire. Inde organum derivari debet, unde facultas manat (li-
 ceat enim iisdem telis Peripateticos impetere: sed à cerebro, motus omnis voluntarius, sensus
 que prodeunt: ergo & organa motus sensusque, nervi scilicet. Motum omnem sensumque à
 cerebro manare hec docent; quod affecto cerebro oppletisque eius ventriculus, ut in apople-
 xia, statim pereat animalitas, illa scilicet à corde: at vulnerato corde & frigidis abscessibus obfesso,
 non intercipitur momento sensus & motus. Præterea affecto cerebro, totum nervosum genus
 momento in illius sympathiam trahitur, & contra cerebro totum genus nervosum corrumpitur.
 Sic in epilepsia, qua cerebri est affectus, convellitur totum corpus: corde autem affecto,
 nihil tale contingit. Debet principium sensus & motus esse temperatum, quia calidum omnia
 permiscet: sic dum ira exæstuat cor, sensus, ratio & animi omnes functiones perturbantur.
 In phreniticis sensationes sunt deliræ, motus præcipientes & furibundi, & ex Aristotele san-
 guinis calidioris agitatio officium sentiendi intercipit. At calidissimum est cor, vret enim si
 manum admoveas. Docet in Ethicis Aristoteles, pueros & iuvenes ineptos esse morales Phi-
 losophiæ auditores, quia multa perturbatio circa ipsos sit & motus. Si ergo sensus motusque
 voluntarij principium non est cor: ergo neque nervorum. Quin etiam nervorum & cerebri

Sententia
 Aristotelica
 interpretata.

Opinio Aven-
 cenna.

Erasistratus.

Avicenna
 opinio.

Alia opinio.

Medicorum
 opinio.

Hippocratis
 auctoritas.

Rationes Me-
 dicorum.
 Prima.

Cerebrum sen-
 sus & motus
 principium
 esse.

Cor ineptum
 esse organum
 sensus.

Secunda ratio.

eadem est substantia & similis structura: cerebrum totum est medullosum & duabus velatur tunicis, nervi intus molles, duabus vestiuntur tunicis, dura & tenui: unde Galenus nervum parvum appellat cerebrum, sed durius & resiccatum: quis autem in corde & vasis eius medullam unquam observavit? Sed cur rationes profero, cum sensus ipse nervorum omnium rivulus & scaturigines in cerebro observet? In corde unicus tantum est nervulus à recurrente sinistro exortus, quo scito interceptione non exstinguitur, sed eliditur tantum vox, & obtinefit animal. Præterea maior apparet continuatio nervi cum cerebro, quam cum corde: si enim ligetur nervus in medio, pars superior cerebrum versus, sentiet & movebitur, pars vero cordi vicinior insensibilis erit & immobilis. Postremò, si cor nervorum esset principium, interceptis viis à corde ad cerebrum, repente animalia sensu & motu priuarentur, at corde leso, nudato, exempto, manent adhuc voluntaria actiones. Id docuit eleganter Galenus secundo de placitiis Hippocratis & Platonis; Si (ait) nudaveris cor atque deprefferis, nec voce, nec respiratione; nec ulla prorsus voluntaria actione impediri animal cernes, imò licebit tibi cortotum eximere illa sensu voluntariis actionibus; id quod in nonnullis sacrificiis contingit, in quibus animalia cernuntur corde in aris imposito non restirare tantum aut clamare fortiter, sed etiam fugere, quousque profusione sanguinis extinguantur. Si ergo cerebrum non cor nervorum principium. Peripateticorum rationes ita diluenda sunt. Cor primum moveri inficiamur, non enim quamdum materno concluditur utero puellus, cordis motu & opera indiget. Sed demum primum moveri, motus ille voluntarius non est, nec in nostra potestate ut nobis pareat; nervorum autem & musculorum motus sunt voluntarij. Non sentit cerebrum, quia sentire non debet; non debet, quia sensuum omnium communis est iudex. Cor ita exquisitè, ut dicunt, sentire negamus, sunt enim fere omnes cordis affectus insensibiles. Ligatis carotidibus fit sensus & motus priuatio, non primò & per se, sed ex euentu, quia interceptur vitalis spiritus, qui animali materiam subministrat. Per synopen facultates omnes concidunt, exhausto vitali spiritu & exoluto cordis calore. Quam afferunt nervorum & cordis similitudinem, nullam agnoscimus: nervi enim intus molles sunt & medullofi, at in corde medulla nulla cernitur; nervosa autem fibra, quæ in vitroque sinu conspicue sunt, membrarum sunt epiphyfes trichuspides, non nervi. Postremò, dum cor prius quam cerebrum conformari putant; errant, ni fallor, toto cælo; principum enim & spermaticarum partium prima stamina eodem tempore delineantur. Explodatur ergo Peripateticorum opinio, & cum Medicis cerebrum nervorum principium astruamus.

Tertia ab
Aristotele petita.

Quarta.

Quinta.

Peripateticorum
rationes singula
diluantur.
Motus cordis
non est voluntarius,
Cur non sentiat cerebrum.

Nulla cordis
& nervorum
est similitudo.

An nervi arteriis venisque continui sint, ut voluerunt quidam.

Et de colici doloris in paralyfin transmutatione.

QVÆSTIO VIII.

FVIT olim Praxagora opinio, ut scribit Galenus cap. 7. libri 1. de placitiis Hippocratis & Platonis, nervos arteriis esse continuos, nihilque aliud esse nervos, quam exiliores factas arterias. Cum enim arteriarum corpus cauum sit & durum, continua in animali diuaticatione facta, tandem ita angustas evadere cavitates putat, ut inter se tunica concidunt; quod ubi contigerit, arteria nervus videtur. Videtur id voluisse Aristoteles, tertio de historia animalium, capite quinto. Aorta (inquit) arctior est & vehementer nervosa, deducitque longius, hoc est ad caput aut imas partes, in angustum admodum coarctatur ac nervi naturam ex toto accipit: nervi igitur arterioli ille sunt multe in unum coeuntes, non communem canalem, sed corpus ex pluribus ac tenuissimis canalibus compositum, idcirco fissilis est nervus secundum longitudinem. Nam arteriola in fibras rectas desinunt nervos constituentes. Huius sententia leui-

Praxagora
opinio, nervos
arteriis esse
continuos.

Aristoteles
sententia.

tatem refellit Galenus loco citato; nam & intercostales arterie exiles sunt, & plexum cerebri arteriole angustissimæ quas tamen nervos nemo appellavit: quin & femoris nervus amplissimus est & crassissimus, quem arteria nomine ne ipse quidem Praxagoras insignire ausi. Audini quosdā rerum novarū inuētores publicè docuisse, nervos nihil aliud esse quam venas, quæ dum ad cerebri substantiā pervenēre, in nervi naturā degenerāt. Hanc novam opinionem his rationibus fulciunt. Sanguinis ingens copia, per venulas & arteriolas, tum ad cerebri basim, tum ad anteriores ventriculos, ubi plexus apparent, fertur, ibi cerebri frigidiæ temperatur, ne vaneſcat, atque ita sentiendi & movēdi officium præstat. Hæ venulæ nisi ad partes sensus motūsque participes propagentur, inutiles erunt. Quid enim cerebro tantæ temperati sanguinis copia est opus? Præterea si nervi non sunt venæ, aut saltem cum venis continui, necesse est ut exeat & vasis sanguis spirituosus in laxam cerebri substantiam, & è cerebri substantia rursum ingrediaur nervos, quod repugnat naturæ spirituum; spirituum namque natura est diluari, non cogi: nervi igitur nihil aliud sunt quàm venæ in naturam nervosam mutatæ; videntur autem nervi prope cerebrum candidiores, quia cerebro quasi tomento fulcuntur. Tertiò his adſtipulatur experientia. Paralyſis frequenter in colicum & arthriticum dolorem deſinit, & hi in paralyſim: necesse est ergo ut è venis in nervos transmigret humor idè, per vasorum continuatam. Hæc & similia proferi Reuſnerus, vir sanè lepidissimus. Nos enim qui Hippocratis & Galeni dogmata tuemur, coquos & vino Hippocratico ebrios vocat; fortasse cum Hippocrate & Galeno nunquam est ipse epulatus; qui si delicatissima eorum condimenta primo ribus (ut aiunt) labris deguſtaſſet, non ita inconsideratè & temerè inter eos inuheretur. Quàm autem absurda ſit eius opinio, videant omnes. Quomodo nervi venarum propagines eſſe poſſunt, cum venarum & nervorum nulla ſit continuas aut ſimilitudo? Venæ ubique cauæ ſunt, nervi σκληροὶ tantum; venarum exterior tunica mollis eſt, nervorum durissima; nervi interior pars medulloſa eſt; quis in vena medullam unquam obſervauit? Rationibus ita ſatis faciendum puto: Qui in cerebri venis continetur ſanguis, nutriendo cerebro & generandis ſpiritibus dicatus eſt; eſt enim cerebri moles ampliſſima, quæ ſanguinis eam copiam requirit. Abſurdum putant è venis exire ſanguinem & rursum in nervos diffundi, niſi ea corpora continua ſint; ſed non vident à vena porta per mediam hepatis carnem tranſcolari ſanguinem & in cauæ radices diſpergi. Poſtremò quæ de paralyſeos in colicum & arthriticum dolorem tranſmutatione obſciunt, nihil concludunt: non enim colici & arthritici doloris materia perpetuò in venis continetur. Nihil obſtat à nervis in venas, à venis in nervos, & μεταſτασιν & ἐνσπένεσιν fieri, cum per occultos ſapè & inſenſiles ductus humorum fiant recurſus. Quoniam verò in paralyſeos & colici doloris mentionem incidimus, de utriusque affectus tranſmutatione pauca quedam hæc annotare non erit ſtudioſis (ut opinor) ingratum. Obſervauit Paulus ex Aegina Medicus cap. 18. libr. 3. quamplurimis è colico dolore in epileſiam aut paralyſim tranſmutationem factam. Noſtra ætate, ait cap. 18. libr. 3. colicus morbus homines vexauit, in quo abſoluta motus priuatio in artubus conſequebatur, verum ſenſus tactus illæſus conſeruabatur. Et cap. 43. euſdem libri; πολλοῖς μὲν εἰς ἐπιληΐαν, ἑτέροις δὲ εἰς παραλυσιν τῶν κάλων σωζομένους τῆς αἰσθήσεως, τοῖσι δὲ καὶ εἰς ἀμφοτέρω γέγιον ἀπόσκεψις. Colica, ait, quaſi peſtifera quadam contagione terminabatur, plerique ad morbum comitiale, aliis ad artuum reſolutionem ſeruato ſenſu; & qui ad comitiale delapſi ſunt, plerique perierunt: qui verò ad reſolutionem, plerique ſeruati ſunt, velut in iudicatione cauſa tranſlata. Meminit etiam huius paralyſeos Auicenna cap. de paralyſi, & Holerius ſcholiis ſuis eruditissimis. Itaque colicus dolor in paralyſim, & paralyſis in colicum ſapè tranſmutatur. Eius tranſmutationis viæ, alias manifeſtæ ſunt, alias inſenſiles; quid enim obſtat à nervis in inſterna hu-

Alia opinio
Reſolueri.

Primæ rationis.

Secunda.

Tertia.

Conuelliunt
Reuſnerus.

De colici doloris in paralyſim tranſmutatione.

Pauli authoritatis.

Viæ tranſmutationis.

morum decubitus fieri, & ab intestinis humores crudos, sed attenuatos in nervos vapores γὰρ τὸ σώμα συμπαγές. Omne corpus in viuentibus transpirabile & transfluxibile. In abscessibus inferiorum partium & tumoribus crudis fit sæpe πάλινδρομη seu recursus ad superiores partes, unde cita mors venit, idque per insensiles ductus. In calcis fractura apud Hippocratem lib. de fract. sunt febres singultuose & conuulsivæ περὶ πύρετον & in Aphorismis angina faucium cum rubore & tumore ceruicis sæpe recurrit. Cur ergo à nervis in intestina & venas, & à venis in nervos non fiet humorum μελάσας? Febris materia in venis conclusa, sæpe in nervos migrat, testem habeo locupletissimum Hippocratem in Coacis prænotionibus. σπασμὸς ἐν σπυελῷ γενόμενος παύει τὸν σπυρετὸν αὐτῆς μέγαν, ἢ τὴν ὑστέρα, ἢ τὴν τρίτην, ὑπερβαλλὼν δὲ τὴν ἄρτην ἐν ἡρξαι καὶ μὴ παύόμενος κακόν, id est, Conuulsio febris finem adfert, quæ aut eodem die aut posttridie, aut ad summum perendie incidit, sed si eam qua cœpit horam excesserit, neque quicuerit malum. Conuulsio nervorum affectus est, febrilis materia in vasis locum habet: si ergo conuulsio febre sedat, è venis in genus nervosum μεταστάσιν fieri necesse est. Fit etiam colici in arthriticis, & arthritici in colicum dolorem transmutatio, cuius meminit Hippocrates 6. epid. sectione 4. τὸ ἐν ἡσπυρίῳ ἐν τῇ δεξιᾷ ἀρθρίκως ἐγέλῳ ἢν ἡ σπυελίτις, ἐπὶ δὲ τοῖς ἐν ἡσπυρίῳ ἐπιπνοώτερος. Qui articulari morbo detentus intestini dolore dextra parte vexabatur, leuius habebat, ubi verò hic morbus curatus fuit, magis dolebat. Quod etiam repetit libro de humoribus, humoribus enim ad intestina depositis, mirum non est articularum dolores lenari, ut & iis curatis inter articularum dolores ingrauescere. Hec omnia annotare placuit, ut discant rudiores, & occultos esse ductus nobis incognitos, per quos humorum sunt translationes, & mirabilem etiam esse vasorum omnium societatem, non tamen ideo esse eiusdem generis. Nam & vena & arteria per anastomosis penè innumeræ continuæ sunt; est tamen eorum structura valde dissimilis. Non sunt igitur nervi veng aut arteria continuatæ & exiliores factæ.

Colicus dolor
in arthriticis
mutatur, &
contra.

An nervi sensus motusque sint organa.

QVÆSTIO IX.

NERVOS sensus motusque esse organa docet hac ratione Galenus, quod ligatis, sectis, obstructis & refrigeratis nervis fiat sensus motusque privatio. Improbant multi hanc Galeni rationem, quia ligatis carotidibus fit sensus privatio, non tamen carotides arteriæ organa sensus dici debent. Respondent quidam cum arteria simul intercipi nervum sextæ coniugationis, qui arteriæ contiguus est, atque ita non ob arteriæ, sed nervi ligaturam caron excitari. Ego illius cari qui obstructis fit aut ligatis carotidibus causam aliam agnosco, interceptionem quippe vitalis spiritus, qui animali materiam suggerit, unde fit ut denegato aditu spiritui vitali, nulla animalis spiritus generatio fiat, nihilque in nervos influat. Quod si sextæ coniugationis nervus vinciat, non uniuersum corpus sensu priuabitur, sed hæc tantum partes in quas distribuitur. Peripatetici nervum sentiendi organum non agnoscentes, sed carnem, aut quid ei analogum. Hoc voluit Aristoteles 2. de part. anim. & Averroes 2. Colliger. Qui Aristotelis partes tuerentur his rationibus nituntur. Sensibile positum super sensorium non mouet sensum; sed obiectum super denudatum nervum admotum sentitur à nervo, non est ergo nervus sensus organum. Respondemus in sensibus maxime terreis, quales sunt tactus & gustus, non requiri medium externum, ut in visu, auditu & odoratu, sed medium esse vniuersum modi cum organo; sic cutis citra medium externum sentit & caro denudata sine medio sentit, quam tamen Aristoteles tactus organum statuit. Secundò obiciunt, per totam partis substantiam nervos non disseminari, & tamen partes omnes sentire, sic per totam carnem

Nervi sensus
motusque organa
Galenus.
Obiectum.

Solutio.

Peripateticorum opinio contraria.
Ratæ prima.

Solutio.

Secunda ratio.

Responſio.

non diffunditur nervus ſentit autem ubiq; caro & cutis. Dico ſufficere in una parte exiguum nervum, à quo ſpiritus per totā partē diffundantur: ut enim per totā carnē venæ & arteriæ non ſparguntur, ſanguinis tamen & ſpiritus ſit per omnes partis particulas diſtributio, ut non eſt neceſſe per totā partis ſubſtantiā nervū diſſeminari, alioqui totū corpus nervoſum eſſet.

Tertia ratio.

Poſtremo, id nobis obtrudūt, ſi nervi ſoli ſenſus organa eſſent, ſequeretur partes eas non ſentiri ad quas non fertur nervus, ac multe partes ſine nervis ſentiūt, ut dura meninx, quæ tamen exquisitiſſimi eſt ſenſus. Reſpondeo, mēbranas cerebri ſentiendi facultatem accipere à medullari cerebri ſubſtantiā quam tegunt. Quam enim vim interior nervi ſubſtantiā medullaris mēbranis eam regentibus largitur, eandem cerebrum ſuis mēbranis impertit: eſt enim nervus velut parvum cerebrum reſiccatum, & cerebrum nervus ampliſſimus ac molliſſimus. Propterea abſurdum eſt exiſtimare mēbranas cerebri nervis carere, quia nervorum paria omnia excipiunt & undique perforantur mēbranz duæ ut nervis exitum dent. Statuatur ergo ex Hippocratis & Galeni doctrina nervus ſenſus omnis autor, quia ſenſificæ facultatis imperium deſert. Eſt alius nervorum uſus ad motum, nullus enim voluntarij motus citra nervi opem, & licet muſculus organum ſit immediatum voluntarij motus, non movet tamen niſi per facultatis & ſpiritus animalis influxum; inſluit autem per nervos, qui ſpiritum latens dicuntur. Hinc collige varia eſſe motus organa, cerebrum, nervos, muſculos. Verum quæſi forteſſe quidam, ſi ſenſus per nervos fertur, quomodo refertur ſenſus in partis temperi? nam Galenus libro de conſtitutione artis Medicæ ſcribit, partem vel ſentire, vel non ſentire tanquam vel magis vel minus eſſe proprietatis. Reſponde, ad ſenſum duo requiri. Primum ut ſentiens facultas inſluat, ideò conſtructi ſunt nervi; deinde ut inſluxa ingrediatur partem, cuius temperies ſit organum ad ſenſum accommodatum.

Nervus quando organum movet.

Obiectio.

Solutio.

¶ An nervi motori j à ſenſificis diſtinguantur.

QVÆSTIO X.



QUÆ AD MODUM cerebrum, in anteriùs & poſteriùs dividi ſolet; ita nervorum duo genera à Galeno ſtatuuntur; anteriore, qui à cerebro, & poſteriore, qui à cerebello aut ſpinali medulla ortum ducunt. Illos in arte parva, & 9. de uſu partium cap. 14. necnon 7. de placit. Hippoc. & Plac. cap. 5. mollioreſ eſſe vult, hoſ durioreſ; illoſ ſenſui, hoſ motioni tantum deſtinatoſ putat. Itaque ex Galeni ſcriptis duo colligimus:

Nervus ſenſificus à cerebro, motrices à ſpinali medulla oriri vult Galenus.

Non probatur ea Galeni ſententia.

Non omneſ ſenſui j à cerebro.

Nulluſ nervuſ ab antica cerebri parte oritur.

Non omneſ nervi ad motum ſunt deſtinati. Demouſtratio prima.

primum nervoſ ſenſificoſ à cerebro anteriore, motriceſ à poſteriore & ſpinali medulla orti; alterum duroſ ad motum, molleſ ad ſenſum tantum eſſe deſtinatoſ. Verum utraq; propoſitio ſi abſolutè & in uniuerſum enuncietur, falſa eſt, nec mihi videtur conſona principio rationis. Non enim ſenſorij omneſ à cerebro, ſed plurimi à ſpinali medulla, nec motori j omneſ à cerebello, ſed quidā à cerebro ortum ducunt. Præterea non duri omneſ motori j ſunt, nec molleſ omneſ ſenſifici, ſed motori j dantur quamplureſ ſenſifici mollioreſ. Prima propoſitio ita confirmatur. Nervuſ ſecundæ coniugationis movet oculum, qui tamen opticeſt contiguuſ, & ab eodem ferè oritur principio. Nervi omneſ, qui cervici, thoraci, brachiis, humeris, cruribuſ ſenſum dant, non à cerebro, ſed ſpinali medulla tanquam caudice ſcaturiunt, non ergo ſenſifici omneſ immediatè ab anteriore cerebro emergunt. Quid, ſi dicamuſ cum Neotericiſ, nervoſ omneſ à poſtica cerebri parte & ſpinali medullæ principio, nulloſ ab antica oriri? Alteriuſ propoſitioniſ veritas hac demonſtratione fulcitur. Nervi, quò longiuſ abſunt à cerebro, eò durioreſ: quò propiuſ, eò mollioreſ. Nervuſ ſextæ coniugationiſ, qui in oriſicium ventriculi ſuperiuſ implantatur, ſtomachicuſ vocant, longiuſ abeſt à medullari cerebri ſubſtantiā, quā ſecundæ & ſeptimæ coniugationiſ nervuſ: eſt igitur ſtomachicuſ durior ſecundo & ſeptimo pari: at ſtomachicuſ ſenſui tantum eſt deſtinatuſ, ſecunda verò & ſeptima coniugatio

conjugatio mouens, illa oculum, hæc linguam, unde consequens sit motorios quosdam quibusdam sensificis esse molliores. Quin etiam qui in dentium radices inseruntur nervi, eisque sentiendi facultatem impertiunt, duriores sunt multò, quàm qui oculum & linguam mouent. Est & altera demonstratio ex Galeni principiis repetenda. Motorij omnes nervi etiam sunt sensifici, cap. 5. lib. 7. de placitis, & 7. de Anatom. administ. Omnis nervus utramque facultatem & sentiendi & mouendi habet. Cum enim vnicus sit specie animalis spiritus, qui mouet & sentit, vnicus & idem animalis facultatis influxus, vna & eadem nervorum omnium structura, quid obstat ab vno & eodem nervo sensum & motum obiri? Non igitur ad duritiem aut molliem nervi referendum puto, quod hic moueat, ille sentiat; sed ad modum passionis organi, aut insertionis: nam si nervus in carnosas & musculosas partes inseratur; facultatem mouendi communicabit; si verò in musculosas partes non feratur, non mouebit, quia non mouet sine musculo nervus; organum quippe est muscularis immediatum voluntarij motus. Sed hæc ipsa, quæ obscuriora multis videri possent, exemplorum appositione illustremus. Vnicus & idem nervus sextæ coniugationis, mouet & sentit, pro varia partium in quas diuiscatur conditione, in orificio ventriculi sentit exquisitissime, hinc sedes appetentiæ dicitur, non mouet autem, quia in ventriculo nulli sunt muscoli; eiusdem coniugationis portiuncula ad laryngem reuerrens, eius musculos mouet, & præcipuum vocis organum dicitur. Quintæ societatis portio audit, portiuncula temporales musculos mouet; non ergo sentiunt nervi, quia molles, & mouent quia duri; sed vnus & idem nervus, eadem perpetuo mouendi ac sentiendi facultate præditus, & ad utramque indiscriminatim se habens, pro varia partium in quam inseritur conditione, nunc sentit, nunc mouet; si in organa motus inseratur, mouet; si in organa tactus, sentit. Fatemur quidem & admittimus, molliores nervos ad sensum aptiores esse, duriores ad motum, quia sensus receptione sola & passione fit, motus actione, at molliora facilius recipiunt, duriora, validius agunt; sed sensorios omnes motorios molliores esse planè inficiamur. Excusari tamen Galenus poterit, si dixeris fortasse dum sensorios nervos molles vocat, de reliquis quatuor sensibus, visu, auditu, gustu, odoratu, non de sensu tactus maxime terreo loquutum fuisse, mollis est namque qui gustat, mollior qui videt, mollissimus mammillarum processus, odoratus organum, qui verò tangendi facultatem impertit, duritie à motorijs nõ differt. Et hoc voluit Galenus, 7. de placitis, dum nervum omnem sensu tactus præditum esse scribit. Sicut qui Galeni sententiam ita interpretentur, vnus & idem partis, oculorum puta, aut lingue, nervos sensificos motorijs esse molliores; ita enim opticum molliorem esse volunt secunda coniugatione, quæ mouet, & tertiam quartamq; & vltimas, molliores septima. Verùm mihi hæc non satisfaciunt, cum enim ab vno & eodem principio, prima duo nervorum paria oriantur, non video cur vnum alio mollius esse debeat. Mollietis namque & durities nervorum, à tribus tantum pendet; vel ab exortus principio: sic qui à cerebro oriuntur, molliores sunt, qui à spinali medulla, duriores, quia cerebrum mollius: vel molliores sunt aut duriores nervi, quia longius vel propius absunt à suo principio; sic optici quia brevissimo perreptant intervallo, sunt mollissimi, manuum & pedum durissimi. Postremo, molliem & duritiem comparant nervi, ex duriorum corporum, ut ossium, cartilaginum, & membranarum contactu. Concludamus ergo molliem & duritiem non facere nervorum species distinctas, nec ideo sentire nervos, quia molles, ideo mouere, quia duros; sed utraque facultate præditos, prout in organa motus aut tactus inseruntur, hic sentire, illic mouere.

Altera de
monstratio.

Idem nervus
mouet &
sentit.

Exemplis illis
struitur hæc
ipsa.

Excusatio Ga-
leni.

Interpretatur
Galenus.

Unde molli-
ties & du-
rities nervo-
rum.

Conclusio to-
tius dispu-
tationis.

Cur pereat sensus illeſo motu, & contrà motus, ſenſu non viciato.

QVÆSTIO XI.



QVÆSTIO hæc Medica & Anatomica, cum ad paralyſeos naturā intelligendam multum conferat, non videtur ſilentio prætereunda. Eam Galenus cap. 6. libri 1. de locis affect. & cap. 12. eiusdem libri, necnon cap. 5. lib. 1. de cauſis ſympt. eleganter exagitat. Scribimus ferè omnes Pragmatici, paralyſin triplicem eſſe; unam exquisitam & perfectam, quam motus & ſenſus priuationem definiunt; alteram imperfectam, in qua perit motus illeſo ſenſu; tertiam imperfectiſſimam, in qua perit ſenſus illeſo motu. Hanc Galenus cap. 12. lib. 3. de locis affectis, non reſolutionem ſed à viciatione potius appellandam putat. Cur autem contingat illeſo motu ſenſum ledi, & contrà deperdito motu, ſentiendi libertatem manere, inquirendum. Partes reperiuntur in nobis quamplurima, quæ duas eàſque diſtinctas nervorum differentias admittunt: alia enim ſenſum tactū, aliæ motum & ſenſum impertiuntur. Exempli gratia, videt oculus per opticum, movetur per nervum ſecundæ coniugationis. In lingua diſtincti ſunt motrices nervi à ſenſificiis, tertia enim & quarta coniugatio guſtant, ſeptima movet. In illis proculdubio non eſt difficile cauſam assignare, cur pereat alteruter illeſo altero, quia diſtincti ſunt nervi, diſverſa eorum principia, diſſimilis inſertio. Si itaque ſolus opticus obſtruatur, ut in gutta ſerena, ſtatim extinguetur videndi actio, illeſo oculi motu; ſi autem ſecundæ coniugationis nervus afficiatur, immobiles erunt oculi, quem affectum πῆξις vocat Hippocrates, & ἀκυνότις, necnon σῆξις: quod ſi uterque nervus ſimul afficiatur, cōmuni leſo nervorum principio, ut in apoplexia & caro, utraque functio intercipiatur. Sed cum ab uno & eodem nervo utraque facultas ad unicam partem demandatur, cur pereat alterutra functio, difficilius eſt cauſarum inſtigatio: has autem ita liceat rimari nobis. Perit ſæpiſſimè motus illeſo ſenſu, etiamſi ab unico nervo utraque vis inſluat, propter inopiam ſpiritus animalis: pauca etenim ſpirituum irradiatio, ſenſus quidem autor eſſe poterit, ſed non motus; quia maiore facultatū robore ad movendum, quam ad ſentiendum eſt opus; cum movere apud Philoſophos ſit agere, ſentire autem quoddam pati, perit itaque motus ſæpiſſimè manente ſentiendi libertate. Sed contrà, an poſſit illeſo motu ſentiendi vis in eadem parte extingui, dubitatione non caret; non enim rationi conſentaneum videtur, deſiciente infirmiore, nempe ſensatione; validiorem ſervari, movendi quippe functionem. Dico igitur ſi diſtincta ſit nervorum inſertio, poſſe id quidem fieri, ſed in uno & eodem nervo nunquam. Poſteſt exempli gratia, in manu ladi ſenſus, ſuperſite motu, quia nervi unius variz ſunt propagines; portio in cutē, alia in muſculos diſſeminatur, ſi quæ in cutem fertur ſola afficiatur, peribit ſenſus cutis, ſuperſite muſculi motus, ut in Pauſania hiſtoria docet Galenus cap. 12. lib. 3. de locis affectis. Doctiſſimus Arceſius cōmentariis ſuis in nonium Rhaſis, cur interdū pereat motus illeſo ſenſu, & contrà, cauſam refert ad variam partium ſuſcipientium & cauſarum efficientium naturam. Plus poſteſt (inquit) ad ſentiendi vim labefactandam, intemperies frigida, ad movendi facultatem, humida; madentes enim nervi, ad motum, reſiccati ad ſenſum inepti redduntur. Ego Galeni rationem magis probo, perire motum illeſo ſenſu, quia ad motum maiore ſpirituum copia & robore opus eſt, quam ad ſenſum. Sini qui dicant non poſſe moveri partem, ſi ſenſus tollatur, quia nunquam ſit motus niſi præcedat alteratio à ſenſu facta, ut nervi ad ſenſum faciant primò & per ſe, ſecundariò ad motum, ideòque ſæpe intercipi motum illeſo ſenſu, ablato autem ſenſu, fieri non poſſe ut moveatur pars, ut ſimile ſit nature ingenium artificis organorum, quæ in templis ſtatim per folles immiſſo tactis, modò his, modò illis pro artificis arbitrio diverſos edunt ſonos: ſic animalibus alteratio per ſenſus, eſt velut tactus, diſponens inſtrumentum

Paralyſis triplex.

Cur pereat ſenſus illeſo motu, & contrà.

Prima ratio in diverſis nervis.

Secunda ratio in eodem eadēque nervo obſcurior.

Perit ſæpe motus illeſo ſenſu, raro ſenſus ſuperſite motu.

Arceſius inſinuat.

Quorundam in: interpretatio.

ad statum recipiendum, ut deficiente sensu, deficiat motus. Verum quamplurima hic observantur inuoluta summèque ardua, quæ sententiæ huius veritatem infringere & labefactare videntur. Nam si ad motum, maior requiritur quam ad sensum spirituum copia & illustratio, cur in epilepsia affecto cerebro communi nervorum principio, pereunt omnino sensus, remanente motu? Cur in caro sentiendi facultas omnino extinguitur, manente respirationis, quæ motu thoracis perficitur, libertate? Cur Phreniticis minuitur sensus, motu validissimo existente? Cur Elephanticis minuitur sensus illeso motu? Cur denique dormientes non sentiunt; moventur autem eorum quamplurimi, ut de noctambulis apparet? Problemata hæc quinque ordine dissolvenda sunt. Epileptici non sentiunt, quia læditur in illis communis sensus de singularibus diiudicans; remanet autem motus, quia imperium motus non omnino intercidit. Ad sensum enim duo requiruntur, alteratio organi, ab obiecto sensibili, & alterationis perceptio. In epilepsia non fit sensus; quia prædiximus est sensus communis; impeditur læso organo, anterioribus quippe cerebri ventriculis, in quibus sedem habet epilepsia, Galeno teste 3. de locis affect. Spinalis autem medulla, à qua nervi omnes crura, thoracem & brachia moventes oriuntur, primò & per se non afficitur; itaque non ob inopiam animalis spiritus perit sensus in epilepsia, sed quia commune sentiendi principium læditur. Vel dicamus, moveri quidem epilepticos, sed motum eum animale non esse, nec ab influente è cerebro facultate nasci, sed cerebri potius contractionem sequi: idè enim in epilepticis contrahuntur nervi, quia contrahitur cerebrum, & ut Arabis dictione utar, corrugatur ad exclusionem rei molestæ, auræ quippe venenatæ irritantis, aut pituitosi humoris opulentis. Unde Arabes, convulsionem epilepticam non proportionatam appellarunt, quia partes quæ convelluntur, convulsionis causam inanitionem & repletionem in se non continent. Secundum problema ita solvitur. In caro remanet spirandi libertas, & in apoplexia quantumvis valida moventur adhuc thoracis musculi, quia respirationis tanta est necessitas, ut nervorum principium ultro impellat; accedit quòd caros in anteriore cerebri parte, à qua sensus potius sedem habet, docente Galeno. Problema tertium de phreniticis, qui validos edunt motus, sensus autem debilissimos habent, ita diluendum. Phrenitis cum sit cerebri, & membranarum ipsius inflammatio, nervos accendit resiccatque, & ea ratione ad motum aptiores reddit; caloris namque proprium est movere: resiccati ergo nervi & incalcescentes validius movent; sed ad sensum inepti redduntur, quia ad sensationem requiritur mollities, non siccitas. Elephanticorum eadem ferè est ratio; resiccati enim ab humore atro & nervis, & cute, perit externarum partium sensus. Postremo, quod de dormientibus obicitur, altioris videtur contemplationis. Nam in una & eadem parte, ad quam movendi & sentiendi facultas per unicum nervum fertur, ut in brachio & crure, motus adest non sensus. Multi per somnum loquuntur, gradiuntur & vigilantium munia exercent. Narrat Galenus cap. 4. lib. 2. de motu musculi: se somno oppressum, integrum ferè stadium dormiendo confecisse, nec à somno priusquam in lapide inpegiisset, excitatum. Theo Tithoreus Stoicus dormiens in somniis ambulabat, ut & Periclis servus in summo tecto. Respondent quidam somnum sensum esse vinculum non motus; unde Aristoteles somnum definiit ἡσυχία τῶ πρὸς οὐ αἰσθάνειν, id est, quietem primi sensorij. Alij motum nequaquam fieri dicunt nisi in partibus quæ à spinali medulla nervos accipiunt; sed non satisfacit utraque responsio. Dicamus itaq; moveri dormientes, quia exigua vis in musculus latens à forti imaginatione excitatur; propterea non moventur somniantes, nisi imperante valida imaginatione brutorum imaginationi similis; est autem dormientium imaginatio brutorum imaginationi similis, quia rationem repugnantem non habet: unde fit ut illi multa moliantur quæ vigilantes non audent: tecta in sublime conscendunt, per trabes & lacunaria oberrant, omnia denique audent intrepide, quia imaginatio vaporum caligine consopita, pericula non agnoscit. Non sentiunt autem

Problemata
quinque.

Primum.

Secundum.

Tertium.

Quartum.

Quantum.

Primi solutio.

Cur in epilepsia perit sensus manente motu.

Secundi solutio.

Cur in caro perit omnino sensus remanente motu.

Tertijsolutio.

Cur phrenitici validos edunt motus, & sensus debilissimi sunt.

Quarti solutio.

Quinti solutio.

De noctambulis.

Cur motescunt dormientes.

Dormientium imaginatio brutorum imaginationi similis, & cur.

dormientes, quia obiectum sensus non adest, at motus obiectum habet proprium, appetitum scilicet, qui spectra imaginationi representat. Cum ergo per somnum feriantur cetera facultates animales, sola imaginatio ita plerumque operatur, ut vim motricem & ceteras inferiores seu mancipia quædam moueat, quod cum sit, spiritus animales motui inferiunt ad sua organa ire coguntur. Excitantur autem prædicti motus ex rerum ad id cogentium introseruatis speciebus. Huic porro affectui sunt obnoxij qui sanguine spumante & multo feruidoque spiritu abundant. Est aliud responsum, in somno & per somnum, affici magis anteriores ventriculos, in quibus sedem habet sensus communis, non spinalem medullam, à qua ferè omnes motorij nervi scaturiunt. Siat igitur inuicta & firma demonstratio, sepe motum intercipi illeto sensu in vna & eadem parte, quia ad sensum minor quam ad motum spirituum copia desideratur. Ceterum ne quid videatur prætermisum à nobis, quod ad perfectam nervorum cognitionem spectet, duo excutienda sunt problemata obscurissima. Primum, cur affecta spinali medulla superiore parte, ut in ceruice aut dorso, pereat interdum femoris & cruris motus, illeto brachij & thoracis, qui propius absunt ab ea, motu & sensu. Hoc verissimum esse docet Galenus 3. de locis affectis, & nos sepe obseruauimus. Vidi ergo nobilem quandam adulescentem qui vulnere accepto in ceruicis medulla statim cruris ac pedis dextri motu priuatus est, superstiti utriusque brachij & totius ferè corporis motu. Alterum problema est, cur sensus tactus prope cerebrum imbecillior est, ad extrema perfectior, validiorque, ad unguitum enim radices exactior est sensus, ad pudendi finem exquisitissimus. Prioris dissolutio ex spinalis medulle Anatome peti potest, quam pauci obseruauerunt, voluit namque Anatomici ferè omnes à ceruicali medulla ceruicales tantum nervos, à dorsali dorsales, à lumbari lumbares tantum nasci: neque à superiori medulla inferiorum nervorum propagines derivari putant. Ego autem lumbarium & dorsaliū nervorum capillamenta quædam à ceruicali medulla interdum nasci sepe obseruavi; ut eadem sit medulla spinalis, que cauda equina dispersio. Ut ergo in cauda equina pili quidam à superiore parte orti, alij in superiorem caudæ partem, alij in mediam desinunt, alij ad extremam usque feruntur: ita nervorum spinalis medulle propagines, quædam ab eodem puncto enate, aliæ in cervicem, aliæ in thoracem, aliæ in lumbos desinunt. Fieri itaque potest, ut vulnerata spinali medulla, eius nervi principium afficiatur, quod ad crura & pedes disseminatur, illeto nervus, qui in thoracem & brachia diuercantur. Potest & alia offerri ratio valde probabilis. Vulnerata aut percussa superiore medulla decumbit momento tenuis & serofus quidam humor inter tenuem & crassam medullam latitans, qui inferiores nervos madefaciens eorum roborem & robur exoluit, spiritusque animales ad motum & sensum ineptos reddit. Postremam questionem soluit Galenus 7. de placitis. Nervi (inquit) quo longius sunt distiti, eo magis horum principum de iis sollicitum est; sic parentes absentium liberorum sollicitudine magis anguntur, quam presentium. Dicunt aut fieri in extremis partibus reflexionem spirituum & ingeminari ob acutos angulos; addatur tertia ratio, quo magis exquisitam unumquodque cuiuslibet nervi requirit cum suo principio unitatem, eo maiorem ab eius dissolutione dolorem subsequi, at non fit in extremis partibus unitatis solutio, nisi plurium particularum à suo principio fiat dissolutio; sic caro transversum secta, magis dolet quam in longum, quod à hic partium cum suo principio magis, ibi minus seruetur unitas.

Problemata
duo.

Cur interdum
lesæ ceruicis
aut dorso me-
dulla, prius se-
moris motus,
illeto brachij.
Secundum.

Cur sensus
tactus ad ex-
trema vali-
dior.

Prioris solutio.
Observatio
pulcherrima
de spinali me-
dulla.

Posterioris
solutio.

An sola facultas per nervos influat, an cum facultate spiritus.

QVÆSTIO XII.

SENTIENDI & mouendi facultatem, à cerebro per nervos tanquam funiculos, in vniversum corpus influere, demonstratū est: sed an sola facultas influat, an cum facultate *συνεργητικὴν* quid, controuersia non caret. Galenus, nunc cum influxu facultatis, spiritum admittit corporeum, nunc spiritus præsentiam ad motum & sensum pernegat. Cap. 4. lib. 7. de placitis, dubitat, an in omnibus nervis contineatur spiritus, ut in substantia & cavitatibus cerebri. Concludit tandem, per quosdam nervos, ut per opticos, corporeum quid ferri, quia opticos manifestè cauos putat. Contineri autem in opticis spiritum ita docet. Clauso alterutro oculo, momento dilatatur pupilla, quod à spiritu fit, non ab humore, quia ab vna in alteram pupillam non tam subito fluere aut reflueret humor. Hoc etiam apparet in suffusionibus; si enim clauso oculo alter dilatatur, signum est videndi actionem non omnino interceptam, & quendam adhuc spiritui pate-
re aditum: vult itaque in opticis nervis contineri spiritum; sed an in reliquos qui sensiles canitates non habent, influat à cerebro spiritus, ingenuè fatetur se ignorare. Cap. 7. lib. 1. de locis affect. facultatis tantum influxum videtur agnoscere. Musculi (inquit) quia cognatum sensus & motus principium non habent, nervi perpetuò indiguerunt, qui illis & sensum & motum suppedient, quemadmodum sol rebus omnibus quas illuminat splendorem affert. Cap. 6. eiusdem libri. Ad crura, inquit, facultas quidem sed citra essentiam descendit; & primo de semine, qualis lux soli, talis cerebro vis que in nervos infunditur. Hæc cum aduerterent docti quidam, & Galenum satis sibi non constare obseruarent, existimarunt, per nervos corporeum nihil influere, sed facultatem solam & qualitatem incorpoream. Proferam singulas eorum rationes. Spiritus (aiunt) omnis corporeus est; exhalatio quippe est sanguinis tenuissimus, & igitur sensili aliqua canitate, qua tanquam ergastulo contineatur: sic vitalis spiritus tenuissimus & calidissimus per caua arteriarum corpora stritur: at nulle in nervis sunt canitates, & que motricum substantia durissima, non est igitur verisimile per nervos corpoream spiritum ferri. Secunda ratio priorem illustrat. Volumus Medici in paralyysi ideò sensum & motum extingui, quia à pituita lenta & viscida nervi obstruuntur; unde spiritibus aditus denegatur: si itaque pituitam molliorem non pervadunt spiritus, quomodo duriores nervi substantiam permeabunt? Tertiò, si sentiendi & mouendi vis per corporeos deferretur spiritus, momento non communicabitur, sed in tempore, nihil enim corporeum in instanti movetur: at pro voluntatis arbitrio obsequuntur cerebro musculi & tam cito quàm lubet extremum pedis articulum mouemus, non ergo à spiritu corporeo motus, sed à qualitate sola incorporea. Præterea, si per nervos influeret spiritus, obstructo cerebro, ut in apoplexia, non subita fieret sensus & motus priuatio, essent enim in singulis partibus animales spiritus sensus motusque authores. Quin etiam secto aut ligato nervo, experimur partes infra ligaturam moventur sensu ac motu priuari. Quod si in nervis animalis quidam esset spiritus, mo-
uerentur aliquantulum, & sentirent partes, donec exhaustus omnino esset spiritus. Addunt, phreniticos cum paucis spiritibus motus edere validissimo; non ergo ad motum requiri spiritum. Sed & nature spirituum repugnare putant, è cerebri substantia & sinibus in nervorum corpora ferri, quia spirituum natura est dilatari, non cogi, quomodo igitur vnientur animales spiritus, ut densam nervorum substantiam ingrediantur? Postremo, quomodo (inquit Argæterius lib. de somno & vigilia) ad nervos descendet animalis spiritus tenuissimus, æreæ & igneæ naturæ? si enim sursum natura sua fertur, descendet ergo violenter impulsus: sed à quo hac violentia? & qua ratione quod violenter fit in nobis non sentitur? His rationibus solam facultatem velut irradiatione & illustratione quadam influere, citra corporeum

Galenus varia sentire videtur.

Contineri in opticis spiritum.

Per nervos solam facultatem influere, non corpus, velunt quidam. Ratio prima.

Secundaria.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Septima.

Octava.

Contraria opinio, influere spiritum.
Sicut primum.

Secunda.

Subterfugium quorundam.

Improbatur.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Diluentur contrariationes.
Ad primum.

Spiritum contendunt. Nos contra à cerebro in nervos spiritum quandam influere existimamus, his persuasi rationibus. Non edit animales functiones in cerebro sine spiritu anima, non intelligit, non speculatur phantasmata sine spiritu, qui per sinus & tota medullarem substantiam diffunditur; cur ergo extra cerebrum ad sensum & motum eodem spiritu non utitur? Dari autem in cerebri substantia animale quendam spiritum, suo loco demonstrabitur. Præterea obstructio nervi sensum & motum intercipit, optico opilato, videndi actio perit, quasi lucerna interextincta, quia lumini interno spiritui quippe, ad crystallinum aditus intercluditur. Obstructio hæc facultatem non impedit, est enim qualitas incorporea. Scio quid dicant adversarii, non ab obstructione intercipi sensum motumque, sed à refrigeratione & mollificatione nervi, quæ facultatem exolunt: requirit enim facultas omnis certam organi temperiem, quæ si visietur, male editur functio. Sic refrigerato cerebro, ut in melancholia, & inflammato, ut in phrenitide, citra obstructionem nullam, fit principum facultatum imaginationis & ratiocinationis lesio. Sed diuerticula sunt hæc. Nam luxatis colli ac dorsi vertebra, cur inferiores partes sensu & motu priuantur? non quia refrigerati & mandentes, sed quia compressi nervi, à qua compressione denegatur aditus spiritui animali, & eiusdem cum suo principio continuïtas intercipitur. In renum calculo à sola nervi compressione, stupor in crure & art. & in per sentitur, nulla ibi est alteratio facultatis, nec organi, sed vitiosa tantum conformatio. Accedit ratio tertia validissima. Dilatatio pupillæ clauso altero oculo non fit à facultate sola, qualitas enim sola non distendit nec occupat locum; ergo à corpore; corpus hoc, aut est spiritus, aut humor: non humor, quia non tam citò ab altero in alterum oculum remearet; præterea nullus humor in oculis continetur, qui ita diffuset: est itaque spiritus, qui per opticorum confusionem & coitum ab altero in alterum remeat, unde mira oculorum eypnotica. Quod si in optico admittas spiritum ad visionem, cur non in cæteris idem spiritus sensus motusque autor eris? Adde quod animalis omnis motus si continuus sit, fatigatur, exhaustus quippe ac dissipatis spiritibus, non facultate. In animi deliquio, retractis aut exolatis spiritibus concidit animal: & in vertigine, ideo titubant ac sopiuntur animalia, quia spiritus animalis per nervos recta deducendus, circulari eo motu alio vergit, & à nervorum principio retrahitur. Queris Galenus libris de usu partium: Si unus nervus potest deferre vim sine foramine, cur in exortu spinalis medulla formatus est meatus? non opus est cavitate ad influxum facultatis, i. de sympto. causis cap. 8. per nervos vult vim sentiendi transmitti, ut modo magis, modo minus influat; at vis animalis spiritalis nec magis nec minus recipit; influxum ergo intelligit spirituum. Quin etiam influere spiritum colligere licet ex lib. de org. odor. vult enim molliores & maiores nervos ad sensum aptiores esse, quia celerius & in maiore copia suscipiunt spiritus animalis radios. Postremo, si neget ferri per nervos omnes spiritum fieri non poterit, ut in una & eadem parte, ad quam unus nervus fertur, pereat motus illa solo sensu. Hoc enim ideo contingere omnes putant, quia spiritus pauca irradiatio sensus author esse potest, non motus; cum sensu, passione sola, motus actione perficiatur. Concludamus ergo sentiendi & movendi facultatem à cerebro in nervos influere, non solitariam, sed cum spiritu quodam corporeo. Ne videantur autem qui contrariam tuerentur sententiam, de nobis victoriam reportasse, rationes singule quibus se palmam consequuturos existimant, ordine diluendæ sunt. Nervi (inquiunt) cani non sunt, ergo spiritus per eos non fertur. Incepta sanè argumentatio. Spiritus namque; omnium quæ in corpore continentur tenuissimi & tenuissimi, cur non interiorum nervi medullam, quæ tota est *σπογγώδης*, permeabunt, cum osium crassitiem pervadat alimentum, & cutem, sudor ac excrementa crassiora? venæ & arteriæ conspicuas cavitates obtinuerunt, non ut spiritum, sed ut sanguinem venosum & arteriosum continerent: at per nervos solus spiritus sine sanguine influit. Esse autem interiorum nervi substantiam foraminibus multis peruiam, hæc indicat, quod à venis in genus ner-

nosum sæpe humorum fiat μεταστάσις. Sic febris apud Hippocratem convulsione finitur, & calicus dolor apud Aeginetam in paralyfin sæpe transmutatur: si humor interiorum nervi substantiam permeat, cur non & spiritus tenuissimi ac perniciose veloces? Obiciunt præterea, spiritum per densam nervi substantiam ferri non posse, quia in paralyfi molliorem pituitam non pervadit. Dico molliorem quidem esse pituitam, sed viscidam, lentam & frigidam, nec à nativo calore regi, nervum autem calido influente magis esse peruium, vel spiritus pituitam quidem suo impetu permeare, unde τὸ ἐνὸς μὲν ὄρτα dicuntur, sed ad motum ineptos reddi, quia humoris lentore madescent, refrigerantur, atque ita puritatem, tenuitatem & splendorem amittunt, non secus ac solares radij interiecta caligine & densissima nube non lucent. Instant tertio, non moveri spiritum in instanti, quia corpus est. Respondemus, spiritum animæ organum illius in suis statim parere, & in nervis semper contineri, qui alio influente perpetuo reparatur, unde fit ut ante priorum exhaustum, novus quidam continenter suppetat. Quartæ & quintæ rationi ita satis fit. Ligato nervo perit sensus, & obstructio cerebro fit animalitatis priuatio, ob impeditam facultatis à cerebro manantis continuitatem; non enim spiritus per se & substantia sua, sensum ac motum affert partibus, sed quatenus perfusus est facultatis radiis, quos tam non licet à virtute & continuatione cerebri detruncare, quàm non licet nobis solis radios ab eodem diuisos, interceptos servare. Quæ de phreniticorum motibus obtrudunt, ita solvantur à doctissimo Veiga, validos quidem esse phreniticorum motus, sed non durare, & resiccatos tantum ac inflammatos cum nervis spiritus, furibunda concitamenta excitare. Postremis duabus rationibus ita satisfaciendum puto. Spiritum duobus modis considerari, aut quatenus physicum est corpus, & propria forma naturæ regitur; aut quatenus nobilioris formæ, animæ scilicet, instrumentum est: si à propria forma moveatur spiritus, sursum & ad exteriora movebitur perpetuo, ignea siquidem & æræa naturæ est; at dum nobiliori formæ subseruit, nunc deorsum, nunc sursum, nunc foras, nunc intro, movetur, nunc cogitur, nunc dilatatur, prout animæ ad necessarios usus visum fuerit. Admittatur ergo cum facultatis influxu spiritus corporeus, per nervos tanquam funiculos partes irrigans, sensus motusque participes. Sunt qui dissentientes Galeni locos ita conciliant, per nervos, quosdam spiritum secundum substantiam totum pervenire ad partem; per alios autem esse facultatis animalis vehiculum, ut postquam secundum sui substantiam ad certum quandam terminum est productus, mutet momento temporis instar solis radios qualitatem solam.

Ad secundam.

Ad tertiam.

Ad 4. & 5.

Ad sextam.

Ad septimam
& octavam.
Spiritus duobus modis consideratur.Conclusio.
Quorundam interpretatio.

Per quam nervi partem internam an externam feratur spiritus & facultas sensificacæ & motrix, & an nervi caui sint. **QUESTIO XIII.**



VIA nervi substantia duplex est, interior, mollis ac medullaris, & exterior tota membræa; ferri per externam animalem spiritum voluerunt quidam, non quidem inter duas tunicas, nec per membranarum substantiam; sed per arteriolas membranæ hærentes & per eas excurrentes. Fuit eius sectæ primus author Praxagoras, qui nervos nihil aliud esse putabat, quàm exiliores factas arterias, contra hunc questione octava huius libri iam disputatum est. Argentarius spiritum animale arterias nunquam deferre contendit, nec animale à vitali distinguit. Eius rationes singulas libro decimo ad veritatis regulam examinabimus. Doctissimus Rondeletius per vasa tunicarum miro artificio implicata, non per medullam, ferri spiritum sensus motusque authorem existimavit: medulla autem hunc unicum agnovit usum, ut tomenti instar, exilia vasa fulciat sustineatque. Nos cum Galeno septimo de placitis Hippoc. & Platon. per interiorem nervi

Ferri per arterias spiritum animale voluerunt quidam.

Opinio Rondeletij.

Opinio Galeni
& nostra, fer-
re per modu-
lum spiritum.

Nervi conspi-
cuam cauita-
tem non ha-
bent.

Obiectio.

Salutio.

Per internam
nervi substan-
tiam ferri spi-
ritum.
Ratio prima.

Secundaria.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Septima.

Obiectio.

substantiam ferri animalem spiritum volumus. Cum (inquit) nervi à cerebro & eius mem-
branis oriantur, per interiorem partem sensus & motus animali suppeditatur: membra-
nae autem eundem usum nervis conferunt, quem ipsae meninges cerebro praestant: unde licet
utramque detraxeris, nullam noxam contrahet membrum id quod nervus pertingit. Idem
fit cerebro utrisque membranis denudato. Hanc Galeni sententiam rationibus nostris
confirmare placet: quae ut reddantur illustriores, illud in primis pro ratio velim-
bis concedi, nervos sensilem & conspicuam cauitatem non habere, quia animales spiritus
omnium tenuissimi conspicua non egerunt cauitate: est tamen eorum interior substantia
tota πυρρῶδης καὶ στερομένη. Id voluit Hippocrates libro de locis in homine, δαν
νέυεξ appellat ἀχοιλία, id est, sine ventre, & Galenus comment. primo in 6. Epidem.
nervos cauitatibus destitutos esse scribit. Quod si obiciamus Galenum libris de usu partium
& de nervorum dissectione opticos manifestè cauos pronuntiasse, & primo de symptoma-
tum causis nervorum cauitatem indicasse his verbis. Impeditur animalis facultatis influ-
xus, cum nervus meatu praeditus, vel obstructus est, vel compressus. Respondebo, cauita-
tes alias esse sensiles, quales sunt venarum & arteriarum: hoc modo nunquam voluit Ga-
lenus nervos esse cauos, alias ferè insensiles quae pori dicuntur; Hac ratione nervi omnes
caui sunt, & inter ceteros, optici, quia molliores amplioresque. Qui autem affert solent pe-
nis nervi, sensilem cauitatem habentes, non nervi sunt voluntarii, sed ligamenta ab ossibus
orta, nec animalis est, sed naturalis eorum motus. Statuatur ergo interior nervi substantia
mollis & porosa: per eam, non per vasa, excurrere animalem spiritum volumus, his per-
suasi rationibus. Dum apoplexia in paralyfin degenerat, annon à medulla cerebri in ven-
tres, & ab his in sacram medullam nervosque ab ea scaturientes decumbit humor: unde
& spiritui aditus denegatur, & alteratur eius temperies? Quis dixerit in venulas & ar-
terioles influere, easque obstruere: nam & paralytica pars, & interior nervi medulla, &
membranae eam vestientes vivunt: si fluit ergo per illas arterioles vitalis spiritus ad vi-
tam, cur non in easdem influit animalis, vitali multo tenuior? In processu illo mammillari
& medulloso, annon per interiorem eius substantiam feruntur cum aëre, & vapores &
spiritus tenuissimi? Obstructo optico perit momento videndi vis non interceptis arterioli:
extingueretur enim pars, vitalis spiritus radiis non amplius illustrata: ergo affecta medul-
lari substantia. Luxatis vertebriis, resolvuntur infernae partes, quia premittitur sacra medul-
la non arteriole: vivit enim adhuc pars. Calculosis νεφρῶν τοῦ πυρρῶδους καὶ στερομένου, cras i
directo stupore torpet, compressis nervis & musculis flectendo cruri dicatis, qui renes ambo in-
cubant: à compressione autem arteriarum, nihil primò & per se tale contingit. Arteriola,
quae per membranas nervos velantes excurrunt, vitae spiritum nervis affundunt, non sci-
endi movendique facultatem: quia non differunt arteriae nervorum ab aliis arteriis spe-
cie; at alibi animales non continent spiritus. Postremò, ut cerebrum per medullarem sub-
stantiam cerebrum dicitur, estque medulla cerebri, princeps nobilissimi organi pars, memo-
ria, cogitationum rationisque sedes: ita nervi praecipuam partem agnosco medullam, quae
sentientis & motricis facultatis imperium deferi: propterea cerebrum appellat Galenus
octavo de usu partium, nervum amplissimum & molliissimum: nervum vero parvum cere-
brum resiccatum & durius. Quod si interior nervi pars, ut voluit Rondeletius, falcendi
tantum stabiliendisque arterioliis esset dicata, ignobilior haec esset nervi pars. Obiciat for-
tasse argutius quidam, lumbares nervos medullosos non esse, quia sacram medullam non
tangunt: tota enim medulla dum ad dorsi fines pervenit, in fibras & capillamenta abso-
mitur, sed discat ille capillamenta nervorum lumbarium, altius quam à lumbis ortus sui
principia ducere, feruntur enim, alia quidem ad dorsum, alia ad cervicem usque.

LIBER QUINTVS,

ΠΕΡΙ ΣΑΡΚΩΝ, ID EST DE
CARNIBVS, ET VISCERVM, ET GLAN-
DVLARVM, ET MVSCVLORVM.

HISTORIA ANATOMICA.

Quid caro, & carniū differentie omnes.

CAP. I.



HACTENVS earum partium quæ verè sunt spermaticæ, naturam videor explicasse; nunc carnosarum historiam describere placet. Caro, Græcis σὰρξ, multiplicè apud veteres medicos habet acceptionē. Sæpè apud Hippocratem caro idem est quod κνήμια, id est, secundum illud conformationis opus, quo rudis partium quædam adumbratio & moles quasi carnea conspicua est. Sic libro de carnibus genituram septem dierum carnem vocat. ταύτην (inquît) τὴν σάρκα ἐς ὕδωρ ἐμβάλαὼν σκεπτόμενος ἐν τῷ ὕδατι, εὐρίσκεις ἔχειν πάντα μέλεα, id est, hanc carnem si in aquam coniectam attentius contempleris, omnium partium rudimenta habere comperies. Sed nimis ampla & valdè impropria est ea carnis significatio. Est apud eundem Hippocratem pressior & magis propria carnis acceptio; qua muscutorum genus denotatur, vt caro idem sit quod musculus; sic Aphorismo 16. sect. 4. & sectione secunda libri de fracturis, musculos absolutè carnes appellat, quod præcipua eorum pars caro sit, & apertissimis verbis libro de Arte. Quæcunque partes carnem in orbem circumsitam habent, quam musculum vocant, hæ omnes ventrem habent. Interdum caro simplicem eam partem denotat, quæ singulis partibus est peculiaris, quæ villos omni ex parte ambit, colligat, tegit, eos muniens contra natiui caloris futurè omnia populantē, atq; etiam contra æstum, frigus & cæteta foris occurrentia. De carne illa edictū hoc protulit libro de ossium natura admirandus Senex, αἱ σάρκες πάντων ζῴων δεσιν καὶ ζύνταξιν παρέχοντα, id est, Carnes omnium colligationē & constructionem constituit. Nos ex Galeni & recentiorū scriptis, carniū quatuor agnoscimus differentias. Est caro propriè dicta; est caro viscerum: est & caro cuiuslibet parti peculiaris, & caro glandulosa. Caro propriè dicta, pars est mollis, tubicunda, ex sanguine mediocriter reficcato genita, ob id sanguinea pars dicitur & calida; talis est muscutorum caro, quæ vetè & absolutè caro dici consuevit; talis est etiam gingivarum caro, & quæ in glande penis conspicitur. Caro viscerum, Erasistrato σαρξ γαστρικὴ dicitur, quali affusio alluuiæque. Existimauit enim viscerum molem ex sanguine è venis effuso con crescere. Nos propriam esse viscerum substantiam existimamus, & præcipuam cuiusque visceris partem, cui actio primò & per se debeat. Est caro cuiuslibet parti etiam solidæ peculiaris, quæ proprium nomen non habet, sed carnosam substantiam appellare solet Galenus: decimo enim methodi in solidis partibus, duplicem agnoscit substantiam; alteram exquisitè solidam & fibrosam, penitus exanguem; alteram villos infarcientem, quæ propria

Carnis variæ acceptiones. Caro conceptus primū significat.

Caro idem est quod musculus.

Caro cuiuslibet parti peculiaris.

Carnis quatuor differentie.

Quid caro propriè dicta.

Caro viscerum affusio est.

Caro cuiuslibet parti peculiaris.

In solidis partibus duplex substantia.

*Communes
carnis vsus.*

*Peculiari car-
nis vsus.
Carnium scu-
lorum vsus.
Carnis visce-
rum vsus.*

Caro glandosa.

cuiusq; partis caro dicitur: illam resatciri nunquam, sed tigrari & humectari tantum posse putat. Talis in ventriculo, intestinis, œsophago, vesicis, vtero conspicua est. Sic plantis circa lignosæ ac velut nervosæ villos, suam carnem Theophrastus tribuit. Triplicis huius carnis, communes vsus descripsit Galenus 12. de vsu partium, ut scilicet contra æstum, frigus, & cætera fortis occurrentia pariter tueatur. Caro enim omnis cadenti aut cubanti animali sub sterniculum sit molle, dum vulneratur, telis durioribus cedit, dum contunditur sit operimentum penicillis simillimum, æstuante sole præbet umbraculum, vrgente frigore calefacit. Communes hos vsus dixi, quia sunt alij cuiusque carnis peculiates, nam musculo- rum caro, & morum edit voluntarium, & suo infarctu prohibet ne contractus tendo secedat à corpore, & siccitatem nervorum ac ligamentorum à perpetuo motu contractam sua permissione emendat. Caro viscerum. seu stœbe quædam & fartura, tum viscerum vasa firmat; tum spatia horum media opplet, tum actionem aliquam similem eamq; officialem edit, ut suo loco dicetur. Est postremo caro quædam glandosa; sic corpus glandosum in ventre imò ad portas ferè hepatis situm, pancreas aut καλλιπεπας veteres appellarunt; & αἰδέρα id est glandulam definiunt quidam carnem in se conuolutam. Hæ sunt, meo iudicio, carnis differentiz omnes, quatum historiam particularem accuratè & breuiter hoc libro describere institui.

De carnibus viscerum.

C A P. II.

*Caro visceris
quomodo simplè
dicatur.*



A R O viscerum Galeno similis simplèxque existimatur, non missionis tantum ratione; vnam enim parilèmq; naturam omnes etiam minutissimæ eius particulæ obtinent; sed quia nullam in se habet delineationem; vnde à quibusdam Arabibus confusa dicitur. Eam primus Erasistratus παρέγχυμα appellauit, quasi affusionem concretionemq; sanguinis. Rufus interpretatur, τὸ ἐν τοῖς σπλάγχνοις μεταξύ τῶν ἀγγείων πεποιηγός, quod in visceribus inter vasa concretum est. Carnem hanc parui fecit Erasistratus, illiusque vnicum agnouit vsus, ut vasis affunderetur ne cohererent, & puluinaris ac mollioris sub sterniculi instar vas fulciret stabiliretque. Nos præstantiorem huius carnis vsus agnoscimus. Præcipuam enim visceris partem esse volumus, cui actio officialis primò & per se debeat concedi. Sic hepatis carni, tribuenda est hæmatosis primò & per se, venis autem secundariò & per influxum. Pulmonis caro aërem præparat cordi. Lienis caro fœculentum expurgat sanguinem. Renum caro trahit secernitque serum. Itaque caro hæc propriam visceris substantiam constituit. Sola hæc inter cæteras carnes insensilis est, & Galeno teste in arte parua in numerum earum partium debet referri, quæ insitam tantum non influentem facultatem habent. Hepatis caro, rubra est & mediocriter crassa, nec calore tantum suo venarum hæmatosum promouet, non secus ac epiploon, lien & citumiectæ partes ventriculi coctionem iuant: sed propria & insita vi sanguini formam, temperiem & colorem imprimit. Lienis caro est velut παρέγχυμα αἰετιὸν καὶ ἀπογοισιδές, ratum, fungosum & solum instar solidioris spongiæ aut leuioris pumicis, hauriendis excipiendisq; lutulentis & melancholicis succis opportunum. Renum caro rubra est, densa, solida, non multum à cordis substantia differens, nisi quod villis intertextitur nullis; solida autem fuit ne immodica laxitate exceptam vrinam sine-

*Carnis visce-
ris actio prin-
cipalis debe-
tur.*

*Caro visceris
est insensilis.*

*Hepatis caro
qualis.*

Lienis caro.

*Renum caro
qualis.*

De carnibus viscerum, glandul. & muscutor. 171

ret fusiùs elabi. Trahit insira viscerum ab vniuerso corpore, eum sanguini permistum secernit & pederetum instillat in sinus membranosos. Pulmonum caro leuis est, rara, spongiæ similis, & velut è spumoso sanguine concreta; leuis quidem, vt facillè collabi attollique possit, arque ita thoracis motibus promptissimè obsequi; rara & spongiola, vt follis instar aëre inspirato statim repleatur, fumidoque vaporì pariter viam muniat, ad efflandum & expirandum. Caro hæc alteram spiritus vitalis materiam aërem scilicet præparat cordi; non enim extraneus aër, impurus & derepentè irruens fieri poterat interioris spiritus conueniens pabulum; hunc itaque paulatim alterari & familiarem innato spiritui qualitatem longiuscula mora recipere necesse fuit. De cordis carne dubitari potest, an ad parenchymata referti debeat, an ad muscutorum carnes. Galenus neutram esse vult. Parenchymata enim villos non habent, cor villos omnis generis obtinuit. Musculi vnicum villorum genus in eadem patte habent, cor villis omnibus miro artificio textum apparet; muscutorum motus sunt volutarij; cordis motus non est in nostra potestate vt nobis pareat; cordis igitur caro peculiaris est, qualem in reliquo corpore nullà reperiis. Non minor de linguæ carne est difficultas; anguilæ enim ac murenæ in modum variis motibus agitur, per eam tamen fibræ excurrunt nullæ, quò sit vt musculosa dici nequeat: ad parenchymata ego mallem referre.

*Pulmonum
caro cur leuis
& rara.*

*Quid sit cor-
dis caro.*

*De lingua
carne.*

DE GLANDVLIS.

Quid sit glandula, & glandularum differentia. CAP. III.



QUIA veterum quamplurimi glandulam definierunt *συνεχὴν σαρκώδη*, carnem in se conuolutam; ego facilioris doctrinæ gratia, vniuersum glandularum genus, ad carnes referendum existimaui. Glandula, Græcis *ἀδὴν*, pars est simplex, rara, friabilis, spongiæ modo mollis, vasorum diuisionibus firmandis, humoribus superfluis ebibendis, & rigandis quibusdam pattibus à natura instituta. Hanc glandularum naturam expressit eleganter author libelli de glandulis, siue Hippocrates fuerit siue Polybius. *φύσις (ait) αὐτῶν ὅτι ἀπορροῦντες ἀεὶ ὁλοὶ μὲν καὶ πῖνες, natura earum spongiola est: sunt enim rare & pingues*: id autem facillè deprehendes, si multa vi ipsas digitis compresseris, humorè enim oleosum emittet, erumpetq; sanguis, specie albus, velut pituita. Talem autem substantiam obtinuerunt finis alicuius gratia. Vsum triplicem notaui, quem nunc clariùs explicabo. Primus glandularum vsus est, vt vasorum diuisiones firmant: periculum enim erāt, ne vasa per amplas capacitates delata, suisque solis membranis munita, in violētis motibus tanquam rami à truncis diuellerentur, nisi corporibus hisce, tanquam stratis molliusculis fulcirentur. Est ergo glandula in stabilimentum & custodiam vasorum comparata; propterea vbi vasorum apparent diuortia, ibi perpetuò glandulas apposuit natura. Sic in portæ diuisione glandula adest insignis, pancreas vocat; in venarum mesenterij diremptu, glandula penè infinita; in caux ascendentis distributione thymus; in vasis cerebri conarum: in ceruice, axillis, inguinibus, vbi iugulares venæ, axillares & crurales variè diuancantur, glandulae adfunt vasa fulcientes: ideò molles & raræ constructæ sunt: ne sua duritie vasa læderent,

*Glandula ad
carnes cur re-
ferenda.*

*Definitio glan-
dulae.*

*Glandulae al-
bae & pin-
guës.*

*Cur glandulae
rare & spon-
giolae.
Primus glan-
dularum vsus,
est vasa fir-
mare.*

Secundum glandularum usum, humores superflui absorbere.

Demonstratio elegans.

Tertium est, ut partes aliquas irrigent.

Aliud genus glandularum. Glandosa corpora.

Quid inter glandosa corpora intersit.

earumque distentionem dum sanguine turgent, impedirent. Est alter glandularum usus, ut pituitam, serum & superuacuos humores absorbeant cibantque spongiarum modo, ne in nobiliores partes ruat: propterea earum forma rotunda est, oblonga & rara excipiendis fluxionibus opportuna. Hunc usum aperit Hippocrates libro de glandulis his verbis, *ἀποσελῶσι τὴν πλεονέξιν τῶν σωματιῶν*, id est, *reliqui corporis redundantiam auferunt*, estque hoc alimentum ipsis familiare. Quod autem humiditatis expurgandæ causa à natura sint data, ita demonstratur. Et plures sunt, & maiores glandulæ in partibus cauis, iisque præsertim quæ natura sua humidæ sunt & sanguine plenæ, quàm in solidioribus & minus succulentis, ut articulis: sic ponè aures & circa collum ubi sunt iugulares venæ; circa alas, ubi axillaris adest ramus, circa inguina, ubi cruralis apparet vena, glandulæ sunt insignes, trium principum partium, cerebri, cordis, hepatis, superuacua excipientes: quas idè vulgus emunctoria vocat: quæ si afficiantur, aut intumescant, visceris alicuius intemperiem præuiamque *διάλεσιν* denorant. Abscessus (inquit Hippocrates sect. 2. lib. 6. epidem.) veluti glandularum tumores, eorum quidem locorum ex quibus progetminant, ac velut stolones ducuntur, atque etiam aliorum specimen exhibent, ac præcipuè viscerum: & apud Galenū, methodi, ubi prope insignem arteriam aut venam vlcus ortum est, celerrimè bubones exurgunt, id est, glandularum inflammationes. Tertium addidi in definitione glandularum usum, ut partes quasdam irrigent, ne faciliè siccentur, aut ad motum reddatur ineptæ: tales sunt mesenterij glandulæ quædam, quæ intestina madore suo proluunt, laryngis & linguæ adenes saliuam generantes, glândulæ in oculorum angulis sitæ eorum motum iuuantes, & prostatæ illæ in collo vesicæ sitæ, quæ oleosa & velut saliuali humiditate viretram irrigant, ne vrinæ lædatur actio. Hæc glandularum propriè dictarum natura est. Est aliud glandularum genus, quod veriùs glandosum corpus dici debet: substantiam quidem habet similem glandi, raram quippè & laxam, sed ad succos animanti viles generandos est comparatum. Glandulæ simpliciter dictæ, nec venas peculiare, nec artetias, nec nervos obrinuerunt: & apud Galenū ex censu earum sunt partium, quæ facultates tantum insitas habent, non aliunde emanantes: ad glandosa hæc corpora, yasa habent conspicua sensuque pollent exquisitissimo: illæ usum tantum præstant; hæc & usum & actionem. Sic testes apud Galenū glandosa sunt corpora: eorum enim substantia *ψαγε* est *χρὴ σπυγγώδης*, mollis & cavernosa, in qua semen excoquitur perficiturque: sic mammæ glandosa sunt corpora, quibus insita est vis *γαλακτοποικτικὴ*, id est, *lactis generandi*: usum tamen eundem aliquando conferunt, quem & reliquæ glandulæ, vniuersi enim corporis sordes absorbent, quia eadem parte sæpè ad varios usus natura abutitur. Sic renes in numerū glandularum ascribit Hippocrates: & cerebrum ipsum *πικρὸς ὁ δένει, λευκὸς γὰρ καὶ ψαφαεὶς*, simile est glandulæ, album enim & friabile, & eadem commoda præstat capiti.

Præcipuarum vniuersi corporis glandularum brevis enumeratio. CAP. IIII.

Glandulæ in cerebro duæ.

Cinerium.



LANDULARVM infinitus penè est numerus: ego præcipuarum, quibus peculiare nomē inditum est, hoc capite describam. In cerebro duæ sunt nō admodum magnæ. Prior turbinatæ figuræ & nuci pinæ non est dissimilis: *κωνοειδὴ* & *κωνόειον* vocant. Hæc vcnis & artetis in cerebrum fufis, reliquarum glandium instar, pro firmamento esse creditur,

Decarnibus viscerum, glandul. & musculorum. 173

liberum etiam animali spiritui è tertio in quartum ventriculum aditum parat. Altera inter processus clinoides ossis sphenoidis sita & infundibulo substrata, *Gland. pituitaria.* superiorum cerebri ventriculorū superuacua, carne sua porosa & bibula spōgie instar excipit, tandemque per cunei foramina in palatum pederentim instillat, Ponè aures & sub auribus, glandulæ multæ sunt, parotides vocant, vasorum firmandis diuisionibus & cerebri humoribus ebibendis destinatæ, vulgus emuntoria cerebri appellat. In faucium interna regione, quæ *ισθμὸς* ab angustia dicitur, quòd angustissima sit, & varij generis organa cōtineat, glādula duæ apparent amygdalis purgatis similes, *παισθημα* dicuntur & *αμυγδαλές*, vulgus amygdalas & tonsillas vocat. Hæ fauces, os & linguā saliuāli humiditate irrigat perpetuò. Duæ ad laryngis radicem sunt: duæ etiam œsophago substratæ, quæ sæpè ita intumescunt, vt potibus & liquidioribus alimentis viā intercludant, non ite solidioribus: solidiora enim iter sibi parant cōprimendo, liquidiora fungosam glandis substantiā implent magis. Hunc ego affectum in quibusdā obseruauit. Est in caua ascendētis diuisione sub sterno summo, glandula, quā vulgus glandium vocat, Græci *θύμον*, fulciendis & stabiliendis vasis dicara. Sunt & aliæ quāplurimæ in thoracis cavitāte, axillis, inguinibus, brachiis, cruribus, nomine proprio carētes. Posteriori vētriculi regioni & duodeno intestino, corpus glādolum substernitur, quod quia simplicis carnis speciē quodāmodo exprimit, Græci *σπλῆν* & *καλλίπεας* appellarunt. Corpus hoc venę portæ ramos in ventriculum, duodenū & lienem distribuendos amplexu suo comprehendit sustinetque, vt illorum diuicatio inferiore dumtaxat epiploī mēbrana suffulta, reddatur securior. In mesenterio glādulas penè innumeras locauit natura: tū ad vasorum diremptus: tum vt impēdiant ne venarū arteriarūque ductus cōprimātur, vel ab oppletis intestinis, vel à cōpressionē abdominis, atque ita chyli impediatur anādoxis: tum vt intestina madore suo proluant: denique vt sint velut ligamenta vasorum, ne in violentis motibus disrumpantur. Sunt in vesicæ collo iuxta sphincterem glandulæ, prostatæ appellatæ: quæ & semen perficiunt, & asseruant ad necessariōs vsus, & oleosa ac velut saliuāli humiditate vretam irrigant, ne vrinæ lædatur acrimonia. Reliquarū historiam in particulari singularum partium descriptione persequemur.

Parotides.

Amygdala.

Laryngis glādula.

Car. sapt. sili. da. alimenta deglutitūtur, non liquida.

Thymus.

Pancreas.

Glandula mesenterij.

Prostata glandula.

DE MUSCULIS.

Quid sit musculus.

C. A. P. V.



RECIPIVVM superest carnis genus explicandum, in cuius descriptione placet, ob rei varietatem & difficultatem, aliquantulum spatium: tam longè enim latèque se fundit, vt maximam ferè corporis partem constituat: samplissima quippe est musculosa carnis moles, qua si hominis corpus spoliaueris, vt

Carni musculosa præcip. d. s. corp. carnis moles consistit.

in marasmo à febrili incendio omnia populante contingit, iam non viuētis, sed penè emortui animalis, aut potius: resiccati cadaueris imaginē exprimet: qua ratione fortasse ductus Hippocrates, libellū de principiis & natura singularū partium *ἀποτομῆς καὶ σαρκῶν*, id est, *de carnibus*, inscribendum putauit. Carnem hanc in orbem circumsitam musculi nomine dignatur Hippocrates, libello de arte, & vice versa, musculos carnes absolute vocat,

*Carnem mus-
culum vocat
Hippocr. &
musculum
carnem.
Ex musculo
carnis habetur
totius sanctorum
collegitur.*

quod præcipua eorū pars caro sit. Ex carnis musculosæ laudabili habitu, totius corporis sanitatem perfectā colligit in prognostico; & sanos designaturus, carnium, id est, musculorum dumtaxat meminit, aphorismo 16. sect. 4. dū elleborū periculosum esse scribit carnes sanas habentibus. Sunt enim musculi ex earū partium numero, quæ regunt & reguntur: regunt quippè membra, quibus mouendis sunt destinata: reguntur verò à cerebro, per nervos; à corde, per arterias; à iecore, per venas. Itaque si bene se habeant; quod faciliè ex figura eorū naturali florido colore & iusta mole dignoscet; principum partiū laudabilè constitutionem indicabunt. Horum musculorum naturam, differentias, actiones, hoc libro explicare institui. Musculus Græcis *μῦς* dicitur; vel quòd ex coriati murem forma imitetur; vel quòd pisce, què musculum appellat, similis sit. Dicitur alio nomine à Latinis lacertus, à quo lacertosus musculosus significat. Musculi duplex est consideratio; prior structuræ seu cōpositionis; altera officij & vñs rationem habet. Itaque musculi duplex assignari potest definitio. Si structuram spectes, definitur à Galeno in arte parua, caro ex simplici carne & villis nervosis contexta; & libello definitionum medicarū, nervosum corpus carne permixtum. Elegantiùs definiri potest, pars organica & dissimilans, nervis, carne, villis, venis, arteriis & tunica propria contexta. Organicam esse, docet Galenus libro de differentiis morborū, quo loco inter simplicissima & primi generis organa reponit, quia nō cōficitur ex dissimilantibus particulis, sed ex simplicibus. Dissimilantem esse, partium diuersi generis structura indicat. Nervus spirituum & facultatis sunt delatores; caro suo infarctu fibras ne permisceatur prohibet, nervorum & tendinum siccitatem temperat, villos custodit, ne contundantur & rumpantur, spiritus denique animales suo calore ad motum aptiores reddit; fibræ ex ligamentorum minimis particulis variè scissis contextæ, carnes firmant, stabiliunt & custodiunt, ne dissoluatur; venæ velut riuus quidā nutritio- nis solius gratia sunt comparatæ; arteriæ calori conseruando dicatæ sunt; tunice & musculos tegunt, eorūque substantiā continēt, & à vicinis partibus se- parant, & sensum tactus eis præbent. Hæc musculi est structura, omnibus, solis & semper conueniens. Est altera musculi definitio ab officio petenda, quā tradit Galenus primo de motu musculorū. *ὁ πρῶτος κίνησις τῆς καὶ ὁ μῦς οἱ μῦες εἰσὶν, musculi instrumenta sunt motus eius qui fit secundum impetum*, vel musculus immediatū est voluntarij motus organum. Per, *καὶ ὁ μῦς* intelligit id quod Aristoteles vocat *ἐκούσιον*, id est, spontaneum, quod ab interno fit principio, appetite scilicet facultate. Galenus voluntarium vocat, sepe animale, vt distinguatur à naturali, & libro de tremore palp. musculos appellat *τὰ πρὸς αἰσθητικὰς κινήσεις*, organa quæ sponte nostra mouentur. Est autem voluntarius ille motus, què & sedare potes cū vis, & rursus excitare quiescentem, cūque velociore, tardio- rem, rariorem, & frequentiores facere. Voluntas verò duplex statuitur; altera *κατὰ προαίρεσιν*, id est, ab electione; altera *καὶ ὁ μῦς*, id est, ab instinctu; prior vi- gilianrium est; posterior dormiētium, aut aliud quiduis minus attentè facientium illa cum tensione est; hæc contēstionis est quædam remissio: propterea dormiē- tes nec extremas figuras, nec perfectum tonicum motum perficiunt, vt vigila- tes. Huius voluntarij motus, varia quidem sunt organa, cerebrum, nervus, mus- culus; sed vnicum est immediatum. Cerebrum imperat, nervus imperium defert, musculus obsequitur: cerebrum, de obiecto appetibili siue vñle, aut noxium, prosequendum, an fugiendū cogitat, hinc motus principium; fa-

*Musculi nu-
mura.*

*Musculi du-
plex conside-
ratio.
Definitio mu-
sculi à stru-
ctura.*

*Musculus or-
ganus est.*

*Partes muscu-
lorum.*

*Altera mus-
culi definitio,
ab officio.
Explicatio de-
finitionis.*

*Quid sit mo-
tus volunta-
rius.*

*Voluntas du-
plex, ab ele-
ctione & ab
instinctu.*

*Quid inter
voluntarium
et naturalem
motum.*

*Triorganus
motus, cere-
brum, nervus,
musculus,
quomodo.*

cultatem mouēdi defert nervus, spirituum lator; musculus spiritus radiis illustratus, statim contrahitur, partemque variè pro voluntaris imperio immediatè agitat: & ut eques habenis equum impellit; ita vis animæ fictrix in cerebro sedens, nervis, quasi habenis, musculos mouet. Hæc ergo ad motum localem & voluntarium sunt necessaria, quæ ordine se consequuntur, obiectum appetibile, facultas appetens, vis loco moriua, cerebrum, animalis spiritus, nerui, musculi. Est itaque musculus immediatum voluntarij, id est spontanei motus, instrumentum. Quæ contra huius definitionis veritatem affecti possunt, in controuersis explicabuntur.

Quot, & quæ sint musculorum partes.

CAP. VI.



MUSCULORVM partes ita distinguere placet, ut aliæ sint similes, ex quibus rotum musculi corpus coagmentatur, aliæ dissimiles, in quas musculi corpus secundum longitudinem diuiditur. Similes vocatæ particule sunt nerui, fibræ, tendines, caro, vena, arteria. Dissimiles tres statui solent, principium, medium, finis;

seu caput, venter, cauda. Ex similibus miro artificio simul iunctis varièque implicatis organum perficitur motui voluntario destinatum, sed non omnium pars est dignitas, nec omnes eodem gradu ad motum edendum concurrunt. Ut ergo in omni perfecto organo, quatuor partium genera obseruare solemus; primum earum est, à quibus primò & per se editur actio; principatum illis tribuit Galenus; alterum earum, sine quibus actio non fit; tertium per quas melius editur: postremum earum quæ actionem conseruant: ita in musculo, quarum hæ partium differentiæ Anatomico diligenrer sunt aduertendæ. Caro illa fibrosa, præcipua est musculi pars & propria musculi substantia esse creditur Hippocrati & Galeno: talem enim in reliquo corpore nullam reperies; ea deficienter deficit motus; vbi autem villosa hæc caro reperitur, ibi & voluntarius motus: hæc sola moticis facultatis influxum recipere apta natæque est: hæc sola facillè colligit sese, laxat, remittit partem quam trahit: sic viscerum omnium præcipua pars caro esse dicitur. Nerui qui in musculos variè diuariantur, partes sunt sine quibus fieri non potest motus. Sunt enim spirituum animalium latores, & missum à cerebro imperium ferunt: illis sectis, obstructis, refrigeratis, inflammatione obsessis, aut alio quouis modo affectis, perit motus. Ligamenta & tendines actionem reddunt perfectior em: non enim ad motum simpliciter, id est, primò & per se tendo est comparatus, sed secundum quid, ad vehementiores tantum, validiores & continuos motus perficiendos: propterea infiniti musculi tendine carent. Venæ, arteriæ, membranæ, actionem conseruant; venæ enim & arteriæ fugacem musculorum substantiam refarciunt: propterea multæ per carnes sparguntur, quia σάρκες σαλαι apud Hippocratem attrahentes carnes, & sanguinis maior est quàm reliquorum humorum copia, ob maximam musculosi generis molem. Membrana operimenti instar musculus tegit eique sensum tactus largitur. Hæc itaque similium particularum quæ musculus efformant natura est. Torum hoc musculi corpus in tres dissimiles partes diuiditur; caput, ventrem, caudam. Caput sepius neruosum, rariùs carnosum est; fit enim ex ligamentis quæ ab osse oriuntur, sed non omnino insensibile est, ob neruorum insertionem, membrana etiam tegitur peculiari. Venter media est musculi pars, rota ferè carnosæ, maiorem musculi molem constituens: sic γαστρονομία appellarunt tibie pulpam, in qua muscu-

Quæ requiruntur ad localem motum voluntarium.

Partes musculorum.

In omni organo quatuor partium genera obseruantur.

Caro præcipua est musculi pars.

Nerui pars est sine qua non.

Tendines perfectiorem reddunt actionem.

Venæ, arteriæ, membranæ actionem conseruant.

Musculi dissimiles partes tres.

Caput.

Venter.

Cauda.

Tendo ex quibus fiat.

Tendo media
natura inter
neruum &
vinculum.

lorum omnium illius partis media sese tangunt, vt vnicum musculum constituere videantur. Extrema pars musculi, finis, cauda, tendo, *ὑπονεύρωσις* quasi enervatio appellari solet, quod tota ferè sit neruea. Putat Galenus, tendinem gigni ex confusis permistisque neruorum & vinculorum fibris, ita tamen vt plures multò sint ligamentorum quàm neruorum villi, vnde fit vt sextupla & decupla crassitudine tendo neruum excedat. Non poterat ligamentum solum per se & natura sua immobile ac insensibile, motum voluntarium edere; nervus verò ob mollietatem & tenuitatem vastissimas membrorum moles trahere non concedebatur: mixtū ergo ex ambobus aliquod organum creari debuit, quod neruo quidem durius & robustius, vinculo autem mollius & infirmius esset: talis est tendo, mediam inter vtrumque naturā obtinens: vinculum enim sensus acumine superat; à neruo verò plurimum deficit. Tendinem porrò non omnes musculi habuerunt vt lingua, testium, labiorum, frontis, penis, & sphyncteres: sed hi dumtaxat, qui aut validum & vehementem, aut continuum edunt motum. Qui ossium motibus sunt destinati, in tendines omnino, vel maiores, vel minores desinunt: inferuntur autem, non in ossium syntaxin, nec in fines ossis à quo oriuntur, sed ferè in caput ossis mouendi, illud inuoluentes. Qui continuum edunt motum, valido egent motore; ergo & tendine; sic oculorum musculi tendines habuerunt.

Quæ sit musculi actio, & motus musculorum differentia.

CAPVT VII.

Quatuor sunt
musculorum
motus.Contractio,
primarius est
motus &
proprius.Extensio, secundarius
musculi motus.Tertius musculi
motus est
decidentia.

Tremor quomodo fiat.

Postremus
musculi motus
est.

V S C V L I, quatenus animale est organum, actionem vnicam statuimus, motionem scilicet: sed illius motus natura non omnibus est cognita. Galenus cap. 8. lib. primi, de motu musculorum, quatuor differentias motuum agnoscit, ἢ γὰρ συρῆλαι, ἢ ἐκτείνονται, ἢ μεταφέρονται, ἢ τελεαμένοι μὴ κινῶνται, aut enim contrahuntur musculi, aut extenduntur, aut transferuntur, aut tensi manent. Contractio, propria est, & insita musculi actio; dum enim partem mouet, siue flexam tendat, siue tensam flectat, contrahitur perpetuò ad proprium principium, id est caput versus. Esse autem contractionem propriam cuiusque musculi actionem, ex eo patet, quod si musculum transuersum secueris, videbis partem aliam sursum, aliam deorsum contrahi. Extensio secundus est musculi motus, non proprius, sed aduentitius; dum enim contractus musculus extenditur, ab alio laxatur, non à seipso: propterea musculo propè omni, alter actionis contrariæ author est attributus, vt flexori, tensor: adductori, abductor: leuatori, depressor: dum ergo contractus musculus extenditur, antagonistæ motum sequitur: vt extensio, non sit proprius eius musculi qui contrahebatur motus, sed passio potius, quàm actio. Est tertius quidam musculi motus valdè improprius, in quo nec contrahitur, nec laxatur, sed pondere suo decedit, & hoc est μεταφέρονται, id est transferri: motus hic non ab anima est, sed à forma elementari; præ grauitate enim pars spiritus animalis radiis non amplius illustrata, concidit: itaque mouetur pars otiante motrice facultate. Sic tremorem dicebat Galenus fieri ex pari ferè contentione mouentis & moti, facultatis & membri, facultas enim attollit, grauitas deprimat: vt ex ea attollendi & deprimendi vicissitudine, fiat tremor. Postremum musculi motum tonicum appellamus, in quo musculorum fibre intenduntur & tensæ manent, vt videatur quidem immobilis pars, sed tamen reuera moueatur.

mouetur: talis in volantibus auibus, homine stanre, ascendente formica pari impetu per descendentem hastam, conspicuus est. De eo motu Galenus loquitur, dum etiam inquietè musculos agere dicit. Sunt ergo musculorum quatuor omnino motus, duo per se, contractio scilicet & contracti conseruatio, qui ronicus est motus: ea est enim successiuorum natura, vt non minus fiant dum seruantur, quàm cum primùm gignuntur. Et duo per accidens illis contrarij, extensio scilicet & decidentia. Contractio, extensio & motus tonicus, figuras habent, nunc extremas, nunc medias. Extremæ omnes dolorificæ sunt: mediæ, iucundissimæ: extremas, nisi animum intendamus, diu ferre non possumus: medias verò etiam aliud agentes facillè toleramus. Propterea dormientes rarò extremas habent musculorum flexiones & extensiones: sed in alterutrum latus, vt obseruat Hippocrates in prognostico, decumbunt, uturibus, manibus, pedibusque modicè reflexis, quia per somnum animalium actionum robur remittitur, non tollitur omnino. Tonicum etiam ferunt motum dormientes, non contentissimum, vt vigilantes: sed remissiorem, vt in musculis excrementorum vias claudentibus cernere licet, qui propriū munus etiā in profundo satis somno obeunt tonico quodam motu. Cæterum obseruatione dignū est, musculos omnes dum agunt, curuos: dum quiescunt, rectos fieri: quia dum contrahuntur, latiores euadunt & breuiiores, dum laxantur, longiores: excipe abdominis musculos & intercostales: laxati enim & remissa contentione curuantur, quod propter inferioris ventris & thoracis laxam cedentēque vacuitatem contingere puto.

Duo musculorum motus per se.

Duo per accidens.

Figura extrema & media.

Dormientes rarò extremas habent figuras.

Figura musculorum qualis dum agunt & diu quiescunt.

Differentiæ omnes musculorum explicantur.

CAP. VIII.



MUSCULORVM differentiæ, à substantia, quantitate, figura, situ, ortu, insertione, villis, partibus, vsu & actione petendæ sunt. Si substantiam spectes: alij sunt carnosi omni ferè ex parte, vt sphincteres & linguæ musculi: alij ferè toti neruosi vel membranosi, vt qui tibiam abducit membranofus dictus, aut fascia lata. Quantitas dimensionum est: dimensio autem triplex statuitur, longitudo: hinc, alij longi, vt rectus abdominis & tibiæ abductor, alij breues; latitudo, vnde alij lati, vt obliqui & transuersi abdominis, necnon latissimus brachium deprimens: alij angusti, & altitudo, vnde alij crassi, vt vasti duo: alij tenues. Figuræ musculorum sunt multiplices: alij enim murem, alij lacertam, alij raiam piscem referunt. Sunt & trigoni, retragoni, pentagoni, pyramidales, orbiculares: ad hoc genus referre licet deltoidem musculum, rhomboidem, scalenum, trapezium & similes. A situ elegans colligi potest diuisio: situm spectare licet, & in fibrarum situ, & in differentiis loci: à fibrarum situ, alij sunt recti, alij obliqui, alij transuersi. Obliqui ad obliquos motus conferunt, recti ad exactam flexionem aut extensionem. Loci differentiæ secundum longitudinem, supernos & infernos constituunt musculos: secundum latitudinem, dextros & sinistros: secundum altitudinem, anticos, posticos, internos, externos. Internam sedem occupant qui partem flectunt, externam qui extendunt. Si ortum inspicias: alij ab ossibus oriuntur, hi que nunc ex eorum capitibus aut condylis, dum scilicet maiores esse debent: nunc paulò inferius, aut ex glene: nunc ex vnico osse, nunc ex pluribus: alij à cartilaginibus, vt laryngis musculi proprii: alij à membrana tendines obuolvente, vt vermiculares: alij ab aliis partibus, vt sphincteres. Ab insertione, alij in os inferuntur: alij in

Musculorum differentiæ omnes.

1. A substantia.

2. A quantitate.

3. A figura.

4. A situ.

5. Ab ortu.

6. Ab insertione.

7. *Ab uis.*8. *Ab uarietate partium.*9. *Ab usu & actione.*

Ab altitudine uarietate ita differentie.
Prima.
Qui sunt congeneres musculi.
Qui sunt antagoniste.

Theorema de congeneribus musculis:

De contrariis musculis præcipuis.
Secunda differentia ab actione.

Tertia differentia.

cartilaginem, ut laryngis & palpebrarum musculi: alij in membranâ, ut qui oculum mouent: alij in curem, ut labiorum: alij in alia corpora: alij ex pluribus orti partibus, in vnam desinunt partem. Alij ex vnica orti, in plures inferuntur. Villorum contextum si intueatis, omnes ferè musculi vnicum villorum genis obtriuuerunt: sunt tamen quibus duo vel tria fibrarum apparent genera, ut pectorali & trapezio, necnon labiorum musculis, unde varij & diuersi illi motus. Octaua musculorum differentia à variis eorum partibus peti debet: partis autem nomine & musculi præcipuas partes intelligo, & eas quibus insident musculi. Partes musculi tres sunt, caput, venter, tendo. Caput omnibus ferè est vnicum, quibusdâ duplex, triplexq; unde bicipites & tricipites dicti: vter aliis vnicus est, aliis duplex, ut musculo maxillâ inferiorè claudenti & ossis hyoidis, qui ob id digastres & digastrici sunt appellati. Tendo aliis latus & membraneus, aliis teres, aliis breuis, aliis longus, aliis perforatus, aliis non, aliis vnicus, aliis multiplex: aliquando cernere liceat plures musculos in vnâ tendinè desinere, ut in tibia ex gemellis & soleo vnica fir chorda. A partibus verò quibus insident, hæc nomina fortijuntur, musculi, ctotaphitæ seu téporales, tachitæ, seu spinati, & iliaci. Postrema musculorū differentia, & omnium, meo iudicio, maximè necessaria, ab usu & actione petenda est. Actio musculorum est motio voluntaria. Itaque pro actionum varietate, variz etiam erunt musculorum differentie: quas ego ad tres præcipuas refero. Prima hæc est o. Musculi vel sunt congeneres vel contrarij: congeneres eos appello, qui in vnum idemque opus conspirant, ut flexores ambo, extensores ambo, eorum alter dextram, alter sinistram sedem occupare solet. Contrarios siue antagonistas voco, qui contrarias & sibi inuicem succedentes actiones edunt. Musculo enim propè omni, alter actionis contrariæ author est attributus, ut flexori, tensori, leuatori, depressor: adductori, abductor: excipe sphincteres vesicæ & ani, necnon cremasteres. Congeneres illi magnitudine, numero & robore ferè semper sunt pares: antagonistæ verò non semper numero, magnitudine & robore sunt pares: sed pro partis mouendæ pondere aut actionis vehementia multum variant. Sic caput flectentes duo tantum sunt, extendentes duodecim, maxillam claudentes multi sunt, aperientes duo tantum: concidunt enim grauiâ facillimè suo pondere. De congeneribus edictum hoc protulit Galenus. *Quotiescumque musculi congeneres in oppositis partibus sunt pares, numero, magnitudine, robore, vnius resolutio, conuulsionem facit alterius.* De contrariis verò hæc scripsit primo de musculorum motu: *Motuum qui sibi succedunt altero pereunte, necessario alterum tolli. Si enim qui extendit, præscindatur, flectetur quidem pars, sed manebit in eo statu semper, quia extendi amplius non poterit.* Altera musculorum differentia à motus varietate sumpta, est eiusmodi. Musculi alij seipfos mouent, alij alia corpora. Qui seipfos mouent, sunt ani & vesicæ sphincteres: qui aliud mouent à seipsis, vel mouent os, vel aliud quidpiam ab osse. Qui os mouent, in tendines vel maiores, vel minores desinunt: qui aliud ab osse mouent, aliqui habent tendines, aliqui non: qui mouent partes facillè mobiles, nullos habent, quia eorum motus est vehemens, ut linguæ & testium musculi: at oculorum musculi tendines habent, quia oculus continenter motus, valido eget motore. Tertia differentia peculiare respicit motus, qui varij sunt: unde flexores, tensores, attollentes, deprimentes, adductores, abductores, rotatorii, circumagentes, masseteres seu manforij, cremasteres, id est, suspensorij, sphincteres seu constringentes dicuntur.



MUSCULORVM definitus non est apud Aurores numerus, nec facile est certum statuere: alij enim plures, alij pauciores agnoscunt. Sunt qui ex vnico plures faciunt, & illi musculorū numerum augent: sunt qui ex pluribus vnicum constituunt. Nos musculorum omnium syluam & confusionem hoc capitulo in breuē summam contrahemus. Singulis autem fere omnibus propria imposuit nomina Syluius, ab actione, vsu, figura & rei cuiusdā externę similitudine petita, quę quia rem clariū exprime videntur, & memoriā mirum in modum iuuant, in historia nostra retinere placuit. Sunt ergo in vniuersum musculi quadringenti & quinque. Frontis primum duo sunt: palpebrarū sex, tres vtrinque: aperiunt enim eas duo, claudunt quatuor. Oculum, mira volubilitate versant duodecim musculi, sex in quolibet oculo, artollens, depressens, adducens, abducens, & circūagentes duo. Auriculā mouent sex, tres dextrā, totidem sinistram. Nares dilatant duo: occludūt totidem. Labiorum nouem sunt, quatuor mouent sursum, totidem deorsum, est & buccinator. Maxillę inferioris decem sunt, eam sursum, deorsum, antrosum, retrorsum & in latus vtrumque mouentes. Hyoides suspendunt & stabiliunt octo musculi. Linguam anguillę in modum mouent, sursum, deorsum, antrosum, retrorsum & ad latera, decem. Faucium octo sunt, quatuor vtrinque deglutitioni seruiētes. Laryngem dilatant, cōstringunt, aperiunt, claudunt quatuordecim, quatuor cōmunes & decem proprij. Capitis quatuordecim sunt, sex magni & octo parui. Cervicem flectunt quatuor, extendunt totidem. Scapularum motus omnes perficiunt, octo peculiares musculi, quatuor in qualibet; trapezium, leuator proprius, serratus minor & rhomboides. Brachium vtrumque octo musculorum ope mouetur: quorū hæc sunt nomina; deltoides, supra-spinatus, latissimus, rotundus maior, pectoralis, infra-spinatus, rotundus minor & subscapularis. Cubiti vtriūsq; duo sunt flexores: biceps & brachij: duo extensores, longus & breuis. Radij vtriūque duo sunt pronatores, rotundus & quadratus: duo supinatores. Carpum flectunt duo, extendunt totidem. Digito manus, si pollicē excipias, flectunt tres: palmaris, sublimis & profundus: extendunt quatuor, adducunt quatuor, vermiculares dicti: abducūt interossei sex: pollicis nouē sunt musculi, flexor vnicus: extensores duo: adducētes tres: abducētes totidē. Est & peculiaris in minimo digito musculus, eū ab alijs abducens, vt sint in qualibet manu viginti septem. Respiratorij musculi sunt in vniuersum sexaginta quinque: ex quibus triginta duo distendunt, & totidē contrahunt: his additur diaphragma. Intercartilagineos illos vndecim internos & externos nō agnoscimus. Abdominis decē sunt: obliqui quatuor: recti duo, trasuer si duo & parui duo. Dorsum mouent decem musculi, quinque vtraque parte. Ani musculi quatuor sunt, sphincteres duo, & leuatores totidē. Vesicę vnicus est sphincter. Testiū duo sunt musculi, cremasteres dicti seu suspensorij. Penis quatuor. Femur vtrumq; flectunt duo; psoas & iliacus: extendunt tres natiū auctores. Adducunt intrò tres: abducūt sex, obturatores duo & quadrigemini. Ctrurum ergo musculi sunt viginti & octo. Tibiam flectunt quatuor, postici dicti: extendunt totidē, rectus, vasti duo, & crureus. Adducunt duo, longus & popliteus: abducunt vnicus membranofus dictus, vt sint tibiæ viginti duo. Pedem totum, id est tarsum, flectunt duo, tibieus, anticus & peroneus: extendunt quatuor,

Numerus
musculorum
internus.

Musculi sunt
405.
Frontis 2.
Palpebrarū 6.
Oculorum 12.

Scapulum 6.
Narium 2.
Labiorum 9.
Maxillę inferioris 10.

Hyoides 8.
Lingue 10.

Faucium 8.
Laryngis 14.

Capitis 14.
Culi 8.
Scapularum 8.

Brachiorū 16.

Cubiti 8.

Radij 8.

Carpi 8.

Manuum 14.

Respiratorij
65.

Abdominis
10.

Dorsi 10.

Ani 4.

Vesicę 1.

Testium 2.

Penis 4.

Ctrurum 28.

Tibiæ 22.

Pedis 12.

Digitus 21.

gemelli duo, soleus & plantaris. Digtos flectunt duo, sublimis & profundus; extendunt totidem: adducunt lumbrii quatuor: abducunt interossei octo. Pollex flectitur vnico: extenditur altero peculiari: adducitur vno: abducitur altero. Est & peculiaris minimi digiti abductor, vt sint in quolibet pede digitorum motui dicari musculi vnus & viginii. Omnes verò in vniuersum sunt 405. Plures si velis addere aut pauciores facere, non curo.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An musculus voluntarij motus organum sit.

QVÆSTIO I.

Auerrois opinio.



Medicorum opinio de organo motus.

Circulatio motus differentes loci.

Peris organum motus.

Auerrois contra Galenum, musculus non esse organum motus.

Ratio prima. Secunda. Tertia.

Quarta. Quinta.

Sexta.

Septima.

Ostia.

Nota.

Decima.

Undecima.

DE voluntarij motus organo, certant Peripatetici, & Medici. Auerroes cor primum motus organum statuit, quoniam quicquid mouet, ipsum mouetur necesse est, at perenni & perpetuo motu cor agitur, quiescit autem aliquando cerebrum, quiescunt & nervi, est igitur cor primum motus organum, sed huius opinionis leuitas fusiorem hic disputationem non desiderat. Medici nunc cerebrum motus omnis voluntarij organum statunt, nunc neruum, nunc musculum. Cerebrum sensus motusque omnis esse authorem, toties à Galeno est decantatum, vt si non credas, committas piaculum. Nervos motum omnem voluntarium prestare, & scribit Galenus duodecimo de vsu partium, & quotidianus renascentis commonstrat, secto enim, puncto aut affecto nervo, ille sensus musculus sit motus vt & sensus interceptio. Musculum verò motus voluntarij organum esse libris de motu musculorum, validissimis rationum momentis conficit Galenus. Hec Galeni & Medicorum placita, malis pugnantia visa sunt, quæ tamen conciliare non erit difficile. Varia sunt organa motus, varij motus authores, sed ratione planè diuersa. Cerebrum imperat, neruus imperium deserit, musculus obsequitur. Itaque voluntarij motus tria sunt organa; sed unicum est proximum & immediatum, musculus scilicet, quod voluit Galenus, dum musculum voluntarij motus organum definit. Huius rei euident argumentum est, quod nulla pars citra musculi operam, quantumvis nerui presentia illustretur, voluntario creatur motus, ita vt apud Medicos mutuo hoc reciprocet, voluntariè moueri, & musculos habere; per voluntarium autem intelligo spontaneum & proaireticon. Auerroes acutissimus vir Galeni hanc definitionem ratioculis quibusdam oppugnare contendit. Lumbriorum (ait) & insectorum motus, spontanei sunt, qui tamen sine musculis perficiuntur. Lingua iussu & sponte nostra exeritur, at nullus musculus in lingue extremum extrinsecus inseritur, qui foras rapiat linguam. Quinetiam inflatur coles, mouetur ventriculus & sæpè oberrat per ventrem uterus, sine musculo. Hec Auerroes; quibus validiora rationum momenta liceat adicere. Brachium sponte nostra in orbem mouetur, at nulli sunt circulares in brachio musculi. Flectitur & curuatur tota dorfi ac lumborum spina voluntario motu: at flectentes spinam nulli sunt musculi: sed & voluntariè moueri & musculos habere, non reciprocari hac docent. Quod Hyoides os, octo musculos habet, qui tamen motum nullum prestant. Quadrupedum oculi septimum habent musculum, neruum opticum ambientem, qui planè est immobilis, sex enim tantum sunt oculorum motus, recti quatuor, duo obliqui, septimus ergo non mouet, sed firmat, est que non motui, sed quieti potius destinatus. In aurium ductu & ossiculis tribus, musculi apparent perexigui, veteribus incogniti: at inuiti audimus. Accedit quod respiratio musculorum perficitur opera: at dormientes respiramus, dormientium autem nulla est voluntas, electio nulla: sed & mouentur dormientes quamplurimi: nam Galenus se integrum stadium confecisse scribit, nec à somno priusquam in lapidem impegisset excitatum. at per somnum animales & voluntaria omnes actiones feriantur ac cessant: adde quòd voluntas omnis à cognitione est: voluntarius ergo

De carnibus viscerum, glandul. & muscutor. 181

motus cum cognitione finis coniunctus esse debet: at musculorum motus saepe est sine ulla cognitione. Pueruli enim & bruta motus edunt sine cognitione. Postremo, cor musculum vocat Hippocrates libello de corde: sed cordis motus in nostra voluntate non est ut nobis pareat: non debet igitur musculis voluntarij motus organum statui. Hæc multis fortasse satis valida videbuntur, quæ tamen ego leuissima esse iam demonstrare aggredior. Exanguis & insectilia imperfecta esse norunt omnes, quæ ut sine ossibus stant, sine liene melancholicum succum expurgant, ita sine musculis voluntariè moueri nihil prohibet. Lingue corpus musculum esse existimarunt quidam, propterea anguille ac murænâ in modum variis. & penè incognitis motibus agitari: ego mollem quidem, carnem & fungosam spongia instar lingua substantiam agnosco: verum cum fibris nullis sit intertexta, musculum esse non puto, sed variis ac diuersis musculis agitari, è quibus duo linguam exerunt, Auerroij parum subtili Anatomico incogniti. Motus ventriculi planè naturalis est; penis verò inflatio, partim naturalis, partim animalis: naturalis, ratione nervi utrimque cavi: animalis, ratione musculorum quatuor, nervos distendentium. Brachij circularis motus, à nullo quidem peculiari & simplici musculo perficitur, sed ab omnibus successivè brachium moventibus; quia circularis motus simplex non est, sed ex omnibus relictis & obliquis compositus: deltoides sursum, rhomboides retrorsum, latissimus deorsum, pectoralis antorsum movent. Spinam flectentes nulli à veteribus describuntur muscoli, quia thoracis vertebrae secundum naturam, ut exprimit eleganter Hippocrates libro de fracturis, intro curvatae sunt, tum in viscerum contentorum, pulmonis quippe, cordis, hepatis gratiam; tum quòd figura hæc nullis opem ferentibus musculis sponte satis ad flexionem sit proclivis. Nos tamen peculiare musculum agnoscimus. Accedit corporis gravitas, humana enim corpora in anteriorem partem tantum curvantur, quantum qui spine dirigende præfecti sunt muscoli, sue actionis remisierint. De hyoide an moveatur, dubitari posset: sed demus esse immobilem: musculos ad symphysin tantum comparator volumus. Etenim cum ossa per ἀρσπον ant σφύγγων connectantur, nulla autem sit ossis hyoidis articulatio, quia nullus cum ossis contactus: debuit per vincula quadam vicinis partibus connecti & alligari; vincula hæc decuit esse carnea, molliorque, ne œsophagus, arteriam asperam, ingulares venas, arterias carotides, nervum sextæ coniugationis, musculos denique laryngis & lingue duritie sua premerent, colliderentque. Septimus quadrupedum musculus opticum ambiens, oculum dum firmat, movet motu tonico: intenduntur enim illius fibrae, & in quiete etiam (inquit Galenus primo de motu musculorum) moventur partes, ut in tetano & aubus volantibus. Si hæc non arrideant, dic musculum opticum ambientem non propriè musculum esse, sed carnem tantum simplicem fulciendo & stabiliendo optico appositam, qualis est gingivarum caro. Musculorum, qui in aurium ossiculis adsunt, usum non alium agnoscunt Anatomici, quàm ut malleoli capituli ab incudis cōtactu & articulatione separet. De respirationis natura suo loco disputabitur: sufficiat hic annotare, voluntatè duplicè esse: alterâ κατὰ φύσιν, id est, ab electione, alteram κατὰ ὄψιν, id est, ab instinctu: prior vigilantium est: posterior dormientium. De motu dormientium, respondet Galenus primo de musculo- rum motu, non otari omnino per somnum animam, sed contentiois remissionem potius quādam esse, quæ animalium functionum robur remittitur, non tollitur omnino, aut cessat. Quæ de motibus puerulorum & brutorum obijciuntur, ita solvantur à doctissimo Scalige- ro, voluntatem infantium & brutorum ab instinctu esse: eadem enim est vis quæ servit ani- mæ ad corporis commoda, & quæ conatam habet speciem suæ conservationis. Dum cor musculum vocat Hippocrates, abusive loquitur: non enim musculi esse vult nervo & fibris nervi: sed carne tantum, id est carnis substantia & colore. Maneat igitur inuicta & stabilis Galeni opinio: motum omnem voluntarium à musculo perfici, tanquam immediato organo.

Duodecima.

Rariorem singulis scripsi. Prima.

Secunda. De lingue motu.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Septima.

Octava.

Nona.

Decima.

Undecima.

Duodecima.

Quæ musculi pars princeps motus causa statuenda sit, ratione,
tendo an neruus.

QVÆSTIO II.

Musculi partes, quatenus animale est organum.

Tedo primum
motus organum
Galenus.

Neruus princeps
musculi
pars.
Auctoritatis
vera.

Nos carnem
fibrosam princi-
pem musculi
partem agnos-
cimus.

Tendo non ad
motum simplici-
ter est com-
paratus.

Neruus im-
mediatè nos
mouet.

Auctorita-
tes veritas, do-
centes carnem
principem esse
musculi par-
tem.



MVSCVLVS quatenus animale est organum, tres habet motuius-
seruientes similes particulas, neruum, tendinem, carnem: totidemque
dissimiles, caput, ventrem, caudam. Quoniam verò, ut iam demon-
stratum est, in omni organo, similis quadam statuenda est pars, quæ
actionis causa sit princeps: cui harum trium principatus sit deferendus,
breuiter inquirendum. Galenus hac in re non satis sibi constare videtur: capite tertio libri
duodecimi de vsu partium, tendinè primum statui motus organum: musculum verò illius gra-
tia constructum esse. ὁ μὲν γὰρ τέλει (ait) τὸ πρὸν ὅλον ὅτιν αὐτὸ τῆς κινήσεως ὄργανον.
Quam sententiam sequutus est doctissimus Veiga, commentarius in artem paruiam: quo lo-
co tendinem, ligamentum appellat durum: vipote ex osse ortum: rotundum, gracile, robu-
stissimum & maximè proclue, vi sua sponte contrahatur: licet duo hæc maximè distingua-
tur: est enim ligamentum infensile, tendo exquisitissimi sensus. Interdum principem musculi
partem neruum agnoscit Galenus, cap. quinto libri de plenitudine. Neruorum (inquit) fi-
bre per musculum disperse, primæ sunt quæ mouent, & duodecimo de vsu partium, musculus
partim naturalis est organum, partim animalis: naturalis, quatenus vena & arteria consistit,
animalis, quatenus neruo participat, à quo hoc habet, ut motus voluntarij instrumentum sit.
Octauo de Anatomicis administrationibus, commune esse vult omnibus musculis, ut si æteri
ledantur, totus musculus statim motu priuetur. Duodecimo de vsu partium, scribit nerui
vsu esse, ut missum à ratione imperium deferat, motusque principium præbeat. Ego, ut
tendinem, nec neruum principem musculi partem esse puto, sed carnem fibrosam: tendo enim
non ad motum simpliciter est comparatus, sed secundum quid, id est, ad validiores motus &
graviore artus agitando: propterea non omnes musculi tendines habent, ut docet Galenus
capite tertio libri primi de motu musculorum: nam ferè omnes laryngis & lingue musculi,
sine tendine mouent, ut ani ac vesica sphincteres: sed hi dumtaxat, qui aut validum & ve-
hementem, aut continuum edunt motum: sed neque neruus princeps motus organum statui
debet, quia moueret ubique: at in ventriculo, intestinis & visceribus non mouet: deinde
exilior est neruus, quam ut contractione sua partem mouere possit. Quod si obiciat in con-
uulsione contrahi musculos, exhaustis, aut nimium oppletis neruis. Respondebo, inuoluntari-
um esse motum, neque neruos tantum, sed etiam carnes exaruisse: nam si ad eam siccitatem
peruenierit corpus, quæ neruorum humidum exhauriat, carnes prius exaruisse necesse est. Quid si
conuulsione non tam ab exhausto & repletionem fieri dicamus, quam à vitiatæ imaginatione.
Postremo, obliqua & flexuosa est nerui in musculum insertio, quæ contractionem tractu
organo necessariam moliri non potest: adde quod per vniuersum musculi corpus ramulos
non spargit: sed nunc in ventrem tantum, nunc in caput, alias in tendinem. Sola igitur ca-
ro princeps musculi pars & motus causa statui à nobis debet. Hoc mirus Hippocrates satim
indicasse videtur, dum musculos absolute σάρκα, id est carnes appellat: libello enim ἀπὸ
τεχνῆς, ὅσα γὰρ (inquit) τῶν μελέων ἔχει σάρκα ἀεικέρεια, ἢ μὴν καλεῖται,
πάντα νδὲν ἔχει, id est, quæcunque partes carnem in orbem circumlitam habet,
quam musculum vocant, hæc omnes ventrem habent: carnem ergo musculum ap-
pellat. Libro de fracturis & de articulis, musculos carnes vocat, & quarto Aphorismorum,
carnes sanas habentibus, id est musculosum genus, helieborum periculosum esse scribit.
Hoc voluit etiam Galenus. Nam decimo methodi scribit propriè & simpliciter vocatam
carnem eam dici, quæ in musculo est: quinto de locis effectibus, rectos abdominis musculos à
nullo musculo, id est carne regi asserit, quos tamen tendine & aponeurosi obliquorum regi

nemo negat: libello de ossibus eam symphyseos speciem, quæ sit per musculos, vocat συνσφύσεων; capite § 9. artis parvæ, frigidis & siccis corporibus, adipem per carnes dispergi vult, non per tunicas: intelligit autem per carnes, musculos, qui propriis teguntur tunicis: eodem libro propriam musculi substantiam vult esse carnem fibrosam. Olim pestilente cæli constitutione, quoddam ulceris genus vagabatur, quod solam musculorum carnem excedens depulabatur, intactis venis, arteriis, nervis, & tunc (ait Galenus) demebatur partis motus. Sed missis gravissimorum virorum autoritatibus, sententiam nostram rationum momentis illustremus: Nulla est in animali particula, quæ citra carnem fibrosam voluntariè moveatur, moventur autem quamplurimæ sine tendine; & ubicumque fibra adfuit carnosa, ibi etiam voluntarius est motus: quod de nervo nemo dixerit: nam insignes à sexta coniugatione nervos accipit ventriculus, quem tamen voluntariè non moveri norunt omnes. Tota quadrupedum serè omnium, ut boum, equorum, & canum, cutis περὶ ἀνελπίκως, id est sponte movetur, quia panniculo, fibris carnosus omni ex parte texta, adheret. Hominum cutis planè est immobilis, quia nervosus quidem, sed non carnosus eorum est panniculus, quod veteres non observarunt. Sola faciei & frontis cutis iussu nostro movetur, quia musculosa, id est, carnea ea parte tantum est cutis. Vesica urinariæ cervix quia carnosa, musculi sphincteris vicem gerit, & urinam ad tempus retinet; eadem est sphincteris ani ratio. Galenus eam cuiusque organi principem partem habendam censet, quæ organo peculiaris est, quam alibi reperire non licet; at caro musculosa hic tantum invenitur, nervi ubique sunt & ligamenta: est ergo caro princeps musculi pars. Aristoteles tertio de historia animal. carnem vult esse præcipuam partem cuiuslibet instrumenti. Sic cerebri caro spiritus gignit animales, arteriæ preparant tantum: hepatis caro sanguini ruborem & formam imprimit: testium caro glandosa semini vim prolificam concedit: pulmonis caro aërem preparat cordi: renum caro serosum humorem trahit, feceruntque. Musculorum itaque caro motum edit voluntarium. Ceterum dum carnem principem motus causam esse dico, non eam quæ cuiuslibet parti peculiaris est, intelligo: ita enim partes omnes spontè nostra moverentur, sed veram & propriam tantum, quæ tomenti modo fibræ nervis impacta à nervica substantia distingui non potest, ut fibrosa sit caro: propterea Galenus passim propriam musculorum substantiam vult esse carnem fibrosam: caro enim custodi fibras ne contundantur & rumpantur, fibra verò custodiunt carnem, ne dissoluatur. Huius iam videor sententiam nostram satis confirmasse. Vnicum pro quæstionis coronide superest agendum: cur carni potius quàm reliquis partibus facultas hæc movendi insita sit. Facultatem animalem à cerebro per nervos influere certissimum est: facultas hæc τὴν ἐνδεξιαν, id est fuscipientis partis aptitudinem postulat: sic ossa ob duritiem & soliditatem ad sensum inepta sunt, & molliæ puerulorum corpora ad motum ineptissima: sola caro motricis facultatis influxum recipere apta natæque est: quia ad motum, maiore spirituum eorumque calidorum copia & illustratione quàm ad sensum est opus: cum movere apud Philosophos sit agere, sentire autem quoddam pati: at fibræ carnosa, nervosis exanguibibus multò sunt calidiores: ergo & animales spiritus calefaciunt, & ad motum aptiores reddunt. Accedit quod caro fibrosa, facilius colligit sese, laxas, remittit partem, quàm trahit. Sunt alij carnis usus quàm ad motum, à Galeno & recentioribus assignati: primus, ut sit internis visceribus partibusque propugnaculi vice. Caro (inquit Galenus cap. 3. libri 12. de usu partium) cadenti, aut cubanti animali, sub sterniculum sit molle, dum vulneratur telis durioribus cedit, secantibus resistit, aestuante sole præbet umbraculum, urgente frigore calefacit: denique viscera ab externo tutatur. Est alter carnis usus, ut suo infarctu prohibeat, ne contractus tendo secedat à corpore. Tertium agnovit Alexander, ut siccitas nervorum & ligamentorum à perpetuo motu contracta, permissione carnis emendetur.

Retinens id confirmatur. Prima.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Caro cuiusque partis præcipua est organi pars.

De qua carne hic intelligamus.

Cur carni facultas movendi insita sit.

Alij carnis usus explicantur.



LIBROS de musculorum motu edidit diuinus Galenus, in quibus mirabilis sese extulit eruditio. Hunc tamen nescio quo studio contradicendi, magnus ille Vesalius ubique carpit, imò discerpit. Arguit in primis Galenum, quòd dixerit libro primo de musculorum motu, mixtam esse naturam musculorum, mediàmque inter ligamentum & neruum. Ita enim scribit

Galenus. Eadem tendonibus quæ musculis contingunt passionēs; mixta autem quædam ipsorum natura est & media inter ligamentum & neruum. Sed mentem Galeni non est assequutus; postremum enim hoc ad tendines non musculos referri debet. Aperit suam nobis diuoriam paulo infra his verbis. Quod quasi mixta quædam natura tendinum sit ex ligamentis & nervis dictum est à nobis. Accusat secundo Galenum, quòd dixerit vndecimo de vssu partium, musculos omnes in tendines desinere. Sed non videt Galenum de illis tantum loquantur, qui mouent ossa; nam primo de motu musculorum multos enarrat qui tendine ce-
rent. Musculi (ait) alij seipsos mouent, alij alia corpora. Qui seipsos mouent, sunt aut & vesica sphincteres, à quibus nullus nascitur tendo, qui aliud à seipsis mouent, aut os mouent, aut aliud quidpiam ab osse, qui os mouent, in tendines omnino, vel maiores, vel minores terminantur. Qui aliud ab osse mouent, ita se habent, vt aliqui habeant tendines, aliqui non. Tertiò Galenum arguit, quòd tendinem primum esse organum motus voluerit, cum tamen caro fibrosa præcipua sit musculi pars. Respondeo, in his musculis qui tendinem habent, tendinem primo mouere, non tamen esse motorem primum; tendo enim cum sit finis musculi, prius partem mouere creditur, quàm aut venter, aut caput. Postremò in particulari musculorum historia multa à Galeno inconsideratè scripta exclamat Vesalius, vt brutorum patius, quàm hominis musculos descripsisse videatur. Ego sanè multa à Galeno prætermissa, aut non ita accuratè expressa non inficior; homo enim fuit; humanum autè est errare, ignorare, labi: sed eadem in Vesalium iacula liceat retorquere. Dum enim laryngis, epiglottidis & oculorum musculos enarrat, non humanos, sed bouinos describit, vt obseruat acutissimus Fallopius: nam nec septimus ille musculus opticum ambiens, in humano oculo apparet; nec musculi illi epiglottida aperientes aliisque quam plures laryngis proprii, reperiuntur. Sed & in particulari musculorum historia, multa ab eo sunt omissa, multa etiam non ita accuratè expressa, quæ aperuit Fallopius.

HISTORIA ANATOMICA.

De musculis faciei, ac primum de musculis frontis.

CAP. X.



FACIES ea quæ caluæ subest, pilis orbatâ, Latinis facies, Græcis πρὸς ὤματα dicta, nomine à re ipsa accepto, quia πρὸς ὤματα ὅρατα, externorum sensuum organa concludens, animique affectus exprimens, musculosa: primum cutis opera, deinde propriorum musculorum ministerio varios còsque mirabiles edit motus.

Musculosam faciei cutem dico, quia membrana illa neruosa, carneis fibris conferta, toti faciei cuti ita adhæret, vt vix ab ea separari possit; propterea cum in reliquo corpore cutis planè sit immobilis, in facie sola πρὸς ὤματα κινῶν, id est sponte nostra mouetur. Musculosam hanc membranam, μὲν ὠδὲς πλάτυσμα, id est musculum latum peculiari nomine vocauit Galenus, qui equitantium capitiò similis est, si eius tantum auferas, quantum pileolo tegitur; faciem enim propè totam & collum tegit. Ab hoc solo, faciei cutem totam moueri existimauerunt veteres; sed à recentioribus

Calumnia
Vesalij in Ga-
lenum.

Male Galenū
arguit.

Altera Ve-
salij in Gale-
num accusa-
tio.

Defensio Ga-
leni.

Tertia calum-
nia.
Depulsa.

In peculiari
musculorum
historia multa
ignorasse Ga-
lenum ait Ve-
salius.

Excusatio Ga-
leni.

In musculis etiam
errauit Vesal-
ius.

Facies vnde
dicta.
Facies quomo-
do moueatur.

Musculosa fa-
ciei cutis quid
sit.

Musculus la-
tus.

De carnibus viscerum, glandul. & musculor. 185

recentioribus paulò accuratiùs singula inspectantibus singulis faciei partibus peculiares muscoli sunt concessi, quos ego describere iam aggrediot. Prima faciei pars μέτωπον seu frons dicitur, in cuius fine sunt supercilia, quæ pro diuersis animi affectibus nunc attolluntur, nunc submittuntur. Debuir autem moueri frons propter oculos, quia & multum aperiri eos oportebat, cum externa multa vno & eodem tempore intueri conanrur, & rursus dum clauduntur, cogi. Huic motui præter membranam illam carnosam, dicati sunt duo muscoli, qui à superioribus partibus, in quas capilli desinunt, orti, in inferiores inferuntur, frontemque ac supercilia attollunt. Eorum fibræ obliquæ non sunt, vt voluerunt quidam, nec vt cutis rugæ transuersum situm obtinent; sed rectà deorsum feruntur. Duo autem sunt in medio aliquantulum disiuñcti; nam quoties vehementer commouemur, aut miramur, cutim in media fronte contrahimus & corrugamus, vt sese supercilia mutuo tangant, quæ cutis contractio non fieret, si vnicus esset musculus.

Frons cur debuit moueri.

Duo musculi frontis.

De musculis palpebrarum.

C A P. XI.



PALPEBRÆ quia sunt oculorum tegumenta & folia, ὀμμάλιφύλλα καὶ καλύμματα, necessariò moueri debuerunt, vt oculum aperirent & clauderent. Clausi enim oculi visilium imagines nunquam susciperent; aperti verò & ab extrinsecus occurrentibus tuti non essent, & citò deprauarentur; quia spirituum luminisque interni maxima fieret dissipatio; vicissim ergo, prouires postulabar, & aperiendi erant, & occludendi. Palpebræ autem & si duæ sint, vnicam mobilem fecit Natura, superiorem scilicet. Quid enim inferioris motu opus erat, cum per superioris motum ad inferiora claudatur, & per motum eiusdem ad superiora aperiatur oculus? Mouetur ergo superior palpebra sursum & deorsum; sursum vnus musculi ope, qui ab interiore orbita, ab eodem ferè principio, à quo ille qui oculum sursum mouet, enatus, & in tendinem satis latum desinens, in palpebræ superioris rarfum inseritur, palpebramque attollens, oculum deregir. Claudunt palpebram duo muscoli; alter ab interiore angulo ortus, totum circumdat cilium sphincteris instar; alter ab eodem angulo & nasi radice extrusus, in tarsum inseritur.

Palpebra cur moueri debuerunt.

Superior sola mobilis.

Aperit palpebram vnus musculus.

Claudunt palpebram duo.

De musculis oculorum.

C A P. XII.



CVLII cum sint veluti exploratores, interdum nocturne nobis excubantes, & ad hoc dari animalibus, vt quæ utilia sunt prosequantur, & fugiant quæ nocitura videntur, in omnem partem moueri debuerunt, vt aspectum quocumque vellent facillè conuerterent. Musculi ergo sex vndiqueque oculum mira volubilitate versant; vnde à Poëta faciles appellatur. Ex his, quatuor sunt recti, motibus tectis præfixi, & duò obliqui. Rectorum, primus sursum, alter deorsum mouet, tertius ad scquam, quattuor ad dextram trahit. Horum quatuor non dissimilis est structura, nec ortus principia multum à sese distant. Oriuntur enim omnes ab vno ferè & eodem principio, ab interiore scilicet & profundiore orbita, quam sphenoides portiuncula constituit; hinc in varias adnatæ runicæ partes lato satis neruosoque tendine inferuntur. Habuerunt aurem tendines, etiam si exiles sint admodum, ob continuitatē motus, quia oculus frequentet motus ro-

Cur oculi varietate moueri debuerunt.

Sex oculorum musculi.

Quatuor musculi recti.

Eorum ortus.

*Errat quorū-
dam de ortu
horum mus-
cularum.*

*Obliqui duo
musculi.*

*Trochlea Fal-
lopij.*

*Septimus mus-
culus in ho-
mine non in-
venitur, sed
in quadrupe-
dibus tantum.
Nomen mus-
cularum sex.*

busto eget motore. Errant ergo, qui musculos oculi ab interiorē mēbrana, eaque crassa opticum ambiente, enasci putant. Hoc enim sensui omnino adversatur. Neque verò à membrana debuerunt, aut potuerunt enasci; non debuerunt, quia membrana exquisitissimi sensus nervum circumdat; itaque musculi in monibus suis nervum comprimerent & visioni obessent: non potuerunt, quia firmæ non adhererent basi. Quatuor hi si omnes simul agant intrò oculum trahunt sistuntque. Obliqui duo, versant & circumferunt oculum obliquè; alter superius; alter inferius. Prior ab interiorē orbita ortus, vt superiores quatuor, ad angulum maiorem fertur, ibique in chordam gracilem veteribus incognitam, à primo Fallopio eleganter descriptam definens, eam trochleæ obuoluit, tandēque in lateris coniunctiæ obliquè inferitur. Trochleam voco cartilaginem, quæ canalem habet per quem currit dicta chorda, & ligamento membraneco ita ab angulo penderet, vt trochleæ speciem omnino referat. Musculus hic dum intrò ad principium trahitur, chorda sua, circulari quodam motu oculum ad maiorem angulum obuoluit. Posterior ab interiorē angulo & ea rima quæ duo maxillæ ossa iungit ortus, ad exteriorē angulum oculum transuersim amplexatus, inferitur; hunc ab oculo oriri & in oculum inferi existimauit Columbus, sed decepit eum fortasse musculi huius obliquus & ferè latens inter alios situs. Septimus, quem describunt ferè omnes Anatomici, & Vesalius etiam, nervum opticum ambiens oculumque firmans ne exorbitet, in quadrupedibus tantum, quæ prona terram spectant, reperitur; in homine nunquam. Sunt ergo sex tantum oculorum musculi, quibus singulis artificum filij nomina indidere. Primus attollens & superbus dicitur, secundus deprimens & humilis; tertius adducens & bibitorius; quartus abducens & indignatorius; duo obliqui circumagentes, circulares, amatorij, quòd sint velut in amore duces.

De musculis aurium.

CAP. XIII.

*Musculi au-
rium tres.*

Primus.

Secundus.

Tertius.



A VRES vni homini ferè semper immobiles sunt; si quando tamen eas moueri contingat, vt in quibusdam obseruau, exiguum musculorum opera id fieri existimandum. Primus anteriore parte situs, à fine extremo & superiore musculi frontis ortus in eam auriculæ partem definit, quæ ἀσπίδιον dicitur; trahit auriculam ad superiora & anteriora. Alter ab occipitio oritur, angusto principio, & latior euadens, posteriori auriculæ inferitur, eamque ad posteriora trahit. Tertius portiuncula est latissimi & cutanei illius musculi qui ad aures vsque excurret.

De musculis narium.

CAP. XIII.

*Nares cum de-
buerint ma-
nere.*



*Dilatant na-
sum duo mus-
culi.*

QUIA per nares odorum omnium species ad cerebrum feruntur, inspiratur etiam ad cerebrum aer ad animalis spiritus generationem, tandēque per nares mucosa cerebri illuuius expurgatur, vt & commodius emungi, & facilius inspirantibus ac expirantibus nobis dilatari, & ad odores fædos arcendos celerius occludi possent, voluntario motu & dilatari, & constringi debuerunt. Dilatantes nasum, duo sunt musculi; vnus utrinque, à fronte acuto carnosoque

principio exorti, qui latiores facti, ad narium *πτερύγια* seu pinnas feruntur, trianguli formā ferē exprimētes. Constringuntur occludunturq; nares duo, labiorū musculi continui; unde fit, vt quoties per nares aliquid trahimus, superius labium constringere cogamur. Quem porro in narium parte interna describit. Vesalius constrictioni dicatum, nobis adhuc videre non licuit, vt neque Columbo ac Fallopio; merum ergo figmentum est.

Occludit duo.

*Vesalius inter-
nus musculus
non reperitur.*

De musculis labiorum.

CAP. XV.

QUAE Vtrumque labium, constringi, laxari, contrahi, distendi, deflecti, ac tandem eò conuerti oportuerat quocumque vel edentium, vel bibentium, vel loquentium, vel aliud agentium vsus postulabat; sagax & prouidēs Natura, labiorum substantiā ex cute & musculis mirō artificio cōfusus permixtusque cōposuit, vt musculosā ea cutis, vel musculus cutaneus appellari possit. Fuerūt veterū & iuniorū quāplurimi, qui solius musculi lati opera moueri utrūque labium voluerunt, cuius fibrę quia variē sunt implicatę, varios etiam & contrarios edunt motus. Sed obseruati sunt ab artificibus, peculiare labium vtrumque mouentes musculi, quorum numerus apud eosdē incertus est. Ego vtrumque labium & sursum, & deorsum moueri obseruo; ac labiū quidem superius mouēt sursum, duo musculi, qui à malo orti carneo principio, obliquē descendunt, & in labij superioris latera inseruntur; deorsum mouent totidem, à mento in idem labium delati. Inferius labium sursum mouetur, duorum musculorum opera; qui ab osseo ambitu oculi & malo orti, in labium inferius obliquē inseruntur. Deorsum mouēt totidem, à mento in idem labium inserti. In his octo musculis duo fibrarum genera obseruare licet, externas scilicet, & internas. Internę labia intrò contrahunt, externę retrahunt. Adest postremò musculus quidā sphincteris modo buccas circūdans, buccinato rem dicūt, quem plerique maxillę inferioris musculū esse putāt, sed malē. Oritur à summis gingiuis & in gingiuas summas terminatur, circuli instar variis fibris intertexus, totam quam inflamus buccatum regionem cōplectitur. Hunc musculum leuiter attingit, quę oris amplitudinē inuestit, tunica, tam validē illis partibus connexa, vt numquam illacera auelli possit. Huius officium est, cibum nūc huc, nunc illuc propellere, vt à dentibus atteratur, dein ad tubarum modulationem eas partes inflare.

Cur Labia moueri debeant.

Labium cutis musculosū est.

Labium superius mouent sursum duo musculi.

Deorsum totidem.

Inferius labiū sursum mouent duo.

Deorsum totidem.

In musculis labiorum duo fibrarum genera.

Musculus buccinator.

De musculis maxille inferioris.

CAP. XVI.

EX DVABVS maxillis, superiorem, in homine & ceteris animalibus immobilem esse, exceptis psitaco ac crocodilo, iam demonstratum est; fuisse enim illius morus, & naribus odores excipientibus aerēque inspirantibus, & oculis maiore circulo inspecturis, impedimento inferior ergo, ad secandos, frangendos, minuendosque cibos, & ad vocis articulationem necessariò moueri debuit. Sunt autem maxillę inferioris simplices motus omninò sex, sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrorsum, antrorsum, retrorsum, qui omnes musculorū opera perficiuntur. Maxillā mouent sursum, id est, eam claudūt, quatuor musculi: duo vtrinque, temporalis scilicet, & in ore latitans. Temporalis aut crotaphita,

Superior maxilla cur immobilis.

Maxilla inferior cur debuit moueri.

Maxilla mouetur sex. Claudentes maxillam duo musculi.

*Temporalis
musculus.*

*Dignitas il-
lius musculi.*

*Observatio
pulcherrima.*

à tora temporum cauitate, lato, carnoso & semicirculari principio enatus, sensim gracilefcens, & sub offe iugali delatus, netueo & validissimo tendine in apophy- sen coronoidem inferioris maxillæ inseritur. Musculus hic præstantia & dignita- re reliquos omnes superat: propterea ad illius tutelam mirabili artificio vsa est Natura. Primum enim crassa & dura membrana, pericranio scilicet eum velaui- nam interior musculi pars, quæ offi adhæret, tota est carnea: os autem ea parte periosteo non tegitur, quod pauci obseruauerunt. Hæc pericranij portio musculi tegens plerisque imposuit, qui duos musculi huius tendines describunt, internum & externum. Deinde infernam musculi partem netuis conspersam, zygomate, velut aggere lapidoso, vallauit, vt videatur solius huius musculi gratia constructu os iugis. Postremo tendinem hunc infra supraque molli substerniculo & carneo tegumento muniuit, vt extetnis minus occurreret. Tantam musculi huius digni- tatem esse voluit Hippocrates, vt maxillæ inferioris luxationem, sæpe lethalem existimari, ob tempotalis musculi alterationem distentionemque. ἢν δὲ μὴ (in- quit libro de articulis) ἐμπέσῃ, κίνδυνος ἐστὶ τῆς ψυχῆς, καὶ ὑπὸ πυρελῶν ἐπι- χεῖν, ἐπὶ νοσήσας καρώσιος: καρώσιος γὰρ οἱ μῦες οὗτοι, καὶ ἄλλοις ὅλοις καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐξέρχονται. hoc est, *Nisi inferioris maxillæ reponantur ossa, periculum im- minet vitæ, ob febres continuas & soporem torpidum: soporiferi namque hi musculi sunt, si & alterentur, & intendantur præter naturam.* Proximi enim sunt cerebro, & maxi- mam per insignes nervos cum eo habent communionem: at quæ sunt propin- qua quæque communia, primum illa maximèque affici solent. Sunt in homine exigui hi musculi; sed validissimi: maximi & netuosiissimi leonibus, lupis, canibus, & iis animalibus quæ *καρχαρόδοντα*, id est, *dentes serratos habentia*, dicuntur; quia his robur in mordendo inesse debet. Temporalis musculo venit adiutor alius par- uus & in ore latitans, qui ab ossis sphenoidis processibus alatis exortus, internè in latera maxillæ inseritur. Ambo hi maxillam claudunt. Aperient maxillam duo tantum, vnus vtrinque, non enim necesse fuit tor esse aperientes, quot clauden- tes; nec verum est, contrariis actionibus succedentes musculos æquales sem- per esse numero, magnitudine, robore, oriuntur ambo à processu styloide, carno- si; dein neruosi fiunt, rursusque carnosi in menrum inrerius inseruntur, idèoque digastrici dici solent, quasi ventres duos habentes, nam extrema carnosà sunt, pars media vetam tendonis speciem ostentat; quæ figura aspectu elegans, cate- rorum nulli, præterquam hyoidis musculo à scapula prodeunti, concessa fuit. Debuerunt autem hi musculi in medio tenues esse & neruei, vt minimum occu- parent loci, quandoquidem suus linguæ & hyoidis musculus, relinquendus erat; sed & trochleæ velut imaginem hinc spectare oportet, quæ necessaria fuit; quò- modo enim cum non ab infernis colli partibus oriantur hi musculi, sed potius à supetnis, maxillam deorsum mouerent, nisi trochleæ obuoluerentur? Mouent maxillam ad latera, in dextrum scilicet & læuum, duo musculi, vnus vtrinque, Græcis *μαστοιγῆς* *μῦες* dicuntur, id est, *mansorij & molitores*, ab officio. Propria enim eorum actio est *μάσσησις*, id est, *manducatio*. Horum duo videntur esse ca- pita; alterum à malo in extremum maxillæ angulum fertur; alterum à zygomate versus mentum fertur: interfecant sese horum capitum fibræ in modum X. idè- que credibile est, musculos hos & in latera, & antrosum retrosumque maxillam mouere, quia multiplex variusque in mādendo requiritur motus. Addit Fallopius, musculum à supetnis pterygoidis processus parribus ortum, & in posticam ma- xillæ partem insertum, qui eam antrosum mouet, vt delitescens ille retrosum.

*Difuscularum
temporalium
affectus peri-
culosus.*

*Musculus in
ore latitans.*

*Aperientes
maxillam duo
tantum.*

*Digastrici cur-
diti.*

*Cur tenues
fuerint in
medio.*

Trochleæ.

*Maxillam
mouentes ad
latera maste-
tores.*



Ossis hyoidis dictum, quia nullam cum vicinis ossibus habet articulationem, (illius enim extrema alterius ossis extrema non tangunt) debuit per vincula quædam, vicinis partibus alligari; quomodo enim huic tanquam basi hæreret lingua? Vincula hæc non dura nervæque, sed mollia & carnea esse oportuit, ne œsophagum, arteriam asperam, iugulares venas, arterias carotides, nervum sextæ cōiugationis, musculos denique laryngis & linguæ duritie sua premerent colliderenque, tum vt linguæ motibus celerius obsequerentur, nec deglutitioni essent impedimēto. Hyoidis ergo musculi non motioni, sed tensioni potius dicari videntur: os autem hoc nec tunc, stabiliunt & velut suspendunt octo musculi. Duo à superiore sterni parte orti, in basim hyoidis inseruntur; duo ab interiore mento ad hyoidis basim feruntur; quintus & sextus à coracoide processu, obliquè in cornua ossis feruntur. Sunt in extremis, ortu scilicet & insertione carnosissimi, in medio exangues & nervæ, illis ferè similes, qui maxillam aperiunt; unde digastricos vocat Galenus, quos scapulam attollere putat, sed malè. Septimus & octavus à styloide processu enati, in hyoides cornua inseruntur; sunt perforati in medio, vt musculo maxillam aperiendi aditum præbeant.

Ossis hyoidis
vincula car-
nea esse de-
buerunt.

Musculi ossis
hyoidis tensio-
ni potius quàm
motui sunt
destinati.
Hyoidis octo
musculi.

De musculis linguæ.

CAP. XVIII.



LINGVAM gustatus & sermocinationis organum, ad saporē percipiendos, trudendos, transmittendosq; in gulam cibos, & literas exprimendas variè anguillæ & murenæ in modum moveri oportuit; propterea & carnosam habuit substantiam, eamque absolutam, mollissimam, & latam, quæ facillè contrahit sese, producit, dilatat: & musculos obtinuit proprios, eâ sursum, deorsum, antro-
sum, retrorsum & ad latera mouentes. Sursum mouent duo, à styloide processu, in mediam ferè linguam inserti. Deorsum totidē, ab inferiore maxilla enati, quæ sunt molares & in linguam feruntur. Antrosum aut extrorsum duo ab interiore mento orti, retrorsum duo à basi ossis hyoidis prodeuntes; dextrorsum vnus, finistrorsum alter, à cornibus superioribus ossis hyoidis ambo exorti, & in linguæ latera inserti. Hi omnes successivè agentes, linguam in orbem mouent. Sunt qui plures addant, alij pauciores; quod sanè perexigui est momenti. Linguæ porrò historiam fusiore suo loco enarrabimus.

Lingua car-
nosa variè
moveri
debet.

Lingua decem
musculi.

De musculis faucium.

CAP. XIX.



DESCRIPSIT Auicenna musculos quosdam faucium. Recentiorum primus Fallopius eorum meminit, videtur tamen ad deglutitionem omnino necessarij; quia ad cibi potusque ingressum, & dilatari, & constringi debuerunt fauces. Sex itaque sunt musculi faucium, tres utrinque. Primus tenui & nervoso principio ab ea sphenoides portione ortus, quæ articulationi maxillæ proxima est, in palati cauum inseritur trahitque sursum & antrosum extremum palatum. Alter ab eodem ferè principio natus, ad faucium latera in eas partes, quæ tonsillas continent,

Musculi de-
glutitioni in-
seruientes.

Sex musculi
faucium.
Tres utrinque.
Primus.

Secundus.

Tertius.

*Quartus addi
potest.*

inferitur, totamque ferè lateralem faucium partem amplectitur; dilatationi feruit. Postremus ab ea parte ortus, qua caput ceruici iungitur, tenue admodum, totam faucium posteriorem cavitatem ambit, & descendens fertur in latera hyoidis; fauces constringit & deglutioni seruit. Adderem ego musculus, quem ferè omnes laryngis esse putant, & communem vocant: oritur à lateribus cartilaginibus quæ scutum refert, & œsophagum omni ex parte circularibus & transuersis fibris amplexatur atque ita deglutioni seruit.

De musculis laryngis.

C A P. XX.

*Larynx cum
musculis de-
buit.*



*Quatuordecim
cartilaginei
Laryngis mus-
culi.
Quid appella-
mus commu-
nes musculos,
quid proprios.*

*Communes
musculi qua-
tuor sunt.
Duo bronchij,*

Duo alij.

*Duo alij com-
munes ab om-
nibus descri-
pti, non sunt
laryngis mus-
culi.
Proprij laryn-
gis musculi
decem.*

LARYNX arteriæ asperæ operculum, ad vocis modulationem dilatari, constringi, aperiri & claudi debuit. Motus hi quia animæ sunt non naturæ, id est, animalis facultatis non naturalis, musculorum opeta eguerunt. Sunt itaque laryngis musculi quamplures; quorum apud peritiores Anatomicos numerus valde est controversus. Nos missis lubricarum opinionum fluctibus, quatuordecim tantum statuiimus. Eorum alij sunt communes, alij proprii. Communes appello, qui ab aliis partibus quàm à laryngē oriuntur; proprios, qui à larynge orti, in eandem inferuntur. Laryngis autem nomine corpus illud intelligo, quod tribus constat cartilaginibus, tyroide, annulari, & arytenoide: ex quibus duæ tantum mouentur, sola annularis seu innominata manet immobilis. Tyroides, quæ scuti formam refert, & dilatatur, & constringitur; arytenoides verò, quæ parte superna fistulæ linguam efformat, & clauditur, & aperitur. Horum porro motuum ratio sic se habet. Communes musculi quatuor tantum sunt. Priores duo bronchij dicuntur, quia per latera arteriæ asperæ feruntur. Oriuntur à superiore & inferiore sterni parte, & per arteriæ bronchia ascendentes, in partem inferiorem eius cartilaginis, quæ scutum refert, inferuntur: hi laryngem deorsum trahunt, & dum infernas tyroidis partes cōstringunt, supernas dilatant. Duo alij superioribus oppositi, à lateribus ossis hyoidis enati, fibris rectis in infernam tyroides partem inferuntur, eam sursum trahunt, & dum supernas laryngis partes constringunt, infernas amplificant. Addunt ferè omnes, qui de re Anatomica scripserunt, communes alios duos, quos ab œsophago nasci putant, & in latera tyroides inseri; sed ego œsophagi potius quàm laryngis musculos esse credo, eosque deglutioni inservire, quia œsophagum omni ex parte cingunt & amplexantur. Proprij laryngis musculi decem sunt, exigui admodum omnes, quinque utraque parte. Primus ab anteriore cartilaginis innominatæ parte ortus, obliquè & fibris obliquis ad anticam & infernam tyroidem fertur; quam dum cōstringit, superiorem laryngis partem dilatat. Alter latior & longior, à posteriore cartilaginis annularis parte ortus, rectà ascendens, in arytenoidem desinit, & glottida aperire creditur. Tertius ab antica & interna innominata obliquè in arytenoidem fertur, posticas glottidis partes dilatat, & anticam constringit. Quattuor ab interiore tyroide obliquè in arytenoidem inferuntur, cōtrariam tertio actionem edens. Postremus omnium minimus, à media arytenoide in latera arytenoides inferitur & aperit fistulam. In hos musculos recurrentis nervi ramuli quamplures disseminantur. Quæ porro hic controversia occurrunt, & quomodo in horum musculorum descriptione magnus Vesalius deceptus fuerit, infra videbis. Fistulam operit epiglottis, quam & attolli & deprimi existimant ferè omnes, musculorum opera, sed nulli in ho-

*Epiglottidis
musculi in ho-
mine non re-
periuntur.*

mine teperiuntur; hiat enim semper larynx, neque vnquam deprimatur epiglottis, nisi pondere alimenti; attollitur ergo per se cartilagineum corpus, quia vi deprimatur.

De musculis caput mouentibus.

CAP. XXI.



MOUERI in omnem partem decuit caput, ad rei noxię fugam, & vtilis prosequutionem. Ad varios autem & multiplices hos motus vnica articulatio eaque laxa sufficeret quidem; sed tam nobile membrum vnico & simplici articulo committere non erat tutum. Natura itaq; vt libro de Ossibus docuimus, securitati consulens, quod vnus articuli laxitate & magnitudine præstare oportuerat, duobus paruis arctioribus & musculorum multitudine compensauit; adeo vt capitis omnes motus super prima & secunda vertebra perficiantur. Motus capitis, alij sunt recti, alij obliqui, alij semicirculares. Recti motus duo sunt, flexio, quę sit annuendo; extensio, quę renuendo. Flexioni dicati sunt duo tantum musculi, anteriore parte siti, mastoidei dicti, gtauia enim facili deprimuntur. Oriuntur hi à superiore sterni parte, & à claviculis, deinde oblique in occipitis processus mammillares dictos inferuntur; hos in duos & tres secant quamplurimi, sunt enim distincta eorum principia, inter quę cavitatis adest sensibus conspicua. Extensioni, octo inferuntur musculi; quatuor magni, & parui rotidem. Ex magnis, primi duo splenij, alij complexi dicuntur Syllio. Splenij, à spinis quinque superiorum vertebra- rum thoracis, & ab infernis quatuor cervicis orti, primum contigui, deinde separati, portione altera, in transuersos secundę vertebrae processus, altera in occiput inferuntur; caputque recta extendunt, si cum suo congenero agant. Alij duo sub his quia partibus naturę dissimilis constant, nunc carnosos, nunc neruosis, vt plures esse videantur, complexi seu implicati dicuntur. Oriuntur principio multiplices, à spina scilicet primę & secundę thoracis vertebrae, necnon à transuersis processibus quinque inferiorum vertebra- rum cervicis, & variè permixti vnique corpus efformantes, in medium ferè occiput desinunt. Parui quatuor graciles admodum, à situ, recti dicuntur; quorum duo à spina secundę cervicis vertebrae prodeunt, alij minores sub his, à posteriore parte primi spondyli orti, in occiput feruntur. Hi duo sunt capitis recti motus flexio & extensio. Obliqui duo sunt, alter in dextrum; alter in sinistrum. Ad hos motus peculiare musculi destinati non sunt sed dum alterius partis flexor, cum extensore opposito simul agunt, obliquum edunt motum, vt in carpo videre licet. Circularis capitis motus perfectus nullus datur: non enim caput in orbem omnino vertere licet: semicircularis itaque tantum est; quem parui quatuor musculi, obliquum occupantes situm, præstant. Primi duo è medio occipite prodeunt, in transuersas primi spondyli apophyses inferuntur. Reliqui duo, ab acuto secundę cervicis vertebrae processu exorti, in transuersam primi spondyli apophysin desinunt. Hi nimirum sunt capitis omnes musculi, numero quatuordecim.

*Cur variè de-
bit moueri
caput.*

*Flexores ca-
pitis musculi
duo.*

*Extendentes
eius.*

*Magni qua-
tuor,
Splenij duo.*

Complexi duo.

*Parui quatuor
recti.*

*Obliqui mo-
tus à quibus
musculis.*

*Obliqui mus-
culi quatuor
semicircularē
motum edentes.*

De musculis cervicis.

CAP. XXII.

*Flectunt cer-
vicē quatuor.
Longi duo.*

Scaleni duo.

*Extendunt
quatuor.*



CERVIX flectitur, extenditur & movetur ad latera, flectunt qua-
tuor, longi duo, & scaleni duo. Longi sub œsophago latitantes, à
corporibus superiorum verberarum thoracis enati, carneo &
acuto admodum principio, in primam cervicis vertebra[m] & ali-
quando in occiput inferuntur. Scaleni ob triangularem figuram
eamque inæqualem sic dicti, à prima costa & iugulo, carnoso &
laro principio exorti, sensim angustiores facti, in trasversas ferè omnes vertebra-
rum cervicis apophyses fibris obliquis inferuntur. Extendunt cervicem totidem
musculi: transversi duo & spinati totidem. Transversi, à processibus sex transver-
sis verberarum thoracis orti, in transversas omnes cervicis vertebra[s] feruntur.
Spinati inter spinas siti, à radicibus spinarum thoracis pronati, in spinas cervicis
desinunt. Motus qui fit ad latera ex altero extensore & flexore simul agentibus
perficitur.

De musculis scapularum.

CAP. XXIII.

*Scapularum
motus.*

Trapezium.



*Levatores pro-
prij.*

CAPULA movetur sursum, deorsum, antrosum & retrorsum:
in orbem verò moveri non debuit, tum ad humeri robor, tum
quia claves huic velut affixæ, circularem motum impediabant.
Sursum movet trapezij portio & levatores proprii. Trapezium,
ob figuram sic dictus, ab aliis cucullaris, quod monachi cucullæ
referat, & ancillarum collario similis sit, ab occipite ferè roto, ab
omnibus cervicis spinis & octo supernis thoracis natus, in to-
tam omoplatæ spinam & basim ferè mediam inseritur. In hoc varia fibrarum ge-
nera & diuersi exoritur observantur: propterea varios edit motus, & scapulam sur-
sum, retrorsum ac deorsum movet. Sunt musculi levatores proprii omoplatam
attollentes, quos Anatomici omnes pro unico numerant, cum tamen diuersas
eorum sit exortus diuersaque insertio: A prima enim, secunda & tertia cervicis
vertebra enati, in varias superioris anguli partes inferuntur: carnosissimi omnes sunt,
& propriis membranis discreti. Deorsum scapulam movent portio inferior tra-
pezij & portio latissimi: dum enim is robusto & quasi reflexo tendine ad brachium
inferitur, carnosa portione inferiori scapulæ angulo alligatur, eamque deorsum
trahit. Non fuerunt autem necessarii peculiare scapulam deprimentes musculi,
quia suo pondere laxatis supernis facile concidebat. Antrosum movet vnicus,
serratus minor dictus: hic à costis quinque superioribus antequam in cartilagine
abeant, pronatus, in processum coracoideum tendine partim carnoso, partim
neruoso, implanatur. Retrorsum omoplatam trahit vnicus, isque quadrangu-
laris musculus, à figura rhomboides dictus. Oritur à tribus spinis inferis cervi-
cis, & tribus supernis thoracis, atque in totam prope scapulæ basim inferitur: se-
ri potest in duos. Addunt plerique serratum maiorem & digastricum ex Galeno.
Sed errant ille enim thoracis est proprius, hic hyoidis.

*Deprimentes
scapulam nul-
li sunt proprii
musculi.
Serratus mi-
nor antrosum
mouet.
Rhomboides
retrorsum
trahit.*



RACHIVMIUS & sponte nostra mouetur, sursum, deorsum, antè, retrò, & in orbem, octo musculorum opera. Sursum mouent duo musculi, deltoides & supra-spinatus. Deltoides à figura litetæ Δ nomen sortitus, ab aliis $\epsilon\pi\omega\mu\iota\varsigma$, & humeralis, à clauī dimidia & tota omoplatæ spina & acrothio exortus, sensim gracilescens, validissimo tendine in mediam ferè humeti partem infertur.

Brachij sursum mouent duo.

Supra-spinatus à cavitare supra omoplatæ spinam enatus, in brachij ceruicem implantatur. Deorsum mouent brachium, duo, latissimus & rotundus maior. Latissimus, ani sculptor dictus, aut dorsalis maximus; à spinis ossis sacri, lumborum & nouem thoracis lato principio eoque nerueo oritur, necnon à superiore ossis ilij parte, dein rursum ascendens, totus carnosus in omoplatæ angulum inferiorem primùm fertur, mox robusto & quasi reflexo tendine, sub humeti caput infertur. Varias habet fibras & brachium vario modo deorsum trahit, obliquè tamen. Tribus constat angulis inæqualibus, duobus longis & altero breui. Rotundus maior ex ima omoplatæ costa, in brachij ceruicem fertur. Antroorsum mouetur brachium vnius tantum musculi eiusque validissimi opera, pectoralem vocant, quod pectori insideat, aut à figura inæquali, pentagonum, quinque enim habet latera. Oritur hic à clauī plusquam dimidia, sterno propè toto, costis sexta, septima & octaua, carnosus & lato principio, dein forti & quasi reduplicato tendine, in brachij os inter deltoidem & bicipitem musculum infertur, & axillæ cavitatem relinquit. In hoc tria villorum apparent genera, ptopterea brachium sursum, deorsum & recta mouet, sed antroorsum semper. Retroorsum mouent brachiū musculi tres, infra-spinatus, rotundus minor, & subscapularis. Infra-spinatus à cavitare infra spinam oritur, latissimus admodum & carnosus; implet enim totam eam scapulæ cavitatem, quæ infra spinam est, & in brachij caput ac ceruicem infertur, tendine crasso quidem, sed lato. Rotundus minor à costa inferiore scapulæ ortus, in brachij ceruicem & interiorem humerum fertur. Subscapularis seu immerfus, à scapulæ simā parte tota ortus, eamque omninò implens carne sua, tendine satis lato & valido in humeri ceruicem & caput infertur. Hi tres brachium tettoorsum mouent, & semicircularem motum videntur edere. Circularis verò perfectus, quia ex rectis omnibus & obliquis componitur, à peculiari nullo perficitur musculo, sed ab omnibus successiuè agentibus.

Deorsum mouent duo.

Antroorsum mouet pectoralis.

Retroorsum mouent tres.

Circularis motus ab omnibus fit.

De musculis cubiti.

CAP. XXV.



ECVNDÀ manus pat̃s $\pi\eta\chi\upsilon\varsigma$ καὶ ὠλένη, Latinis *vlua*, duobus constat ossibus, cubito & radio. Vtriusque diuersi sunt motus; cubiti enim morus proprius est flexio, extensioque; radius verò sub moru manū pronam & supinam facit. Cubiti quatuor sunt musculi, flexores duo & extensores rotidem; flectunt biceps & brachijus. Biceps duo habet capita, alterum à scapulæ acetabulo & cavitare glenoidæ pet brachij fissuram delatum; alterum ex coracoide processu exortum, in vnicum ventrem & tendinem coeuntia, in aneriorotem, non cubiti, vt sentit vulgus, sed radij partem inferuntur. In retea, quod pauci obseruauerunt, appendicem carnosam in medium ferè brachij os immittit. Brachijus, à brachio superno & an-

Cubiti quatuor musculi. Flexores duo. Biceps.

Appendix carnea. Brachium.

teriore carnosus exir, ossique adherens, in radium cum suo congenere fertur, nec non in cubitum. Extendunt cubitum totidem musculi, longus & brevis. Longus, è scapula prodit parum per sub illius ceruice; brevis à ceruice postica humeri enatus, priori ita connascitur, vt fecerint nulla arte queant, itaque permixti & confusi ambo, vnico tendine foris nerueo, intus carnosus, in olecranon inferuntur.

De musculis radij.

CAP. XXVI.



RADIJ proprius motus est manum pronare & supinare. Cum enim totam manum solus ferè radius excipiat, potest solius radij motu tota manus simul circumagi; partes verò vt digiti, nec circumduci possunt, nec debent, ad firmiorem & articulationem & apprehensionem. Radium ergo mouent quatuor tantum musculi, pronatores duo, & supinatores totidem. Pronatorum, alter rotundus dicitur, qui ab apophysi interna brachij ortus, & sæpè ab inferna humeri parte, oblique in radium propè medium membranoso tendine cessat; alter quadratus, ab imo cubito in imum radium desinit. Supinatores duo sunt; longior alter, ab inferiore brachij parte, in inferiorem radij partem inferitur; neruosus aliter, ab apophysi externa brachij, in medium ferè radium fertur, eique omnino adheret. Intus carnosus est, foris membranosus; oblique autem incedit, quia illius motus obliquus est.

De musculis carpi.

CAP. XXVII.



CARPUS flectitur, extenditur, & oblique ad latera mouetur. Flexores duo sunt, interni ambo; quorum alter à brachij interna apophysi ortus, cubito ossi artensus, in quantum os carpi crasso suo tendine, partim carneo, partim neruoso inferitur. Alter supernus, ab eodem tuberculo pronatus, in os metacarpij primum indici subiectum, desinit. Extendunt carpum totidem musculi, externi ambo: supernus aliter, à brachij externa apophysi ortus, radio instratus, in bifidum desinit tendinem: quorum altero, in metacarpij os primum: altero, in secundum inferitur. Alter musculus inferior, eodem enatus principio, tendine vnico, in metacarpij os quartum, quod minimo digito subiicitur, desinit. Mouent carpum oblique, & ad latera iidem musculi, aut seorsum operantes, aut flectentium vnus, cum extensore simul agens.

De musculis digitorum quatuor.

CAP. XXVIII.



MANUS organi omnium nobilissimi, mirabilem structuram suo loco describemus: ea tantum quæ ad historiam musculorum spectant, explicare consiliū est. Manus propria actio est apprehensio, vnde ὄργανον ἀσπληγίδον dicitur. Non potest autem sine motu fieri apprehensio: fuerūt ergo ad actionem manus musculi necessarii. Motus hic digitorum omnium ope & beneficio perficitur, qui flectuntur, extenduntur, adducuntur & abducuntur. Cum autem digiti quinque sint, pollex, index, medius, medicus & auricularis, quia posteriorum quatuor motus omnino sunt similes; pollex autem in flexione &

extensione habet quid peculiare; illorum quatuor musculi, nihil ferè habent dissimile; pollex verò peculiaribus eget musculis. Digiros ergo quatuor flectunt res musculi; palmaris, sublimis, & profundus. Palmaris ab interna brachij apophysi acuto nervo quoque principio ortus, statim carnosus, rotundus & parvus euadens, in angustum primum & longum tendinem protenditur, qui omnibus ferè manus internis musculis subiectus, & ligamentum carpi internum supergressus, tendonem tenuem latumque sub omnem cutem anteriorem manus ad primum usque articulum diffundit, & per volam ferè totam expanditur, non flexionis solius gratia, sed ad firmiorem apprehensionem, & ut sensu acriore polleat manus. Sublimis ab interna brachij apophysi enatus, priusquam ad carpum perveniat, quatuor tendines tanquam habenas emittit. Hi validissimo & transverso ligamento annuli instar, coeuntes & arctati, in secundam digitorum quatuor articulationem inferuntur; dum verò primam articulationem perreptant, ei membranarum & villorum interiectu ita firmiter alligantur, ut eam moveant. Profundus priori substractus, ab eodem exortus tuberculo, in totidem nervos tendines scinditur, qui primæ & secundæ digitorum quatuor articulationi membranosis ligamentis affixi, tandem in tertiam articulationem inferuntur, eamque soli flectunt. Ut autem profundo huic musculo ad tertiam articulationem pateret aditus, natura mirabili artificio sublimis tendines quatuor perforavit. Musculorum digiros flectentium tendo, omni ex parte rotundus est, nisi dum articulo inseritur, tunc enim latior fit, ut facilius moveat & apprehendat. Extendunt digitos musculi quamplures, quos Sylvius pro unico numerat, & digitum tensorem vocat, cum tamen eorum diversi sint exortus variæque insertiones. Oriuntur ferè omnes, ab externo processu brachij, aut paulo inferius, & annulari vinculo prius colligati, mox in secundum & tertium articulum variè inferuntur. Digitum ergo tensor in quatuor partes dividi potest. Prima in parvum digitum fertur, & bifidus est: altera amplior in duos finditur tendines; prior bifidus in auricularem & medicum; alter simplex in medicum inseritur; tertia portio in principio prioribus confusa, in duos abit tendines; alter ad medium fertur, alter ad indicem; postrema in indicem solum, nunc unico, nunc duplici tendine, fertur. Est autem hoc observandum, tendines hos rotundos non esse, ut anteriores qui digitos flectunt, sed latos, membranarum instar; quia nimis rotundum erat os exteriore parte. Hi sunt ergo digitorum quatuor flexores & extensores. Mouentur etiam digiti in utrumque latus, internum scilicet & externum, dum adducuntur ad pollicem, aut abducuntur: idque musculorum exiguorum opera. Adducunt digitos parvi quatuor, à lumbicorum figura lumbici & vermiculares dicti. Oriuntur hi à tendinibus profundiusculi, initio carnosus & teretes, dein exili nervo quoque tendine, primum lateribus digitorum hærentes, oblique ad externam tertij articuli partem inferuntur. Abducunt digitos interossei sex, non octo, in metacarpij spatiis latitantes, tres interni & totidè externi, qui per latera digitorum ascendentes, ad postremam eamque externam articulationem delati: cum vermicularibus coeuntes, unicum eumque latum efformant tendinem, ut videantur & vermiculares & interossei, parte ea quæ lateribus digitorum hæret, manuum digitos procul inuicem diducere; adducereque, extrema verò portione, extensioni digitorum inservire; unde sæpe contingit secundo eo, qui digitos omnes tendit, musculo, non propterea extensionem manus omnino perire, remanentibus quippe exiguis his, eidem actioni dicatis.

Digiros flectentes musculi tres, Palmaris.

Sublimis.

Profundus.

Extendentes digitos.

Adducentes digitos lumbici.

Abducentes, interossei.

*Flecor pollicis.**Tensor.**Adducens.*

OLLEX, quia toti manui solus æquipollet, peculiare habet musculos, flectentes, extendentes, adducentes & abducens. Flectunt, vnicus proprius, qui à superiore ferè radij parte enatus, in vltimum articulum inferitur. Extendunt duo, ambo à cubito exorti. Prior in tertium articulum vnico tendine inferitur; posterior bifido tendine in varias pollicis partes definit. Adducunt musculi tres, qui monticulum Veneris constituunt. Primus ex osse carpi medium digitum sustinente, carnosus tantisper assurgit, dein membraneo tendine in latus pollicis, quod indicè spectat, paulo magis introrsum quàm extrorsum inferitur. Alter huic contiguus & eodem fetè enatus principio, in secundum os pollicis inferitur. Tertius ab osse carpi medium ferè digitum respiciente ortus, obliquè ad secundum pollicis articulum fertur. Hi tres dum simul contrahuntur, secundum pollicis articulum validissimè flectunt: vbi seorsim agunt, pollicem ad alios adducunt digitos: primus quidem ad indicem; secundus ad medium digitum. Tertius ad auricularem. Abducunt pollicem totidem musculi, propriis carentes nominibus. Sunt & alij musculi in minimo digito, qui in tres aut quatuor secari possunt, qui auricularem digitum ab aliis abducunt, monticulum efformant Mercurio dicatum.

*Abducens ex
minimo digiti
musculi.*

De musculis respirationi dicatis.

CAP. XXX.

*Respiratio
quomodo fiat.*



ESPIRATIO, quia motu perficitur locali, eoque voluntario, distentione quippe thoracis, qua ducitur aer; & contractione, qua vapor fumidus excluditur, duplici muscutorum eguit genere; alij enim dilatationi: alij contractioni suam dicarunt operam. Dilatantium & constringentium numerus apud Anatomes scriptores est varius. Nos alios volumus esse proprios, qui soli respi-

*Respiratoriij
musculi proprii, communes.*

Respiratio duplex, coacta & libera.

*Respiratoriij
musculi sexaginta quinque.*

*Diffundentes
32. inspiratores
22. inferiores.*

rationi inferuiunt; alios communes, qui ad alios vsus sunt comparati, vt octo abdominis musculi. Rursum respirationis organa mouentia, ita cum Galeno distinguere placet; vt alia sint libera, alia coacta. Liberam voco, quæ placido spirandi vsu penè est insensibilis. Coactam, in qua aspectabilis est thoracis totius distentio contractioque. Illa solius ferè diaphragmatis editur motu; hæc muscutorum sexagintaquatuor ope perficitur. Sunt ergo respiratoriij musculi in vniuersum sexagintaquinque, non octoginta nouem, vt volunt ferè omnes Medici: quia nulli sunt intercartilaginei: ex quibus, trigintaduo distendunt, & totidem contrahunt. Distendentium primus subclauius dictus, ab interiore iugulo exortus, obliquè antrosum in primam costam inferitur: altera forma, serratus maior appellatus, ex interiore scapularum basi enatus, in sex aut septem superiores costas serratum inferitur, vbi cum obliquo epigastrii exteriore, pectinatum digitatimque committitur. Hunc scapulam mouere existimarunt quidam, sed falso. Tertius huic contiguus, thoracem amplificans, obliquus est epigastrii superior, cuius in valida inspiratione maximam vim agnoscimus; singulis enim superioribus costis lrimiter alligatur. Quartus & quintus serrati sunt posticillæ superior; hic inferior. Ille sub rhomboide situs, à spinis tribus inferioribus ceruicis, & prima thoracis exortus, obliquè in tres costas superiores tripartitus inferitur. Hic eandem panilemque figuram obtinens, ex inferioribus dorsi & superioribus lumborum

spinis pronatus, in tres quatuorve inferiores costas digitatim inferitur. Ad sunt præterea inintercostales externi vnde decem, Græcis *μεσόπλευροι*; quod media inter costas spacia occupent. Hi ex superiore costæ parte ordi, obliquè in inferiorem partem feruntur, & ad sterni cartilagineas desinunt: neque vnde interni spacia opplēt intercartilaginea. Sunt itaque sexdecim in vtraque thoracis partē musculi, costas diducenres, inspirando aëri dicati. Totidem sunt expirationi inferuientes: vnde decem quippe intercostales interni, qui ab inferiore costæ parte ordi, obliquè in superiorem inferuntur. Fibras habent externis contrarias, sese in modum X. interfecantes: opplent hi non modò ossium, sed & cartilaginum interiecta spacia: vnde fit vt in vtrisque spatiis diuersitas fibrarum appareat. Duodecimus expirationi dicatus musculus, in internam sterni partem occupat, triangularis à figura nuncupatur. Oritur ab inferiore sterni parte, & sursum protensus, cartilagineas deorsum adducit pectusque angustat. Decimus tertius, sacrolumbus dictus, quod ab osse sacro & spinis lumborum nascatur, musculis dorfi primùm confusus, mox discretus, mirabili & veteribus incognita insertione, in costas ferè omnes protenditur, singulisque costis duplici rendine & eo validissimo alligatur: eorum alter deorsum, alter sursum ferrur, vt videantur quasi sese interfecare, & eo moru costas arcere constringereq;. Super sunt tres epigastrii musculi: obliquus ascendens, rectus & transuersus, qui numerum complent sexdecim musculorum: quibus si alterius lateris toridem adieceris, 32. efficiet: atque ita sexagintaquatuor habebis musculos. Accedit his omnibus diaphragma inspirationi & expirationi inferuient, quod numerum perficit sexagintaquinque. Qui porò à veteribus & neotericis ferè omnibus addi solent intercartilaginei externi internique viginti quatuor, commemrati sunt, vt in controuersis demonstrabitur. Decepit autem illos triangularis ille musculus interior, peculiare obtinens fibras.

*Contrabentes
thoracem 32.
expirationis
feruientes.*

Intercartilaginei nulli sunt

De diaphragmate.

CAP. XXXI.

DIAPHRAGMATIS perfectam & absolutam historiam libro de organis vitalibus describemus: est enim velut ininteriectus paries vitalia organa à naturalibus determinans, vnde nomen ei impositum. Hic sufficit annotare, septum hoc musculosum esse, & ratione situs transuersum dici; ab anteriore quippe thoracis partē, ad posteriorem vsq; protenditur. Oritur à lumborum vertebris, quibus duorum tendinum interiectu alligatur, rum à notharum costarum extremis, postremò ab inferiore sternò & xiphoide cartilagine, rotus carnosus, desinitque in validissimum tendinem circularem & membranofum. Diaphragmatis motus proprius est cōtractio, ideò expirationi primò & per se; inspirationi secundariò inferuit, tenditur enim attolliturque in expiratione, laxatur & decumbit in inspiratione. Id in extincto animali facillè deprehendes: cōtractum enim perpetuò apparet diaphragma: at vira cessat expiratione. De structura, figura, partibus & vsu huius musculi, multa cāque non trita suo loco aperiemus.

*Diaphragma
tū ortus.*

*Diaphragma
tū motus.*



QUIA abdominis musculi respirationi inferuiunt, doctrinae ordo postulat, ut eorum descriptionem hic subtexamus. Abdominis musculi in homine sepe octo sunt: quatuor utrinque congeneres, id est, figura, magnitudine, robore & actione pares: ex quibus quatuor sunt obliqui, duo recti, totidem transuersi, à situ quem occupant & villorum textura, appellationem hanc sortiri. Primi omnium inter secundum occurrunt obliqui externi, omnium latissimi, quos omnes quotquot sunt Anatomici, descendentes appellant, in hoc tam misere falsi, quam in eorum exortu, in sectione & officio assignatis. Oriuntur à superiore ossis pubis & ilium parte, necnon à transuersis lumborum apophysis, hinc sursum protensi, portione carnea in nothas omnes costas, & octauam, septimam ac sextam veras, serrato magno digitatim, pectinatim, & serrarum impliciti, inferuntur: altera portione nervea, *Σπινεύρωσις* vocant, tendineque latissimo, in lineam albam feruntur: hæc autem à coriaceo & exangui corpore, multo nonnunquam adipè obdito, cognominata est: horum figura triquetra est. Ferri autem ad superiores potius quam inferiores partes, id indicat: quod inspirationi & dilatationi thoracis inferuiunt: in thoracem ergo inferuntur. His subditi sunt obliqui duo interni, superioribus ita oppositas obtinentes fibras, ut decussatim instar literæ X. sese interfecent. Oriuntur à superiore ossis ilium regione & transuersis lumborum processibus: hinc carnosiores, oblique sursum prouecti, in costas inferiores quatuor, easque nothas inferuntur: deinde duplici tendine (dictu mirum) rectum musculum hinc inde amplexante, in lineam albam feruntur. Hoc bifido tendine, & roborantur & comprimuntur recti, atque in medio musculorum sedent. Succedunt recti duo, ab osse pubis antico exorti, qui primum contigui, mox aliquantulum discreti, modicèque ampliores facti, in sterni cartilagine inferuntur: villos habent rectos, non quod villi ad pubem usque sint continui, secantur enim in plures partes: sed quia rectà procedunt: in simia & quadrupedibus excurrunt ferè ad clauiculam: in homine ad medium sternum feruntur: quia illorum figura prona est, hominis erecta. In his duo notatu digna obseruantur. Primum aponeuroses seu neruæ quædam intersectiones, nonnunquam tres, sæpe quatuor, quibus velut internodiis & roborantur musculi propter longitudinem aliquantulum debiles, & abdominis figura conseruatur sphaerica. Sunt præterea venæ duæ circa vmbilicum coeuntes, epigastrica ascendens, & quæ per interius sternum fertur, mammariam dicunt. Ex earum anastomosi credit vulgus fieri consensum mammarum cum utero; ego *συμπλάζουσαν* non nego; sed nutritionis tantum gratia constructas has venas credo, cum etiam in viris reperiantur. His omnibus musculis subsunt transuersi; sic dicti, quod & transuersum in abdomine situm obtineant, & fibras habeant transuersas. Oriuntur à transuersis vertebrarum lumborum apophysis, ossibus ilium & pubis, & in notharum costarum fines ac lineam albam inferuntur; hærent autè peritonæo ita firmiter, ut vix ab eo illaceros separe. Transuersorum musculorum tendines, ut & obliquorum quatuor, circa vmbilicum & pubem perforati sunt: illic ob vasa vmbilicalia, hic propter spermatica. His octo musculis accedunt aliquando in viris & mulieribus parui duo, triangulares, ab osse pubis externo orti, & in pattem infernam neruamque rectorum inserti, succenturiatos vocant, quasi maioribus

Obliqui externi.
Error. Anatomicorum in actu horum musculorum.

Obliqui interni.

Tedo bifidum.
Recti duo.

Intersectiones neruæ.

Venarum coeuntes.

Transuersi duo.

Tendines musculorum perforati.

Succenturiati duo.

opem ferentes: sunt qui ἡψίαίως, quod lumen occupant, vel ἐφθβαίως, quia pubi obtenduntur, appellare malint: hos rectorum tendinibus ne collideretur, propugnaculi vicem gerere, & infernarum partium compressioni, non autem pudendi erectioni inservire credimus. Cæterum cur transuersi internum, recti medium, obliqui externum situm occuparint, hæc vnica videtur ratio; quod profundiores & transuersæ fasciæ magis premunt, minus rectæ, minimum obliquæ; hæc brevis est musculorum abdominis descriptio; quos omnes Natura construxit ad ventris inferioris compressionem; dū enim seorsim^a agunt, modò hanc, modò illam, nunc superiorem, nunc inferiorem, nūc mediam abdominis partem cōprimunt, quod si simul omnes agant, æquabilis sit compressio, ex qua mirabiles hi fructus emergunt; sc̄cum deturbatio, iuuante diaphragmate, valida exspiratio; spiritus cohibitiō, quam Praxagoras πνεύματος καὶ ἀλγῆν appellauit, & fœtus expulsio. Mirto communem horum musculorum & carniū omnium vsum; partium subiectarum propugnaculum. Cæterum obseruatione dignum est, dissimilem esse horum musculorum & aliorum figuram dū agunt, & dum quiescunt. Reliqui enim ferè omnes mūscoli dū quiescunt, recti fiunt; dum agunt, curui: cōtrā abdominis muscoli priusquam agant curui sunt, vt subiecta instrumenta; cū verò agunt, intrò cedunt, nam facile premunt subiectas cauitates, quod propter inferioris ventris laxam cedentēque vacuitatem fit, vt intrò contentio feratur, remissio autem extuberet.

Ratio situm
musculorum.

Vt sunt musculo-
ri abdominis.

Figura horum
musculorum
dissimilis ab
aliis.

De musculis dorfi.

CAP. XXXIII.

DORSI nomine spinam ferè totam intelligo, quæ varios & multiplices edit motus, anticos, posticos & ad latera: idque decem musculorum opera. Duo primi, carnosio latòque principio à superna & postica cauitate ossis ilij, necnon superiore & interiore ossis sacri parte enati, supra lumborum vertebrae excurrentes, & transuersis hærentes processibus, in infimam costam desinunt. Hi lumbos & dorsum, si agant simul, in anteriora flectunt recto motu: si eorum alteruter agat, in latus mouet. Duo alij omnium longissimi, à dorso, ossibus sacro & iliū orti, necnon à spinis vertebrarum lumborum, in processus omnes transuersos vertebrarum thoracis, in spinas dorfi, ceruicis, ad caput etiam ipsum feruntur, totamque ceruicem & dorsum ad posteriora flectunt. Quintus & sextus, ab omnibus transuersis apophysibus lumborum orti, plurimas emittunt chordas, quibus inferuntur in omnes lumborum ac thoracis vertebrae, multiplici insertione; alia quidem externa, alia interna: alia in spinas, alia in transuersos processus. Septimus & octauus, à transuersis processibus primæ, secundæ & tertiæ thoracis vertebrae orti, in transuersas apophyses omnium ferè vertebrarum ceruicis feruntur. Postremi duo à spinis vertebrarum thoracis orti, in spinas ferè omnes ceruicis inferuntur. Hi cum superioribus & dorfi & ceruicis, spinam in posteriora flectunt, immotis lumbis.

Dorsimusculi.

Primi duo.

Alij duo.

Quintus &
sextus.

7. & 8.

Postremi duo.

*Cur in duo
musculi sunt.*



QUIA homo animal erat politicum, ad contemplationē & actionem natum; non oportebat primum cibi ingressum, & postremum excrementorum exitum esse perpetuum, ut in plantis, sed ex eius arbitrio pendentem. Ut ergo in ore & faucibus musculos deglutitioni dicatos locauit Natura; ita ad finem recti intestini, musculos apposuit, viam intercludentes, ne inuoluntaria fiat fecum excretio. Quatuor ergo sunt ani musculi, sphincteres duo, & leuatores totidem. Sphincterum alter carnosior est, ab inferioribus vertebrae ossis sacri ortus, & instar orbicularis annuli, fibris transuersis, recti intestini extremo implicatus, anum ita occludit, ut excrementis nullus pateat aditus. Alter cutaneus est, & meo iudicio, nihil aliud videtur esse quam cutis indurata, carnosae fibræ texta. Leuatores duo, sic dicti, quod anum delapsum reuocet, lati sunt, tenues, non admodum carnosii. Oriuntur ex lateribus & internis partibus ossis pubis & ischij, vel potius ex ligamentis à coccyge & ischio prodeuntibus; inde ad suum quisque latus deorsum protensi, rectum intestinum amplexantur, externæ ipsius tunicæ inferi.

*Quatuor ani
musculi.
Sphincteres
duo.*

*Leuatores
duo.*

De musculo vesicae.

CAP. XXXV.

*Vesicae musculus
vix.*



VESICAM quidem excipit continetque vesica, velut laguncula quædam; sed ne continenter & inrempeste eam reddere cogeremur, musculus construxit Natura, qui ceruicem omni ex parte cingens & ianitoris vicem gerens, exitum intercludit, ne iniunctis nobis effluat vrina. Hunc Græci ab officio σφυστήριον vocant. Situm est in prima ceruice vesicæ, & à ceruicis substantia distingui non potest, ut sphincter ani; sed est ceruicis substantia carnosior, transuersis plurimis fibræ texta, quibus hoc agit ut seipsam constingat. Eo larato, refrigerato, secto, inuoluntariè vrina effluit. Est etiam mulieribus suis in vesicæ ceruice sphincter, sed crassior, quia prostatæ nullæ adsunt.

De musculis testium.

CAP. XXXVI.

*Cremasteres
musculi.*



*Cremasteres
vteri.*

TESTIM duo sunt musculi, cremasteres dicti, id est, suspensorij. Oriuntur ab extremis obliquorum & transuersorum abdominis finibus & peritonæo, eiusque productionibus hærentes, in testes feruntur. Horum usus est, ut sursum nonnihil testes adducant, ipsisque sustinendis opulentur, ne suo pondere vasa exendant. Agnoscunt etiam quidam in vtero muliebri cremasteres, membranas scilicet peritonæi, fibræ carnosæ conspersas, quæ vterum alligant suspenduntque ne procidat.

De musculis penis.

CAP. XXXVII.

*Penis musculi
quatuor.*



PENIS actionem naturalem potius esse quam voluntariam, certissimum est. Ab animali tamen aliquantulum iuuari indicant musculi quatuor. Ex quibus, duo à musculorum ani extremis oriuntur, vel ex inferiore pubis parte & in latera ductus, qui semini & vrinæ communis est (viretram vocant) feruntur. Duo alij ab appendice ossis ischij orti, oblique carnosæ ascendant. Illi prostatas comprimunt, exprimuntque semen

semen iaculationis tempore, & urinæ reliquias in fine mictionis. Hi contracti penem amplifican, vt rectà semē eiaculari possit. Est quoque in mulieribus particula peni respondens. Clitorida vocant, aut rentiginem; duos habet exiles musculos tensioni dicaros.

Clitoridis muscoli.

De musculus femoris.

CAP. XXXVIII.

FEMUR flectitur, extenditur, adducitur, abducitur & circumagitur. Flectunt duo muscoli, alter in abdomine situs, à lumborum vertebis superioribus exortus, valido tendine in trochantera paruum anricē inferitur, *ψόας* vocant Hippocrates & Galenus. Huic incubant renes, vnde fit vt calculosis *ψαρχα τῶ μηρὸς κατ' ἐξυσσιν* por in crure è directo persēriat ur. Alter iliacus dictus, à tota cavitate interna ossis ilij enatus, in eundem trochantera paruum inferitur. Exrendunt crus, muscoli tres natium auctores, maior, medius, minimus. Maior quasi semicircularis, omnium extimus & amplissimus, à coccyge, osse sacro, superna ilium costa obliquè descendens, in femoris os, palmum sub trochantere magno desinit. Medius & situ & magnitudine ab anteriore parte costæ ilium, in trochātera magnum & superficiem eius externam, inferitur. Minimus ab eadem ossis ilium facie externa, sed inerna magis, in trochanteris magni supercilium internum fertur. Adducunt crus & circumagunt intrò tres, quos pro vnico numerant Anatomici, eumque tripitem vocant. Primus à commissura summa ossium pubis & eorum spina, in ossis femoris lineam sub ipsius ossis medio inferitur. Secundus ab ima pubis commissura, sub trochantere paruo inferitur. Tertius ab eodem enatus principio, in parui trochanteris radicem fertur. Abducunt crus & simul circumagunt foras, sex muscoli, quadrigemini & obturatores duo. Quadrigemini sibi omnino similes & parui, situ quasi transuerso locati, à tubere ischij enati, in trochantera magnum inferuntur. Obturatores, sic dicti, quòd foramen inter os pubis & ischij patens obturent, duo sunt; externus alter, aliter internus. Externus à toto foraminis externo ambitu natus, in cauum trochanteris magni fertur. Internus ab interno foraminis ambitu exortus, supra coxendicem extrorsum trochleæ instat reflectitur, & variis tendonibus auctus, tandem vnico in trochantera magnum & eius radicem inferitur.

Flectentes femur duo.

psas.

Iliacus.

Extendunt tres.

Adducunt tres.

Abducunt sex.

De musculus tibie.

CAP. XXXIX.

TIBIÆ iidem sunt, qui & femoris motus; flectitur namq; extenditur, adducitur, abducitur. Flectit quatuor, postici appellari; quorum tres, à tubere ischij nascuntur; interni duo, & vnus exterior. Internorum prior semineruo sus; alter gracilis dicitur. Quartus duo habet capita, alterum à commissura ossis pubis, alterum ab exteriore femoris parte enascitur, & vtrumque vnico tendine in posteriorem tibie partem inferitur, quam flectit & adducit intrò. Extendunt tibiam totidē; rectus, vasti duo, & crureus. Rectus à spina externa & inferna ilium oritur. Vasti duo, à mole nomen sortiri; externus quidem, à radice tota trochanteris magni & cruris osse subiecto; internus verò à trochantere paruo & cruris osse subiecto nascuntur. Crureus ossi cruris affixus est, vt brachizus brachio: quatuor

Flectunt tibiam quatuor.

Extendunt quatuor.

*Adducunt
duo.*

*Abducunt,
vni.*

hi muscoli in tendinem vnicum cessant, qui molem amplexatus, in tibiae principium anticum latè inferitur & genu, hac parte pro ligamento est. Adducunt tibiā intrò, flectentes simul duo muscoli, longus & popliteus. Longus musculorum omnium longissimus, ab ilij spina exortus, obliquè in tibiā internam & anticā descendit. Popliteus ab inferiore & exteriori femoris tuberculo ortus, in interiorē tibiā partē inferitur, estque quadratus. Abducitur tibiā muscoli vnius ministerio, quē membranosum & fasciam latam vocant. Oritur hic carnosus principio à spina ossis ilij & obliquè in tibiā externā fertur, suoque tendine latissimo, omnes ferè femoris musculos inuestit, & ad extremum vsque pedem excurrit.

De musculis pedis.

C A P. XL

*Pedem flectit
duo muscoli.*

*Extendunt
quatuor.*

*Chordae insigni-
t.*



P E s flectitur & extenditur, flectunt duo, tibieus anticus, & petoneus. Tibieus anticus, tibiæ affixus, à superno tibiæ processu ortus, tendine vnico, sed ad finem bifido, in os pedij pollicis præpositum, inferitur. Peroneus biceps, capite altero, à fibulæ superna epiphyssi, altero à medio perone enatus, tendinem geminum mittit, maior sub planta obliquè delatus in os pedij e regione pollicis, inferitur, minor in os minimi digiti fertur. Extendunt quatuor gemelli duo, soleus & plantaris. Gemelli, internus quidem, ab interno femoris capite: externus autem ab externo exoriuntur. Soleus his subditus & latior à tibiæ & perone commissura enascitur. Hi tres in vnicum tendinem cūmque crassissimum & validissimū, pternæ calcisque principio inferendū desinunt. Hunc chordam vocat Hippocrates, lib. *Περὶ ἀρθρώσεων*, vbi ex calcis fractura febris contingere vult singultuosas & cōuulsificas, ob chordæ *συνπλέξαν*. Postremus plantaris dicitur, palmari respondens: gracilis est, & in tendinē prælongū degenerat, quia d'astragali tergum latefcit, p̄rque latera pternæ, in plantā totius cutim absorbitur.

De musculis digitorum.

C A P. XLII

*Digiti flectunt
duo.*

*Extendunt
duo.*

*Adducunt
quatuor ver-
miculares.
Abducunt
interossei octo.
Pollex mus-
culi peculi-
ris.*



D I G I T I pedis, vt & manus, flectuntur, extenduntur, adducuntur, & abducuntur. Flectunt duo, magnus, minor: magnus profundo respondet. Oritur à superna tibiæ epiphyssi, & sub planta in quatuor finditur tendines, qui minorem perforantes, in tertiam quatuor digitorum articulationem inferuntur. Minor sublimi respondens in planta pedis media situs, à pternā inferna ortus, quatuor perforatis tendinibus in secundum digitorum quatuor articulum fertur. Extenduntur digiti quatuor, musculo vno à summa & externa tibiā exorto, & in tendines quatuor dissecto. Est & alius minor sub eo latitans, extendens digitos, sed obliquè. Oritur à superiore tarso totus carnosus, mox in quatuor tendines, interdu quinq; vermicularibus ferè similes, sed crassiores, desinit: & in quatuor digitos, medicum, medium, indicem, pollicem inferitur, in minimum verò tendinem non emittit. Adducunt digitos lumbrici quatuor, à profundis seu digitorum flexoris magni tendinibus enati. Abducunt verò interossei octo, à pedij ossibus orti, & spatia metapedij opplentes, flexioni quoque non parum inferuiunt. Pollex peculiare habet musculos, flectentes, extendentes, adducētes &

abducentes. Flectitur pollex vnico, à tibia prodeunte; extenditur altero, à media fibula enato, qui sæpe in duos tendines diuiditur. Adducitur vnus opera, ossi pedij maximo intus attēsi. Abducitur ab alio, qui à calcis interna parte carnoso enatus principio in primum pollicis os inferitur. Est & peculiaris musculus minimi digiti abductor, à calce exortus, aded vt, hi abductores, tenari, & hypotenari respondeant. Hæc breuis est & facilis musculorum historia. Nolui ad vitandam cōfusionem, & vt studiosorum iuarem memoriam, in eorum descriptione diutius immorari: ea tantum quæ Medico & Chirurgo necessaria sunt, annotare placuit.

EORVM QVÆ IN PARTICVLARI MVSCV-
LORVM HISTORIA OCCVRRVNT,

controuersa explicatio.

CONTROVERSIE ANATOMICÆ.

An hyoides os voluntariè moueatur, & eius musculi motus gratia
sint comparati. QVÆSTIO IIIL.

MVLTA in particulari musculorum historia obseruantur, de quibus inter Anatomes scriptores non satis conuenit. Ego præcipua tantum capita perscrutar. Os hyoides variis constare musculis docet aulopsia. Sed quis horum musculorum sit vsus, quæ ætio, non ita omnibus exploratum habetur. Sunt qui os hyoides, voluntario motu sursum, deorsum & ad latera musculorum ministerio moueri putent; quia musculus voluntarij motus organum est; vt mutuo hac reciprocet, musculos habere & voluntariè moueri. Alij musculos in os hyoides inferi quidem volunt: sed quia lingua huic ossi tanquam basi innititur, ad linguæ potius, quàm ad ossis varios ac diuersos motus destinatos esse sibi persuadent. Ego, os hyoides proprio motu & voluntariè non moueri existimo; quia nisi deglutienti ad sit voluntas, & nisi moueatur lingua, nunquam è sua sede mouebitur. Mouetur ergo non proprio, sed alieno motu. Sed cur musculos habuit voluntarij motus organa? Natura enim nihil temere molitur. Volumus ad symphysin hos musculos constructos fuisse, vt scilicet vndique suspensum & alligatum teneretur hoc os. Quia namque lingua subternitur pro fundamento, decuit per vincula quædam vicinis partibus connecti & alligari; tensioni itaque non motioni dicati sunt hi musculi; tendi autem debuit idem os, quia nulla eius cum vicinis ossibus erat articulatio, nullusque extremorū contactus. Hanc meam opinionem confirmat musculorum hyoidis situs: alij enim à coracoidæ processu, alij à styloide, alij à summo sterni, alij ab interno mento ortum ducunt; at os psyloides ad styloidem & coracoidem processus moueri qui obseruari, adhuc inuentus est nemo. Ridebit hoc nostrum inuentum fortasse quispiam, quia firmitus nervis aut ligamentis durioribus validioribusque tenderetur os psyloides. Sed miretur quisquis ille sit, singularem in opere hoc Natura providentiam. Vincula namque ossis huius, oportuit esse carnea molliaque, ne œsophagum, asperam arteriam, iugulares venas, arterias carotides, neruum sextæ coniugationis, musculos denique laryngis & linguæ duritie suæ premerent colliderentque: tum vt lingue motibus promptius obsequerentur, nec deglutitioni essent impedimento; caro enim facilius colligit sese, laxat & remittit partem quam trahit.

De hyoide
musculis, opi-
niones varia.

Opinio nostra,
os hyoides non
moueri per se.

Hyoides mus-
culi cur facti
sint.

Tensioni fir-
miter prius
quàm motui.

Cur hyoide
ossis vincula
denique esse car-
nea.

De numero musculorum laryngis, & cur in angina laryngis rubet aliquando
cervix & sternum, demonstratio Anatomica. QVÆST. V.

Varia opinio-
nes de numero
musculorum
laryngis.



E numero musculorum laryngis, non convenit inter Anatomicos. Alij enim viginti, alij decem & octo, alij sexdecim numerant. Nos quatuordecim tantum statuimus. Qui viginti numerant, octo communes & duodecim proprios agnoscunt. Decepit eos, opinor, par vnum musculorum hyoidis, quod bronchiis contiguum est, & per latera aspera arterie ascendit. Quinetiam dum proprios describunt, duos à thyroide in annu-

rem ferri putant, cum nulli sint omnino, quia cartilago hæc immobilis est, nec in eam inseritur musculus. Fuerunt in hac opinione Galenus, Vesalius & Sylvius. Si itaque duo hæc musculorum paria demas, supererunt sexdecim, quem numerum Anatomici fere omnes approba-

Duo illi com-
munes œsopha-
gi ductus, non
sunt laryngis
musculi, sed
deglutitionis
feruntur.

rent. Ego tamen communes illos duos, quos œsophageos vocant, laryngis musculos esse non puto, sed œsophagi his ductus rationibus. Non possunt ab œsophago musculi hi enasci, ut sentit vulgus, & in latera thyroidis inseri, quia movens validius esse debet re mobili, & musculus omnis basi firma inniti debet; at œsophagus mollis est, cartilago autem dura; quomodo igitur trahet ad se laryngem œsophagus? Præterea certissimum est, deglutitionem opus esse ex animali & naturali mixtum, ut docet multis in locis Galenus; nam & denotamus eam volumus, nec decuit primum cibi ingressum & postremum excrementi exitum esse perpetuum, ut in plantis, sed ex animalis arbitrio pendentem, ne homo animal esset ἀμεινον καὶ ἀκλόσοπον. Si itaque deglutitio opus est animale, musculorum quorundam opera perficiatur necesse est. At nulli œsophagum cingunt & arctant musculi, si hos demas. Verisimilius est ergo, hos musculos à lateribus thyroidis ortum ducere, & œsophagum omnino amplecti, ac in mediam illius partem linea alba discretam, inseri. Columbus unicum vult esse hunc musculum, non duos, qui sphincteris vicem gerat, & ab altero thyroidis latere ortum in alteram inseratur. Unicus sanè primo occurso apparet, sed paulo oculatius inspectantibus, mediana quadam linea discluditur. Errat autem in eo Columbus, quod laryngis musculum esse velit.

Errat Columbi.

Cur in angina
laryngis rubet
sternum &
cervix.

Ex hac communi musculorum historia, demonstratio quedam anatomica petenda est; cur in angina laryngis, rubet aliquando sternum & cervix. Rubet sternum, per continuitatem musculi bronchij, quia summo sterni oritur & in latera thyroidis inseritur; rubent autem cervicis latera, per musculos œsophageos & colli anterior superiorque pars; per continuitatem musculorum, qui ab hyoide orti, in thyroidem inseruntur. Caterum rubor hic in angina, duobus fit modis; per μετὰ πλῆθος quippe, id est decubitus humoris ab interioribus musculis ad externos; & per ἐν γένεσιν, id est propagationem, quando humoris efferi tanta est copia, ut & internos & externos musculos pariter obsideat. Hac ruboris distinctione, conciliabuntur dissentientes Hippocratis loci, in prognostico namque & Coacis anginam salutarem esse vult, in qua rubent sternum & cervix. Quibus (inquit) una rubent & fauces, & cervix, & pectus, longiores quidem sunt ille angina, sed maxime ex iis evadunt, & in Aphorismis, Erisipelas ab interioribus ad exteriora ferri, bonum. Contra, sectio-
ne 2. lib. 2. Epidem. Anginosa mulier, quæ apud Bitonem decumberebat, cum rubore colli & pectoris ex utraque parte, quarto die interiiit, & lib. 5. Epidem. Anginosa quadam cum maxillarum rubore quinto die interiiit. Dic ruborem qui fit per decubitus, salutarem; cum vero qui per ἐν γένεσιν, lethalem. Musculos epiglottidis ridiculum esset hic describere, quia in homine non reperiuntur. Hiat enim semper larynx, neque unquam deprimitur lingua, nisi pondere alimenti, ut sæpe diximus.

Ruber in an-
gina duobus
fit modis.

Conciliatio lo-
corum Hippo-
cratic.



SI quid est in Anatomica arte reconditum & admiratione dignum, sanè linguæ motus omnem & admirationem & difficultatem superat. Sunt enim tam varij & multiplices ejus motus, ut veterum quidam, linguam non musculorum opera, sed substantia sua carnea, anguille & murene in modum, moveri existimarint. Ego linguæ substantiam carneam quidem agnosco, sed caro ea muscosa non est, quia per eam fibre excurrunt nullæ, nō movet autē sine villo caro. Musculi linguæ proprii decē sunt, eā sussum, deorsum, antrosum, retrorsum & ad latera mouentes. Errat igitur Auerroës, qui linguam proprio motu, non musculorum ope exeri putat; quia (inquit) nullus musculus in linguæ extremum extrinsecus inseritur, qui foras rapiat linguam. Fuit sanè acutissimus vir & summus Philosophus, sed non ita bonus Anatomicus; ab interiore enim mento, musculi duo pronati, linguam exerunt.

De linguæ motu.

Error Auerrois.

De musculorum intercostalium numero & actione. QVÆST. VII.



NIL, ut ingenue fatear, in tota musculorum historia me magis exercuit, quàm hæc musculorum respirationi dicatorum descriptio. Multa enim de eorum numero, actione & usu controuersa occurrunt. Anatomici ferè omnes, octoginta nouem respirationi inseruiantes musculos statuunt, quos ita numerant, ut quadraginta quatuor thoracem distendant, totidemque contrahant; illorum primus est subclauus, secundus, serratus maior anterior, tertius, serratus posticus superior, quartus, serratus posticus inferior: ad sunt præterea undecim intercostales externi, sex intercartilaginei externi, & obliquus descendens epigastrij. Hi omnes viginti & duos constituunt. Totidem expirationi dicatos esse volunt. Undecim namque sunt intercostales interni, sex intercartilaginei interni, triangularis, sacrolumbus, & reliqui tres abdominis, obliquus ascendens dictus, rectus & transversus. Sunt ergo in utroque latere quadraginta quatuor muscoli, qui duplicati numerum conficiunt 88. His si diaphragma addatur, 89 perficies. Hunc musculorum numerum Neoterici ferè omnes approbarunt. Nos tamen auctores, quæ nihil est certius, edocti; sexaginta quinque tantum esse volumus; triginta duo inspirationi, totidēque expirationi inseruiantes. Duodecim nāque illos intercartilagineos internos, externosque reuicimus, cum ab intercostalibus non differant, nec vlla discernantur membrana. Decepit eos, ut opinor, fibrarum diuersitas, & Galeni locus, qui libro de muscul. dissectione, cap. 23. & 5. de Anatomicis administ. cap. 3. ita scriptus legitur. Fibre internorum & externorum musculorum intercostalium, ad sterni cartilagineas vsque similes sunt. At ubi ad cartilaginum spatia accessere, dissimiles apparent. Erroris causa fuit, quod interiorē sterni musculum triangularem dictum, diuersas ab intercostalibus habentem fibras, non recte obseruauit. Sit ergo hæc obseruatio. Anatomica; non differre intercostales ab intercartilagineis, & intercostales externos ad cartilagineas vsque tantum ferri, nec media cartilaginum spatia oppleri; interiores verò ulterius progredi; unde sit ut nobis interiecta costarum & cartilaginum spatia intuentibus, diuerse appareant fibre, cum tamen distincti non sint muscoli. De usu autem & actione horum musculorum, maior est difficultas. Existimarint quidam, hos musculos motui destinatos non esse, quia absurdum foret, musculum eam partem mouere, à qua ortum ducit; oriuntur autem hi omnes à costis. Itaque membrarum potius costas alligantium & connectentium vicem gerere voluerunt, quas fibris quamplurimis & carne quasi tomento Natura texuit, tum ut costarum & thoracis calorem fouerent, quia carnes membranis calidiores; tum ne intercostales nervi per quodlibet costarum spatium excurrentes, simul cum membranis colliderentur. Sed huius opinionis leuitas ex eo

De numero musculorum respirationis, vulgaris opinio.

89. musculus, vulgaris numerat. Nos 65. tantum esse volumus.

Erroris causa.

Obseruatio Anatomica, nullas esse intercartilagineas.

De usu intercostalium, quorundam opinio.

Conuincitur.

conuincitur, quòd si opplendis tantum spatiis alligandisque costis dicati sunt hi muscoli, cur geminos construxit Natura? Cur ita sese intersecant? Cur & unde fibrarum illa diuersitas? Nihil enim in structura corporis se ingerit fortuitum, sufficiebat nec tendis costis, unicus musculus, isque crassior. Quia ergo varij sunt muscoli, propriis membranis discreti, quia diuerse eorum fibrae, diuersus eorum ortus inferiòque, altum sanè quàm ligamenti solius usum conferre volumus. Vsum hunc & actionem primus omnium eleganter aperuit Galenus libro de dissectione musculorum octauo: de Anatomicis administ. quinto: de usu partium quarto: de locis affectis secundo: de musculorum motu, & libello de causis respirationis. Quibus locis

Intercoſtales
musculorum
verus usus.

Recentiores
in Galenm
inſurgunt.
Nota prima.

Secunda.

Auſtoritas.

Reſponſu ad
ſingula.

Galenì locum
explicatur.

Intercoſtales
musculi quid
habeant pecu-
liare, diſci-
turi, & diſci
ſunt.

intercoſtales musculos thoracem mouere, atque ita reſpirationi inferuire docet. Cum enim reſpirationis duæ ſint partes, inſpiratio & exſpiratio; quarum illa dilatatione, hæc conſtrictione thoracis perficitur; externos musculos coſtas diſtendere, internos contrahere vult. Hac vera eſt de uſu intercoſtaliu Galeni ſententia, quam tamen recentiorum quidam conuellere conantur, omneſque intercoſtales contractioni, non diſtentioni, exſpirationi, non inſpirationi dicatos eſſe contendunt, rationibus & auctoritate nixi. Rationes hæ ſunt. Externi à ſuperiore coſta parte orti, in inferiorem inferuntur, interni contra ab inferiore, ad ſuperiorem feruntur. Illi dum agunt, inferiorem coſtam ſurſum trahunt; hi ſuperiorem deorſum; omnes ergo coſtas adducunt & pectus anguſtant; at dilatatione amplior redditur thoracis cavitatis. Soli itaque conſtrictioni, non dilatationi inferuiunt. Præterea plures ad exſpirationem, quàm inſpirationem muscoli requiruntur; quia validior eſt in exſpiratione, quàm inſpiratione, thoracis contentio; at ſi externos inſpirationi, internos exſpirationi dicatos velis, par erit dilatantium & coarctantium numerus. Accedit Galeni auctoritas, quinto de uſu partium capite ultimo, quo loco intercoſtales musculos in diaphragmatis ſubſidium conſtructos eſſe ſcribit. Cum enim (inquit) unus eſſet hic musculus, periculum erat, ne ab octo inferioribus epigaſtrij muſculis e ſua dimoueretur ſede, & in amplam thoracis cavitatem ferretur. Quod ne contingeret, omnes qui in coſtis ſunt musculos, qui thoracem ipſum contendere atque intro contrahere poſſent, comparauit; ut ſuperiore ſinu undique coarctato, diaphragma immotum & ſtabile maneat. Videtur itaque eo loco Galenus indicare, intercoſtales omnes contractioni inferuire. Verùm his omnibus ita ſatiſfaciendum puto. Licet ab externis & internis muſculis adducantur coſtae, non tamen ab utriſque anguſtior redditur thorax. Nam cum coſta in exortu ſuo ad inferna inſectantur, ſit ut dum externorum intercoſtaliu motu, inferior coſta ad ſuperiorem adducitur, pectoris amplitudo maior euadat; dum verò ſuperior ad inferiorem trahitur, internorum ope contrahitur pectus & anguſtius euadit. Quid plures ad exſpirationem, quàm inſpirationem requirantur muscoli, negamus; non enim numerus, qui quantitas eſt, agit, ſed qualitas, robur quippe & vis musculorum; at validiores ſunt & inſigniores exſpirationi dicati: doſalis enim ille muſculus, ſacroſpinatus dictus, duodecim habet validiſſimos tendines, ut huius ſolius maior ſit quam omnium diſtendentiu robur, adſunt præterea tres abdominis muſculi, obliquus aſcendens, reſectus & tranſuerſus, necnon triangularis ſterni, qui ſubclauio & ſerratis ſunt validiores. Auctoritas Galeni ſententia noſtra non aduerſatur, neque enim ſcribit ſimpliciter & abſolutè coſtarum omnes musculos thoracem conſtringere, ſed intercoſtales diaphragmatis gratia comparatos eſſe vult, eoſque omnes qui conſtrictioni dicati ſunt, diaphragma deorſum trudere. Sit hoc igitur ratum, intercoſtales externos thoracem diſtendere, internos conſtringere; illos inſpirationi, hos exſpirationi inferuire. Habent porro intercoſtales muſculi id peculiare, quod priuſquam agant, figuram ſimilem totis coſtis habent; curuam quidem extrinſecus; cauam autem intrinſecus; cum autem agunt, prementes quidem membranam & pulmonem, tantum intro cedunt, quantum ſubſtantiam ſubiectorum inſtrumentorum cedentem habent, ut propterea dum agunt, minus curui ſiant.

DE diaphragmatis exortu eiusdemque motu, vix habeo quid dicam; ita enim dissentientes video Medicos, ut nihil certi ea de re quisquā statuat. Galenus & 5. de vsu partium, & 2. de musculorum motu, multa quidem de diaphragmatis motu prodidit, sed ita obscure loquitur, ut vix eius dicta vix possumus assequi. Nos in re controuersa & ancipiti, sententiam nostram breui aperiemus. Vulgaris est opinio, circulum illū nerueum, qui in muscoli centro apparet, principium esse & caput muscoli; ut peculiaris hac sit diaphragmatis prerogatiua, tendinem carnosum habere, & caput nerueum, contra musculorum omnium naturam. Potest hac opinio rationibus confirmari. Constat inter omnes, respirationem thoracis distentione, & contractione perfici: debent ergo muscoli omnes respirationi dicati in thoracis aliquam partem inferi. Diaphragma princeps est & primariū libera respirationis organum, inspirationi expirationique inseruiens; debent ergo illius extrema in thoracis *Θεπέξα* desinere, eiusque principium in centro locari; aliqui eius motu, nec distendi, nec contrahi, thorax poterit. Quinetiam verisimile est, ibi principii musculi statuentum, ubi nervorum apparent insertiones; at docet *αὐτοῦ* *ἰα*, ferri ad circulum membranosum nervos omnes; erit igitur in medio diaphragmatis muscoli huius principii. Ego contra in circulo illo nerueo, non caput sed caudam & finem muscoli statuo. Eius autem varios diuersosque ortus agnosco. Quia enim circularis est musculus, ab omni thoracis circumferentia eum enasci puto, & in circulum nerueum quasi centrum desinere. Oritur itaque a lumborum vertebis, quibus duorum tendinum interiectu alligatur; tum a notarium costarum extremis; postremo ab inferiore sterni *Θ* xiphoide cartilagine totus carnosus, desinitque in validissimum tendinem circularem & membranosum. Huius exortus & insertionis hæc vera mihi videtur ratio, quod diuersorum motuum, diuersa esse debent principia; at diaphragmatis diuersi sunt motus, contractio, distensioque, inspiratio & exspiratio; diuersa ergo sint eius principia necesse est. Quod si centrum, diaphragmatis caput statuas, unicum erit illius principium, unusque tantum illius motus. Sed audio undique obstreperantes Anatomicos, & eadem in nos iacula retorquentes. Si enim respiratio distentione, & contractione thoracis perficitur, quomodo thoracem distendens contrahetque diaphragma, si ab vniuersa thoracis circumferentia ortū ducat? Est hoc theorema Anatomicum, musculos omnes principia versus contrahi, easque nunquam agitare partes, a quibus enascuntur. Sed satisfactam illia hoc responso, mirabilem esse huius musculi & structuram, & actionem. Vt enim in structura totus est *διχοτομος*; ita & in actione sua varius: ut structuram habet sibi propriam, nec ceteris muscularis communem; ita actionem edit reliquorum musculorum legibus nullo modo subditam. Trahunt omnes muscoli partem, in quam inseruntur; diaphragma verò partem, a qua ortum ducit, trahit. Id autem quomodo fiat, paucis accipite. Carnose diaphragmatis fibrae a thoracis circumferentia exorta, aequaliter contrahuntur omnes, ut circulum illum neruosum ad se trahant. Dum pari contentione trahunt, nihil mouent; cur enim ad anteriorem potius, quam posteriorem, dextram, quam sinistram partem mouebitur musculi centrum? Idem sanè circulo nerueo contingit, quod ferro magneti vndique circumdato; suspensum namque ferrum, manet immobile. Cum itaque diaphragmatis tendo ad principium carnosum & costas moueri nequeat, ob aequalem partium omnium thoracis contentionem; tunc principium versus finem trahitur, & flexiles costae ad circulum nerueum adducuntur; fitque ex ea fibrarum contentione exspiratio; quibus laxatis *Θ* in primum locum reductis, fit inspiratio. Est ergo diaphragmatis finis in medio, nō in costarum extremis, & hæc Picholommei etiam Medici & Philosophi celeberrimi sententia est. Quod

De ortu diaphragmatis vulgaris opinio.
Principium in centro esse.
Ratio prima.

Secunda ratio.

Opinio nostra, medium musculi formae esse.

Obiectio.

Responsio.
Diaphragmatis prerogatiua.

Quomodo mouentur diaphragma.

Respondetur
obiectis.

Intendatur
in expiratione
diaphragma.
Opinio Galeni.

Explicatio lo-
curus.

Expiratione
fieri contractio-
nem diaphrag-
matis.
Obiectis.
Solutio.

autem de nervi in centrum insertione obijciunt, ridiculum est. Non enim nervus immediate muscolum contrahit, sed anime tantum imperium deservit; quocumque itaque animale refundat spiritum, siue in medium, siue in finem aut caput muscoli, nihil interest; sic recurrentes nervi ad inferiorem musculorum laryngis partem feruntur. Unicus superest excutendus scrupulus, an verum sit tendi attollique in expiratione diaphragma, laxari autem & decumbere in inspiratione. Voluit Galenus, laxari in inspiratione, tendi in expiratione, cui nos libenter assentimur. Contrarium tamen sentire videtur lib. 2. de musculorum motu, dum expirationem affectum esse vult thoracis, decidentie similem; collabitur ergo thorax & laxatur diaphragma in expiratione. Dic concidere quidem in expiratione thoracem, sed non diaphragma; dum enim trahuntur ad circulum nervum flexiles costae, intenduntur fibrae omnes, dum vero reducuntur costae, laxantur fibrae. Fieri autem contractionem diaphragmatis, expirationem, id inter cetera luculenter demonstrat; quod mortuo & extincto animali, diaphragma sursum contractum perpetuo cernitur, at vita cessat expiratione. Dices expiratione pelli faeces; ergo non retrahi, sed ad ventrem potius accedere diaphragma. Respondeo, non contractione septi, sed musculorum abdominis faeces deturbari; inuat tamen septi situs peristalticum intestinorum motum.

De musculorum abdominis ortu, insertione & situ, noua opinio: vindicatur etiam Galenus à recentiorum calumniis. QUESTIO IX.



VIX possum me continere, quin rideam, dum video tyrannicos de Anatome disceptantes, musculorum abdominis historiam & sectionem tam parui facere, ut qui eam ignorauerit, imperitus omnino & nouiculus apud illos habeatur. Ego sanè nihil in tota musculorum historia, magis inuolutum unquam indicavi; neque adhuc quemquam, qui exquisitè epigastrii musculos integros & illaceros secuerit, vidi. Quàm misè igitur fallantur singulorum esto iudicium. Atque ut rem totam paucis explicem, in nomine, ortu & insertione musculorum abdominis, non levis est error. Vulgus, obliquorum quatuor, alios statuit descendentes, alios ascendentes. Ego ascendere omnes puto; propterea illos externos aut priores, hos internos aut posteriores appellandos puto. Ascendere autem obliquos omnes, ex eorum officio colligo; nam priores omnium latissimos, cum serrato magno pectinatim coeuntes, in inspiratione & dilatationi thoracis inferuire, volunt omnes; at quomodo si descendant munus id præstabunt? Hinc quàm malè eorum exortum & insertionem assignarint omnes, palam sit. Volunt enim à contactu serrati magni, quinta, sexta, septima, & octaua costis oriri descendentes obliquos, & in ossa pubis atque ilium inseri; volunt etiam ab hisdem inferiores costas moueri. Quae si vera sunt, musculus partem immobilem mouebit, & circa fines non principium versas contrahet sese, ita veteris doctrinae splendor omnis obscurabitur. Ego à superiore ossis pubis & ilium parte, necnon à transuersis lumborum processibus oriri existimo; hinc portione carnea, in costas inseri, portione neruæ, in lineam albam desinere; illa thoracem mouere; hac epigastrium comprimere. In ortu & insertione rectorum musculorum, planè à Galeno dissentio; vult enim à sterni ossibus ad pubem ferri; ego contrà à pube ad sterni latera; quia pubis, ilium, & ischiolum ossa non moventur. Accusant quidam Galenum inconstantie & leuitatis, quòd capite 6. libri 5. de locis affectis, rectos musculos nullo externo musculo regi scriptum reliquerit; cum tamen obliquis duobus regi, doceat Anatome. Sed discant, musculi nomine, carnem (quæ præcipua est musculi pars) intellexisse Galenum; at nulla carne regi rectos, sed aponeurosi tantum obliquorum, certissimum est. Sed & de situ horum musculorum exclamant Neoterici. Nam quinto de usus partium rectos primum describit, mox obliquos; & 5. de locis affectis capite 6. rectos omnium primos & tan-

Erratum. Ana-
tomici omnes
in ortu & in-
sertionem muscu-
lorum obliquorum
abdominis.
Nulli sunt
descendentes,
omnes ab infer-
nis oriuntur.

Opinio nostra
de ortu obli-
quorum.
In ortu rectorum
musculorum error Ga-
leni.
Accusatio
Galeni de situ
Neoterici.

Excursus Ga-
leni.
Accusatio
Galeni de situ
musculorum.

genti maximè conspicuos esse vult, cum à nullo externo tegantur. Contrà 5. administ. Anatom. & 6. methodi primi omnium habentur obliqui, mox recti, postremò transuersi. Hos sanè Galeni dissentientes locos conciliare non est difficile. Libris de usu partium, muscutorum historiam & usum, non sectionis modum describit, itaque à rectis ordinatur, quòd rectum index sit sui & obliqui. 5. de locis affectis, modum explorandi abdominis tumores aperit, docetque rectos, cum omni ex parte sint carnei, nullàque tegantur carne, sed aponeurosi tantù, si tumeant, facile à Medico tactu deprehendi. At libris methodi & 5. administ. Anatom. simplicem situm enarrat & sectionis ordinem sequitur; primi autem inter secandum sese offerunt obliqui, dein recti, tandem transuersi. Utrum verò abdominis musculi thoracis potius quàm inferioris ventris gratia constructi sint, dubitarunt quidam. Exisimant multi, primariò ad motù thoracis constructos esse, quia eorù opera distenditur contrahiturque folium instar thorax; secundariò ad ventris compressionem, unde faccum expulsio. Non enim (aiunt) semper sit excretio, at thoracis motus continuus est. Ego contrà primarium eorum usum agnosco, abdominis compressionem; secundarium, thoracis motum; quia hi soli abdomen comprimunt; alij verò quamplures thoracem distendunt contrahuntque, propterea ad communes respiratorios sunt referendi.

Conciliatur
Galenus.

De muscutorum paruorum, quos succenturiatos vocant,
structura & usu. QVÆST. X.

UT AT Columbus exiguos hos musculos, quia in omnibus non reperiuntur, distinctos non esse à rectis; sed si inueniantur, portiones esse rectorum. Fallopius contrà, musculos esse vult, à rectis omnino distinctos; nam & membrana peculiari discernuntur, & desinunt in mediam lineam, non in rectos musculos, & fibras habent obliquas, non rectas, & illorum fibrae nunquam cum fibris rectorum miscentur. Eius scripta legit: singula enim hic transcribere hominis esset otio ac literis abutentis. De eorum usu varij variè sentiunt. Volunt quidam erectioni penis inferuire, sed horum muscutorum ortus, & insertio sententiam hanc manifestè conuellunt. Oriuntur ab osse pubis externo, & in rectorum fines inseruntur, partem itaque, ad quam non feruntur, mouere non possunt. Accedit quod & in mulieribus iidem musculi reperiuntur. Sunt qui urinae excretioni dicatos putent, sed quomodo id fiat non video, nisi ex euentu, dum hypogastrium premunt. Ego rectorum primum tendinibus ne collidantur, propugnaculi vicem gerere existimo. Cum enim recti ob longitudinem & actionis varietatem essent aliquantulum debiles, eorum robori tribus modis consuluit sagax & prouidens Natura. Primum nervas intersectiones (aponeuroses dicunt) tres quatuorve, quasi internodia, apposuit, mox bifido obliqui interni tendine, quasi ambabus manibus, hinc inde rectos est amplexata. Tandem triangulares hos musculos extremis tendinibus addidit, ad eorù robur, non secus ac in temporali musculo & decimo femoris, argumento est, quod illis deficientibus, adeps copiosus hos tendines circumsepit. Sed & in subsidium obliquorum & transuersorum constructos fuisse verisimile est, quia obliqui & transuersi, internas partes comprimere non poterant exquisitè.

Opinio Colum-
bi de paruis
musculis.
Conciliatur
eleganter à
Fallopio.

De usu paruo-
rum spinosus
vicia.

Quomodo ser-
uiant urinae
excretioni.
Perus curam
usum.

De situ & officio sphincteris vesicae.

QVÆST. XI.

NO N inutilis est de huius musculi situ cōtrouersia. Nā cū in vesicae ceruice, glādo-
sa duo appareant corpora, quæ & semen cōtinent asseruantq; ad necessarios usus,
& oleosa humiditate uretrā irrigant, ne urinae ledatur acrimonia; existimarunt
quidā, musculū hunc, & vesicae ceruicem, & glandulas illas prostatas amplexari
constringereq;. Alij contrà supra glandosa corpora situm esse musculum, id est glādulas illas à

Prostatum
usum.

Ratiocinet.

musculi amplexu liberas esse voluerunt. Cui ego sententia assentior potius, quā priori. Nam si vera essent quæ illi cōtēdunt, nunquā sine vrina semen excerneretur; aperto enim, & laxato musculo ad seminis excretionem, vrina statim funderetur, quia illius retentio, solius sphincteris opera perficitur. Sed & in gonorrhœa Venerea, quæ ab inflammatione & ulcere fit prostratum, stillaret cum semine vrina, aperto sphinctere, qui ianitoris vicem gerit. Quinetiam vrina super hæc glandosa corpora semper fluitaret, ea allueret, tandēque sua acrimonia roderet. Est ergo sphincter in ipso cervicis vesiçæ limine, collocatus. Obiicit contrā Vesalius, mingentibus sepe urinam supprimi, si exformosa mulieris aspectu tentigine corripiantur, deinde distento & rigido pene, etiam si prematur abdomen, urinam non effluere; tertio gonorrhœa laborantibus, semen cum vrina miseri; & pus sepe emitti in principio mictionis. Accedit quod multi in vesicam, non penem semen eiacularantur, quod deinde vrina primum simul excernitur. Postremo, crebrò mingēdum est illis, qui gonorrhœa laborant. Vt itea:

Conteritur vrinæ Vesalius.

Ratiocinet.

Singulus Vesalius ratiocinatus fuisse.

ergo à prostaticis ad vesicam meatus patet, nec sphinctere musculo intercluditur. Verum his ita satisfaciendum censeo, distento pene, urinam supprimi, etiam laxato & aperto sphinctere, quia tunc intumescunt glandulæ post sphincterem sitæ, quæ vrinæ aditum intercludunt. Mictetur aliquando in gonorrhœa Venerea semen vrina, & in principio mictionis effluit pus; sed etiam non mingentibus, stillat purulentum quidpiam, idque continuò & inuitis nobis. Qui semen in vesicam eiacularantur, præclusos habent glandularum ad ductum vrinæ & seminis communem, aditus; aut ab ulcere fistuloso; aut à caruncula; aut à cicatrice; itaque etiam si musculo cōstringatur vesicæ cervix, non tamen ita exqui sitē clauditur, quin semini spiritali vi & impetu prodeunt, viam aperiat. Mictio illa frequens in gonorrhœa virulenta, non arguit musculum, infra glandosa corpora esse locatum; sed quia ab ulceris acrimonia irritatur, ob viciniam, expultrix vesicæ facultas, sermumque redditur acrius. Quod autem nihil intessere putas Vesalius, ad seminis & glandularum puritatem, siue musculus ille supra, aut infra sedeat, quia idem est canalis semini & vrinæ dicatus; non videt communem quidem esse meatum vrinæ & semini; sed cum semper ferè vrina vacuum, vesicam vero semper ferè seroso humore plenam, qui glandulas continuò allueret semēque infœcundum redderet, nisi inter vesicam & glandulas interiectus esset hic musculus, ianitoris vicem gerens. De usu & officio huius musculi, dissentientes quidam Galeni loci explicandi sunt. Quinto & secundo de usu partium, vult vesicæ musculum factum, ut excernendorum celeritatem iuuat, id est excretioni inseruiat, contrā, 6. de Anatom. administr. & 7. de Crassi. & 8. dictum putat, quid stringat vesicæ os, impediātque ne inuitis nobis effluat vrina; & secundo de motu musculorum. Musculi (ait) qui est ad vesicam & anum, officium est, non excernere superflua, sed retinere. Conciliabitur Galenus, si dixeris; musculum, neque primum, neque simpliciter sacre ad vrinæ excretionem, sed secundariò, dum enim præeunte voluntate seipsum laxat, apertius viis permittit urinam effluere, & ita excernendorum celeritatem iuuat; dum etiam circa mictionis finem contrahitur, ut rursus vesicam claudat, reliquias vrinæ pellit vesicæ cervicem exprimendo. Eius autem propria actio est tensio, quæ quia sine aspectabili motu diu perseverat, dormientes enim non metiunt, & vigilantes urinam resinent ad tempus, motus tonicus dici potest; laxatur autem, non à contrario, sed à seipso.

Dissentientes Galeni loci explicantur.

De usu & actione sphincteris vesicæ.



LECTORI STUDIOSO,
AND. LAVRENTIVS S.

LIBRARVM inspectionem damnarunt multi, quòd ea studiosos remoretur magis quàm promoueat: ego non omnino inutilem censeo. Itaque vt quorundam precibus obtemperarem, præcipuas depingendas curavi, aliorum icones sequutus; non enim ob Aulicas occupationes licuit mihi, vt erat in animo, eas delineare. Nouas addidi, in quarum descriptione si quid erratum fuerit, totum id pictori & sculptori acceptum refer; nam in historia Anatomica mentem meam satis aperuisse videor. Cæterum figuras omnes simul & in medio ferè operis excudendas iussi, vt legentium oculos oblectarem. Hoc itaque æqui bonique consule.

TABVLA HÆC EXTERNAS OMNES
ET PRÆCIPVAS CORPORIS PARTES EXPRIMIT.

FIGVRA I. anteriorum est
partium.

- AA. Capitis circumscriptionem totam à
mento ad verticem ostendit.
B. Frons est pudoris indicium.
C. Tempora quæ canitie annos producit.
D. Minor oculi angulus aut canthus
externus dictus.
E. Maior seu internus canthus.
F. Malum.
G. Bucca.
H. Nasus externus solus in homine emi-
nens.
I. Auris externa auricula dicta.
K. Os.
L. Mentum.
M. Collum.
N. Claves, seu iuguli.
O. Mamma.
P. Sternum, pectus.
Q. Epigastrium.
R. Hypochondria, aliis præcordia.
S. Umbilicus, radix ventris.
T. Lumbaris regio.
V. Hypogastrium.
X. Ilia.
Y. Pubis seu pecten.
Z. Inguina, bubones.

- a. Penis, mentula.
b. Humerus.
c. Cubitus.
d. Carpus.
e. Metacarpus.
f. Femur.
g. Genu.
h. ἄστυν ἢ μίον pars carne decudata.
i. Tarsus.
k. Metatarsus.
l. Malleoli.


FIGVRA II. posticas partes
delineat.

- A. Verticem denotat.
B. Occiput.
C. Deltoidem musculum.
D. Scapulae.
E. Renum regionem.
F. Ossis sacri situm.
G. Coccygem.
H. Nates.
I. Femines pulposas partes.
K. Popliteum.
L. Suram, pulposam partē γαστήρι-
μιον.
M. Calcem, pternam.



FIG. II.


FIG. I.



TABVLA HÆC SCELETOV OMNIA FERE
OSSA ANTICA OSTENDIT.

A	Os coronale aut frontis, os inuerecundum.	medius, medicus, auricularis.
B	Sutura ossa capitis ab ossibus genæ superne discriminans.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
C	Os iugis. Zygoma dictum.	Hæc omnia numerū costarum ostendunt, quarum alia sunt germanæ, scilicet quippe superiores: alie straniæ & illegitime, quinque scilicet inferiores.
D	Os maxille superioris, maximum tangentium appellatū, omnes superiores dentes continens, etiam incisivos.	a a Ossa ilium.
E	Processus mammillaris, in osse lapidoso & prærupto situs.	b Os ischi.
F	Maxilla inferior.	c Ossa pubis aut pectinis.
GHIK	Hæc quatuor literæ totam spinam dorsi, quæ multis costat vertebriis, indicant.	d Symphysis ossium pubis, quæ super cartilaginem.
L	Os pectoris sternum dictum.	e Foramen ischi nomine carens adlevitatem ossis factum.
*	Cartilago xiphoides, ensiformis, scutiformis.	f Caput rotundum & magnū femoris quod ischi cauitatem ingreditur.
MM	Claui culæ.	g Cervix.
N	Apophysis scapula, quam acromion vocant.	h Trochanter seu rotator magnus.
O	Apophysis coracoides.	i Trochanter parvus.
P	Scapula, omoplata.	k Femoris os.
Q	Caput brachij seu humeri, quod in scapula cauitatem inseritur.	l Rotula genu, patella, mola.
R	Os brachij.	mm Condylis duo inferni femoris.
SS	Articulatio cubiti.	n Genu.
T	Radius.	o Articulatio femoris cum tibia.
V	Cubiti os.	p Tibiæ os, fossile maius.
XX	Articulatio cubiti cum carpo.	γ Peronæ os, fossile minus.
Y	Quinque digiti manus, pollex, index,	q Malleolus internus.
		s Malleolus externus.
		t Ossa tarsi.
		uu Ossa metatarsi.
		yy Digiti pedis.






TABVLA HÆC POSTICA ET LATERALIA
OSSA DEPINGIT.

A	<i>Ossa bregmatus seu sincipitis.</i>	d	<i>Olecranon.</i>
B	<i>Sutura coronalis.</i>	ccc	<i>Radius.</i>
C	<i>Os frontis.</i>	f	<i>Digiti manus.</i>
D	<i>Ossa temporum.</i>	g	<i>Prima lamborum vertebra.</i>
E	<i>Ossis sphenoidis, quod basilare vocant, productioni.</i>	iii	<i>Ossis innominati ambitus.</i>
F	<i>Zygoma.</i>	kk	<i>Ilium ossa.</i>
G	<i>Maxilla inferior.</i>	l	<i>Coxendix.</i>
H	<i>Sutura lambdoidis locus.</i>	mn	<i>Symphysis connexio ossium pubis per synchondrosin.</i>
II	<i>Processus duo maxille inferioris, alter acutus, coronon vocant, alter condyloidis dictus per quem fit articulatio.</i>	o	<i>Coccyx.</i>
KK	<i>Metacarpus.</i>	p	<i>Trochanter magnus.</i>
L	<i>Carpus octo constans ossibus.</i>	q	<i>Cervix femoris.</i>
MM	<i>Os cubiti.</i>	r	<i>Caput ossis femoris.</i>
N	<i>Epiphysis inferior cubiti.</i>	f	<i>Sinus innominati ossis.</i>
T	<i>Quomodo coeant ossa cubiti.</i>	tt	<i>Ossa femoris.</i>
V	<i>Prima vertebra dorsi.</i>	uu	<i>Rotula, patella genu.</i>
X	<i>Scapula.</i>	xx	<i>Perone.</i>
Y	<i>Sternum, os pectoris.</i>	y	<i>Poples.</i>
Z	<i>Clavicula inguli.</i>	zz	<i>Os tibie.</i>
I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	<i>Duodecim costae.</i>	1,1	<i>Malleoli duo.</i>
a	<i>Brachij caput.</i>	2	<i>Planta pedis, solum, vestigium.</i>
b	<i>Medium humeri.</i>	3	<i>Os tali.</i>
c	<i>Inferior pars brachij in duas apophyses desinens.</i>	4	<i>Astragalus.</i>
		5	<i>Os scaphoides nasculare.</i>
		6,6	<i>Ossa innominata.</i>
		7,7	<i>Metatarsus.</i>
		8,8	<i>Digitorum ossa triplici ordine disposita.</i>





TABVLA HÆC FIGVRAS MVLTAS CONTINET,
SPINAM QVIPPE TOTAM, SCAPVLAS, CLAVES, BRACHIj,
manuum, femoris, tibiæ & pedis ossa omnia delineat.

FIGVRA PRIMA totam
spinam ostendit.

- AB Septem cervicis vertebrae his notis
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, expressæ.
CD Dorsum aut metapothrenum duode-
cim vertebrae contextum.
EF Lumborum vertebrae quinque.
GH Os sacrum sex ossibus constans.
IK Coccygis os quatuor ossiculis con-
textum.
LLLL Acute vertebrarum apophyses,
spinas vocant propriè.
MMMM Transversa vertebrarum
productiones.
NNNN Obliquæ apophyses superio-
res.
OO Obliquæ apophyses inferiores.
PP Foramina vertebrarum, per quæ
nerui exiliunt.

FIGVRÆ duæ quæ primam sequun-
tur, os sacrum & illius extre-
mum ostendunt.

- ABCDEF Vertebrae sex ossis sacri.
GHIK Coccygis os.
A Apophysis superior primæ vertebrae.
B Sinus in prædicta apophysi insculptus.
CCCC Cavitas continende spinali me-
dulla dicata.
DD Sinus seu cavitas in quam os ilium
inferitur.
EE Pars exterior eius cavitatis.
FFF Posteriores ossis sacri apophyses,
spinas vocant.
G Cartilago in extremo coccygis ap-
pensa.
ILLR Apophyses transversa.
M Apophysis superior prima vertebra.
GHIK Totum os coccygis in tertia fi-
gura pictum ostendunt.

FIGVRA quarta scapulam & quæ in
ea observari debent demonstrat.

- AA Cavitas superficialis, in quam bra-
chij caput inferitur, quæ articula-
tio arthrodiam facit.
BB Cervix omoplate.
CD Apophysis coracoides, anchyroides.
EF Apophysis altera omoplate, in quæ
inferitur clavicula, acromion vo-
cant.
G Cavitas in externa scapula parte.
HH Angulus superior omoplate.
II Spina scapulae.
KK Cavitas iuxta spinam.
LL Extremum basis scapulae.
MM Pars caua.
N Extremum anguli inferioris.

FIGVRA v. claves delineat.

- AAA Caput claviculae, quod sterni
articulatur.
BBB Pars quæ scapulæ articulatur.
CCC Linea in claviculis insculpta.

FIGVRÆ vi. explicatio brachij
ossa continens.

- AA Caput brachij seu humeri quod in
scapulae cavitatem glenoidem in-
feritur.
BC Cervix brachij.
D Sinus aut potius scissura brachij, os
in duas ferè partes diuidens, bicipi-
tis musculi tendini excipiendo di-
cata.
EF Posterior ossis pars.
HI Anterior ossis pars.
KLM Pars ossis fina.
N Linea & spina musculorum extor-
qui dicata.

- O Sinus cubiti caput excipiens.
 P Sinus alter priori oppositus apophyses cubiti excipientes.
 Q Trochlea in ossis extremo.
 RR Apophyses duae infernae brachii, externa & interna.
 T Tertia apophysis in medio duarum sita, quarum beneficio fit. ginglymos.

FIGURA VII. ossa radij & cubiti ostendit.

- ABB Apophyses acutae in fine ossis cubiti.
 CC Cavitas brachij trochleam excipiens.
 D Ossium asperitates musculorum insertioni dicatae.
 EE Epiphysis rotunda & caeva radij manum pronam & supinam efficiens.
 FF Cervix epiphyseos.
 GG Radij asperitas & scissura.
 HH Acutae apophyses.
 II Olecranon.
 KK Pars plana & aequalis.

FIGURA VIII. tibiae ossa maius & minus delineat.

- AA Pars interior superioris epiphyseos ossis tibiae, quae duas habet superficiarias cavitates, femoris capita inferiora, condylos vocant excipientes.
 BB Linea ossis epiphysin discriminans.
 C Epiphysis superior perones, supernam tibiae epiphysin immediate tangens.
 D In hac parte haerent & quasi affixi sunt musculi quatuor tibiam extendentes.
 EEEE Interstitia quae inter peronem & tibiam sunt, in quibus observare oportet lineas, angulos, spinas.
 FFFF Linea & acutae apophyses, quae

in osse tibiae sunt conspicuae.

- GGGG Aliae eiusdem ossis rima.
 HH Prima ossis minoris, vulgus fossile minus vocat, linea.
 I Secunda.
 KK Tertia.
 LL Epiphysis inferior ossis tibiae.
 M Apophysis inferior perones malleolum externum constituens.
 N Apophysis inferior ossis tibiae malleolum internum constituens.
 O Cavitates duae superficiariae, primam pedis os, astragalum vocant, excipientes.
 P Connexio utriusque ossis, tibiae scilicet & perones in parte inferiore.
 T Cavitas in perones inferna epiphysis sita, quae ligamentum validissimum enascitur, quod in os ballista, astragalum vocant, fertur.

FIGURA IX. ossa omnia manus extremam tam interna, quam externa describit.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Octo ossa carpi duplici ordine distincta, propriis carentia nominibus. Eorum alia cum radio & cubito articulantur, alia cum metacarpo.
 I. II. III. IIII. Quatuor sunt ossa metacarpi, quae inferna parte cum carpo articulantur per synarthrosin, id est, compactam pressamque articulationem: nos eam articulationem neutram & dubiam cum Galeno appellamus: est enim diarthrosis, si modum compositionis spectes, quia adsunt capita & cavitates: est synarthrosis ratione motus qui obscurissimus est.

- ABC Tria ossa pollicis.
 DDDD Primus ordo digitorum.
 EEEE Secunda digitorum acies.
 FFFF Tertius ordo digitorum.
 HHH Ossa sesamoidea, quae firmiorem reddunt articulationem.

FIGURA X. ossa omnia pedis & externa & interna ostendit.

- AA Os tali, os baliste, Astragalus, τέ-
ταρπος quatrio, à quatuor ipsius
lateribus.
- BB Os calcis Ἀέρυα, calcaneum.
- CC Os naviculare σκαφοειδές, à scaphæ
& cymbæ similitudine.
- DD Os cyboides, os tessere à formâ cubi,
os quadratum.
- EEE Tria ossa innominata χαλκοει-
δῆ, cuneiformia, quod cuneum
referant.
- FFFFF Quinque ossa metatarsi aut pe-
dij, quorum similis ferè est ac
metacarpi structura.
- GG Quinque digitorum articuli eadem
aciè dispositi, ac digitorum manus.

constat enim quilibet digitus ter-
nis ossibus, excepto pollice.


* Ossa sesamoidea digitorum pedis ar-
ticationem firmantia.

Prætermissa erant quædam in figura
ossium cubiti, quæ hic adde-
re placuit.

- L Pars interior epiphysis inferioris of-
fis cubiti cana quæ carpo annectitur.
- M Apophysis styloides prædictæ epi-
physcos.
- N Superior pars infernæ epiphyscos ossis
radij, quæ in extremo cavitates duas
habet ossa carpi excipientes.
- ** Quomodo radius & cubitus in medio
dehiscant musculorum gratiâ, &
superius inferiusq; partibus coeant.



FIG. I.



FIGVRA I. grandiore iam
infancem proponit.

- A Os frontis in duas aequales partes di-
uisum, & ad nates usque excurrens.
B Ossis temporum pars squamosa, in
medio ossis, in ambitu membranacea.
C Maxilla inferioris separatio qua
per cartilaginem fit.
DD Cernicis vertebra.
E Sterni ossa cartilaginea.
F Ossis ilij extrema cartilaginea.
G Femoris caput molle & cartilagi-
neum.
H Trochanteres epiphyfes & molles.
I Patella in utroque genu tota carti-
laginea.

FIGVRA II. abortiui fœtus bime-
stris ossa tencilla, magisq; adhuc
quam pueri cartilaginosa ostēdit.FIGVRA III. fœtum triginta dierum
iam dearticulatum delineat, cuius
ossa omnia caeco concreto aut
butyro similia sunt.

- A Hiatus ille in suprema caluarie sede

partem illam ostēdit, quam vulgo
Fontanelam vocat, Arabes Zen-
dech, ubi antierius cerebrum maxi-
festè palpitare cernitur.

- bb Brachij extrema omnino cartila-
ginea.
cc Cubiti & radij epiphyfes molles &
ab ossibus fere separate, unde si ve-
luxari aliquando illas contingat.
dd Epiphyfes femoris & tibiae.
cc Pedij ossa omnino cartilaginea.

FIGVRA IIII. caluarie pueruli in-
terioriam partem indicat.FIGVRA V. externam caluarie
sedem ostendit.

- AA Occipitis os in quatuor partes di-
uisum.
BB Occipitis foramen amplissimum
medulle spinali dicatum.
CCC Os sphenoides quatuor partibus
distinctum.
DDD Alueoli maxillarum, in quibus
dentes etiam in puerulis in-
fixi sunt.





FIG I



TABVLA HÆC VENARVM ET ARTERIARVM
RIVOS OMNES EARVMQVE ORTVS ET
insertiones indicat.

FIGVRE I. explicatio.

- AAA Diaphragma septū transversum.
B Portio pericardij.
C Cordis à quo arteria omnes oriuntur
situs.
DDDD Quatuor pulmonis ale seu lobi.
E Aspera arteria.
F Pars hepatis gibba.
GG Pars hepatis caua.
H Vescula fellea.
QR Renes duo, dexter & sinister.
T Situs venæ caue inter septum trans-
uersum & cor.
VX Basis cordis.
Y Mucro cordis.
a Truncus venæ caue cordis dextro si-
nui hians patentissimo ostio.
b Auricula dextra cordis.
c Auricula sinistra.
d Truncus venæ arteriosæ.
e Rami arterie venosæ, & venæ arte-
riosæ.
f Truncus arteriæ magnæ.
g Ramus subclavius à magnâ arteria
ortum ducens.
i Maior portio & magis conspicua eius
rami in duos direpta, unde carotis.
kl Dextra & sinistra, his literis kl si-
gnificata.
m Arteria axillaris.
nn Nervi qui ad septum transversum fe-
runtur, unde eius & cerebri mira-
bilis consensus.
o Principium venæ sine pari.
pq Divisio venæ caue ascendens in ra-
mos duos insignes.
1 Iugularis interna.
2,2 Iugularis externa.
4 Divisio iugularis externa.
5 Venæ auricularis per tempora excur-
rens, in duos ramos dirempta.
6 Ramus venam frontis constituens.

- 9 Nervus recurrens sinister.
10 Rami venæ cephalicæ.
11 Venæ cephalicæ, humeraria.
12 Venæ basilicæ.
13 Cephalicæ diremptus.
14 Ramulus cephalicæ exiguus, qui deest
interdum.
15, 16, 16, Ramus cephalicæ medianam
constituens.
17 Basilicæ venæ per brachij excurrentes.
18, 19 Basilicæ diuaticatio.
20 Ramus basilicæ medianam constituens.
21 Venæ communis aut medianæ.
22, 23 Basilicæ profundior in duos ramos
dirempta.
24 Ramus medianæ qui ad parvū digiti
fertur, & saluætellâ facit, hæc nota
25 expressam.
26 Ramuli quidam arterie priores ra-
mos comitantes.
27 Ramuli per cutem excurrentes.
28 Quomodo cephalicæ & basilicæ per
totam manum variè diuaticantur.
1 Truncus venæ portæ.
2 Cysticæ gemellæ.
3 Meatus cholidocus.
4 Nervi & arterie hepatis.
5 Magna arteria.
6 Rami aortæ, qui ramos venæ portæ
ferè ubique comitantur.
7 Arteria mesenterij.
8 Venæ adiposa.
8, 9 Emulgentes seu renales due.
10, 10 Venæ spermaticæ, dextra à trunco
emergens, sinistra ab emulgente
ramo.
11, 11 Vasa urinaria, præterea ductus.
12 Arteria magna descendens.
q Ortus arteriarum spermaticarum.
13 Permissio arteriarum & venarum

spermaticarum.

- a *Vena & arteria lumbares.*
 b *Divisio vena & arterie.*
 c *Arterie sacre.*
 d *Ramus iliace.*
 e *Vena muscula.*
 g *Vena sacra.*
 h *Vena pudenda.*
 i *Vena hypogastrica.*
 n *Exortus arterie umbilicalis.*
 l *Ramus epigastricus.*
 mm *Vena saphena & eius rami.*
 n *Ischiatica minor.*
 o *Muscula externa.*
 p *Muscula interna.*
 r *Vena cruralis.*
 st *Poplitea vena & eius rami.*
 u* *Divisio.*
 yx *Rami duo externi ab ischiatica minore prodeuntes.*
 z *Ramus e vena crurali emergens.*
 3,4 *Vena suralis.*
 j *Ischiatica maior.*

FIGURA II. azvgon ostendit, sed tam videbis in sequenti tabula accuratius expressam.

FIG. III. consensum mammarum & vteri ostendit per epigastricam & mammariam venas.

- L *Ramus epigastricus ad umbilicum usque excurrans.*
 ab *Vena mammaria.*

FIG. IIII. explicatio.

- A *Truncus vena portae.*
 B *Arteria hepar ingrediens.*
 C *Arteria & nervus per vesiculam felleam distribuendi.*
 D *Vena cystica.*
 EF *Vena & arteria gastrica.*
 G *Ductus cholidocus in duodenum latus.*

- H *Vena & arteria gastrepiploica.*
 I *Ramus mesentericus.*
 K *Ramus splenicus.*
 L *Vena & arteria intestinalis.*
 M *Truncus vena portae.*
 N *Vena coronaria stomachi.*
 O *Epiplois dextra.*
 PQ *Epiplois postica.*
 R *Gastrica minor.*
 S *Splenicus rami rivuli per totum lienem spargendi.*
 T *Vas breue seu venosum.*
 V *Lien.*
 XX *Vena mesenterij.*
 2,2 *Arterij mesaraicæ.*
 Y *Vena hæmorrhoidales.*
 3,3,3 *Glandula mesenterij.*

FIG. v. explicatio.

- AA *Maior pars hepatis.*
 B *Vena umbilicalis.*

FIG. VI. testium vasa exprimit.

- AA *Testis.*
 9,9 *Membrana dartos testem inuoluens.*
 2 *Musculus cremaster.*
 3,4 *Reflexus vasis ejaculatorij.*
 5 *Testis sua propria membrana velatus.*
 6,7 *Epididymis.*
 8 *Quomodo spermatica vasa per peritonei productionem descendunt & ascendunt.*
 9 *Vasa spermatica ejaculatoria.*
 10 *Ramuli ex venis & arteriis spermaticis prodeuntes.*
 11 *Vena & arteria spermatica separata.*
 12 *Meatus urinarij.*
 13,14 *Quomodo ejaculatoria vasa ad parastatas ferantur & coeant.*

FIG. VII. explicatio.

- A *Umbilicus.*

- B *Vena umbilicalis.*
 C *Urachos à fundo vesicae pronatus, qui non in cornutis modo, ut Neoterici putant, reperitur, sed etiam in homine.*
 DD *Arteria duae umbilicales ab arteriis iliatis prodeuntes.*
 E *Vesica.*
 F *Meatus urinary.*
 G *Prostata.*
 H *Meatus semini & urinae communis, ourithram vocant.*

Explicatio FIG. VIII.

- A *Umbilicus.*
 B *Vena embrij nutritiva.*
 C *Urachos.*
 D *Arteria umbilicalis.*
 EE *Glandula prostata.*
 F *Meatus semini & urinae communis.*

- G *Musculus sphincter ianitoris vicengerens.*
 H *Mentula, membrum virile.*

FIG. IX. explicatio.


Exprimit Figura haec utrum & eius vascula solent describi ab omnibus habebis postea viua & germanam utrius imaginem.

- a *Fundum uteri.*
 b *Os uteri internum.*
 c *Collum uteri, seu cervix.*
 d *Orificium cervicis, in quo ductus urinae à vesica ducens conspicitur.*
 ee *Ramuli quamplures venarum & arteriarum pudendarum, quae ad collium uteri desinunt.*
 ff *Monticuli, in quorum medio fissura est rimam magnam efficiens.*

TABULA



FIG. I.



VIII



VII.



IX



VI



III



V



TABVLA HÆC VENARVM CAVÆ ET PORTÆ
RADICES EARVMQVE QVAMPLVRIMAS ANASTOMOSES
veteribus incognitas demonstrat.

FIGVRA prima radices venæ cauæ
& portæ per icur spatias &
coeuntes indicat.

AAAA Radices sunt insigniores venæ
cauæ.

B Truncus est venæ cauæ ascen-
dentis.

CC Truncus est venæ cauæ descen-
dentis.

DDD Radices venæ portæ.

EEEE Anastomoses radicum cauæ &
portæ; coeunt enim ambe
venę multis in locis, & san-
guis à cauâ in portam & ab
hac in illam liberè meat re-
meatque.

FIGVRA II. ascendentis cauæ ra-
mos & thoracicarum venarum
cum ramis quibusdam venæ azy-
gos communionem delineat.

a Truncus venę cauæ ascendentis.

b Azygos vena, id est, sine pari.

cc Rami subclauij.

dd Intercostales venæ superiores costas
nutrientes.

ccc Thoracica venæ thoracis anticos
musclos & mammai irrigantes.

ffff Ramuli thoracicarum cum ramulis
azygos coeuntes per anastomosis.

gg Axillaris ramus.

hh Vena basilica seu interna.

ii Humeraria, cephalica externa.

kk Mediana, quam Arabes nigram
vocat.

ll Ramulus azygos cum emulgentē com-
munionem habens.

FIGVRA III. venæ portæ ramos
omnes depingit.

Errauit in hac figura pingenda scul-
ptor; ramum enim splenicum
qui sinister est in dextris locauit.

A Caudex venæ portę ab hepate ex-
liens.

BBB Radices venæ portę per hepatis car-
nem sparse.

CC Cystica gemelle.

D Gastrica venæ ventriculi orificium
accedens.

E Diuisio venæ portæ in duos insignes
ramos, splenicū & mesentericum.

F Splenicus ramus sinister & elatior.

G Mesentericus ramus dexter & am-
plior.

H Coronaria stomachica ventriculi os-
cingens.

II Rami splenici ad lienem accedentis
diuarcatio.

LL Hæmorrhoidalis ramus hæmorrhoi-
das internas excitans.

MM Reliqui mesenterij rami penè inu-
meri.

Exiguos omnes ramos hic notare
nullius esset vfus, satius erit in ca-
daveribus illos obseruare.


FIG. III.



FIG. I.



FIG. II.



FIGVRA I. anteriores venas
delineat.

- aa *Vena est frontem perreptans.*
 bb *Ramuli iugularis vena ad buccas
& nasum pertingentes.*
 cc *Vena tempora & occipitium irri-
gantes.*
 dd *Iugularis externa.*
 ee *Humeraria seu cephalica & exter-
na per brachij externam partem
delata.*
 ff *Basilica seu interna.*
 gg *Mediana ex ramis basilice & ce-
phalice simul coeuntibus conflata.*
 hh *Ramuli à thoracis venis ad mam-
mas delati.*
 i *Rami ab epigastrico prodeuntes.*

- kkk *Vena cruralis ad inguina & crura
descendentis rivi externi.*
 ll *Cruralis vena per interiorem femo-
ris partem excurrent.*
 mm *Tibia vena interior.*
 nn *Tibia vena exterior per externas
partes diuaticata.*
 oo *Vena malleoli saphena dicta.*


FIGVRA II. externas postici cor-
poris venas ostendit.

- 1 *Vena est puppis.*
 2 *Rami sunt è iugulari externa ad dor-
sum propagati.*
 3 *Vena saluatella sub minimo digito.*
 4 *Vena est que sub pollice secatur.*
 55 *Vena poplitis.*



FIG. II.

FIG. I.



TABVLA HÆC NERVOS A CEREBRI
MEDVLLA PRODEVNTES EXPLICAT.

FIGVRA I. explicatio.

- AAA Superficies cerebri.
B Cerebellum.
C Processus mammillares.
E Portio spinalis medulle.
F Organum odoratus.
G Nervus opticus.
I Tunica reticularis.
K Secunda coniugatio oculos mouens.
L Ramulus tertij paris.
M Nervus gustatorius.
N Ramus tertij paris qui ad frontem fertur.
O Rami alij tertij paris.
PP Tunica interna narium.
Q Alij rami eiusdem paris.
R Ramus tertij paris ad os desinens.
S Ramus tertij paris ad dentes molares inferius.
TV Ramus alius.
XX Rami qui ad dentes feruntur.
Y Ramus tertij paris in linguam inferius.
Z Quarta coniugatio.
a Quintum par auditorium.
bcd Ramus quinti paris ad musculos maxillares delatus.
ce Sexta coniugatio.
fg Rami in musculos colli diffeminati.
h Nervus costalis.
** Δ Δ Nervus septima coniugationis.
ii Nervus intercostalis à spina prodiēs.
k Nervus stomachicus.
lm Nervus recurrens dexter.
nop Nervus recurrens sinister.
q Rami qui ad pulmonem feruntur.
r Rami ad pericardium desinentes.
stu Rami stomachici diuicatio.
xy Rami ad epiploon vesiculam felicem delati.

1.2.3.4.5.6. Rami hi omnes ad partes fore
7.8.9.10. omnes ventris inferioris distribuuntur.


FIGVRA II.

- AA Cerebri exterior pars.
B Cerebellum.
C Processus medullares.
DE Medulla spinalis exortus.
F Organa odoratus.
G Nervus optici.
1.2.3. Tria foramina.
H Coitus opticorum.
I Tunica retiformis.
K Secunda coniugatio.
LM Tertium par.
abcd Quinta coniugatio & eius rami.
c Sexta coniugatio.
f Septima coniugatio.

FIGVRA III. nervos recurrentes ostendit.

- A Orificium arteria magna cum coronariis duabus.
B Truncus aortae descendens.
C Arteria subclavia sinistra.
D Truncus arteriae magne ascendens.
E Arteria subclavia dextra.
FG Arteriae carotides.
HIK Rami arteriae asperae.
L Larynx.
M Glandula laryngis.
NO Nervus sexta coniugationis.
PQQ Reflexio nervi recurrentis dextri sub arteria subclavia.
RSS Reflexus nervi sinistri in truncum arteriae magne.

II.



III.





FIG. 1.



FIGVRA hæc nervos omnes delineat; præsertim qui à sacra medulla scaturiunt.

A Locus spinalis medulle.

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. &c.

Vertebrae sunt spinalis medulle.

G Distributio rami posterioris à primo nervorum pari cervicis.

HIL Distributio rami anterioris eiusdem coniugij.

MN Ramus secundæ coniugationis, & eius distributio.

O Ramus posterior tertij paræ.

P Ramus anterior tertij paræ.

VXY Ramuli omnes quarti paræ.

5 Quintum par.

cdef Rami anteriores, & posteriores

ghi quintæ coniugationis.

6 Sextum par.

nnoo Nervi diaphragmatis.

7 Septimum par.

8 Primum par dorsi.

9 Secundum par dorsi.

10. 11. 12. 13. Decem nervorū paria ex tho-

14. 15. 16. 17. racis spina prodeuntia.

12. 3. 4. Sex paria nervorum quæ per brachium distribuuntur.

5. 6. Δ * Divisio nervorum brachij.

10. 11. 12. Quinque nervorum paria à lumbari medulla prodeuntia.

13. 14. 15. 16. 17. Sex nervorum paria ab ossibus prodeuntia.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

14 Primus nervus in femur fertur.

15 Ramulus primi paræ femoris in cutem discriminatus.

16 Ramulus primi paræ in musculos distribuendus.

17 Secundum par femoris.

18 Ramulus superficialis secundi paræ.

K Ramulus profundior secundi paræ.

19 Tertium par nervorum femoris.

20 Ramulus tertij paræ in musculum tricipitem delatus.


21 Quartum par omnium crassissimum.

22. 23. 24. Hæc omnia ramulos quatuor paræ delineant; & quomodo in musculos omnes, & partes pedis variè diuisentur.

25. 26. 27. 28.

TABVLA





TABVLA HÆC VERAM SPINALIS MEDVLLÆ
ET NERVORVM AB EA PRODEVTIVM
cōfigiem exprimit.

FIGVRA I. integram medullam suis
membranis vclatam ostendit.

A *Portio spinalis medulla quæ cranio
tegitur.*

BBB *Spinalis medulla extra caluariam
prodiens, vertebris circumualla-
ta & duabus membranis crassa
& tenui vestita.*

C *Quomodo latior sit medulla & am-
plior in ceruice.*

DDD *Quomodo sensim attenuetur in
dorso.*

EE *Quomodo latior sit circa lumborum
regionem.*

F *Quomodo tenuissima sit circa finem
ossis sacri.*

G *Nervi geniculatim prodeuntes.*

sola vestitam; venulas item & ar-
teriolas, & quomodo nervi ab an-
tica & postica parte aequaliter
prodeant.

aa *Tenuis membrana.*

bb *Venula & arteriole per membra-
nas excurrentes.*

ccc *Nervi quomodo exeant.*

FIGVRA II. denudatam omnino
medullam eiusque anticam fa-
ciem delineat.

FIGVRA III. medullam in aquam
iniectam ostendit, & quomodo
nervi omnes in capillamenta ab-
eant, caudamque equinam refe-
rant.

FIGVRA II. medullam crassa mem-
brana denudatam ostēdit, & tenui



Fig. I

Fig. II

Fig. III



FIGVRA I.


| | |
|---------|--|
| A | Glandula sub auribus sita. |
| B | Musculus maxillam aperiens. |
| C | Musculus sternohyoideus. |
| D | Musculus coracoideus. |
| F | Musculus caput flectens mastoideus dictus. |
| G | Portio trapezj. |
| H | Cavitas circa ingulum. |
| I | Claus. |
| K | Musculus deltoideus. |
| L | Pectoralis musculus. |
| M | Sternum. |
| OOO | Serratus maior. |
| PP | Ortus obliqui externi aut descendentes epigastrij. |
| Q | Musculus biceps. |
| R | Caput unum bicipitis. |
| SS | Brachii musculus. |
| T | Musculi longi brachium extendentis portio. |
| V | Rotundus musculus radij pronator. |
| XX | Carpi flexor superior. |
| Y | Palmaris. |
| Z | Carpi flexor inferior. |
| aa | Musculus longus radij supinator. |
| bb | Extensor superior carpi. |
| ccd | Pollicis tensor. |
| e | Tendo musculi indicem extendentis. |
| h | Musculus medius pollicem abducentis. |
| 3 4 5 6 | Annulus carpi. |
| i | Tenar. |
| * | Hypotenar. |
| k | Productio peritonei. |
| l | Glandule inguinales. |
| m | Musculus triceps. |

| | |
|-------|---|
| o | Sutorius. |
| p | Gracilis. |
| q | Membranosus fascia lata. |
| Δ | Portio musculi natium authoris. |
| r | Vastus externus. |
| s | Rectus gracilis. |
| t | Vastus internus. |
| u | Biceps. |
| xy | Tibia denudata carne. |
| z | Tibiens anticus. |
| 2 | Gemellus externus. |
| 3 | Peroneus. |
| 4 5 | Digitum tensor. |
| 7 | Malleolus externus. |
| 8 | Annulus pedij. |
| 9 | Abductor digitorum. |
| 10 | Gemellus internus. |
| 11 | Tendo plantaris musculi. |
| 12 13 | Solaris portio. |
| 14 | Tibiei postici portio. |
| 15 | Ligamentum a tibiae osse in talum desinens. |
| 16 | Musculus tenari respondens. |

FIGVRA II. diaphragma delineat.

| | |
|------|--|
| A | Diaphragmatis corpus. |
| B | Foramen vene caue. |
| C | Foramen oesophagi. |
| D | Quomodo arteria magna feratur inter duas diaphragmatis non perforati partes. |
| **** | Pars carnea diaphragmatis. |
| EF | Vincula duo quibus alligatur diaphragma vertebri lumborum. |
| GH | Extrema horum vinculorum. |

Fig. 1.



FIGVRÆ I. explicatio.

| | |
|----|--|
| I | <i>Musculus frontis.</i> |
| 2 | <i>Musculi duo palpebram claudentes.</i> |
| 4 | <i>Musculi labia mouentes sursum.</i> |
| A | <i>Temporalis musculus.</i> |
| B | <i>Zygomatis os.</i> |
| C | <i>Masseter musculus, masticatorius.</i> |
| D | <i>Buccinator.</i> |
| E | <i>Musculus ossis hioidis.</i> |
| F | <i>Sternoides.</i> |
| G | <i>Bronchius musculus laryngis.</i> |
| H | <i>Coracoides.</i> |
| I | <i>Mastoides.</i> |
| K | <i>Superior pars trapezij.</i> |
| L | <i>Inferior pars trapezij.</i> |
| M | <i>Deltoides.</i> |
| NN | <i>Brachicus.</i> |
| Z* | <i>Biceps.</i> |
| OP | <i>Extensores cubiti.</i> |
| Q | <i>Coitus duorum musculorum.</i> |
| R | <i>Quomodo musculi hi desinant in olecranonum.</i> |
| SS | <i>Musculus longus radij.</i> |
| TT | <i>Extensor superior carpi.</i> |
| V | <i>Digitum 1. flexor.</i> |
| YX | <i>Extensor inferior carpi.</i> |
| Z | <i>Flexor inferior carpi.</i> |
| a | <i>Palmaris.</i> |
| bc | <i>Pollicis tensores.</i> |
| de | <i>Musculus medius.</i> |
| f | <i>Rotundus radij.</i> |
| g | <i>Flexor superior carpi</i> |
| i | <i>Infraspinatus.</i> |

| | |
|-------|--|
| lm | <i>Latissimus brachij deorsum mouens.</i> |
| ooo | <i>Serratus maior.</i> |
| pp | <i>Obliquus descendens abdominis.</i> |
| Δ | <i>Pectoralis.</i> |
| q | <i>Sutorius.</i> |
| r | <i>Membranosus.</i> |
| s | <i>Rectus tibiae.</i> |
| t | <i>Vastus externus.</i> |
| u | <i>Magnus natium author.</i> |
| x | <i>Trochanter magnus.</i> |
| y | <i>Alter natium author.</i> |
| z | <i>Triceps.</i> |
| 5 | <i>Seminervosus.</i> |
| 6,6 | <i>Semimembranosus.</i> |
| * | <i>Gracilis.</i> |
| 7 | <i>Biceps tibiae.</i> |
| 8 | <i>Sutorius.</i> |
| 9 | <i>Vastus internus.</i> |
| 10 | <i>Gemellus externus.</i> |
| 12 | <i>Gemellus internus.</i> |
| 13 | <i>Ossis tibiae carne nudatum.</i> |
| 14 | <i>Solaris musculus.</i> |
| 15 | <i>Profundus.</i> |
| 16 | <i>Tendo gemellorum.</i> |
| 17 | <i>Peroneus.</i> |
| 19 | <i>Tensor digitorum.</i> |
| 20 | <i>Ligamentum tarfi.</i> |
| 21 | <i>Malleolus internus.</i> |
| 22 | <i>Ligamentum utrique ossi tibiae commune.</i> |
| 23 | <i>Malleolus externus.</i> |
| 25.26 | <i>Hypotenar.</i> |






FIGURA I.

- A Foramen exiguum in osse frontis.
 B Musculus temporalis.
 C Portio zygomatic.
 D Masseter musculus.
 E Foramen in maxilla inferiore conspicuum.
 F Buccinator musculus.
 G Labiorum caro rara.
 HI Digastricus musculus.
 L Os ioides musculus denudatum.
 M Musculi laterales lingue.
 N Cartilago scutiformis.
 O Musculus delitescens.
 P Bronchius.
 Q Anterior pars arteria aspera.
 RS Coracoides digastricus.
 T Complexus musculus capitis.
 V Levatores proprii scapulae.
 X Scalenus.
 Y Clavis.
 Z Deltoides.
 a Acromion.
 b Coracoides.
 cdef Ligamenta brachij & omoplata.
 g Sternon.
 h Prima thoracis costa.
 I Serratus minor.
 ikl Serrati circumscriptione.
 m Serratus maior.
 ΔΔ Recti abdominis musculi.
 opquu Contiguitas & aponeuroses horum musculorum.
 fx Aponeuroses transversus musculi.
 y Transversus musculus.
 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Hæc omnia iam descripta fuere.
 40 Profundus musculus.
 41 Sublimis.

- 12, 12 Productiones peritonei.
 14 Obliquus ascendens abdomini.
 17 Trochanter magnus.
 25 Vastus externus.
 29 Iliacus musculus.
 21 Lumbaris musculus.
 12 Triceps.
 23, 24 Crureus.
 26 Vastus externus.
 27 Rectus.
 28 Gracilis.
 29 Peroneus.
 30 Tensor pollicis.
 31 Os tibiae.
 33 Peroneus.
 34 Abductor digitorum.
 35 Extensor digitorum.

FIGURA II.

- AB Ligamenta duo penis.
 CC Principium ligamentorum.
 D Caput penis.
 E Sphincter.
 F Prostate.
 G Corpus vesicæ.
 HH Portio vasorum semen deferentium.
 II Vasa urinaria in vesicâ desinentia.

FIGURA III.

- 1, 2 Duo nervi canis.
 3 Vasa penis.
 4 Caput penis denudatum.
 5 Meatus semini & urina communis.
 6, 7 Substantia spongiosa & nigricans.
 8 Vnio vinculorum penem constituentium.

FIG. 1.



FIGVRA I.

| | |
|---------------|--|
| A | Temporalis musculus. |
| B | Zygoma. |
| C | Masseter musculus. |
| D | Mastoidens. |
| Δ E F G H I K | Trapezius. |
| L | Deltoidens. |
| M | Rotundus maior. |
| N | Depressor brachij. |
| O | Latissimus. |
| P | Portio obliqui descendens. |
| Q | Portio bicipitis. |
| R | Portio brachici. |
| S | Brevis cubitum extendens. |
| T | Longus extendens. |
| V | Extensoris cubiti. |
| X | Rotundi supinatoris portio. |
| Y | Extensor superior carpi. |
| Z a | Digitum tensor. |
| bf | Eius diuisio in multos tendines. |
| ce | Extensores pollicis. |
| g | Musculus medius. |
| h | Eius tendines. |
| 6 | Magnus natium author. |
| iklm | Eius ortus insertioque. |
| o | Minimus. |
| p | Principiū carnosum musculi membranos. |
| q | Membrana eius musculi, fasciam latam vocant. |
| r | Portio vasti externi. |
| f | Biceps tibiae. |
| tt | Seminervosus. |
| u | Semimembranosus. |

| | |
|------------|--|
| x | Portio tricipitis. |
| y | Gracilis. |
| 7 | Rectus. |
| 8 | Sutorius. |
| 9 | Crureus. |
| 10 | Poples. |
| 11, 12, 13 | Gemelli duo. |
| 14, 15 | Peroneus. |
| 16 | Malleolus externus. |
| 17 | Hypotenar. |
| 18 | Malleolus internus. |
| 19 | Tendines musculorum tarsum flexentium. |

FIGVRA II.

| | |
|----|--|
| H | Caput ossis brachij. |
| II | Quartus nervus. |
| K | Principium musculi brevis. |
| | Principium longi musculi. |
| M | Locus quarti nervi. |
| N | Finis musculorum cubitum extendentium. |
| O | Olecranium. |
| P | Diuisio nervi olecranium versus. |
| Q | Portio brachici. |
| R | Portio longi. |
| S | Extensor superior carpi. |
| T | Extensor inferior carpi. |
| V | Flexor inferior carpi. |
| XY | Digitum tensor. |
| Z | Flexor superior carpi. |
| a | Extensor pollicis. |



FIG. 1.




FIGURA I.

- A Splenicus musculus.
 BB Complexi duo.
 C Levatores omoplate.
 D Clavis.
 E Serratus posticus superior.
 F Rhomboides musculus.
 GHK Ortus & insertio Rhomboides.
 L Rotundus minor.
 M Spina omoplate.
 * Deltoides.
 NOP Ortus & insertio deltoides.
 Q Infra-spinatus.
 R Depressor brachij.
 2,4 Latissimus.
 STV Ortus latissimi & eius connexio cum basi scapula.
 X Latissimi cum ilium osse connexio.
 Z Portio obliqui descendens abdominis.
 a Longus cubitum extendens.
 b Brevis.
 cd Bicipitis portio.
 e Rotundus radij.
 f Extensor superior carpi.
 g Ligamentum cubiti.
 hh Os cubiti.
 i Flexor inferior carpi.
 kl Brevis radij.
 m Tendo longi musculi.
 n Tendo lateralis musculi pollicis.

- 6 Abductor superior digitorum indicis & medij.
 q Extensor inferior carpi.
 rs Digitum tensor multiplex.
 7,8 Medius natium author.
 6,0 Ligamenta ossis sacri.
 10 Musculus gemellus.
 11 Trochanter magnus.
 12 Obturator internus.
 13 Nervus crassissimus.
 14,15 Semitendinosus musculus.
 Vastus externus.
 17,17 In altero crure videbis maximum natium authorem.
 18 Biceps.
 19 Nervus magni divisio.
 20 Gracilis musculus.
 21 Portio tricipitis.

FIGURA II.

- I Apophysis mastoidea.
 2,4 Quatuor parvi musculi obliqui.
 3,3 Duo recti.

FIGURA III.

- 1 Spina secunda vertebrae cervicis.
 2 Apophysis transversa primae vertebrae colli.
 3 Apophysis mastoidea.
 4,5 Duo parvi musculi recti.



FIG. 1.




FIGURA I.

- AA Splenicus sinister.
 BB Complexus.
 C Levator scapulae.
 D Clavis.
 E Coracoidens.
 F Serratus posticus superior.
 G Rotundus maior brachij.
 HK Infra-spinatus ortus & insertio.
 L Rotundus minor.
 MNOP Deltoideus ortus & insertio.
 Q Sacrolumbus.
 R Semi-spinatus.
 S Sacer.
 T Costa.
 V Intercostales externi.
 X Serrati magni portio.
 Δ Serratus posticus inferior.
 ab Obliquus descendens & eius insertio.
 c Latissimus.
 deg h i k l m n o p q t u Sunt reliqui
 manus & carpi musculi iam ex-
 plicati.
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. Sunt
 cruris tibiae & pedis musculi in
 superiore tabula descripti.

FIGURA II.

- A Ortus musculi deltoidei à clavi.
 B Portio scapulam tegens.
 C Ortus eiusdem musculi à spina omo-
 plata.
 D Insertio eius musculi.

FIGURA III.

- A Os sacrum.
 B Locus articulationis ischij.
 C Ligamentum os sacrum ischio alli-
 gans.

D Pars dextra ossis pubis.

E Locus quarti nervi.

FGH Obturator internus.

I Iliacus.

K Lumbaris, psoas.

LM Sutorius.

* Gracilis.

P Rectus.

Q Vastus internus.

R Semineruosus.

ST Triceps.

V Semimembranosus.

 abcdefg Gemellos, solarem tibi-
 cum flexores digitorum ostendit.

FIGURA IIII.

A Os femoris.

B Caput.

CD Condyl.

E Os tibiae.

FGHIK Partes tibiae in sculto descri-
 ptas indicat.

LM Solaris musculus.

N Tendo gemellorum.

O Vinculum femur ischio alligans.

PP Vincula eam articulationem cin-
 gentia.QR Vincula magni & parvi trochan-
 teris.S Vinculum articulationis genu com-
 mune.

T Vinculum proprium.


XYZ Vincula tibiae.

a Vinculum tibiæ perone alligans.

bc Ligamentum annulare.

dc Ligamenta tibiæ calcaneo ali-
 gantia.fg Ligamenta tibiæ astragalo ne-
 centia.

Fig. 1



IN TABVLA HAC DEPICTAS INVENIES FERE
OMNES NVTRITIONI DICATAS PARTES.

Explicatio primæ Figuræ.

- AAAA Peritoneū in tres partes sectum.
B Hepatis ligamentum præcipuum.
CD Pars gibba hepatis.
EE Anterior ventriculi pars denudata.
FG Vene, arterie & nervi in partem ventriculi inferiorē distributæ.
H Linea quæ epiploī dicitur principiū.
IIII Epiploon, omentū, zīrbus adipinus.
K Vena umbilicalis.
L Umbilicus à peritoneo separatus.
MM Ramuli per epiploon sparsi.
NO Arteria duæ umbilicales.
P Vrachos.
Q Vesicæ fundum.
R Connexio peritonei & vesicæ.

FIGVRA II.

- A Scissura hepatis, in quam umbilicalis vena se condit.
BB Portio peritonei.
C Fundum vesiculæ felleæ.
D Pars in quâ vena umbilicalis fertur.
E Portio gibbe hepatis partis.
F Nervus hepatis.
G Pars caua hepatis.
H Sinus œsophago cedens.
I Vinculum hepar diaphragmati al-
ligans.
KK Stomachus.
L Orificium inferius.
M Orificium superius.
N Renis sinistri situs.
O Truncus venæ portæ.
P Pancreas.
Q Arteria hepatis.
R Intestinum duodenum.
STV Mesenterium.
YY Vreteres meatus.
Z Vena & arteria spermatica.
X Vasa ejaculatoria.

FIGVRA III.

- AAA Prima ventriculi tunica, com-
munis dicta.

- B Membrana propria vetriculi prur.
C Altera membrana propria.

FIGVRA IIII.

- AA Superior pars œsophagi.
BB Oesophagus arterie magnæ cedens.
CD Portio diaphragma permeans.
EE Glandule duæ.
FF Glandosum quoddam corpus.
GG Orificium superius ventriculi.
HH Orificium inferius.
I Pars superior ventriculi.
KK Fundum ventriculi.
LL Anterior pars ventriculi.
MNO Pars posterior.
P Duodenum intestinum.
Q Meatus cholidocus.
R Duodenum sectum.
S Pancreas intestino herens.
TV Nervi stomachici.
Y Ramus sinister nervi stomachici.
1 Vena & arteria gastrica.
2 Gastrica minor.
3 Gastricæ epiploicæ.
4,5 Coronaria stomachica.
6,7 Rami à splenitico orti.


FIGVRA V. hepar ostendit.

- AA Superior pars gibbe hepatis.
BB Inferior pars gibbe hepatis.
C Locus venæ cauæ diaphragma per-
DE Truncus venæ cauæ. (meantis.
FG Vincula hepatis.
H Venæ portæ.
I Cavitas orificiū vetriculi excipiens.

FIGVRA VI. lienem delineat.

- A Pars sinistra lienis.
BB Portio epiploī lienis venas sustentans.
CC Altera epiploī portio.
D Superior pars lienis.
E Pars inferior.
FG Partes dextra & sinistra.
H Linea quæ in liene apparet.
IK Pars caua lienis.
LL Pars gibba.

FIG. I



III



III



III



V



VI



VI



VI



FIGVRÆ I. explicatio.

- AA Portio peritonæi.
 B Præcipuum hepatis ligamentum.
 CC Pars gibba hepatis.
 DD Pars caua.
 E Ligamentum dextrum.
 F Vena porta.
 G Truncus vena caue.
 H Truncus arteria magna.
 I Vena adiposa.
 K Rami arterie magnæ.
 M Vena & arteria emulgentes.
 NO Vena & arteria spermatica.
 PP Membrana renis.
 QQ Renes.
 RSTT Vena spermatica sinistra, &
 venarum cum arteriis conexio.
 VV Arteria spermatica.
 XX Vasa eiacularia.
 YY Meatus vrinarij.
 1 Vesica urina receptaculum.
 2 Prostata in collo vesicæ sita.
 3 Musculus sphincter.
 4 Vena pudenda.
 5,5 Ligamenta caua penis.
 6,7 Due testium tunice.
 8,8 Parastate.
 9 Quomodo excant vasa eiacularia.
 10 Parastate testibus hærentes.

FIGVRÆ II. explicatio.

- ABCDE Hæc omnia iam descripta
 FGH, &c. frueret; delineant enim hepa-
 tis partes, ramos vena por-
 ta & similia.
 4 Quomodo vena caua arterie ma-
 gnæ cedat.
 5 Arteria lumbaris & muscula.
 6 Intestinum rectum discissum.
 7 Vasa eiacularia.
 8 Vesica.
 10 Productio peritonei.
 11 Membrana mentulam operiens.
 12 Membrana erythroides dicta.
 13 Scrotum.

FIGVRA III.

- AA Truncus descendens aorte.
 BB Truncus descendens vena caue.
 CD Vena & arteria emulgentes.
 EF Renes ambo.
 GGG Vasa vrinaria.
 HH Vena spermatica dextra à trunco
 aorta.
 II Vena spermatica sinistra.
 K Arteriarum emulgentium origo.
 M Vesica dissecta.
 NN Insertio vireterum.
 O Meatus semini & vrinæ communis.
 Q Musculus sphincter.
 R Vasa spermatica præparantia.
 S Vasa eiacularia.
 T Insertio vasorum præparantium.
 VXY Caput testis.
 1,1 Membrum virile.
 2 Meatus communis.
 3,3 Duo nervi caui.

FIGVRA IIII.

- AB Pars dextra testis.
 CC Vena & arterie spermaticæ dissectæ.
 D Quomodo vena & arteria coeant.
 EE Unde oriuntur eiacularia vasa.
 FG Caput testis.
 HI Caput testis diuisum.
 LM Testis ab epididymide separatus.
 N Unio vena & arteria.
 O Vasa testium.
 P Testis suis membranis tectus.
 QR Testis membrana denudatus.
 TV Corpus testis dissectum.

FIGVRA V.

- 1,1 Membrana renis in cavitate interna.
 2 Foramen per quod vrinæ in vire-
 rem defluit.
 3,3,3 Extrema venarum in renis carnem
 desinentium.
 4 Posterior pars.
 5 Anterior pars.
 6 Vreter.

11.





FIG. 1.



111.



1111.



V



111.



TABVLA HÆC CÆTERAS PARTES IN VENTRE
INFERIORE CONTENTAS DELINEAT.

FIGVRA I.

- ABCD Pars interior peritonci.
EE Portio mesenterij.
FG Membrana mesenterij.
HI Portio mesenterij colon alligans.
K Intestinum rectum.
L Fundum uteri.
MN Testes muliebres.
OO Membrana peritonci uterum alligantes.
P Villi carnosus musciculum uterinum formantes.
RS Pars anterior cervicis uteri.
T Vesica super uterum sita.
V Umbilicus a peritoneo separatus.
X Portio vene umbilicalis.
Y Drachus.
Z* Arteria umbilicales.

FIGVRA II.

- AB Vena mammaria externa.
C Corpus mammarum.
DD Glandule in mammis sitæ.
EFGH Peritoneum.
IK Vene mammaria interna.
L Pars gibba hepatis.
MN Pars caua.
O Truncus vene portæ.
P Vena caua descendens.
Q Arteria magna descendens.
R Arteria in ventrem inuicem diuiscata.
ST Vene adiposæ.
VV Vene & arteria emulgentes.
YZ Renes.
aa Meatus urinaris sectus.
bc Meatus urinaris dexter.
dc Vene spermaticæ.
fg Arterie spermaticæ.
ik Corpus uteri.
l Os uteri.
op Connexio venarum & arteriarum spermaticarum.

- q Vasa testem peritoneo connectentia.
rrt Testes.
ss Principium vasis ejaculatorij.
x,x Collum uteri.
y Vene & arteria hypogastrica.
4 Vreteres vesicæ ingredientes.
6 Labia uteri.
7 Collum vesicæ uteri cervici annexum.
8 Epigastrica vene ramuli.
9 Sphincter vesicæ.

FIGVRA III.

- AA BB Cavitas uteri.
CD Linea uteri cavitatem discindens.
EEE Crassities uterini fundi.
FF Fundum uteri.
GG Os uteri internum.
HH Membrana uteri a peritoneo orta.
II Membrana uterum alligantes.
L Portio cervicis vesicæ quæ in cervicem uteri desinit.
MM Collum uteri.

FIGVRA IIII.

- A Pars anterior uterini fundi.
B Collum.
CD Pars interior uteri balanofere similis.
EE Membrana uterum alligantes.
F Testiculus sinister.
G Vene & arteria spermatica.
H Vterus.
K Vasa ejaculatoria.
L Vesica capacitæ.
M Duo foramina.
N Vreteres meatus.

FIGVRA V. uterum delineat; sed cum videbis accuratius expressum in sequenti tabella.

III.



III.






Fig. 1.



II



V



TABVLA HÆC VTERVM GRAVIDÆ MVLIERIS
ET EMBRYI SITVM OSTENDIT.

FIGVRÆ I. explicatio.

- ABC Peritoneum in quatuor partes di-
uisum.
EE Portio hepatis conspicua.
FF Ventriculus.
GH Coli intestini reflexio.
IK Membrana aut vincula quibus al-
ligatur uterus.
L Pars uteri gravidati anterior, in
qua fœtus continetur ad umbili-
cum usque ascendens.
OO Membrana à peritoneo exorta to-
tum uterum vestientes.
Q Principium uterini fundi.
R Sedes vesicæ.
S Vrachos.
TT Arterie umbilicales ab iliacis pro-
deuntes.
V Umbilicus.
X Vena umbilicalis.

FIGVRÆ II.

- ABCD Corpus uteri & pars eius po-
stica in quatuor partes dis-
secta.
EEE Inferior pars uteri, in qua vena-
rum oscula apparent.
G Collum uteri.
H Vena pudenda.

FIGVRÆ III.

- III Secundine extra uterum.
KK Membrana chorion dicta fœtum
omni ex parte ambiens, in qua ve-
narum apparent myriades et
arteriarum.

FIGVRÆ IIII.

- LMNO Membrana amnios dicta fœ-
tum inuolvens immediate, quæ
vrinæ & sudoris receptacu-
lum est, nam allantoidem ab
omnibus fere descripiam in
humano fœtu non agnosci-
mus.
* Vasa umbilicum constituentia.

FIGVRÆ V.

- PQ Prima membrana fœtum inuoluent.
R Portio uterini iecoris aut carnis
placente.
SSS Vena interna & externe.
T Quomodo vasa omnia circa umbi-
licum coeant.
VY Pars externa membranae amnios.
XX Pars interna eiusdem membranae.



Fig. I.



II



III



III



V



**HIC VASA SPERMATICA MULIERVM
A NEMINE ADHVC DESCRIPTA VIDEBIS.**

FIGVRA I. secundinas delineat.
AAAA Caro placēta aut vterinum icur recentiorum; ego vasis firmandis & stabiliedis potius dicatum esse, quam excoquendo sanguini, existimo.

FIGVRA II chorion & amnion tunicam exprimit.

BBB Membrana chorion dicta vasorum omnium fetus sustentaculum.

CCC Venarum & arteriarum umbilicalium rami per chorion sparsi.

DDD Vasa umbilici in vnum coeuntia.

EEE Membrana amnios dicta, sudoris & vrinae receptaculum. Nam allantoidem in homine nō agnoscimus, licet ourachos reperiatur.

FIGVRA III. foetum quatuordecim dierum, in quo partes omnes delineatae sunt, ostendit.

FF Fetus quatuordecim dierum in quo membra omnia discreta apparent.

GG Vasa quatuor umbilici in vnum coeuntia.

HH Quomodo umbilici vasa se sim crassiora euadant, ut unicum hoc dubitandi occasione quibusdam pre-

bueris, an ea ab utero oriantur.

III Quomodo vena & arteris umbilicales per chorion infinitis ramis diuariantur.

KKKK Amnios membrana, in qua vrinae & sudores colliguntur, quibus innatat fetus & sedet innocentem tanquam in balneo.

FIGVRA IIII. vteri vasa spermatica eis culatoria scilicet & corū diuicationem a nemine descriptam, delineat.

LL Vteri corpus.

M Cervix vteri.

N Vesicae cervix in collū vteri desinē.

OO Testes muliebres.


PP Vasa spermatica praeparantia.

QQ Vasa deferentia seu eiaculatoria.


RR Quomodo vasa eiaculatoria in duos ramos diuiduntur, eorum alter ad latera vteri, cornua appellabāt veteres, fertur; alter ad vteri cervicem fertur.

SS Ductus a nobis observatus qui in cervicem vteri fertur, non autem vteri fundum ingreditur, quo grauidae semen eiaculantur.

FIG. I.





II.



III.

III.



TABVLA HÆC ORGANA FERE OMNIA VITALIA
IN MÈDIO VENTRE SEV THORACE CONTENTA OSTENDIT.

FIGVRA I. explicatio.

- AA *Extrema partes cartilagineum.*
BB *Musculi intercartilaginei.*
CC *Costa à cartilaginibus seunctæ.*
DE *Claves denudatæ.*
F *Vasæ axillaria.*
G *Jugularis externa.*
HH *Mediastinum.*
II *Superficies diaphragmatis.*
K *Quomodo mediastinū diaphragmati alligatur.*
L *Mucro cordis.*
MNOPQ *Vena quæ secundū latus sinistrum fertur.*
RSTV *Pulmonis pars thoracem sinistrum occupans.*

FIGVRA II.

- AAA *Interior pars sterni.*
BC *Vena mammaria.*
DE *Arteria mammaria.*
F *Thymus.*
G *Portio mediastini ad sinistrum inclinans.*
HI *Portio dextra mediastini.*
KLL *Cavitas inter duas mediastini tunicas.*
MM *Situs basis cordis.*
NO *Pulmo sinister.*
PQ *Pulmo dexter.*
RTV *Cutis thoracis.*
SS *Portio diaphragmatis à xiphoidæ separata.*

FIGVRA III.

- A *Vena caua & arteria magna.*
B *Ortus pericardij.*
CDE *Basis cordis.*
F *Mucro cordis.*
G *Hæc parte pericardium diaphragmati hæret.*
H *Portio diaphragmatis.*
II *Nervi diaphragmatis.*
MNO *Lobi pulmonum.*

FIGVR. IIII. pericardiū & cor denudatum ostendit, valæque omnia.

FIGVRA V. pulmones & cordis dextram partem delineat.

- A *Pars dextra cordis.*
B *Auricula dextra.*
C *Quomodo vena caua adaperitur cordi.*
DE *Vena caua diaphragma permeans.*
F *Vena caua ascendens.*
H *Truncus aortæ.*
K *Nervus sextæ coniugationis.*
LMNO *Lobi pulmonis.*
P *Vasæ pulmonum.*

FIGVRA VI. sinistram cordis partem exprimit.

- ABC *Pars sinistra cordis.*
DEE *Vasæ cor nutritia.*
F *Auricula sinistra.*
GH *Arteria venosa & eius rami.*
I *Principium venæ arteriosæ.*
KL *Pulmo sinister.*
M *Auricula dextra.*
NN *Vena caua.*
O *Aorta.*
Reliqua iam sunt explicata.

FIGVRA VII. VIII. IX. X. XI. cordis valvæ & valvulas tum semilunares, tum tricuspides delineat.

FIGVRA XII. & XIII. pulmones ostendit.

- A *Portio œsophagi.*
B *Portio arteriæ asperæ.*
C *Vena arteriosa.*
D *Arteria venosa.*
EFGH *Quatuor lobi pulmonum.*

II

III

III





FIG. I.

V

VI

VII

VIII





XI

XII

XIII

IX

X



IN TABVLA HAC DEPICTAS INVENIES EAS ANA-
STOMOSES QVÆ IN CORDE EMBRYI ET RECENS NATI
animalis reperiuntur, de quibus libro nostro de formatione
fœtus, elegans disputatio instituitur.

FIGVRA I. cordis, pulmonu, arteriæ
magnæ, venæ cauæ, venæ arterio-
sæ, asperæ arteriæ viua imaginem
exprimit, nec non eam commu-
nionem, quæ ab arteria magna ad
venam arteriosam fit per interie-
ctum canalem arteriolum, cuius
operta transpirat & vivit pulmo
fœtus. Erravit autem pictor, quia
dextras partes in sinistris locavit.

AAA Totum cordis corpus.
B Arteria magna è sinistro cordis si-
nu prodicens.
C Truncus aortæ ascendens.
D Truncus descendens.
E Vena arteriosa.
F Canalis arteriosus, qui ab arteria
magna in venam arteriosam
fertur, duobusque hæc vasa conti-
nua facit.

GG Pulmonum lobi sexale.

FIGVRA II. eandem vasorum com-
munionem ostendit clariùs.

a Aortæ truncus.
b Venæ arteriosæ truncus.
c Canalis arteriosus vasa duo uniens.

d Vena caua ascendens.
ccc Ramuli venæ coronariae per cordis
substantiam sparsi.

FIGVRA III. eam anastomosis ex-
primit, quæ est à vena caua in ar-
teriam venosam per foramen am-
plissimum.

1 Vena caue truncus ascendens.
2 Vena caue truncus descendens.
3 Vena coronariæ orificium.
4 Foramen amplissimum anastomosis
faciens.
5 Valvula huic foramini præfesta.
6 Membrana tricuspidex in orificio ve-
næ cauæ locata.
7 Arteria aspera.
8 Larynx.


FIGVRA IIII. venam arteriosam
eiusque ramos omnes ostendit.

A Orificium venæ arteriosæ.
B Diviso in duos truncos.
C Distributio illius per universam pul-
monum substantiam.

III X




FIG. I.




.IIII.



.II.



.III.



TABVLA HÆC CEREBRI PARTES OSTENDIT.

FIGVRÆ I. explicatio.

- AAA *Latus dextrum duræ membranæ.*
BB *Latus sinistrum duræ meningis.*
CC *Tertius sinus duræ meningis secū-
dum longitudinē capitis excurrēs.*
DDD *Vasa quæ per membranam crassio-
rem sparguntur.*
E *Exigua arteriole per duram me-
ningem excurrentes.*
FFF *Ramuli per cranij foramina exeun-
tes, & in pericranium cutēque
musculosam diuarcandi.*
GGG *Fibræ tenuissimæ duram menin-
gem firmātes & alligātes cranio.*
HH *Fibræ per suturam sagittalē exeun-
tes ad exortum pericranij.*
II *Fibræ per suturam lambdoidem
exeuntes in eundem vsū.*
L *Cauitas in osse frontis.*
M *Cranij os.*
N *Pericranium.*

FIGVRA II.

- AA *Tertius duræ membranæ sinus.*
BC *Cauitas tertij sinūs detecta.*
DDD *Vasa à dicto sinu prodeuntia & in
tenuem membranam excurrētia.*
EEE *Pia mater.*
FF *Vasa per tenuē membranā sparsa.*
GGG *Vasa duræ membranæ.*
HHH *Dura mater in quatuor partes
diuisa.*

FIGVRA III.

- AAA *Pars sinistra cerebri.*
BBB *Pars dextra.*
CCC *Gyri & anfractus cerebri.*
DDD *Portio duræ meningis cerebrum
in dextram & sinistram par-
tem dirimens.*

EEE *Vasa cerebri.*

- F *Ductus venæ inslar cerebrum in
duas partes discludens.*
GGG *Ramuli prædicti ductus.*
H *Rami è tertio sinu prodeuntes.*
II *Vasa è quarto sinu in membranas
desinentia.*
K *Principium quarti sinūs.*
LL *Pars cerebri callosa.*
MM *Sinus in callosa corpore conspicui.*
N *Locus in quem desinit portio cras-
sioris membranæ cerebrum in duas
partes dirimens, & falcem meso-
riam constituens.*
OO *Portio tenuis membranæ.*
PP *Portio crassioris membranæ.*

FIGVRA IIIL

- AAA *Pars sinistra cerebri.*
BBB *Pars dextra.*
C *Pars dextra cerebri à cerebro sepa-
rata.*
DD *Anfractus cerebri.*
EEE *Pars cerebri subcineritia.*
GH *Pars cerebri candidior.*
III *Portio callosa à cerebro separata.*
LLMM *Superiores cerebri ventriculi.*
OO *Plexus choroïdes.*
PP *Vasa quæ ad plexum feruntur.*
Q *Vasa quæ ad tenuem membranam
feruntur.*

FIGVRA V.

- ABCDEFGHIJKLMN OPQR
*Hæc omnia ventriculos, cerebri
vasa, plexum choroïdem, quæ iam
indicata fuere, delineant.*
STV *Corpus psalloydes, fornix, tricus
suffultum columnæ.*
X *Septum lucidum.*
YY *Superior pars septi.*

FIG. 1.

II.



V

VI



TABVLA ALTERA CEREBRI.

FIGVRA VI.

- AAA Pars fornicis tertium ventriculū operiens.
 BC Duo pedes camerati corporis.
 D Ventriculus sinister.
 E Ventriculus dexter.
 FG Arteriae duae plexum choroidem efformantes.
 H Vas quarti sinus.
 I Diuisio praedicti vasis.
 KL Pars dextra & sinistra diuisionis.
 MN Plexus choroides.
 OO Vasa ex quarto sinu dura meningis prodeuntia.
 P Reliqua vasa in tenuem membranam sparsa.
 Q Meatus à tertio in quartum sinum.
 * Canales in substantia ventriculorum cerebri locati.

TABVLA ALTERA CEREBRI.

FIGVRA VII.

- AA Pars sinistra cerebri.
 BB Pars dextra.
 CCC Anfractus cerebri.
 DD Substantia cerebri exterior subcineritia.
 EE Substantia candidior.
 FG Portio arteriarum carotidon.
 H Pars inferior tertij ventriculi.
 K Vulua.
 L Conarium seu glans pinealis.
 NN Nates seu testes quibusdam.
 OOO Productio crassioris membranae cerebellum tegens.
 PP Secundus & sinister sinus ex duplicatura meningis crasse efformatus.
 QQ Primus & dexter sinus per latera lambdoides excurrens.
 R Concurfus trium sinuum, torcular quorundam.
 S Tertius membrana sinus.

- T Quartus sinus.
 V Vas è quarto sinu prodiens.
 XX Cerebellum tenui tantum membrana velatum.
 Y Ramuli à quarto sinu in tenam membranam cerebellum velatam distributi.
 ZZ Portio dura meningis ossi lapidose infixa.

FIGVRA VIII.

- AB Pars dextra & sinistra.
 CDE Anfractus, pars cineritia & alba.
 FF Portio arteriarum carotidon inferior pars tertij ventriculi.
 I Meatus ad infundibulum deficiens.
 * Media & posterior pars tertij ventriculi.
 L Anus, alius vulua.
 M Glans pinealis.
 NO Testes.
 RR Cerebellum.
 TVXYZ Vasa sunt cerebelli & membranarum eius.

FIGVRA IX.

- AA Cerebrum altius diuisum.
 BCD Portiones tres cerebelli in anticam partem reiecti.
 E Vermiformis processus.
 FGH Principium spinalis medullae intra caluam conclusa.
 I Quartus ventriculus.
 K Venula cerebelli.
 L Vasa quae à dura in tenuem membranam feruntur.
 PQR Caultates ossis occipitis, in quibus portiones tres cerebelli latera BCD notata continentur.
 SSS Sinister sinus ex duplicatura crassioris membrana factus.
 TTT Dexter sinus.

Fig. VII.



X



VIII



XI.



XII.



X.



XV



XVI.



XIII.



XVII.



XIII.



XIV



FIGURA X.

- AA Pars cerebri quæ spinali medullæ oriū dat.
 B Meatus à tertio in quartum ventriculum.
 C Quartus ventriculus.
 D Conarium.
 EF Testes.
 GH Nates.
 IK Partes quibus medulla spinalis alligatur.
 LMNO Cavitas in principio spinali medullæ calami figuram exprimens.

FIGURA XI.

- AB Pars dextra & sinistra cerebelli.
 CC Pars media cerebelli.
 D Anterior pars vermiciformis.
 E Meatus quarti ventriculi.
 GG Portio cerebelli spinalem medullam creans.
 I Posterior pars vermiciformis.

FIGURÆ XII. explicatio.

- AA Pars dextra.
 BB Pars sinistra.
 CD Processus duo medullares, mammillares dicti, præcipuus odoratus organa.
 E Cavitas processui mammillari excipiendo dicata.
 G Septum utramque cavitatem discludens.
 H Portio duriore membrana, cerebrū in dextram & sinistram partem dirimens.
 IK Vasa cerebrum ingredientia.
 LMN Tres cavitates in osse occipitis sitæ.
 OPQ Sinus crassioris membrane.

FIGURA XIII.

- AABB Partes cerebri dextra & sinistra.
 CC Processus mammillares.
 DD Cavitates processibus dicatæ.
 EFG Vena cerebri.
 I Vasa à sinu crassioris membrane prodiens, in tenuem membranam insertum.
 K Alia vasa.
 M Cauda optico-rum.
 NO Nervi optici.
 PQR Ramus arteriæ carotidis in dextrū cerebri ventriculum & tenuem membranam excurrens.
 S Portio infundibuli pituitariæ à cerebro stil-lantem sensim accipiens.

FIGURA XIII.

- AA Portio cerebri cū principio spinalis medullæ.
 BB Portio nervorum optico-rum.
 CC Chorda seu infundibulum.
 D Ductus à tertio cerebri ventriculo in infundibulum deficiens.

- EF Rami arteriarum carotidon.
 G Secunda coniunctio oculis movens.
 H Ramulus exiguus nervi gustatorij.
 I Nervus tertij paris.
 K Quarta coniunctio.
 L Ramulus quinti paris.
 M Quinta coniunctio.
 N Ramulus sextæ coniunctionis.
 O Rami septimæ coniunctionis.

FIGURA XV.

- AB Nervi optici.
 CD Arteriæ carotides.
 E Infundibulum.
 F Foramen infundibuli glandulam pituitariam, quæ carne est porosa & bibula, pertingens.
 GG Portio nervorum secundæ coniugi.

FIGURA XVI.

- A Glandula pituitaria.
 B Infundibulum.
 CC Portio arteriarū ad cerebrū ascendens.
 DEFG Rami prædictarum arteriarum secundæ coniunctionis.

FIGURA XVII.

- AB Arteriæ ascendentes, quæ rete mirabile efficiunt.
 CD Ramuli ex plexu illo mirabili rami implicati.
 E Glandula pituitaria.

FIGURA XVIII.

- A Glandula pituitaria.
 BC Sinus arteriarum cranium permeantium.

Explicatio FIGURÆ XIX.

- A Glandula pituitariæ excipienda cerebri totius superiorem destinata.
 B Infundibulum.
 CDEF Ductus pituitariæ & serosos humores cerebri expurgantes.

Reliqua, quæ ad cerebri & medullæ spinalis, nervorumque ab ea proceduntium historiam spectant, in tabellis nervorum sunt delineata; inde igitur repetenda.

LIBER SEXTVS.
IN QVO PARTIVM NVTRITIONI
DICATARVM HISTORIA DESCRIBITVR,
TVM QVÆ IN EA OBSERVANTVR CONTRO-
VERSA, EXPLICANTVR.

HISTORIA ANATOMICA.

Humani corporis divisio.

CAPVT I



Humani corporis elementa medica, minimas scilicet & similes particulas, qua fieri potuit & breuitate & perspicuitate sumus persequuti; nunc dissimilariū & maximè compositarum partium historiam describere placet. Id autem vt ordine ac methodo fiat, quod ex simplicibus coagmetarum est corpus, in præcipuas partes resolui debet, hæc rursus minurius concidendæ, donec ad minimas fuerit peruētum. Diocles Caristius epitola ad Antigonom Regem, humanum corpus in caput, thoracem, ventrem, & vesicam dirimit. Ægyptij,

Humani corporis diuisio multiplex.

in caput, collum, thoracem, manus & crura. Nos vniuersum corpus in tres regiones, inptemam, mediam, infimam, & artus, seu extrema secamus. Supetior vertice & prima vertebra circumscribitur, κεφαλή, caput, communi & fusa acceptione dicitur: pressiore enim & angustiore significato, caput describit Hippocrates, propugnaculum ac domicilium cerebri, cuius caluaria duplici osse contexta, diploe intertexta, carunculis venulisque obliterata, desuper circumfusa est petiocranio cute capillata velato; subter verò adiacet duræ menynge. Secunda regio, recentioribus venter medius & thorax appellatur. Hippocrati venter hic supetior dicitur Aphorism. 38. sect. 7. καταρροὶ ἐς τὴν ἄνω κοιλίαν, distillationes in ventrem superiorem; thorax verò, totius corporis truncum denorat libello de Arte; dum hepar in thorace situm legitur. Regio hæc media suis terminis vndique definitur. Superiore patte adsunt clauiculæ, sic dictæ, quod vniuersum pectus & thoracem quasi claudant: infetior, xiphoides cartilago, & diaphragma, quod velut septum quoddam medium aut tanquam integerrimus paries, hunc ventrem ab infetiore secernit: dextera & sinistra parte duodecim repetiuntur costæ, thoracis latera terminantes: anretiore os pectoris, στήθος vocant Græci, sternum Latini: postetior vῶτον seu dorsum, & ἰσθμὸς χήλιον: vndiq; verò extrinsecus quidem, musculi quamplures; intus autem membrana costis subtenfa. Tertia regio venter inferior κοιλία per anton omasiam; superiore parte, xiphoides & diaphragmate; inferiore, ossibus pubis, ilium, ischium; posteriore, quinque lumborum vertebreis & osse sacro; anteriore toto abdomine, quod quidam ὀμφαλόν vocant, Arabes mirach, circumscribitur. Quod reliquum corporis est, attus, extrema, καὶ ἄλλα appellant, brachia quippè & crura; quæ velut rami trunco corporis adnascuntur. In suprema illa regione, organa continentur animalia; cerebrum quippè

Quid caput eiusque terminus.

Quid regio secunda, eiusque fines.

Tertia regio, eiusque terminus.

Artus. Quid in singulis regionibus continentur.

cogitationum rationisque sedes, motus sensusque omnis fons & origo: in media partes vitales & respirationi dicatur, cor, pulmo, arteriæ: in infima, naturalia omnia, coctioni, expurgationi & procreationi dicata organa. Propterea superior regio, animalis; media, spiritalis; ima, naturalis dicitur. Superior ossibus omni ex parte quasi propriis sepimentis est obvallata; decebat enim partem eam, quæ rationis particeps, atque animæ sedes erat futura, solido recto, ne lederetur, muniri. Media partim ossea, partim carnea constructa est: ossea, ad robur cordis & ad formandam cavitatem; carnea, ad faciliorem systoles ac diastoles motum. Inferior regio, anteriore parte tota est carnea; quia & contrahi, & distendi, & intumescere ob alimenti coctionem, excrementorum suppressionem, ac fetus gestationem oportebat. In harum regionum situ quis non admirabilem summi Opificis providentiam suspiciet? Animalem regionem superiore in loco posuit Deus; tum ad sensum commoditatem; vox enim ex alto melius exauditur; olfactus ascendentem vaporem commodius excipit; oculi cum sint velut exploratores interdiu noctuque nobis excubantes, editissimum postulabant locum; tum quia principes facultates ab alimenti officinis, ex quibus tetri nidores & crebri halitus suscitantur, plurimum distare oportuerat. Spiritalis regio, fons caloris & viuifici nectaris, mediam sedem occupavit, ut supremam & imam prosperæ cuiusdam & salutatis stellæ instar, motu suo ac lumine illustrare posset. Naturalem verò tanquam regiarum culinam, in locum imum relegavit Natura, quod alimenti excrementa ob gravitatem, & commodius in imo resideant, & facilius extrudantur. Hæc trium regionum brevis est descriptio; quarum singulas partes lubet ordine perlustrare; ordine, inquam, non dignitatis, sed Anatomico. At solent qui cadauera secant, regionem imam, tamquam sentinam corporis putredini maxime obnoxiam, prius demonstrare; nos itaque ab ea descriptione ordiemur nostram.

Ventris inferioris divisio.

C A P. II.

Ventris inferioris divisio.



*Epigastrica
regio.
Umbilicalis.
Hypogastrica.*

*Hypochondrij
acceptio mul-
tiplex apud
Hippocratem.*

ENTER inferior, κοιλία per antonomasiam; ab aliis ἡ μήτηρ & κενεών; à Suida πᾶσις, in anteriorem & posteriorem partem diuidi solet. Anterior exteriorque, suprema parte xiphoide, inferna ossibus pubis circumscripta, Galeno ἡ ἡράδην, Arabibus mirach, Latinis abdomen dicitur. Eius varix sunt particulae; quatum tanta est apud Authores confusio, tam multiplex earum acceptio, ut nihil in Anatome magis inuolutum putem. Quid enim epigastrij, hypogastrij, hypochondriorum, lumborum, ilium ἡ ἡρῶν, ἐπὶ τῶν κενεῶν dictio sonet, non satis conuenit. Nos ut obscura hæc illustremus, confusa distinguamus, implicita extricemus, totum inferiorem venterem in tres regiones, supremam, mediam & imam, secabimus. Superior epigastrica; media umbilicalis; inferior hypogastrica vocabitur. Epigastrica à xiphoide cartilagine ferè ad umbilicum vsq; extenditur. Umbilicalis paulo infra umbilicum desinens, trium aut quatuor digitorum latitudinem æquat. Hypogastrica, ad ossa pubis excurrit. Rursus harum quælibet minutius, in mediam, dextram & sinistram partes concidenda. Regionis epigastricæ latera Græcis propriè ὑποχόνδρια dicuntur. Dixi propriè, quia multiplex hypochondrij apud Hippocratem est acceptio. Usurpatur sæpè στερνὸς ὀστέων pro toto abdomine, ut Aphorismo 73. sect. 4. ὁ κόσοςισιν ὑποχόνδρια μετέωρε διαβοροποιέοντα: Quibus hypochondria distenta murmurant. Interdum με-

των μαικῶς, vt 6. Epidem. Successiones hypochondriorum considerandæ, id est, partium quæ in hypochondriis continentur. Alias ἀστονομαστικῶς pro dextro, vt historia 2. scēt. 1. lib. 3. Epidem. de Hermocrate, ὑποχονδρίῃ ἑντασι λαπαρῆς, hypochondrij distentio molliter. Sed propriè hypochondria partes sunt regionis epigastricæ, quæ cartilaginibus notharum costarum adiacent; id nominis indicat etymon; ὑποχόνδρια enim dicuntur, quod sint ὑπὸ τῶν χόνδρων, vel quod τῇ χόνδρῳ ὑπὸ κελεύ, id est, quod cartilag. inibus notharum costarum subiaceant. Celsus præcordia vocat, quod circa ventriculum sint, quem veteres Græci καρδίαν appellarunt. Pars huius regionis media, totius nomen retinet, & ἐπιγάστριον absolūtè dicitur, quo loci cauum illud est quod Polluci σφαγὴ dicitur. In dextro hypochondrio, totum ferè hepar est situm; in sinistro, lien & maior ventriculi portio; in epigastrio, ventriculi & hepatis quædam pars. Regionis vmbilicalis totidem sunt partes, media, dextra, & sinistra. Media, vmbilicus dicitur ab vmbone; ὀμφαλός, ὅπῃ τῷ ὀμπνῆν, à respirando; ῥίζα γαστρός, radix ventris; media eius pars, μεσομφάλιον medicullium; cauum, γαγγαμῶν ab inextricabilis con- tortæ; sagena specie; pellicula rugosa γράια, vitula, quod corrugata senectutis indicium sit. Dextræ & sinistræ partes lumbares vocantur, vbi sedes est libidinis. In dextris ren dexter continetur, pars coli intestini, totum ferè cæcum cum ieiuni portio; in sinistris, ren alter cum coli & ieiuni portione; in mediis, totum ferè ieiunium. Inferior regio hypogastrica dicitur, quibusdam imus venter, Hippocrates ἡζον vocat, Aphor. 35. scēt. 2. Galenus interpretatur τὸ κάτω χωρίον τῆς γαστρός ὅσον ἐστὶ μεταξὺ τῆς αἰδοῦς καὶ τῆς ὀμφαλῆς, id est, ventris imam regionem, quæ pudenda & vmbilicum interiacet, νεῖαρον etiam & νεῖαρον dicitur lib. de Natura mulieb. τὴν νεῖαρον περὶ χεῖρσιν, id est, imum ventrem perfundito; & Aretæus vesicam ἐν τῇ νεῖαρῳ, id est, imo ventre sitam scribit; aqualiculum vocat Petrus, quod eò sordes cōfluant, alij fumen aut rumen à suum mammis; alij ὑποκοιλίον. Huius hypogastricæ regionis dextræ & sinistræ partes ilia dicuntur, quod ileon intestinum contineant; Græci κενεῶνες χολᾶς λαγόνες vocant à laxitate, quod flaccidæ sint; media totius nomē retinet & hypogastrium propriè dicitur; nam Hippocrati libello de humidorum vsu ὑπογαστέριον totus est venter inferior. Rursum inferior hypogastrij pars, in dextram, sinistram, & mediam diuiditur. Dextera & sinistra βουβῶνες, inguina dicuntur; media vbi pilus fruticatur, ἐφῆβαιον, ἡβη, θήσκειον, & interdum Hippocrati ἰ. περὶ γυναικ. ἐπικτένειον, Latinis pecten, pubes, quod ibi pubertatis signa luceant. Veteres nunc κῆπον dixerunt, nunc πιδόν, nunc λεμῶνα; alij εὐδιδάιον, βρόχιον, χεῖμαρῖον κλιτόριον. In ilibus totum ferè intestinum ileon continetur; tum spermatica vasa; in hypogastrio verò, hoc est medio inter ilia spatio, rectum intestinum, vesica vrinæ excipiendæ & excernendæ dicata, vterus in feminis. Posterior ventris inferioris pars ab extremis costis ad ossis sacri extremum extenditur, διελζωμά vocant quidam, id est cinctum, alij lumbos. Diuiditur in superiorem & inferiorem partem. Superior quia carnosa est, à palmando pulpa dicitur, ψόα. Inferior dextrā habet, sinistram & mediam. Dextræ & sinistræ, nates dicuntur γλουτοί, clunes; media pyga vocatur; continet fissuram natium, podicem, rugas ani. Hæc ventris inferioris & singularum eius partium brevis esto descriptio; lubet nunc singula paulò accuratius persequi, & omnes etiam minimas regionis huius particulas, lustrare. Id vt commodius fiat, partium ventris inferioris, aliæ statuendæ sunt continetes, aliæ contentæ. Continentium, alię sunt communes, quæ oblique reperiuntur;

Quid sit propriè hypochondrium.

Quid in regione epigastrica continetur.

Vmbilicalis regio. Vmbilici partes.

Quid in ea continetur.

Hypogastrica regionis partes.

Quid ilia.

Inferioris hypogastrij partes.

Quid in hypogastrica regione continetur. Posterior pars ventris inferioris.

His quid.

Dispositio ventris inferioris in partes continentes & contentas.

eiusmodi sunt cuticula, cutis, adeps, panniculus carnosus dictus & musculorum omnium communis membrana; alię sunt proprię, quę hęc tantum reperiuntur; eiusmodi sunt abdominis muscoli & peritonæum. Partium verò contentarum, quędam coctioni, nonnullę expurgationi, alię procreationi inserviunt.

De cuticula.

CAP. III.

Cuticula nomen.

PARTIVM ventris inferioris continentium prima omnium est cuticula, *ἡ δερμίδα* dicunt Gręci, quod supra cutem nascatur. Celsus cuticulam summam vertit. Hippocrates libello de natura pueri, cutim veram *καταχρηστικῶς ἡ δερμίδα* vocat. Qua parte (inquit) *ἡ δερμὶς* est *ἀραιότερη*, & quo loco posterius rascit; illic ena-

Cuticula quid

scitur pili; Galenus cutis superficiem vocat; alię superiorem pelliculam. Est autem cuticula nihil aliud, quàm tenuissima cutis efflorescentia, cepatum pelliculis tenuioribus similis, insensilis & penę exanguis, ę cutis excremento, non halimoso, non aqueo, sed crassiore pronata; propterea & citra dolorem à subiecta cute separatur, & si aliquando attitu, aut feruentis aquę affusione papulę instar abscedat, promptissimę renascitur. Hanc à vera cute separare non est facile; sed in ambustis ignium vi oborta pustula conspicuo cernitur diuelli. Eius generationem à frigido fieri voluit Hippocrates libro de carnibus, ut in pulte sit crustula, & in sanguine concreto membranula. τὸ ἔσχατον (ait) τοῦ σώματος πρὸς τὴν ἑξῆς ἀναγκαίως ἔχει δέρμα γενέσθαι ὑπὸ τῷ ψυχρῷ, καὶ τῶν πνευμάτων προσβαλλόντων. id est, *Extremum corporis aëri expositum necessario pelliculam contrahit, occursu frigidi & ventorum.* In fœtu nondum perfecto cuticula hęc non apparet, sed

Cuticula generatio à frigido.

tota cutis rubra venulisque obsita cernitur. Differt à vera cute; tum quia insensilis est, idque ad *δυσπαθειαν*; extrinsecus enim occurrentibus obuia est; tum quia venis arteriisque non rigatur; tum denique quia densior est; vnde fit, ut qui ab internis ad superficiem corporis trudentur humores aquei, cutem facilius permeent & cuticulę densiori inhæreant, hinc papulę cœthimata phlyctides. Non est huius pelliculę consistentia vbique eadem; nam in pedibus crassior est, ne dū per aspera loca ambulamus, lædatur cutis; color verò vbique similis præterquam in ano, & in omni loco in quo membrum ad aliud confricatur. Sunt animalia quę singulis annis sponte eam deponunt; homini nō ita licet nisi per morbum, autate,

Quomodo differat à vera cute.

ut qui ornatui student. Cuticulę varij sunt vsus. Primarius, ut sit medium tactus; non enim fit sensio perfecta per immediatum contactum sensibilis & sensorij; eius ergo opera, exactę & cum iudicio qualitates, quę tactum feriunt, percipiuntur; ea ablata, sentit quidem subiecta cutis, sed depravatę, cū dolore scilicet. Alter pelliculę vsus est, ut cutem veram, quę sensus est acerrimi, *ὅπῃ τῶν ἔξωθεν*, id est *ab externis* tueatur. Hoc in vlcere experimur quotidie; si enim sua superficie denu-detur cutis, acerbissimi inde dolores & frigidum vlceribus magis mordax. Tertius, ut cutem tegat ne exudet continuò humor; ut apparet in intertrigine, in qua mader perpetuò cutis. Quartus, ut vasorum ad cutem peringentium oscula occludat. Postremus, ut cutis alioquin asperę, inæqualis & crassiusculę ornamētum sit. Quid enim ea læuius aut politum est magis? Hoc norunt mulierculę, & qui balneis, vnguentis, frictionibus, molliorem eam reddunt quę per morbos prius inaruerat; & hoc est apud antiquos curare cuticulam. Ergo in pelliculę huius generatione crassiore cutis excremento non abutitur; sed bene vtitur, sagax, licet à nemine docta, Natura.

Consistentia cuticulę diuersa.

Cuticula v-
sus varij.
Primus.

Secundus.

Tertius.

Quartus.
Quintus.

Curare cuti-
culam quid.



CUTI CYLÆ subiectam cutem, Græci communiore vocabulo δέρμα vocant, quod omni ferè ex parte excoriari queat, δερὰς etiam, δέρος, δερ' is dicitur. Hippocrates libro de arte δέρην vocat libro de victus ratione in acutis φασκλὴν; libello de insomniis χρώμα: τὴν γὰρ (ait) καὶ ἴαρον διὰ τῷ χρώματος ἑυμφέρεται ποιεῖσθαι, id est, per cutim purgationem fieri confert, quia vitium in ambitu corporis est. Homero ἀνθρώπῳ dicitur; Herodoto δερβιστήρ, aliis δερκλήρ, quibusdā σέρφος, ὡς τὸ σέρφειν τὸ σῶμα ἀμφισπύλλον. Latini cutē, corium, alutam, pellem vocant; licet posteriora hæc, quadripedibus magis conueniant. Cutis membrana est omnium amplissima, & crassissima, ex seminis & sanguinis permixtione genita, temperiem moderatam obtinens, externi tactus verum organum, & subiectarum partium tegumentum, munimentum, ornamentum. Membranam esse indicant, color, textura, sensus, vsus. Candida enim est, extensibilis, sensus exquisitissimi, & ad custodiam partium comparata. Sed hæc tanto reliquis crassior est, quanto vniuersi corporis moles amplior. Substantiam ex semine & sanguine multam habet; non enim planè ex æquis est vt neruus, nec omnino sanguine abundans vt caro, sed veluti sanguine præditus neruus, vt mediam inter carnem neruumque naturam videatur adeptæ. Quia tamen in prima eius generatione, plus inest seminis quàm sanguinis, numquam nisi in mollioribus κατὰ πρῶτον οὐκ οὐκ coalescit, sed κατὰ δεύτερον tantum, id est per mediū heterogeneum, cicatricem vocant, quæ reliqua cute perpetuò durior est, neque vnquam ob densitatē in homine capillatur. Ad eam vasorum fetè omnium extrema designat; vnde fit vt sensus sit acerrimi, nec à subiecta carne nisi cum dolore auelli possit; non tamen ex vasorum extremis dilatatis eā gigni credibile est, vt putat vulgus.

Temperiem inter reliquas partes cutis obtinuit moderatam, estque velut extremorum medium, quia tactus erat iudex & æstimatrix: at organum omne debet esse ἀπείρου, id est alienæ qualitatis expers, & Aristoteli 2. de anima, recipiens debet esse denudatum à natura recepti. Quæ durissima sunt & siccissima, difficilè alterantur ab obiecto sensibili; quæ molliissima sunt, species non conseruant. Cutis in mollietate duritiæque est media, præsertim quæ manum internam tegit maximèque summos digitos, quia interna manu fit apprehensio. Temperata porro est cutis, & insito, & influente temperamento. Insito quidem, quia est velut caro nervosa, aut neruus carnosus; influente verò, quia tantum à musculorum carnibus, neruis, venis, arteriis earumque sanguine & spiritibus caloris accipit & humiditatis; quantum à neruis, ligamentis, ossibus, cartilaginibus, frigiditatis & siccitatis. In homine solo temperatam esse cutem putat Albertus, eamque prætenuem & diaphanam; vnde ad fenestras parandas Persarum quendam regem ea olim vsum fuisse legimus. In cæteris animalibus, aut testacea est, aut mollior.

Figuram peculiarem nullam habet, sed eam à subiectis partibus mutuatur, ibi æqualis, hic inæqualis existens, nunc prominens & extuberans, nunc intus contracta; sed & inscriptiones habet varias, lineamenta & rugas pro motuum varietate, ex quorum aspectu chiromantici miræ pollicentur.

Color spectaticarum partium licet sit candidus, in cute tamē, ratione humorum affluentium, variatus apparèt. Qualis humor (inquit Hippocrates libro ἐπὶ χυμῶν) talis color in cute efflorescit. Pallet biliosorum, nigricat melancholi-

Cuti nemini omnia.

Cuti definitio.

Cuti membrana est.

Substantia cutis ex semine & sanguine. Cutis non esse lesa prima intentione sed per cicatricem.

Temperies cutis.

Cui temperata esse debuit.

Quomodo temperata.

Figura cutis.

Color.

corum, roseo rubore suffunditur sanguineorum cutis, & in animi pathematis, ita, gaudio, vetecundia, metu, tristitia variè immutatur.

Foramina cutis.

Foramina cutis.

Cutis licet omni ex parte continua videatur, habet tamè foramina quamplurima; quorum alia conspicua sunt; alia oculorum aciem effugiunt, illa finita sunt immittendi in corpus, aut emittendi aliquid gratia comparata, ut in oculis, auribus, aures, ore, umbilico, pudendis, ano: hæc infinita, ad *διαπνοὴν ἀδύνατον*, id est *insensilem transpirationem* & sudorum ac fuliginum exclusionem. Quibus rara & crebris exilibusque spiraculis peruia est cutis, ab internis, quæ *ἐνέοντα* vocat Hippocrates, quasi inutilia dixeris, minus afficiuntur: quibus verò dura densaque est, quia fumidis vaporibus exitus denegatur, hi læduntur faciliè. *ἢ δέρματος ἀραιότης* (inquit bonus Senex sexti. Epid.) *ἢ κοιλίης πυκρότης*, id est, *cutis raritas, ventrisque densitas*: debuerunt autem exigua esse illa foramina & penè insensilia, ne maxima fieret spirituum dissipatio. Quod si laxari illa contingat, ut à profusiore gaudio & usu liberaliore citoci, derepente extinguitur homo. Aliquando insensiles hi meatus ita aperiuntur, ut sanguis effluat purus, ut in sudore anglico; & Galenus commentario in librum de fracturis observat aliquando in deligatione fascias crentas apparere, etiam si nullum adfit vulnus, exudante per poros cutaneos sanguine.

Cutis differentie.
Præterea à sub-
stantia.

Secunda à
consuetudine.

Tertia à motu.

Quarta à sensu.

Quinta à pilis.

Vfus cutis.

Actio cutis.

Primus usus.

Secundus.

Tertius.

Cutis variæ sunt differentie, quæ omnes à substantia, connexu, motu, sensu & pilis petendæ sunt. Ratione substantiæ, quædam mollior, rarior & tenuior est, ut faciei, penis & scroti; quædam durior, ut verticis, dorfi & plantæ pedum; quædam in mollitie duritiæque media, ut quæ manum integit maximèque summos digitos, modo callo uti fossilibus non sit obducta. Si connexionem spectes, non est ubique eadem; quædam enim pettinacissimè paribus adhæret, ut volæ manus, tum ad firmiorem apprehensionem, tum ut tagendi facultate exquisitiore polleret; quædam laxa est & faciliè separatur, ut thoracis, abdominis & reliquorum partium; quæ pertinaciter hæret; vel cum musculosa carne vnitur, ut in facie ferè tota; vel cum tédine coalescit, ut in manu interna. Quæ laxa est, id est soluta, musculosæ carni appenditur tantum. A motu tertia sumitur cutis differentia. Alia enim *περὶ ὅλην τὴν σάρκα*, hoc est iussu & sponte nostra movetur, ut frontis & faciei ferè totius. Alia planè est immobilis, ut quæ in reliquo est corpore. Animalia mulea cutem totam sponte movent, ut in herinaceo dum se in rotundum contorquet corpus & conglobat, in Elephæto, ceruo, equo & similibus videre licet. Sensu quidem vniuersa cutis; sed in quibusdam partibus exactior est sensus, ut ad vnguium radices, extremum pudendi, papillas mulierum, quia desunt ibi nervorum extrema; in aliis hebetior, ut in capite; propterea cutem capitis insensilem voluit Aristoteles. Non vniuersæ cuti adnascuntur pilis; alia ergo pilosa est & hirsuta; alia pilis orbata.

Cutis, si veteribus fides habenda, communem & officialem actionem nullam edit, sed priuatam tantum coctionem. Ego tamen animalem actionem citibus, quia cum sit externi tactus immediatum organum, debet qualitates quæ tactum feriunt recipere, receptio autem licet sit passio, ut & omnis sensio, non tamen sine actione fit. Hinc primus colligitur cutis vsus, ut sit organum tactus: nam quia tactus absolutè ad vitam erat necessarius, debuit per vniuersum corpus, & internum & externum diffundi. Interni tactus organa sunt membræ internæ, externi, cutis. Est alter cutis vsus, ut vniuersum corporis habitum vestiat, partiumque subiectarum calorem foueat. Putat Aristoteles cutem ad custodiam carnis constructam, cutem enim omnia habent, quibus est sanguis. Accedit quod per

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 275

tim humanum corpus partium multiplici structura varium, vnum fit & σύμφυτον habet. τὸ δέρμα (inquit summus Dictator lib. de offium natura) πάντων ζώων καὶ ζυτᾶξιν, id est, *cutis omnium exhibet colligationem*. Quinetiam ad declinandas iniurias constructa est; nam cum exquisitissimi sit sensus, eorum quæ nocitura sunt statim nos admonet. Postremò cum in immensum extendi non debeat corpus, partium omnium terminus & extremum dicitur cutis; quam propterea debilem de industria construxit Natura, vt internatum partium exciperet superuacua. Sunt qui ob eam rem emunctoriū vocent vniuersale. Galenus inter τὰ ζυμψέοντα χαλεία, id est, *loca vacuationi conferentia* recenset. Est autem debilis, & ratione situs, & vasorum productione; ad eam enim vasorum omnium externa desinunt; sed idem imbecillitatis incommodum Natura compensauit, quia & multis spitaliculis petuiam eam fecit ad liberam transpirationem, & in extremo locauit, vt ei facilius mederi liceret.

Maxima apud Hippocratem ex cutis habitu & temperie petuntur indicia ad salutem aut mortem. Aristoteles ingenij vires ex cutis & carnis substantia colligit, vt ingeniosi sint, qui mollem; inepti, qui duriotem & crassiotem habent cutim: sed non est hoc perpetuæ veritatis. Nam & ctoco dilis duritia tergoris tribuitur, & solertia. Hippopotami corij ctafitudo talis est, vt inde totrentur halia, & tamen quædam est ingenio Medico diligentia. Elephantorum tergora impenetrabilem cutim habent; at animal hoc proximum est humanis sensibus, intellectus quippe illis sermoneis partij, amoris & gloriæ voluptas, prudentia, æquitas, religio quoque.

De adipe.

CAP. V.



ERTIVM humani corporis tegumētum est adeps seu pingue-
lo, Græcis nunc *πυελή*, nunc *εἶαρ*, nunc *λίπος* dicitur; non enim specie & essentia differte hæc putat Galenus, sed tantum καὶ ἥττον καὶ μάλλον, id est, *secundum magis & minus*: *πυελή* enim id est, *pinguedo*, mollior est humidiorque, axungiam & latum etiam vocant: *εἶαρ* verò id est *adeps*, ctaffior est sicciórque,

seu etiam dicitur. Adipis matetia sanguinis est portio pinguior & magis aëtea, quæ dum per tennes vasorum tunicas totis instat exudat, & ad frigidas partes vt membranas allabitur, à debili earum calore, qui Medicis pto frigote est & densitate ctaffescit cogiturque. Efficiēs ergo frigidum est, non quidem actu tale, quia hoc in viuente animali non agnoscimus, sed minus calidum. Sub cute copiosus generatur adeps, quia sanguinis portio, quæ ob tenuitatem tariore musculorum carnes præterit, à densiore & crassiore cute retinetur; idè animalia quæ corium habent densum, vt ex terrestribus, fues, ex aquatilibus, delphini, plurimum adipis congerunt; hyeme etiam pinguiora sunt omnia. Adipis varij sunt vsus. Primus ad subiectarum partium tutelam: toti enim corpori circumfusus tegumēti instat, ab extrinsecus occurrantibus partes tutatur. Alter ad natiui caloris custodiā; infarctu enim & visciditate sua prohibito caloris effluxu calorem ingeminat, & penetrabili frigori meatus occludit, atque ea ratione calefacit nos, qua & vestes; sic epiploon adipe copioso confectum, ventriculi coctionem iuuare creditur. Tertius, vt calidis & siccis corporibus affusus, ea obliniat humectetque; sic cordi calidissimo & æstuanti copiosus adeps adnascitur. Quartus, vt vasorum, quæ ad cu-

Quartus.

Quintus.

Cutis emunctorium vniuersale. Quomodo debilis sit, & cur.

Varia ex cute petuntur signa.

Quid inter adipem & pyelē differant in-textu.

Adipis matetia.

Efficiēs causa.

Adipis vsus varij. Primus. Secundus.

Tertius.

Quartus.

Quintus.

tem fetuntur stratum sit, alioqui nuda periclitarentur. Quintus ad motus facilitatem; sic qui articulorum ligamētis adeps crassior innasci consuevit, partes atterendas illinit, siccate prohibet & ad motum faciliores reddit: talis est etiam sub oculo adeps plurimus. Sextus, ut loca impleat vacua, carniū instar, & puluinaris vicem gerat. Postremus, ut pabulum sit caloris ignei & per inedia verti possit in alimentum. Fiunt enim (ait Galenus) graciles homines, ob vehementer calidas causas pinguedinem absumentes.

Sextus.

Septimus.

De panniculo carnofo.

CAP. VI.



V T I & pinguedini subiicitur membrana quædam crassissima, vniuersum corpus à capite ad pedes tegens; eam Anatomicorum vulgus barbaro nomine panniculum carnosum vocat, elegantius membranam carnosam diceret. Nos in brutis, ut bobus, canibus, equis, simiis, carnosam quidem admittimus, & fibris carnis ita textam, ut Anatomicæ artis rudioribus plerumque imponat, & musculus esse videatur: at in homine tota est neruea membranaeque; in illis cuti adhæret proximè & ab ea difficilè separatur; in homine per villos tantum hæret habetque interiectum adipem copiosum; vnde fit ut eorum quadrupedum cutis tota spontè moueatur; hominis verò cutis omnino sit immobilis; non ergo panniculus iste in homine dici debet carnosus, sed aut neruosus, aut adiposus, nisi fortasse *συνεχδοχικῶς*, quia pars huius membranæ carnosæ est, quæ scilicet faciem tegit; ita enim cuti fibris suis carneis adhæret, ut ab ea separari vix possit; idèò solius faciei cutis in homine *καταπερικῶς* mouetur. Galenus carnosam hanc faciei totius membranam *μυῶδες πλάτυσμα*, musculum latum vocat, qui similis est equitantum capitio, si tantum eius demas quantum pileolo tegitur. Tota hæc membrana in recens natis rubra apparet, in adultis alba nerueaque. Eius interior pars lento humore velut mucò oblinitur, ne musculorum impediatur motum; sensum habet reliquarum membranarum instar exquisitum, itaque si pungatur & vellitur ab infernis ut acrimonia bilis, motum edit concussiuum, qui rigor dici solet. Membranæ huius varij sunt vsus. Primus, ut quæ ad cutem feruntur venarum, articularum & neruorum propagines hac roborentur & suffulciantur. Alter, ut vapores sanguinis densitate sua & crassitie retineat vertatque in adipem. Tertius ut musculorum carnes tegat ne ab externis lædantur.

Panniculi car-
nosi nomina.Differentia
panniculi car-
nosi hominis
& aliorum
animalium.Quando pos-
sit dici carno-
sus in homine.Latius muscu-
lus quid.

Rigor ubi fiat.

Vtensiles car-
nosi vsus.
Primus.
Secundus.
Tertius.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An cutis organum sit tactus.

QVÆST. I.



E tactus sensorio, certant Philosophi & Medici. Aristoteles secundo de partibus animalium, & Alexander prima paraphrasi in libros de anima, carnem nunc medium, nunc organum tactus agnoscens, numquam cutem. Stabilitur hæc Peripateticorum opinio his rati-
onibus: quod per se insensibile sit cutis & nō nisi carnis beneficio sentiat. Quod capitis cutis carne denudata, non sentiat. Quod aëri exposita caro magis doleat quàm cutis. Quod caro, acriore sensu polleat, nam gemmarum exquisitas qualitates tractabiles percipiunt lingua, quàm manu, & veras gemmas à fictitiis solo lingue tactu discernunt: quod denique sensibile pos-
sum supra sensorium non sentiat, at cuti appositum sensibile sentitur. Quibus Avicenna au-

Cere organum
tactus Peripa-
teticum.

Ratiō.

Secunda.
Tertia.
Quarta.

Quinta.

thorizatum

iboritatem addere liceat, qui capite primo fen 1. doctrina 4. cap. 1. cutem equalia non sentire scribit: si equalia non sentit, tactus organum esse non debet, quia αἰσθητὴν ὅλον omne, & extrema & media obiecta sentit: sic oculus extremos & medios colores videt. Medici contra, cutem organum tactus esse contendunt. Quæ sanè opinio probabilior & verisimilior videri debet, siue temperiem cutis spectes, siue structuram, siue situm. Si temperiem consideres, est cutis partium omnium temperatissima, mediūque obtinet extremorum, reliquarum velut canon & regula, perfectius itaque de tactilibus qualitatibus indicabit. Debet ex Aristotelis doctrina secundo de anima, αἰσθητὴν ὅλον omne esse πᾶν, id est, omnis qualitatis aliene expert: sic Crystallinus humor visibilium spectra & imagines excipiens coloratus non est, & ictericorum flavescentes oculi flava omnia diiudicant; quibus linguale suffusa est, iis amarescunt omnia; in naribus nullus est odor peculiaris; in auribus nullus sonus; ita cutis cum nullum qualitatum excessum habeat, tactus organum statui debet. Si structuram cutis spectes, plures ad eam quàm ad carnem nervi feruntur, at nervus spirituum sensilium est lator, sensibus eos ministrans. Si cutis situm consideres, vicinior est obiectis extrinsecus occurrentibus quàm caro, quia partium omnium est terminus; itaque eorum qua nocitura aut profutura sunt, statim nos admonet. Erit igitur cutis potius quàm caro, tactus organum. Quæ obiciunt Peripatetici, leniora sunt, quàm ut sententie nostræ veritatem labefactare possint. Sentire carnis beneficio cutim, falsum est; nam secto nervo ad carnem delato, perit motus ille so cutis sensu; at præciso qui ad cutem fertur nervo, perit statim illius sensus. Exquisitiùs sentit & magis dolet denudata caro, quia laxior minùsque iniuriis assuetæ; at cutis aëri exposita eius vim non experitur; sic dentes aëri expositi non afficiuntur, reliqua ossa denudata statim μελασµὸν concipiunt. Lingua exquisitiùs gemmarum frigiditatem sentit, non carne sua, sed membrana; at membranas organa tactus statuiamus. Sensile positum supra sensorium non sentiri falsum est; ita enim nullum esset organum tactus præter os, aut cartilago, aut vinculum. Sed interpretatione eget axioma illud Aristotelicum. Sensuum alij sunt ad vitam simpliciter necessarij; scholastici dicunt adesse simpliciter, ut tactus & gustus; alij ad bene esse, ut visus, auditus, odoratus. Horum medium externum est & ab organo separatum; illorum medium internum est & cum organo ita coniunctum, ut separari nequeat. In illis verum est sensile supra sensorium non sentiri perfecte, nam & intra oculum videtur quidpiam & in aure interna sonus exauditur, & intra naves fixus odor sentitur; sed imperfecta est & depravata sensio; at in gustu & tactu quia mediū internum est, potest ad motū sensile sentiri. Statuatur ergo cutis organū tactus & cuticula eius mediū. Arabis verba ita interpretor, cutem equalia seu temperata non sentire, id est nulla molestia & dolore ab illis affici, dum ea percipit. Obicies, per nervum sentire cutim, esse igitur nervum sensus organū, non cutim. Dic per nervum moveri carnes, nō tamen voluntarij motus organum esse immediatum; dat sensum ut & motum nervus, quia animalis facultatū imperium cum spiritu deferat. Sed satisfaciamus Galeno, qui libro de instrumento odoratus ventriculū tangendi organum vocat, quia exquisitissimo sensu pollet. Sanè ventriculi os acerrimo sensu præditum admittimus, ob insignes nervos, quos accipit à sexta coniugatione, & ratione famis ac sitis, quam solus ventriculus sentit, tactus peculiaris organum non negamus, ut & genitalia, quæ ad procreationem incredibili libidinis ostro percita sunt; sed solam cutem externi tactus organum, & qualitatum omnium tactilium indicem esse volumus.

Authenticitates.

Medicis cutis est organum tactus. Rationes.

Respondetur Peripateticorum rationibus.

Quomodo intelligi debeat sensile supra sensorium non sentiri.

Obiecta. Solutio.

Quomodo ventriculus sit tangendi organum.

De temperamento cutis.

QVÆST. II.

Temperamentum
esse cutem.



E cutis temperamento, leuia quadam hîc obseruantur, quæ in rudiorum gratiam lubet explicare. Temperatissimam esse cutem scribit Galenus i. de temperamentis, quod inter sanguineum & exangue mediam obtineat naturam; unde caro nervosa & nervus carnosus dicitur. Capite quinto libri tertij methodi, cutis quia carne tum sicciior, tum densior est, si carnem astringas & sicces, cuti persimilem reddes. Hoc expressit etiam Hippo-

crates libro de humorum usu. Externa cutis, quæ & sibi ipsi & nervo sanguineo continua est, cum extra familiarem calorem in externo frigore versetur, ab utrisque sæpe alteratur & utrisque sæpe indiget. Contrà, æqualem & temperatam non esse demonstrari potest Galeni & Auicennæ autoritatibus; Commentario secundo prognosticon cutis sanguine alitur pituitoso; at iisdem nutrimur quibus constamus. Auicenna sen prima primi doctrina quinta cap. 4. carnem scribit ad æqualitatem magis quàm reliquas partes accedere, erit igitur caro, non cutis temperata. Accedit quod temperata dici non debet, quia est debilissima, recipit enim internarum partium superuacua, & emunctorium dicitur vniuersale. Sed facilis ad hæc omnia & expedita responsio est; alitur pituitoso sanguine cutis, id est non plane excocto elaboratoque, quem calidum esse constat. Auicenna carnem non æqualem & temperatissimam affirmat, sed proximè ad æqualitatem accedere; quæ ratione humanum corpus temperatum dicitur, licet calidum sit & humidum. Imbecillitas cutis non est à temperie; non enim perse & natura sua debilis est; sed ex euentu ratione situs & vasorum: maiora namque vasa in minima desinentia, quia propius absunt à fonte, sunt validiora; itaque internarum partium facultas expultrix cum sit potentior, faciliè in externas superflua deponit, ut imbecillior sit cutis ratione expultricis facultatis. Caterùm an ex cute totius temperiem coniciere possit Medicus, dubitari potest. Aristoteles ex organo tactus ingenij vires colligit, quia in puriore tactu sensus est defæciator, & phantasmata subtiliora, unde anima sublimior operatio. Galenus questionem soluit capite ultimo libri secundi de temperamentis. Errant (inquit) qui ex sola cute totius temperiem colligunt; neque enim si dura cutis est, necessario siccum est animans, nec si mollis depilifce, humidum erit totum animal. Verùm si æqualiter temperatum sit totum corpus, æquum est, ut qualis sit cutis, talis & reliquarum partium unaquæque; sin inæqualiter temperatum, non item; quippe ostrearum totum corpus humidissimum est, cutis vero siccissima.

Non esse tem-
peratam.
Autorita-
tes.

Ratio.
Sæpius ratio-
nibus & au-
thoritatibus.

Pnde imbecil-
litas cutis.

An ex cute
totius tempe-
ries assequenda.

Solutio.

De ortu & generatione cutis.

QVÆST. III.

De generati-
one cutis opinio
vulgata.



E cutis generatione varij variè sentiunt. Putat vulgus eam nasci ex renarum, arteriarum & nervorum extremitatibus dilatatis, quia ubique sentit, alitur & vivit; at vita per arterias, nutritio per venas, sensus per nervos communicatur. Ego ferri quidem ad cutem vasa quamplurima non inficior; nam & ab axillaribus, & à iugularibus, & à cruralibus venis infiniti ad cutem feruntur surculi; totidem etiam arterie hos ramos comitantur. Sparguntur etiam per eam nervi quamplures; sed ex eorum inexplicabili textura cutem generari non puto. Galenus libello de formatione fetus, cutem primam fetus partem esse vult; quod an verum sit suo loco agitabitur. Volunt quidam cutem fieri ex superficie carnis rescicata, quia in vulneribus caro siccata in cutis naturam degenerat; id Aristotelis & Galeni autoritate confirmari potest; ille secundo de generatione animalium, cutem

Non fieri ex
vasis dilata-
tis.
Alia opinio.

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 279

vult fieri carne senescente, hic tertio methodi cutem ex subiecta carne produci scribit. Sed quia inter carnem & cutem interiecta sunt multa corpora, adeps scilicet & membrana illa carnosae dictae, quae verè nervosa est, si collum & faciem exceperis, non video quomodo ex carne cutis enasci queat. Quae verò in vulneribus densata & siccata medicamentis epuloticis carne gignitur cutis, non vera est cutis, sed illegitima, per medium non homogeneum, sed heterogeneum genita; nam & reliqua cute est durior, nec unquam ob densitatem in homine capillatur. Sunt qui ex carne & nervo simul mixtis eam fieri putent; quia apud Galenum multis in locis cutis definitur velut sanguine praeclitus nervus. Sed falsum id esse, hoc unum inter cetera testatur, quòd ubi plures sunt nervi, ibi cutis durior non est; in manu enim interna, plures sunt nervi quàm in vertice, at durior est crassiorque verticis cutis. Nos simul cum ceteris partibus generari cutem existimamus, ex semine scilicet & sanguine simul mixtis; ideoque nervum carnosum, aut carnem nervosam posse dici, quod mediam inter carnem nervumque naturam sit adepta; non enim planè exanguis est ut nervus, nec omnino sanguine abundans ut caro, sed veluti sanguine praeclitus nervus.

Tertia opinio

Concellitur.

Opinio nostra.

An cutis actionem edat officialem.

QVÆST. IIII.

MEDICI ferè omnes de usu & actione cutis idè sentiunt quod de usu & actione ossium. Ossa communem quidem habent usum; nam Hippocrati, libro de ossium natura, τῶ σώματι σθένος καὶ ὁρμήν τε, καὶ εὐδὸς παρέχοντα, id est, corpori stabilitatè, rectitudinem & figuram exhibent. Sed actionem communem & officialem nullam edunt. Communem intelligo pluribus partibus aut toti animali inservientem. Eadem ratione cutis usum quidem habet communem, quia uniuersum corpus tegit, fouet, colligat: sed actionem nullam edere creditur officialem. Id apertissimis verbis expressit Galenus libro de morborum causis. Cutis (ait) coctionem non edit, ut ventriculus; non alimentì distributionem, ut intestina & vena; non sanguinis generationem, ut hepar; non pulsus, ut cor & arteriae; non respirationem, ut pulmo & thorax; non voluntarium motum, ut musculi; ego tamen communem actionem, animalem scilicet ei tribuo. Licet enim sensio omnis passio sit, quia sentire est pati; nulla tamen sensio sine actione perficitur. Politiores Philosophi, in omni sensione duos motus agnoscunt, materialem & formalem; ille receptione sit speciei; hic actione; prior inest organo ratione materiae; posterior ratione potentiae & animae; ille non est causa effectiua sensationis, sed dispositio; hic essentialiter est sensatio. Liceat verbis uti scholasticis. Dum ergo cutis qualitates quae tactum ferunt, percipit, & externi tactus a stimatrix ac iudex censetur, communem toti animali non usum modo, sed etiam actionem praestat. Priuata porò cutis actio, est nutritio, cui attractrix, reentrix, coctrix & expultrix famulantur.

Cutis actio-
nem nullam
officiàlem edere
creditur.

Nos existima-
mus cutem
actionem edere
communem.

An adeps frigore vel calore concreseat.

QVÆST. V.

AD adipis generatione & temperie, tanta olim disceptatione, tamque diuerso consilio certatum est inter Medicos, ut maximos hodie fluctus in pelago Medicinæ excitari sentiam. Hos ego, ratione duce, tanquam prosperae & salutaris cuiusdam stellae lumine illustratus, fortassis componere, omnesque omnium perturbationum procellas à rudiorum animis dispellere ac dissipare contendam. Ne autem in nominum varietate diutius haeream, πῦμα, λίπος, & ap pinguedo, adeps, axungia, seuum apud Medicos sepe

Adipis no-
mina.

et frigida co-
gi adipem, spi-
ritus Galeni.
Rerum.

Contraria
opinio.
Materia cali-
da est.

Efficiens adi-
pi causa, co-
lor.

Ratio prima.

Secunda.

Tertia.
Quarta.
Quinta.
Sexta.

Septima.

Effectus adi-
pi calidi.

Quid sentien-
tius de adipis
efficiat causa

confundantur. Estque eorum omnium eadem ferè ac similis ratio: hac tamen accurate dis-
tinguit Aristoteles 2. De part. animal. & Galenus 4. & 11. De simplic. medic. facul. ad quos
studiosum relegendum puto: hic temperiem tantum & generationem adipis scrutari est ani-
mus. Galenus 2. De temper. adipem à frigido cogi apertissimis verbis declarat: modum au-
tem generationis ita exprimit. Dum aërea pinguiorque sanguinis portio per tennes tunicas
rurum tunicas roris instat exudat, & ad frigidiores partes, ut membranas, allabatur, frigoris
vi densatur: propterea fœminæ viris obesoires, quia frigidiores, & hyeme pinguiora omnia,
necnon quibus exiliora sunt vasa: at venarum angustia frigide temperiei soboles est. Quod
si animalia quæ venas amplas habeat, interdum pinguescant, id à nativitate non habent tem-
perie, sed à citititia: victus quippe ratione & vite instituto: quin etiam à frigido adipem in-
crassari hinc liquet, quod statim à calido fundatur. Venter inferior, quia membranosus &
longè diffusus à fonte caloris, copioso adipe oblituitur; quæ verò sub pectore partes conline
sunt, minus adipis congesterunt: hac Galeni & veterum ferè omnium Græcorum ac Ara-
bum est philosophia. Qui contrariam tuentur sententiam, materiam adipis calidam, agens
calidum, effectus calidos ita demonstrare nituntur. Materia, etiam Galeno teste 2. De tem-
per. sanguinis est portio aërea, pinguis, oleosa, eademque & bilis & seminis; propterea quæ
pinguis sunt, steriles sunt: & quæ saginare volumus animalia, castrare solemus. Aristoteli
pingue nec terreum est nec aquicum, sed aëreum; itaque innata & fluitat perpetuò. Efficiens
calidum esse, primus omnium voluit Aristoteles 3. De hist. anim. & 2. De part. anim. scri-
bit enim coctione adipem fieri: at coctio solius caloris opera ac ministerio perficitur. Eius
Problematis, pingue ait solum odorem non reddere, quia non est crudum sed coctum. Hanc
philosophi sententiam sequenti sunt doctissimus Veiga & Argenterius, commentarii in Ar-
tem parvam, necnon Laurentius Iobertus, qui de adipis natura paradoxum edidit elegan-
tissimum. Rationum momenta hic proferam. Concretio omnis fit à frigido actuali: at tale natu-
rum in viventibus: sunt enim ossa tangenti calidissima & membrane omnes actu calide
sunt; nam ventriculus membranosus chylum coquit, vesica membranosa suo calore pitui-
tam exurit & in lapillos vertit. Sed & membranas cerebro calidiores dixit aliquando Ari-
stoteli: at cerebrum quovis ambiente aëre etiam æstivo calidius est; æstivus autem aër semper
liquat, nunquam cogit. Cor viscus calidissimum perpetuò motu agitur, adipe copioso cir-
ca basin oblituitur. Cerebri membranæ copioso sanguine irrigantur, & vasorum myriadibus
implicitis, nullus unquam adnascitur adips, ut neque frigidioribus ossium tunicis: senibus
ac melancholicis temperamento frigidis, parum inest pinguedinis. Ren calidissimus, pituitam
exurens, & in lapillos cogens, adipe copioso circumfusus apparet. Quinetiam adeps pars
corporis est animata, quia certam habet figuram, & vi membranae sanguinem alterantis
albescit. At quis partem à frigido fieri unquam voluit? Addamus & nos Galeni auctori-
tatem, quæ eorum opinioni faveat. Scribit c. 59. Artis parvæ, frigidis & sicci corporibus
adipem per carnes dispergi, non per tunicas: sed carnes calide sunt. Postremò, adipem cali-
dum esse, effectus docent. Nam 5. De simplic. medic. fac. adipem inter πέντην & statum Ga-
lenus, & epiploon adiposum suo calore ventriculi coctionem iuvare scribit libris De ossi-
partium: adde, quod flammam concipit facillimè. Itaque concretionis causam referunt cum
Aristotele ad membranarum densitatem, voluntque aëream & pinguem sanguinis portio-
nem per carnes transfundi, eas ob raritatem facile permeare: sed dum densam membranam
nanciscitur, ibi coercita à calore cogitur, & vi spermaticæ partis, cui inhaeret, albescit. Adde
si vis Hippocraticæ auctoritatem: is enim libro de carnibus vult pinguis sedem & metropo-
lim esse calidum. Extremas puto & contrarias hinc atque hinc directas acies videri. Nos
utramque fouere partem non possumus. Præstat Galeni & veterum Medicorum, quàm neo-
tericorum dogmata tueri. Nostrium igitur de adipis natura & generatione iudicium hoc

est, utinam bonum. Adipis materia pingue quid est & aëreum; efficiens causa frigidum condensans, non quidem absolute & actu tale (quia hoc in viventibus non agnoscimus) sed minus calidum, quod philosophia pro frigido est: ita non à frigidis absolute partibus, sed à minus calidis, quales sunt membrane, cogitur adeps. Hæc exemplorum appositione claviora illustrioræque euadent. Plumbum adhuc calens & ignitum, statim ab igne amotum, densatur, idque aut à calido, aut à frigido; non à calido igneo, hoc enim liquat, non à frigido actu, quia vres si manū admoueas; ergo à minus calido, quod illi erit pro frigido: requiritur enim certus caloris gradus, qui & plumbum & adipem densari prohibeat; hunc gradum sole carnosæ partes adeptæ sunt, unde fit ut circa eas numquam adnascatur adeps; membranosæ verò, cum parem caloris gradum non obtinuerint, oleosam sanguinis portionem statim coagunt. In vasorum operculis adhuc calentibus, vapor guttescit, non à frigido actu, sed quia in operculo minus est caloris, calescit enim solo vapor: quare minor ille calor pro frigore est feruido vapor. Sic à balnei fornice vincitur exhalationis calor, quo cedente, guttæ succedunt aqueæ. Sic melancholicorum vapores à feruidioribus & æstuantibus præcordiis ad cutim minus calidam elati, frigore coguntur, & in sudores abeunt. Sic partium omnium expirationes ad cerebrum minus calidum elate, concrescunt. Ea itaque ratione adipem à frigido dicimus concrescere, id est, à minus calido; ut cerebrum frigidum dicimus, id est, minus calidum, & aërem æstiuam naturæ suæ & sibi calidum dicimus; frigidus tamen est igni, frigidus viventi; quia per ignis proportionem vivimus, & media extremis contraria sunt in prima Philosophia. His ita constitutis, aduersariorum rationes singula diluenda sunt. Concretionem omnem à frigido actuali fieri negamus, cum adhuc calens plumbum frigore cogatur. Quod visceri calidissimo, cordi scilicet adnascatur adeps, id mira naturæ providentia factum volumus, ne ob perennes motus æstu incandesceret, & quasi incendio conflagraret, quæ etiam ratione aquam velut urinam (inquit Hippocrates) interposuit, ut sanum in custodia floresceret. Vincit mehercule (ais Chrysippus libro De providentia) finalis causa efficientem & materialem; & docet Aristoteles contra Democritum finem esse primam & precipuam causam in operibus naturæ; mouet enim alias, nec mouetur ipsa. Scio quid dicant aduersarii; naturam aduersus proprias leges nihil moliri, debuerat ergo cor temperatum creari, sed liceat mihi idem illis obtrudere, non erat frigida inspiratio necessaria, sed temperandum à primo ortu erat cor. Quæ quàm sint absurda, quis non videt? debuit necessario cor calidissimum efformari; quia in hoc viscere lares focumque esse oportuit; quo natius singulorum partium calor foueretur. Si adipis in corde necessitatem non admittant; sciant non in sinibus cordis neque in carnosæ eius substantia adipem nasci, sed in vasorum membranæ tantum, quæ partes minus sunt calidæ. Sunt qui adipem hunc partem cordis esse velint, quod eandem & figuram & circumscriptionem seruet perpetuo, neque igne liquetur. Cerebri membranæ adipem innasci non putamus: quia nullus foret illius usus; quinimo visciditate sua fumidorum vaporum perspirationem impediret. Cerebrum enim instar cucurbitule trahit continuo sorbetque expirationes partium inferiorum, quibus nisi debiscens calua per suturas pateret, assiduus earum haustibus cerebrum inebriaretur: impediret etiam adeps cerebri motum. Deest itaque finalis causa, deest etiam materialis, quoniam sanguis ad cerebri nutritionem & spirituum animalium generationem copiosissimus requiritur, quem in adipem verti non decuit. Senibus ac melancholicis parum adest pinguedinis, quod in illis desse materia, hi sicciores sunt. Renem pinguedo non carnem sed membranas tantum circumdat: scribit Aristoteles utrumque renem pinguescere, sed dextrum minus quàm sinistrum, quod calidior sit. An verò adeps pars sit animata & vivens, mox disputabitur. Postremo, dum frigidus & siccis corporibus adipem per carnes dispergi, non per tunicas scribit Galenus, per carnes intelligit musculos, qui propriis teguntur tunicis: illis itaque musculorum tunicis ad-

Illustratio
opinionis
nova.

Ad minus calidum
pro frigido ha-
betur.

Demonstratur
contraria ra-
tione.

Ad primam.
Ad secundam.
Cor adeps
circa cor.
Finalis causa
prima est in
naturæ operi-
bus.

Ad tertiam.

Cor nullus in
cerebro adeps.

Ad quartam.

Ad quintam.

Ad sextam.

Ad septimam.

naschitur adeps; quia sanguine & venis abundans, sed in distantissimis tunicis obsecitatem non sufficit adipis materia: docuimus enim non generari adipem nisi ex superfluo sanguine: a frigidis & siccis corporibus non redundant ille reliquis. Quos memorant effectus adipis, nihil concludunt: *πρωσις* sanè medicamentum est, & in epiploo ventriculi calorem fouet, non primò & per se, sed ex euentu, quia infarctu & visciditate sua prohibito caloris effluxu calorem ingeminat, & penetrabili frigori meatus occludit; atque ea ratione calefacit nos, qua & vestes. Quod flammam concipiat facillè id habet à pingui & aërea materia; sic camphora in igne ardet, quam tamen frigidam esse omnes credunt: sed neque effectus hi, efficiem adipis causam calorem esse demonstrant: oleum enim hyeme densatum, citissimè accenditur, at quis neget ambientis frigore concreuisse? Concludamus itaque à frigido, id est, minus calido cogi adipem, & membranis tantum adnasci, quod debilior earum sit calor influxu cordis copioso destitutus.

Conclusio.

An adeps pars sit corporis animata & viuens.

QVÆST. VI.



VI adipem caloris vi concreuisse contendebant, hac ratione nitentur, partem nullam frigoris vi densari: adipem autem viuentis partem esse, quod an verum sit, videamus. Potest sanè & autoritatibus & rationibus id confirmari. Galenus comment. in librum Hippocr. de nat. hom. adipem inter similes partes recenset: *τὸ* lib. 6. de plac. cap. 8. adipem

Adipem partem esse.
Autoritates
et Galeni.

similem ubique functionem edere scribit, ut arterias, venas & nervos; si functionem edit adeps, ergo animatus est, & uiuit. Quinetiam in Arte parua, dum quatuor statuit partium differentias, adipem in earum numerum adscribit, quæ à seipsis gubernantur. Libro de morborum differentiis, ait, auferri partium numerum si arteria, vena, nervi, caro & adips auferantur: libro de inequali intemperie scribit digitorum particulas esse ossa, cartilagine, ligamenta, arterias, venas, carnem, cutim, adipem. Autoritas rationibus his stabilienda. Crescit & augetur adeps ad certum vsque terminum, & in quibusdam animalibus certam sedem & figuram perpetuò habet. Deinde albescit vi membrana sanguinem alterantis, & quasi assimilantis, quod solius animæ & caloris est opus. Postremo, in medio lardo adenes plerumque reperiuntur, qui non gignerentur nisi in adipe inesset vis quedam formatrix. Nos partis nomen ita distinguendum putamus, ut alias latius, nonnumquam strictius vsurpetur. Fusa & ampla significatione, quicquid totum complect, pars totius dici potest: qua ratione adeps partis nomen meretur, ut pili, ungues, medulla, sanguis, lac: sed pressiore significato adeps pars dici nequit, non enim communi vita fruitur, nec ullam circumscriptionem & figuram habet propriam; quinetiam per inedias in alimentum verti potest, Galeno teste: at pars nulla alteram nutrit. Adde quod, nec spermatica est pars, nec carnosæ. Ex semine generari adipem nemo dixerit; in prima enim partium delineatione adeps non apparet: carnosæ omnes partes & sanguineæ, rubræ sunt, non igitur pars viuens & animata dici debet. Dum Galenus similem partem appellat, fusiore vtitur partis significato: dum 6. de placitis, adipem functionem edere scribit, per functionem intelligit usum. Usus enim & actionem sæpe confundit Galenus, licet multum inter se distinguantur, ut libro primo est demonstratum. Sic pili usum habent, actionem tamen nullam edunt. Quod obiticiuni, augeri adipem, dici accrescere appositione materia, ut pilos. Quamdiu ergo suppetit materia, tamdiu augetur: cessante materia, ut in senio, desinit generari. De adipis albedine, sunt qui ita philosophentur, candorẽ hunc non à vi formatrice, sed à frigido potius conciliari: sic pituita omnis candicat, cuius efficiens causa est frigus. Ego albedinis causam refero ad leuem sanguinis à membranis partibus alterationem: dum enim ad membranas copiosior allabitur sanguis, leue

Ræcipienda.

Secunda.

Tertia.

Explicatio
questionis.

Adipem partem non esse
animatum.

Solutio
authoritatis
et rationis
contraria.

Cui candor
in adipe.

aliquid rudimentum primum quidem consequitur; sed quia copiosior est quam ut assimilari queat, parti impactus, densatur à debiliore membranarum calore: itaque non omnino in partem naturam facessit: ut imperfecta videatur pars. Hoc voluit Aristoteles libro de partibus, dum inter carnem & adipem id putat inesse discriminis, quod in generatione carnis ita elaboratur sanguis, ut vertatur in partem quæ vim habet sentiendi; at in generatione corporis pinguis, sanguis mutatur in partem, quæ nullum sensum habere potest. Postrema rationi ita satisfaciendum puto; adenes non ab adipe generari, sed à prima conformatione constructos; deinde adipe undiquaque circumfundi; vel adipem circa adenes crescere; vel adenes à vicinarum partium, non adipis calore generari.

HISTORIA ANATOMICA.

Partium continentium propriarum descriptio. CAP. VII.



VENTRIS inferioris partes continententes propriæ, sunt abdominis muscoli, & peritonæum. Musculi in omnibus semper octo sunt, quatuor utrinque congeneres; id est, figura, magnitudine, robore & actione pares. Ex quibus quatuor sunt obliqui; duo recti, totidem transuersi, à situ quem occupant, & villorû textura appellationem hanc sortiti. Primi omnium inter secundum occurrunt obliqui externi omnium latissimi; dein obliqui interni; illos descendentes, hos ascendentes appellant Anatomici omnes. Quàm benè autem, aut malè, libro de musculis explicatum est. Succedunt recti duo, in quorum parte interna, venæ apparent ascendentes & descendentes, quæ circa umbilicum coeunt; his omnibus subsunt transuersi. Accedunt tandem parui duo succenturiati. Horum omnium historiam, & quæ in ea occurrunt controuersa, libro 5. accuratè descripsimus: eam igitur inde repetat studiosus lector.

*Numerus
musculorum
abdominis.*

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An per epigastricam & mammariam venas mammarum & vteri consensus fiat.

QVÆSTIO VII.



RER internam rectorum musculorum partem, venarum duarum propages excurrere, certissimum est. Vtrum autem in medio musculi, quod circa umbilicû est, coeant, dubitant quidam: ego tam sepe in recens dissectis cadaueribus id obseruavi, ut nihil in Anatome apertius putem. Venarû altera epigastrica dicitur, altera mammaria. Epigastrica sepe ab iliaco descendente caua ramo, sepius à crurali propagatur: mammaria vero à ramo ascendente caua, quem subclauium vocant. Illa per epigastrij musculos, hæc per internam sterni partem & triangularem muscolum fertur; mammas ne minimum quidem attingens, nisi fortassis capillari, & ferè insensili ramo: propterea nescio qua ratione mammariam vocient, cum mame venas habeant amplissimas, quæ à thoracis deriuantur. Has venas osculis quibusdam coeuntes, in eum usum constructas volunt quidam, ut per eas mammariam & vteri consensus ille fiat, quem mirus Hippocrates, Galenus & Medici omnes tantopere celebrant. Ego vasa hæc nutritionis solius gratia comparata esse puto, quod in viris etiam reperiantur. Possè autem per ea consensum fieri simpliciter & absolute, non

*Venarum
epi-
gastrica &
mammaria
consensu.*

Conferendum
fieri patiens &
frequentius
per internas
venas.

inficior: quia ex summi Diſtatoris doctrina, libello *ᾧ ἐστὶν ὁ φῆς, ἔξ ὧν ὅλα μὲν, ἔξ ὧν πάντα*, *ἐμπυρία* *μία, ἐμπυρία πάντα*: conspiratio vna, confluxus vnus, consentientia omnia. Sed patentiores & magis conspiciuos mirabilis huius sympathie ductus agnosco, venas scilicet internas. Docet nos Anatomie ab axillari ramo insignes ferri ad utramque mammam venarum furculos: ad uterum verò innumeras à spermatico & hypogastrico ramo propagines distribui: epigastricam venam ad uterum non ferri, nec mammariam dictam ad mammam, nisi capillari ramo, sensus ipse docet. Est itaque verisimilius per internas illas & insignes venas refuere à mammis ad uterum, & ab utero ad mammam sanguinem, quàm ab externis his capillaribus. Obseruauimus saepe puerperas tribus aut quatuor à partu duobus, maximam lactis copiam per vrinas profudisse: quis per epigastricum ramum id fieri dixerit? Nemo, ut opinor, sana mentis. Ergo per hypogastricum, cuius ramuli ad vesicam feruntur, eiusque tunicas alunt. Volumus ergo à thoracis venis quæ mammam irrigant, & lac, & sanguinem refuere ad axillarem; ab axillari ad truncum vene caue, à quo per continuatam ad hypogastricum ramum defluant, hinc modò in uterum, modò in vesicam. Quomodo autem lac purum sanguine nullo adulteratum per vrinas excernatur, libro nono agitauimus, dum empyicorum expurgationem patefacimus.

HISTORIA ANATOMICA.

De peritoneo.

CAP. VIII.



ARTIVM continentium postrema est peritonæum, membrana tenuissima, latissimæ atque telis simillima; quæ, quoniam inuolucrum modo visceribus & partibus omnibus regionis imæ *ᾧ ἐστὶν ὁ φῆς*, id est, circumtenditur, *ᾧ ἐστὶν ὁ φῆς* *χρῆσιν*, aut *ᾧ ἐστὶν ὁ φῆς* *ὁ κέρας* dicitur: Hippocr. 7. Epidem. *ᾧ ἐστὶν ὁ φῆς* in plurali dixit. *σφῆρα* *συνεπληρωμένη, καὶ ὀρεον, καὶ σφῆρα, καὶ* *ᾧ ἐστὶν ὁ φῆς*: id est, valdè oppletum est serotum, crura & peritonæum: Arabes, *Sphæra* vocant. Huius figura sphaerica est, sed aliquantulum oblonga, extrinsecus fibrosa, vt firmius musculis hæreat, intus læuis, terfa ac velut aqueo humore oblita, vt liberiora sint viscera. Credit vulgus peritonæum nasci ex ligamentis, quæ lumborum vertebrae connectunt, & quæ sacrum os ilium ossibus committunt. Ego membranas omnes, vt & spermaticas partes simul delineari puto: Si tamen pars altera ab altera oriri credatur, quia illi firmiter hæret; malo cum Fallopio sentire, oriri peritonæum à plexu illo neruorum validissimo, qui mesenterio ortum dat à vertebrae enim lumborum & cæteris partibus facillè separatur; at huic plexui annexa, vt illacerum inde auelli nequeat. Substantia peritonæi tota est membranea; tenuis illa quidem, sed firmissima: membranea, vt laxari & distendi facillè possit, dum venter quauis de causa turgescit: tenuis, ne pondere suo subiectis partibus sit molesta; firmissima, ne distenta facillè disrumpatur. Duplex omni ex parte membrana hæc cernitur, sed crassitiem vbique eandem non seruat. Posteriore siquidem parte crassior est, anteriore tenuior; rursumque viris, à xiphoidæ ad umbilicum vsque crassior; scæminis contrà ab umbilico ad pubem validior conspicitur; his quidem ad fœtus incrementum; illis verò ad ventriculi multa crapula turgiduli distentionem. Est autem obseruatione dignum, quod omnibus fœtibus Anatonicis fuit incognitum, peritonæum dum ad vesicæ regionem peruenit ita manifestè duplicari, vt amplius relinquat inter duas tunicas spatium, quod vesicæ continendæ

Nomen.

Figura.

Ortus.

Substantia.

Obseruatio
pulcherrima
de ductu rami
peritonæi
& sic
visita.

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 285

continendæ sit satis; adeo vt vesica, nec amplo illo peritonæi ambitu contineatur, vt reliqua viscera, nec extra peritonæum sit (vt voluerunt quidam) sed inter duas peritonæi tunicas latet. Peritonæum superiore, inferiore & anteriore parte perforatur. Superiore, qua diaphragmati annectitur, tria habet foramina, vt arteriæ descendenti, venæ cavi ascendenti, & œsophago pateat aditus. Hæret autem diaphragmati ita validè, vt eo inflammatione obfesso, hypochondria intrò sursum conuellantur Hippocrati in Coacis prænotionibus. Inferior pars circa anum, ceruicem vteri, venas arteriasque descendentes crurales dictas, necnon qua partespermatica vasa præparantia ad testes feruntur, & eiacularia ascendunt, perforata est; sed foramina hæc veriùs productiones dixeris instar canalis elongati. Anterior & media peritonæi pars, circa vmbilicum manifestè in fœtu perforata cernitur; foramen hoc in adultis oclusum si patefiat, ὀμφαλοκήλην herniæ speciem facit. Peritonæi quinque sunt vsus. Primus, vt regionis imæ partes omnes inuectat, & sanè singulis communem largitur tunicam, aliis crassiorem, aliis tenuiorem; prout cuiusque & vsus & necessitas postulant. Secundus, vt omnia quæ amplectitur continetque viscera, ab extrinsecus ambientibus musculis, velut interiectus quidam paries separet, ne aliquando distenta intestina in media ipsorum spatia intercedant. Tertius, vt sicci alimenti excrementa, tanquam manu prementè, citius propellantur. Quartus, vt velut tegmentum quoddam exactè circumtensum omnia constingat, ne leui occasione laxior ventriculus aut intestina flatibus infestentur. Postremus, vt quæ ab eo continentur omnia, tutò colligenter, suisque sedibus fixa hæreant. Quod si peritonæi continuitas violetur, grauissima inde emergunt symptomata, & herniæ diuersa genera.

Peritonæi septima.

Peritonæi vsus quinque. Primus. Secundus.

Tertius. Quartus.

Quintus.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

De peritonæi membranis, vsu & productionibus.

QVÆSTIO VIII.

N peritonæi historia quedā occurrunt nobis controuersa, quæ paucis aperiemus. Primum, membranam hanc simplicem esse veteres tradiderunt, quod tenuissima, & latis aranearum telis simillima secātibus appareat. Columbus à xiphoide ad vmbilicum tantum simplicem esse scribit; ab vmbilico verò ad pubem duplicem, idque ratione vasorum vmbilicalium, quæ inter membrana duplicaturæ ferri debuerunt. Ego peritonæum omni ex parte superiore & inferiore, anteriore & posteriore, dextra & sinistra duplex esse sæpe obseruanti; neque peritonæum modò, sed omnes humani corporis membranas, etiam tenuem (piam ab Arabibus dictam) duplices esse audacter asseuero. Vt ergo per infernas peritonæi partes, feruntur ad vmbilicum, arteriæ duæ & ourachos; ita ab vmbilico ad hepar inter duas peritonæi tunicas fertur vmbilicalis vena, vt satis mirari non possim, Columbum in sectionibus exercitatisimum, id nō animaduertisse. Vesalius tertium peritonæi vsu à Galeno assignatum ridet. Quomodo enim (inquit) peritonæum intestina premet, & alimenti suspensum deorsum trudet, cum ipsum voluntario motu, quo se contrahat distendatque, predictum non sit? Ergo thoracem constringet pleura cum diaphragmate? Sed noluit Galenus peritonæum, id per se & motu proprio prestare, sed ex euentu: dum enim abdominis musculi & septum transversum, tanquam manus supra quidem coeuntes, infra verò dirempta, constrieta ea quæ in medio sunt, exprimunt atque pellunt deorsum, tunc peritonæum eis opitulatur.

Omnes corporis membrana duplici.

Negat Vesalius peritonæi productiones in fœminis, quod penduli non promineant in illis testes, sed non observavit ferri ad inguina processus hos, esse uteri cremasteres foramina, que eadem in chordis musculorum oblique descendunt, unde fit ut frequenter bubonocæle laborent mulieres.

HISTORIA ANATOMICA.

De vasis vmbilicalibus.

CAP. IX.



QVONIAM inter duas peritonæi tunicas vasa quædam feruntur, quæ veteres vmbilicalia vocarunt, postular sectionis ordo ut prius ea demonstrantur, quam peritonæum omni ex parte examinatur. Dicuntur autem vmbilicalia, quod circa vmbilicum coeant, & per vmbilicum ferantur. Quatuor tantum sunt, vena vñica, arteriæ duæ, & ourachos. Vena, à radicibus portæ & cauis hepatis ortum ducit, estque non minus portæ, quam azygos causæ propago: hinc hepatis rimam & scissuram egrediens, inter duas peritonæi tunicas delata, ad vmbilicum fertur. Quomodo autem per choriõ diuaticetur, libro De formatione fœtus explicabitur. Eiuscum portæ, & per hanc cum caua continuitatem in tenello fœtu facile deprehendes, si tubulo eam inflaueris, videbis enim hepar totum, causæ truncos omnes, cor etiam ipsum & pulmones distendi. Arteriæ duæ à ramis iliaticis prodeuntes, peritonæi membranæ suffultæ, sursum ad vmbilicum prorepunt, sunt autem iliaticum arteriarum propagines potius, quam radices, alioquin nec cor arteriarum, nec hepar venarum esset p' *ἰλῶσις*, sed membrana illa fœtû ambiens, choriõ dicta. Venam, embrii nutriculam vocant, quod ea toto nouem mensium spatio alatur fœtus, refundit quippe maternum sanguinem eumque purissimum in radices portæ, & ab his, per mirabiles anastomoses, in cauam. Arterias verò spiritus semitas nuncupant, quod earum ministerio, respiret aut potius transpiret fœtus. Venæ illius ratione, vmbilicus p' *ἡ ἡ γαστὴρ*, radix ventris dicitur. Arteriarum verò ratione *ὀμφαλὸς, καὶ τὸ ὀμπνῆν*, quod est *ἀναπνῆν*, id est respirare: adeo ut fœtus nutritio & vita ab vno sint vmbilico. Quod his verbis expressit diuinus Senex libello De alimento. *ἡ δὲ ἀρχὴ μὲν ἐστὶν τὸ διὰ τὴν ἡ γαστὴρ, ὀμφαλὸς*, hoc est, *Antiquius alimentum per abdomen, vmbilicus*. Quartum superest vas, à vesicæ fundo extitum, & inter duas peritonæi tunicas ad vmbilicum delatum, ourachon vocant. Canalis est cauis vrinæ ad allantoidem deducendæ dicatus, non in brutis modò (ut volunt quidam) sed etiam in humanis fœtibus conspicuus, quod indicant eorum historię, quibus obstructa ceruice vesicæ, vrina ex vmbilico in multos menses profluxit, ut fusius libro octauo demonstrabitur. Quatuor hæc vasa in vmbilico coeuntia, fœtû in lucem edito, tanquam emerita & vieta in ligamentum degenerant, hepârque ac vesicam suspendunt: hinc tanta vmbilici est dignitas, ut Ægyptij pro supplicio grassatores hodie exuant corio, quos ita demum magno cum cruciatu diu viuere experiuntur, si carnifex vmbilicum ferro non attingat eo resecto, illico expirant, concidentibus quippe vasis quatuor.

Quatuor tan-
tū sunt vasa.

Vena vmbili-
calis ceteris
omnibus quo-
modo cœtina.
Arteriæ duæ

Vmbilici no-
mina.

Alimentum
fœtus ab vmbi-
lico.
Ourachos.

Vmbilici de-
generat.

História.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

De noua hydropicorum per vmbilicum compunctione.

QVÆSTIO IX.



QUONIAM in vmbilici mentionem incidimus, nouam, quæ per vmbilicum tuto fieri potest, hydropicorum compunctionem, hic attere non erit ab instituto alienum. Veteres Medici omnem hydropicorum apertionem *ἄρξεντρον* appellarunt. De ea quatuor queri solent; An fieri debeat, quando, ubi, & quomodo. Fieri tuto posse & debere, grauissimorum virorum auctoritas & ratio persuadent. Eam primus Hippocrates lib. *Ἐὶ τῶν ἐν τῷ πρῶτῳ*, sect. 7. lib. 6. Epid. & in Aphorismis præscripsit. Galenus 14. Method. Paulus Albucaſis, & Medici ferè omnes eam commendant. Auctoritati aſtipulatur ratio. Cum enim medicamentis internis externisque stagnantes aquæ vacuari nequeant, cur non ut in aliis tumoribus aqueis & pituitosis administrabitur ſectio, præſertim cum compuncta & vulneratæ partes omnes ignobiles ſint? Tempus apertionis aperuit eleganter Hippocrates ſect. 7. lib. 6. Epidem. *ὅδ' ὁ πρῶτος τὰς τῶν σπυγῶν τοῖς πυλῶν, ὅτι τὸν λαὸν αὐτῶν αὐτῶν*; id eſt, Hydropicos ſtatim ſecare oportet, empyicos ſtatim vrete. Illud autem *αὐτῶν* ſtatim, interpretor, aut cum Hippocrate lib. de initio morbi, *ταῦτα δὲ* (inquit) *κατ' ἀρχὰς* πρῶτον τοῦ νοσήσαντος, id eſt, in principio morbi hæc ſunt adminiſtranda: aut cum Galeno, priuſquam corrupta ſint viſcera, fruſtra enim educuntur aquæ, quæ vitiatæ iam & alienatæ viſceribus enaſcuntur, unde non leuiter errant, qui deſperatis omnibus paracêteſin aggrediuntur. Non ſunt (inquit eſſus) temerè profananda remedia quæ multis fuere præſidio. Tertium erat caput de loco apertionis. Paulus ex *Ægina Medicus*, & quotquot ad hæc uſque tempora fuerunt Medici, hydropicos paulò infra vmbilicum ſecant, & ad latera, ob muſculorum aponeuroſei ſiquid ex oppoſita parte affecti viſceris. Ego ſectionem illam approbo quidem, ſed commodius per medium vmbilicum fieri poſſe exiſtimo. Ad cuius rei illuſtrationem, obſervationes raras & rationes validas proferam. Narrat Antonius Beniuſenius, hydropicum quendam omni Medicorum auxilio deſtitutum, temerariam ſibi, & fortuitam libertatem vendicaſſe; liberaliore quippe, æque hauſtu ſoluta eſt de repente vmbilici vnitas, tantoque impetu effluerunt aquæ, ut detumuerit omnino venter, & tandem prudentis Medici opera conualuerit. Vidi ego Monſpelij hydropicam mulierem, cui nocte inſteſta nihil tale opianti, ſponte ſolutus eſt vmbilicus, & maxima ſtatim effluxit aquarum copia. Accerſor ego ſummo diluculo cum Barth. Cabrollo, Chirurgo & Anatomico peritiſſimo; vires penè exolutas reperio, ob repentinam eam & immodicam vacuationem: inbeo ſtatim reſci vires. Quibus collectis, perfectè per Dei gratiam conualuit, & nunc viuunt, valètiques ſuperſites. Narrauit mihi Gratiæ apoli, Ludouicus Villanouanus, Medicus doctiſſimus, ſe ruſticum vididiſſe; ea vmbilici compunctione perfectè ſanatum. Secuit importunum hydropicum meo iuſſu per vmbilicum, Balthaſar Garielus Monſpeliensis Chirurgus doctiſſ. & mihi amiçiſſ. iam totius penè detumuerat venter, & mortis periculo deſunctus videbatur, cum decimo poſt ſectionem die, me inſcio, libræ integram ceraſorum caput comedere: tunc ſuperueniente alui fluxu, labefactata naturali æconomia, intra biduum extinctus eſt. Tuto igitur ſectionem eam adminiſtrari poſſe experientia teſtatur: neque etiam id diſſuadet ratio. Nam quò Natura vergit, (inquit ſummus Dictator) eò ducere oportet: at ſæpe per vmbilicum vacuationem eam molitur Natura. Præterea ſit citra multarum partium ſolutionem hæc vmbilici compunctio: cœunt enim circa vmbilicum vaſa quatuor vmbilicalia, quæ ſi dehiſcant, ut ſolent in hydro-

ſe debeat fieri paracêteſis.

Tempus apertionis.

Locus apertionis.

Hiſtoria rara.

ſectio per vmbilicum tuto adminiſtrari poſſe.

288
adus aper-
turus.

pictis, aquarum eò confluentium vi & impetu, sola cutis secanda erit. Dices, ibi musculorum omnium aponeuroses terminari, unde periculum conuulsionis. Desinunt quidem in lineam albam musculorum omnium extrema: sed hæc circa umbilicum, ut in historia nostra docuimus, perforata sunt, ut vasis umbilicalibus aditus pateat. Quinetiam ascite laborantes ferè omnes exomphalosi & tumore umbilici, quem aquarum concursus parit, infestantur: adeò, ut si sola cutis acuto compungatur ferro, statim aquarum fiat effusio. Mitto, quod ita compuncti, in alterutrum latus citra dolorem decumbere possunt. Modus autem apertionis is est. Totæ umbilici circumferentia filo primùm traicienda est, ut arctari possit foramen, si maiore impetu erumperent aque: deinde acuto & pungente ferro secanda cutis, qua parte vasa debiscant: mox ænea aut argentea fistula in vulnus immitti debet, per quam effluere possit aqua; hanc non ἐξαπνύς, κενόη, id est, confertim euacuare oportet, sed κατ' ὀλίγον, sensim paulatimque. Exstat hac de re solenne summi Dictatoris edictum, Aph. 27. sect. 6. Ἀφροδίτη. οὐκ ὅτι ἐμπνοὶ ἢ ὑδρωπικαὶ τέ μνονται ἢ καίονται ἐκρυέντος τοῦ πύου καὶ τοῦ ὑδατος ἀπὸ τοῦ, πάντας ἀπὸ λλυνταὶ: Quicunque empyi & hydropici dum vruntur aut secantur, si pus aut aqua vniuersum effluant, moriuntur. Plurimum enim & repente vacuare, periculosum, Aph. 51. sect. 2. & lib. πάλαι τῶν ἐν τῷ πατρὶ. Hydropicos (inquit) per ferrum urito, & aquas sensim ac paulatim educito. Videtur sectionis huius nostræ meminisse Hippocrates libro de locis in homine. Quam tenuissimis (ait) & lenissimis crustis, ut aquam emittere possis, in umbilici ambitu inurito.

HISTORIA ANATOMICA.

Partium in regione ima contentarum brevis delineatio.

CAPVT X.



HIC ACTENVS regionis imæ partes omnes, cõtinentes, & communes, & proprias descripsimus: nunc quæ in ea continentur singule, eadem ἀκεχέαι lustrandæ sunt. Sunt autem earum duo genera; aliæ namque coctioni, aliæ procreationi suam dicarunt operam. Coctio officialis seu communis, duplex est, χύλωσις & αἱματώσις. Chylosi inferuiunt ventriculus, intestina, epiploon. Ventriculus cibi potioniſque receptaculum, chylum coquit; tenuia in intestina distribuunt perficiuntque; crassa feces derubant. Epiploon, quasi tegmentum ventriculi, coctionem iuuat. Hematosi inferuiunt venæ mesenterij, hepar, vena caua, vesicula fellea, lien; renes. Venæ mesenterij chylum preparant, conferuntque quasi rudimentum sanguinis: Hepar sanguini formam & ruborem indit. Vena caua sanguinem distribuit, vesicula, lien, renes totam αἱματώσιν, & regiè hepatis domus illuuiem expurgat. Hic partium coctioni dicatarum numerus est; in quarum descriptione, non nature, nec dignitatis, sed sectionis ordinem obseruabimus. At partium contentarum prima omnium sese in conspectum dat epiploon, mox in intestina, mesenterium & venæ portæ propagines, quibus detractis, conspicuus est ventriculus, rum hepar, vesicula, lien, tandem vena caua, renes, vesica. Partes procreationi dicatæ, aliæ sunt virorum, aliæ feminarum; virorum genitalia sunt spermatica vasa, testes, pudendum; mulierum eadem vasa, testes, vterus.



MENTVM, quoniam ventriculi fundo & intestinis *ἐπιπλόαι*, id est, innatar, *ἐπιπλῶν* à Græcis dictū est: sunt qui *γαγγαμῶν* & *σαγγῶν*, quasi *reticulum* vocent, quod venularum, arteriolarum & netulorum myriadibus, rete instar, implicitum sit. Aristoteles quarto De partibus animalium, *ὀμῆνα πμελῶδη*, membranam seu osam & adiposam nuncupat: Mauritanii, *zibum adiposum*. Hippocrates s. Epidem. *δέρπον* vocat, & libello De glandulis *τὰ ἐπιπλόα* in plurali. Hoc itaque epiploon imo ventriculo & superioribus intestinis obtensum, rarò in homine infra umbilicum descendit, sed maxima sui parte lienem versus sese retrahit, & velut in spiras colligit. Nullis hoc nexibus intestinis alligatur, nisi colo, cui mesenterij loco est. Omenti figura marsupij, sacculi aut peræ similitudinem refert; duplicem enim habet tunicam, superiorem & anteriorem vnā: inferiorem & posteriorem alteram: vnde *peritonæum duplicatum* dicitur à quibusdam. Superior à gibba ventriculi parte & simalienis ortum ducit: inferior verò à peritonæo statim sub diaphragmate. Epiploi substantia membranæ est, ex duabus tunicis, venis & arteriis quamplurimis, exiguis netulis & adipē copioso contexta. Compositionis hæc mihi videtur ratio; quia densum, leue & calidum esse decuit: densum, vt natium calorem intus concluderet atq̃ areret: leue, vt interaneā non comprimeret: calidum, vt ventriculi coctionem iuuaret, vnde venis & arteriis quamplurimis adipēque copioso est circumfusum. Venas à porta accipit omnes, nullas à caua: arterias à cœliaco & mesenterico ramo: nervos à sexta coniugatione. Epiploi multiplicem vsum agnosco. Primū, vt imo ventriculo: & intestinis tanquam tegmentum quoddam obtensum, insitum eorum calorem tueatur ac foueat, & ita coctionem iuuat. Alter omenti vsus est, vt venæ portæ ramos, in lienem, ventriculū, duodenum & cōlum distribuendos, turò suffulciat, arteriāsque & nervos sustentet. Tertius, vt volitantes per imum ventrem vapores lentos retineat & in adipem cogat. Quartus, vt colo intestino à liene ad ventriculū & iccoris cauum ascendenti mesenterij vicem gerat. Postremum addo ex Hippocrate libro De glandulis, vt copiosus humor ab intestinis influens, cum à glandulis excipi & absumi semel nequeat, in omento velut in æstuario asseruetur. ☉

Nomen.

Situ.

Connectio.
Figura.

Ortu.

Substantia.

Compositio.

Vsu.
Primus.

Secundus.

Tertius.

Quartus.
Quintus.

Intestinorum vniuersalis descriptio.

CAP. XII.



DETRACTO defectoque epiploo, in apertum proferuntur intestina *ἐντερά καὶ ἐνδύνα*, Græcis dicta, *τὰ ἐνδόν ἔναι*: *χολαῖδες* etiam vocāt, quod in ea deriuetur *χολή*; *ἐγκοίλια* quoque & *ἐγκάλια* nuncupantur; Barbari *chordas* appellarunt; hinc cytharæ fides, quod ex intestinis fiant arefcentibus, chordas dicūt. Veteres Comici *interanea* vocant; vnde antiquum vocabulū *exenterare*. Sunt autem intestina oblonga, rotunda & concaua corpora, ab imo ventriculo ad anum, & extremum podicem vsque protensa, coquedis & alterandis aliquantulum cibis, distribuendo in iecur chylo, postremo exportandis expurgandisque fecibus, à natura instituta: propterea flexuosis illa gyris & anfractibus implicuit, ne alimentum confestim elabens, gulæ & insaturabili ab-

Nomen.

Quid sit.

Cur anfractibus.

domini nos subiugaret. Non enim (vt diuinus annotauit Plato) oportebat hominem esse ἀμύσον καὶ ἀφιλόσοπον, quia ad agendum & intelligendum erat natus: moratur ergo in Dædaleis labyrinthis alimentum, cuiusque tenuior portio melaeraicis fugitur, & ad hepar transportatur. Intestinorum substantia tota membranea est, duabus propriis tunicis & tertia communis venarum & arteriarum sulculis penè infinitis, necnō neruulis miro indocte Naturæ artificio cōtextis. Membranea constructa sunt ἔντερος, vt dūm flatu, chylo & fecibus sunt turgidula, distendi sine diuulsione faciliè possent. Membraneum hoc corpus simplex non est, sed duplici tunica, eaque propria textum, tum, vt validior expultrix esset facultas: tum ad διαπύδναι, ne ab externis internisque iniuriis tam faciliè afficerentur: postmodò, si aliquando bilis orgasmo & feritate interior putresceret aut roderetur, exterior saltem tunica illacera, & incolumis permaneret: hanc etiam ob causam intestina sensu donauit acerrimo, ne sola Natura duce, ad excretionem mouerentur, sed sensatæ bilis acrimonia: ne tamen in αἰσθησις id est perpetua passione versaretur animal, intestinorum sensum, qui ratione membranarum & obiecti continuò irritantis erat exquisitissimus, hebetiorem aliquatulum reddidit: nam interiorem tunicam pingui concretòque humore obliuuit, qui & leuitate obtunderet, & crassitie prohiberet acrimoniam, & lubricitate promoueret bilis descensum. Idèò veteres, intestina regi fatuo comparabant, qui bellum, nisi laceratus non gerit. Tunicarum propriarum, interior neruosa est, carnis tamen fibris conspersa; exterior, carnosior, vtraque tamen tenuior & mollior quàm in ventriculo: quia ventriculus dura, aspera & incocta excipiebat, quæ densiorem ac duriorē tunicam postulabant. At nihil è ventriculo in intestina elabitur, nisi planè coctum, attenuatumque sit, nisi fortè alimenti; aut qualitatis mordentis acrimonia lacerat. Rugosa est interior tunica, vt chylum remoretur, alioqui tenuioris chyli prolapsus venarum suctionem celeritate superaret, & crusta quadam, veteribus incognita, obducitur, ne occiderentur venarum oscula: crustam hanc generant tertie coctionis excrementa, vt epidermida. Vtraque intestinorum tunica villos habet transuersos & circulares quamplurimos; quorum ministerio, quæcumque continentur, nulla cunctatione extrudit: eorum denique opera, motus ille intestinorum perficitur, quem αἰσθητικὸν vocant, qui sit contrahentibus & colligentibus sese intestinis supernè deorsum, vt eo motu infra transmittantur fæces, flatus & humores noxij. Hic si deprauetur, vt in colico & iliaco affectu, inuerso ordine à Natura instituto, colligunt sese circulares fibræ infernè sursum, vt nihil per inferiora excerni possit, ne clysteribus quidem inditis acrioribus, & ἀνάσθησις dicitur. Ad horum villorum tutelam fibræ quædam rectæ appositæ sunt, tenuibus intestinis pauciores, crassis plures, maximèque recto, quòd ficiora & duriora excrementa contineant: periculum enim erat ne orbiculares fibræ secederent, nisi extrinsecus à rectis, tanquam vinculo quodam arctarentur: sic complectendis retinendisque circularibus fasciis vincula recta obtendere solemus. Quæ proprias has tunicas extrinsecus obducit, non propriæ intestinorum substantiæ, sed peritonæo accepta referri debet. Venæ intestinorum à portæ truncò & ramo mesenterico omnes defluunt, ita autem diuariantur, vt recta non hient earum oscula ad cavitates intestinorum, sed obliquo ductu inter duas tunicas ferantur, vnde fit vt non rubeat permixtione sanguinis chylus in intestinis. Infinitus porrò earum est numerus, ne in tam longo & flexuoso intestinorum tractu vlla cremoris portio præterfluat, quæ si primum fortè ambitum præterlapsa erit,

Substantia.

Cur membranea.

Compositio.
Tunica
propria cur
dua.Intestinorum
sensum hebetior redditur.

Fibræ intestinorum.

Motus intestinorum peristalticus.

Cur fibræ rectæ appositæ.

Communis
tunica.
Vasa.Cur intestinorum
venarum
numera
sint.

De organis naturib.in imo ventre contentis. 291

secundo vel tertio, vel alio deinceps consequente non arripiatur. Arteriæ verò à ramo cœliaco & mesenterico efferuntur: sparguntur illuc quoque multi nervorum quasi furculi, quos sexta cerebri coniugatio suppedirat. Longitudo intestinorum Hippocrati libello De hominis structura, cubitorum est tredecim. Ego rescicata & flatu distenta intestina septies corporis longitudinē æquare observavi. Occupat totam ferè vmbilicalem & hypogastricam regionem: suntque mira Naturę providentiæ eo situ & ordine disposita, vt tenuia nobiliora, chylo coquendo & distribuendo dicata, digniorem sedem, mediâ quippe, obtineant: crassa vetò vndique illa sepimentū in star obuallens, debuerat enim grandior venæ portę ramus, mesentericus dictus, brevissimo tractu ad tenuia intestina ferri, vt cremorem ad iecur citò transferret; idèò tenuia in medio; crassa autem fecibus continendis dicata, ne comprimerentur in ambitu, locata fuere. Alligantur intestina dorso, interiectu mesenterij. Sed peculiarem eorum situm, structuram, officium iam describere aggredior.

Longitudo intestinorum.

Situs.

Compositio.

Peculiaris intestinorum diuixio seu delineatio. CAP. XIII.

INTESTINORVM corpus licet vnum sit, & continuum ab imo ventriculo ad anum vsque protensum, tamen pro varietate substantiæ, officij, figure ac situs varia sortitur nomina. Ratione substantiæ, intestinorum alia dicuntur *araià*, λεπτὰ, *σενὰ*, id est, *tenuia graciliave*, Plautus *lactes* vocat; aut ob mollitię candoremque pinguedinis, aut ab antiquo vocabulo *lacio*, quod chylum alliciant prolecentque: *pantices* etiam prisco vocabulo appellat. Alia sunt *crassa*, quæ Aristoteles *pinguia* appellauit. Illa ternò numero comprehenduntur, his nominibus insignita, δωδεκάδακτυλον, ἡντισ & εἰλεός, duodenum, ieiunum, ileon: hæc totidem sunt cæcum, colon & rectum. Ratione officij, intestinorum quædam perficiendo distribuendoque chylo dicata sunt; quædam stercori & fecibus colligendis destinata. Quod si figuram spectes, alia dicetur recta, id est, nullis anfractibus inuoluta, vt duodenum & rectum; alia plurimis orbibus & gyris implicita, vt ieiunum, ileon, colon. Veretes situm spectantes; superiora & interiora intestina statuerunt. Erant autem illis superiora tenuia: inferiora crassa, quæ in canibus & plerisque quadrupedibus vera semper obseruavi: sed in humanis corporibus non ita se habere hæc docet, quod colon crassissimum, eminentiorem omnium sedem occupet, iecoris cauo & ventriculi fundo annexū: ileon verò suis circumuolutionibus ad ilia vsque sese extendat. Hic tenuia primum, mox crassa describere consilium est. Primum ex gracilibus duodenum est, Græci δωδεκάδακτυλον ἐκφυσι, & interdum πλωγόν vocant, Latini *duodenum* dicunt, quasi duodecim digitos longum, exortum & processum, quod inibi incipiant intestina, tandèque ostiarium, licet quidem nomina hæc ad ventriculi orificium inferius transferant. Enascitur hæc intestinum ab imo ventriculi parte, & spinata versus vinculis membranis alligatum descendit, nullis intortum anfractibus; tum vt venę portæ à iecoris cauo prodeuntī cedat, tum ne refluat in ventriculum chylus; tum quia vacuam ea parte sedem nullam obtrahit, quā flecti in gyros posset: arctissimum est omnium, ne tam citò præterdaberetur chylus. Quatuor habet duodenum sibi peculiaria. Primum, venam à portę trunco non transuersim, nec obliquè, sed secundum longitudinem rectà deorsum protensam, quam ob id *intestinam* dicunt. Deinde nullis

Prima intestinum diuixio.

Secunda ab officio.
Tertia à figura.

Quarta à situ.

Error veterū.

Tenuiorū descriptio.
Duodenum.

Quatuor duodeno peculiaris: vna.

à mesenterico ramo riuius irrigatur. Tertiò, ductum excipit cholidocum, quo bilem expurgat vesicula, vt tarda intestina ad excretionem stimulet, lentamque pituitam interioribus membranis adhærescentē deturbet. Postremò, πύλας, glandosum corpus, appellatione excellenti, & κατ' ὑπερχλω ita cognominatum, substratum habet. Situm est duodenum in dextro latere, spinam versus. Proximum huic est νῆστις, seu ieiunum, sic dictum, quod secantibus nobis non vacuum omnino, sed reliquis inanius appareat. Vacuitatis causa triplex; hepatis celerius cremorem fugientis vicinia; venarum promptius chylum exhaurientium maior copia, & bilis acrimonia sua laceffens, succumque nulla cunctatione extrahens. Addunt quidam fluxilem chyli naturam. Qua parte duodenum in gyros voluitur, hac statim exordium capit ieiunum; quod autem illius extremum sit, exquisitè designare non est facile. Est enim cum eo quod illi succedit (εἰλεὸν vocant) admodum simile. His tamen tribus quasi notis interstingui poterit, quod ieiunum vasis pluribus scatet, paulo sit rubicundius & vacuum magis appareat. Occupat intestinum hoc totam ferè regionem vmbilicalem, suis circumuolutionibus ad ilia vsque sese extendens. Postremum ex tenuibus ileon est, λεπτόν absolute dictum, quod omnium sit longissimum; εἰλεὸν καὶ ἑλιγμα vocant Græci, quod plurimis orbibus & anfractibus inuolutum sit; εἰλεὸν enim veterè est; & ἑλίσσων, conuoluere, hinc εἰλεὸς, conuoluulus: hoc subter vmbilicum ad ilia & coxas vtrinque positum est, vnde & ilibus nomen dedit. Frequens est huius in scrotum prolapsus; cæcum & colon, cum vicinis adhæreant partibus, non prolantur. Tria hæc gracilia intestina, plures in tunica interiorè transuersas rugas obtinuerunt, quia longior erat externa, non secus atque in virilipudendo exterior cutis crispatur & rugas contrahit. Sed & obseruatione dignum est, interior tunicam villosæ ferici parti similem esse, & crusta quadam obductam.

De crassis intestinis.

CAP. XIII.



EQVUNTUR tria intestina crassa; sic dicta, quod & crassiores habeant tunicas, & crassiorè chyli partem contineant. Horum primum est cæcum, τυφλόν dictum, monoculus & sacculus, quod sit velut venter quidam crassus, vno tantum ductu, & foramine peruius, ad cuius extremum cernere est appendiculum conorti lumbrici specie, mesenterio nulla ex parte alligatum. Eius vsum expressit eleganter Galenus 4. De vsu part. c. 18. vti quid tenuioris chyli & cremoris anadosin sefellerit, id totum in cæco quasi sacco colligatur; ibique dum ob viarum angustiam moratur, à venis mesenterij sugatur; propterea subis, & voracibus animalibus aut amplius est cæcum; aut duplex, vt obseruarunt veteres. In ea appendicula multa asseruari solent; non per diestantum, sed per menses; vidimus sæpè deuoratos ceraforum nucleos, post quartum mensem reiectos. Lator est ampliùsque in recens natis & puerulis hæc appendix, quia liquidioribus alimentis vescuntur, quæ celerrimè præterfluere nisi hoc veluti sacco retinerentur. Pisces & aues rapaces, plures habent eiusmodi appendices, vt in eis tanquam penu & promptuario reseruetur cibus. Huic proximum est colon, omnium amplissimum, quod à verbo Græco, κολάρεσθαι, id est, à torquendo dictum putant, ob tormina, & diros cruciatus quibus sæpè digneatur. Est autem colon doloris capacissimum, tum quia pituitæ crudæ est velut officina; quæ enim

Ieiuni defertur.
Cuius ieiunum.

Oris.

Situm.

Ileum.

Sacculus.

Crassa intestina.
Cæcum.

Vfus.

Appendix
in pueris amplior.

Colon.

Cuius colon dicitur
sæpè torquetur.

enim in tenuibus remanet pituita, facile ob loci angustiam & venarum multitudinem coquitur, hinc ob coli amplitudinem refrigeratur & euadit vitrea; tū quia statuum est receptaculum, & ab infernis partibus aërem excipit. Galenus Comment. 4. in 6. Epidem. *ἔντερον* simpliciter appellat. Sunt qui à verbo *καλύνω*, quod est retardo, remotor, nominis etymon deriuent, quòd in eo morentur fæces; alij *κόλον* malunt nominare, quàm *κόλον*, quòd sinus habeat quamplurimos; Aristoteli, laxum dicitur, Mauritanis, cellulatum. Plurimis hoc quasi cellulis discretum extumescit, & concamerata habet inuolutura, in quibus figuratur fæces: quin etiam multo intus in æquali adipe infarctum visitur, & contractionibus quibusdam catutatis amplitudinem angustantibus secatur, vt diutius contineantur fæces, & ea cunctatione integra fiat cremoris exsuccatio. Fertur intestinum colon à rene dextro, ad iecoris cauum, hinc vetriculi fundo annexum lieni accumbens, reni sinistro alligatur, à quo in posteriora reflexū, duos efficit gyros, instar S, Romani, tandēque in ossis sacri principium definit, ita vt suis circumuolutionibus tenuia ferè omnia sepimenti instar obuallat. Ascendere autem debuit colon, ne tam citò effluerent quæ in eo continentur, atque ita perfecta fieret cremoris exsuccatio; reflexio autem Romanum S, referens ad fæcum retentionem necessaria fuit, ideò excrementa bis reddere cogimur, & primam deiectionem, altera statim sequitur. Ad coli principium valuulam sæpe obseruauimus deorsum spectantem, hostioli instar, quam eleganter descripsit Bauhinus; hæc fæcum & inuulium humorum refluxum ad supernas partes prohibet. Tandem quia amplissimum erat hoc intestinum, ligamenta habuit duo zonularum instar, cum supernis & infernis partibus validè alligantia. Est hoc etiam obseruatione dignum, per coli mediam & supernam partem secundum illius longitudinem, vinculum excurrere, medij digiti latitudinem vix excedens. Est autem aliud nihil, quàm eiusdem intestini substantia & crassior, & densior reddita; cuius hunc ego vsum agnosco, vt cellulas, quæ ad perfectam cremoris exsuccationem constructæ sunt, contineat; laxato enim aut rupto hoc ceu vinculo statim dissoluuntur cellulae. Postremum intestinum *rectum* vocant, quòd nullis sit intortum gyris, sed rectà ab osse sacro ad anum & podicem vsque protendatur; Græci *ἀπενδυμένην* appellant: Hippocrates *ἀρχόν*, id est, princeps, licet *ἀρχὸς* de ano etiam dici possit, vt 5. Epidem. *ἔξω ἡσσαν τῷ ἀρχῷ*, id est, *extra anum erant*: barbari *longaon* nominant: *δακτύλιος* etiam dicitur. Breue est & circa finem amplius, tum vt faciliùs labantur fæces; tum vt maior earum copia contineri possit, quandoquidem retentio animalis erat; alligatur autem firmiter ossi sacro peritonæi interiectu, ne suo pondere dum grauaturo procidat; propterea os sacrum *ἰθύονον* id est, *cum rectitudine extorsum est protuberans*. Eius inferior pars à musculis in orbem circūfusus, *σφιγγεραι*, hoc est, *constringitur*: qui ob id etiam *sphincteres* dicti sunt, ne ante iussum rationis arbitriumque voluntatis fæx ab aluo extrudatur. Maxima recti intestini & vesicæ *συμπύκνωσις* est in viris: sed maior eius & yteri in mulieribus.

Cur ita dictū.

Sini.

Cur reflexio in colo.

Valuula in coli principio obseruatio pulcherrima. Ligamenta eius.

Recti intestini terminus.

Sphincter.

Nomen.

Quid meso-
terium.
Structura.
Origo.Membrana
est due.Vena.
Arteria.
Nervi.
Adip.
Glandularum
quaque usus.

Pancreas.



TESTINA variè conuoluta, inuicem colligat, connectique
 μεσεντέριον: sic dictum, quia μέσον τῶν ἐντέρων, id est, medium
 inter intestina situm sit, non, ut voluit Tullius, medium intestinum: alij
 μεσάραιον, λεπτόν, μεραιὸν καὶ στενὸν vocar. Sunt qui mesenterion
 nomen statuant generis; cuius duæ sint partes, μεσάραιον & μεσι-
 κωλόν: mesareon ea est pars, quæ tenuia cõtinet intestina: mesocolon, quæ crassa
 amplectitur. Quicquid sit, mesenterij corpus est membranosum, intestina colligans,
 duabus tunicis, venis & arteriis innumeris, adipèq; copioso, & ad enibus cõtenti.
 Membranæ oriuntur à ligamētis, quæ lumborū vertebrae connectunt, & os sacri
 ilium ossibus cõmirtunt, aut à plexu illo & fasciculò nervorum Fallopiiano: hinc
 mira lumborum & intestinorum συμπίπτει, & apud Hippocratem Aphor.
 19. Coacarum prognoscen, οἱ ὀσφυάλλγες κοιλίας καὶ θυγατρὸν αὐ. Qui lumbis
 sunt queruli, profusior est aluo, ob consensum mesocoli, ut interpretatur Ga-
 lenus comment. ad Aphor. 4. section. 4. lib. 2. Epidem. Membranæ hæ geminæ
 constructæ sunt, tum ad vasorum robur, neque enim tutum erat vasa tenuia chy-
 lum ad hepar vehentia, sine præsidio deducere: tum ne intestina temere implici-
 ta euaderent, id est, ne intestinorum situs in violentis moribus confunderetur.
 Venæ omnes à portæ ramo, quem mesentericum dicunt, propagantur: arteriæ ab
 inferiore & superiore mesenterica defluunt. Nervi à sexta cerebri coniugatione
 scaturiunt. Media inter venas arteriâsque spatia adeps copiosus infercit, in quem
 adenes, id est, glandulæ insistant quamplurimæ, tum ad vasorum diremptum, tum
 ut impedian, ne vasorum ductus comprimantur, vel ab oppletis intestinis, vel à
 compressione abdominis, atque ita chyli præpediatur anadosis, tum ut intestina
 madore suo proluant. Denique, ut sint velut ligamenta vasorum, ne in violentis
 motibus disrumpantur. Sunt qui glandularum alium agnoscant usum, ne ventri-
 culus & intestina spinæ contractu lædanrur. Posteriori ventriculi regionis, & duo-
 deno intestino corpus quoddam glandosum substernitur; quod, quia simplicis
 carnis speciem quodammodo exprimit, Græci πάγκρεας, & καλλιπρεας appel-
 larunt. Corpus hoc venæ portæ ramos in ventriculum, duodenum & liencem di-
 stribuendos, amplexu suo comprehendit, sustinetque, ut illorum diuaticatio in-
 feriore duntaxat epiploï membrana suffulta, reddatur securior, & ventriculo in-
 star substerniculi & molliusculi pulvinaris subiiciatur.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An intestina vim habeant attractricem.

QUEST. X.



AXIOMA olim disceptatione certatum est inter Medicos, an intes-
 tina unicam habeant facultatem, expultricem puta, an quatuor illas
 nutritrici famulantes, attractricem, retentricem, assimilatricem, expultri-
 cem. Disceptandi occasionem præbuerunt quamplurimi Græcorum &
 Arabum dissentientes loci: nunc enim quatuor illas agnoscunt, nam
 denegant, nos singula sigillatim minutatimque excutiemus, ab attra-
 ctrice disputationem totam inchoantes. Ne autem in facultatum & actionum versetur
 æquiuoco, hi prius adhibendi sunt διορισμοί, hæc nobis iacienda sunt fundamenta. Actio-
 num alias esse communes, seu officiales; alias privatas seu peculiare. Communes, aut totius,

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 295

aut saltem quarundam partium gratia sunt comparatae: Sic hepar sanguinem non sibi tantum, sed ad totius alimoniam conficit: Cor vitales spiritus, cerebrum animales ad totius conservationem generant: Ventriculus non sibi soli, sed hepatis chylum coquit: vesicula, lien, renes non propriè nutritionis gratia, bilem, faculentum sanguinem, & serosum humorem prolestant: sed ad illius hepatis expurgandam: itaque officiales dicuntur hae actiones, quasi alii inservientes & ministrantes. Priuate vero, seu peculiare actiones propria tantum singularum partium conservationi dicatae sunt. Sic propter chylosin, priuatam habet ventriculus nutritionem, qua sibi soli, non reliquis consulit, sanguinemque sibi familiarem trahit, retinet, coquit, eiusque reliquias expellit. Hæc omnibus ita sunt nota, ut ampliore demonstratione non egeant: Sit aliter διοισμοῦς, ad peculiarem & priuatam tractionem expulsionemque villorum opera & ministerio opus non esse, sed ad communem tantum & officialem: quoniam illa sine motu locali perpetuo; hæc ferè omnis cum motu perficitur: trahunt ossa, cartilagine, ligamenta, & expellunt siue villorum contractione. Quis enim ea, dum trahunt, moveri unquam observavit? Qua ratione magnes, etiamsi non moveatur, ingenta & occulta proprietate ferrum trahit, & plantæ immobiles succum familiarem è terra libant & hauriunt, eadem prorsus, singule animalis particula, proprium alimentum prolestant. Communis autem & officialis tractio expulsioque, cum penè omnis motu locali perficiatur, villorum opera indiget: sic cordis motus licet naturalis sit, fibrarum sit ministerio: trahit cor per rectos villos, in sua diastole sanguinem per venam cavam in dextrum sinum, & aërem per arteriam venosam in sinistram haurit, expellit per transversos spiritum, sanguinem, fumidosque vapores: sic uterus per rectos, viri semen prolestat, per transversos contrahitur ad exclusionem foetus. His ita iactis fundamentis, questionis capita ita interpretor, dum queritur, an intestina vim habeant attracticem, non de priuata & peculiari actione queritur: certissimum enim est, quod tam sape ad nauseam usque inculcauit Galenus libris De usu partium, & De facultatibus naturalibus, singulis partibus insitas esse quatuor facultates, attracticem, retentricem, concoctricem & expultricem, cum vita definiatur nutritione, nutritioni autem quatuor hæc famulentur. Sed de officiali tantum & communi tractrice disputatio instituitur, an scilicet intestina vim habeant trahendi à ventriculo chylum. Nos communem illam facultatem in intestinis non agnoscimus. Galenum habemus sententia huius fautorem. Scribit 4. De usu partium, intestina attractrice facultate non indigere. 5. De usu partium: Intestina, inquit, quibus neque attrahere, neque retinere erat necesse, cum simplici egerent motu, simplices quoque villos habuerunt. 3. De natural. facult. Singulis intestinis circulares intraque tunica adsunt fibrae: αἱ δὲ ἐν τῷ μόνῳ γὰρ μόνον, ἔλκοντι δ' οὐ δὲν, id est, contrahuntur enim dumtaxat, nec quicquam trahunt. Idem statuit 6. De locis affect. Si chylum non trahunt (dices) intestina, qua vi ad ea fertur? An protruditur à ventriculo tam utile alimentum? Sanè voluit Galenus coqui in ventriculo chylum, totòque coctionis tempore pylorum intercludi, ne quid siue crassum, siue liquidum elabatur, nisi planè coctum, lavigatum & elaboratum sit, perfecta coctione oblectari cognitione quadam chylo ventriculum, tandem aperta mira Natura providentia membranula, pelli tanquam redundans quid, & superfluum, prolabi que in intestina, in quorum anfractibus dum moratur, fugitur à mesenterij venis tenuior chyli portio cremori persimilis, crassior verò & pondere suo ad crassiora descendit intestina, & per orbiculares villos extruditur. Hæc vera est Galeni philosophia: qua docemur non trahi ab intestinis, sed pelli à ventriculo chylum. Sunt tamen iuniorum quamplurimi, qui tractricem illam vim intestinis omnibus, præsertim gracilibus, inesse sibi persuadent; fulti, ut opinor, Arabum autoritate, & ratiunculis quibusdam. Scribit Avicenna fen 1. primis chylum à ventriculo ad intestina prolabi, duarum facultatum vi, ventriculi expultrice & intestinorum attractrice, quod etiam repetit 13. De animalibus. Auclo-

Quid sit officialis actio.

Quid priuata.

Ad priuatam actionem villus non est opus.

Nulla est communis facultas attractrix in intestinis, Auclores.

oblecta.

salutis.

Contrariæ opinio, Auclores.

Rationi. ritati fauet & astipulatur triplex ratio. Primum, partes omnes familiarem succum trahere nemo inficiabitur: at chylus familiare est intestinorum alimentum quo aluntur, ut ventriculus. Præterea, si à ventriculo tantum pellitur chylus, motus ille violentus erit: at nutritionem vi & impetu fieri absurdissimum est, ita enim non duraret: trahitur ergo non pellitur alimentum. Postremo, intestinis villi obtruduntur recti, at rectos tractionis gratia comparatos esse norunt omnes. Verum quàm sint leuia & puerilia hæc, vel nouunculus etiam indicabit.

Responsio ad singula. Quod enim de intestinorum & ventriculi nutritione in primis obtrudunt, non admittimus: non aliter chylo ventriculus, sed eius præsentia oblectatur tantum, trahit per venas gastricas & coronariam sanguinem quem assimilât, ut suo loco demonstrabitur: non abuntur intestina chylo, sed sanguine per mesaraicas venas delato, propterea non trahunt intestina chylum ut eo alantur. Dum ventriculi chylum pellentis motum violentum esse putant, errant, nisi salor, toto calo: naturalis enim est, quia ventriculi contractionem sequitur, cui naturalis alimentii forma grauitas quippe, non repugnat. Postremo, quæ de villis rectis obiciunt, omnino negamus. Est enim in utraque intestinorum tunica unicum tantum villorum circularium genus. Quod si fibræ quædam appareant rectæ non in tenuibus, quæ chylum continent, intestinis, sed in postremo tantum (rectum dicunt) conspicuæ sunt, in quo feces tantum afferri etiam inuiti fatebuntur. Sed demus in utraque intestinorum tunica villos adesse rectos, non propterea tractricem facultatem admittere cogemur. Neque enim fibræ omnes rectæ ad tractionem perpetuò sunt comparata. Id eleganter exponit Galenus 4. De usu partium, ubi docet recto tantum intestino rectas fibras appositas, non ad tractionem, sed ad transversarum tutelam: periculum enim erat ne orbiculares fibræ secederent, & mutuo auellerentur, nisi extrinsecus à rectis, tanquam vinculo quodam arctarentur: sic venarum tunica villos habens rectos, non ad tractionem, sed ad $\delta\epsilon\pi\alpha\sigma\tau\epsilon\iota\alpha$ tantum: sic complectendis retinendisque circularibus fasciis, vincula recta obtendere solemus.

An intestina vim habeant retentricem.

QVÆST. XI.

De retentrici
facultate Ga-
leni auctorita-
tes.



VÆ superius propositæ sunt Galeni auctoritates, unicam esse intesti-
norum vim, expultricem puta, conficiebant: sunt tamen qui eiusdem Ga-
leni auctoritatis iussibus fulti retentricem & concoctricem non priuatam mo-
do, sed officialem & communem agnoscunt. De retentrici primum dispu-
tabimus, mox de assimilatrice dicturi. Galen. Commentariis ad Apho-
ris. 22. section. 3. ad Aphorism. 12. sect. 4. ad Aphorism. 1. section. 6. ad sent.
53. sect. 3. libri 3. Epidem. necnon 1. De crisi bus, hienteria naturam & causas exponens, ad
retentricis imbecillitatem refert, non proprii alimentii, id est, sanguinis, sed chyli consenti:
idem voluit Auicenna 13. tertij tractatu 5. c. 5. Præterea 3. De symptomatum causis, fa-
cultatem concoctricem in pueris validiorem esse vult, retentricem autem & expultricem im-
becilliozem, quia frequentes sunt illis deiectiones. At quæ deiciuntur, in intestinis continen-
tur. Est ergo debiliior intestinorum retentrix facultas. Quinetiam libello De medicinis, ex-
pertis medicamenta præscribit ad alui fluxum stipica, quæ vim intestinorum roborant, &
nos in diarrhœa, externa roborantia & astringentia admoenemus. Accedit, quod plerisque
astricta sunt aluo, cuius astrictionis causam referunt ad retentrici robur, ex Galeni Com-
mentario ad Aphorism. 20. sectionis 2. Postremo necessaria fuit & chyli & fecum retentis,
chyli quidem, ne alimentum confestim elabens gula in saturabili que abdominis seruituti nos
manciparet: fecum verò, ne continenter & intempèstiuè eas extrudere cogere mur. Hæc &
similia proponunt, ut doceant vim esse aliquam intestinorum, in chylo & fecibus retinen-
dis: quæ, quoniam sunt à Galeni & veterum decretis alienissima, lubet singula Galeni dicta

Alteram.

Tertia.

Quarta.

Exponuntur
singula Gale-
ni auctorita-
tes.

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 297

ita interpretari. Lienteria non intestinorum sed ventriculi est affectus: estque symptoma in praepropera egestionem *στυλὼν ἀμεταβλήτων*, id est, ciborum mutationis penè omnis expertum; ita namque definit Galenus lienteriam, quando cibi nullo modo cocti & alterati egeruntur, propterea malè lienteriam laxitatem intestinorum vocant; quia interdum cum asperitate esse potest, & solius ventriculi, non intestinorum affectus est. Sint enim quantumvis leuia & lubrica intestina, si bene coquat ventriculus, nunquam lienteria afficietur; quia lienterie natura in *σπένδου τῆς πεύρας πέλει*, id est, priuatione primæ coctionis, quæ fit in vetriculo & præcipiti egestionem cõsistit. Malè igitur lienteriam ab imbecillitate retentricis intestinorum fieri concludunt, neque unquam id voluit Galenus: quia lienterie causas excutienti, eas refert ad ventriculi intemperiem, quæ facultatum omnium robur exoluit, & ad leuem ac superficiei tenus impressam exulcerationem, quæ similiter fit in vetriculo irritato lienteria, vt stranguria in vesica. Intestinorum intemperies lienteriam quidem parit, sed non primario, nisi in *στυμπνὸν* iure societatis, communionis & viciniae trahatur ventriculus. Dum puerulos vomitu & deiectionibus sepe infestari scribit Galenus, causam refert ad facultatis retentricis, non intestinorum, sed ventriculi imbecillitatem; sunt enim molliores eorum villi, præterea deiectionum liquidarum causam, agnoscit ingluuiem & voracitatem puerulorum, quorū natiuus color validissimus plus appetit quàm continere & coquere possit; unde fit vt laxatis ventriculi villis, quasi habentis, & vomitus & deiectiones consequantur. Quæ de stipticis intestina roborantibus, & alui proluiem sistentibus obiciunt, puerilia sunt: non enim eo consilio admoventur, vt intestinorum vim retentricem, quæ nulla est, roborent: sed vt mesenterij venas, quæ per intestina numerosa ramorum serie sparguntur, quæque luxuriantes & malignos humores in ea depouunt, astringant; vel, vt ferocientes humores substantia tenuissimos, temperamento calidos, qualitate acerrimos demulceant, refrigerent, incrassent, atque ita ad motum ineptiores reddant. Quid, quæso, absurdius quàm ascriptionis aluiue causam ad retentricis robur referre? Audiant Galenum 3. De causis symptomatum, tarda deiectionis causas eleganter assignantem, nunc expultricis imbecillitatem, nunc hebetiorem intestinorum sensum, nunc ingestorum crassitiem, stipticitatem, paucitatem, nunc musculorum abdominis, quorum in extrudendis facibus mira est facultas, imbecillitatem: at de vi intestinorum retentrice, ne verbum quidem vllum. Postremo, quam nobis obtrudunt chyli & fecum retinendarum necessitate, eam libenter admittimus, sed retentrici intestinorum facultati vim eam non concedimus: chylo enim retinendo flexuosis illis anfractibus & tortuosis gyris prouidit sagax Natura. Iique in tanta viarum longitudine, vix vlla potest alimenti portio foras elabi, quæ nõ ante cuiuspiam sugentium venarum ori se applicuerit. Fecum vero retentio naturalis non est, sed animalis quia musculorum perficitur opera: adsunt sphincteres musculi inferiorem recti intestini partem constringentes, ne ante iussum rationis arbitriumque voluntatis sive ab alio extrudatur. Ex his ergo cuilibet planum fit & apertum, intestina vim nullam habere naturalem, quæ & chylum, & feces retinere possint.

Ad primam.

Quid sit lienteria.

Ad secundam.

Ad tertiam.

Ad quartam.

Causæ deiectionis tardæ.

Ad quintam.

Fecum retentio animalis est, non naturalis.

An intestina vim habeant concoctricem.

Q V Æ S T. XII.



IN qualibet coctione, tria necessario spectanda esse, docet Galenus simile in locis præparationem, coctionem, & perfectionem. Sic primæ coctionis præparatio fit in ore, coctio in vetriculi fundo, absolutio, in tenuibus intestinis. Secundæ coctionis præparatio, in venis fit mesenterij, coctio in hepatis parenchymate, absolutio in maioribus vasis. Semen in præparantibus vasis rudimentum; in testibus formam & ideam; in parastatis perfectionem consequitur suam. Animalis spiritus, in plexibus arteriolarum,

Tria in omni coctione spectanda.

delineationem, in medio sinu formam, in postremo ab solutionem adipiscitur. Ita in Nature operibus varij sunt gradus. Coctio hæc & spirituum & alimentis, siue priuata sit, siue officialis, citra villorum sit ministerium, solius caloris opera & ingenta proprietate perficitur, propterea alteratio dicitur à Galeno 4. De vsu partium, & 3. De naturalibus facultatibus. Hanc coquendi & alterandi chyli facultatem intestinis non denegat Galenus. Ita enim scriptum testatūque reliquit 4. De vsu partium. Intestina, licet coquendi chyli gratia constructa non sint, sed continendi & distribuendi tantum; tamen, quia nunquam ineri & otiosa est Natura, in ipso per intestina trāsitu elaborationem perfectam consequitur chylus, potius ac in maioribus venis facultas est quedam αἵματος ποιότης. Galeni sententiam sequenti sunt Aretæus libro primo De causis & signis chronicorum morborum capite 15. & Auerrhois. Auctoritati fauet & astipulatur ratio. Etenim intestinorum & ventriculi eadem est substantia, siue temperiem, siue colorem siue tunicarum contextum spectes. Coquitur ergo in ventriculo chylus, ibique ideam speciem & formam chyli consequitur: sed dum in anfractibus intestinorum & interioris tunice rugis moratur, alterationem aliquam subiit. Scio apud quosdam nouum percubuisse dogma, ut ἄρῃ ὁ ἄδός ἐστιν, ita & ἡ ἀκρόδεν, plus posse in chylo conficiendo intestina quam ventriculum, neque coctionis tempore pylorum intercludi, sed statim à ventriculo ad ἐντέρας prolabi alimentum nondum planè coctum. Proferunt sua nobis exempla. In vulneribus (aiunt) hypochondriorum & intestinorum tenuium cernimus profluere chylum nondum planè coctum: ergo formam & perfectiorem in ventriculo non erat adeptum. Quinetiam in exomphalosi cibi nondum planè elaborati exiunt, & state media dum gelidam posuimus, frigoris vim momentò in intestinis percipimus. Sed non vident in vulneribus & exomphalosi malè affecta esse intestina, statimque in eorum sympathiam trahi ventriculum; tum ob communionem & similitudinem generis, tum ob viciniam. Exiat enim aureola Hippocratis sententia libello περὶ χυμῶν. Ταῖς ἐντέροις καὶ κοίταις ἐν τοῖς παθήμασι, πρῶτον καὶ μελίστα κακοῦται: id est, quæ sunt propinqua quæque communia, primum illa maximè que affici solent. Quid mirum ergo si è vulnere liquidum & crudum adhuc alimentum effluat? Liquida (sateor) celerrimè preterlabuntur, sed cita est etiam & præceps eorum alteratio. Vix fieri posse credunt tantam ciborum copiam à voracibus & sycophantis deglutitam, à solo ventriculo contineri posse, cum eius amplitudo quinque palmorum capacitatem non excedat, Hippocrati. Sed sciant membranosum esse ventriculum, & in omnem dimensionem facile amplificari: deinde in sycophantis & voracibus non perfectè coqui chylum; quia copia pondere laxatur membranula ostiaria. Sit itaque hoc persuasum omnibus, coqui in ventriculo chylum, perfici autem in gracilibus intestinis.

De vi intestinorum expultrice, & eorundem motu peristaltico.

QUESTIO XIII.

Dari expultricem facultatem demonstratur.



INTESTINA omnia expultricem facultatem non proprij solum, sed etiam communis excrementi valentissimam habere, tam est certum, ut nulla demonstratione egeat. Id & grauissimorum virorum auctoritas, & intestinorum structura, & actionis necessitas satis superque suadet. Galenus tam sæpe libris De vsu partium 6. De locis affectis, & 3. De naturalibus facultatibus, id annotauit, ut loca integra citare hominis esset otio ac literis abutèris. Structuram intestinorum si intueare, videbis proculdubio viamque tunicam circularibus tantum & transversis villis ad expressionem textam. Si pertinaces animos & temeraria ingenia hec non mouent, saltem urgebit actionis necessitas, quæ causa est finalis; debuerunt facilius ut-

cessario extrudi; fuit ergo excretrix facultas hac necessaria, imò expultrix maior est quàm tractrix necessitas, & natura perpetuo magis est diligens ad expulsionem rei noxiæ, quàm ad tractionem utilis & necessaria: sic iamiam morientium expiratio inspiratione validior; pellitur enim expiratione fumidus vapor cordi molestas, trahitur inspiratione, aër cordi εὐπνεῖος φῦτος, & consocialis. Est ergo intestinorum expultrix validissima. Sed modus expulsionis non omnibus cognitus est. Ego in apertam lucem proferre conabor, Expulsio facum motu perficitur locali. Motus ille duplex, naturalis unus, animalis alter, naturalis; intestinorum est proprius, animalis, musculorum abdominis. Naturalem appello, quicumque voluntarius non est, animalē, qui sponte & ἀεραετῖκῶς perficitur. Naturalem antiqui ὀρεσάτικον vocarunt: sit per transversos & orbiculares villos, intestina contrahentes; hic rursus duplex, unus κατὰ φύσιν, id est, secundum naturam, alter ἑξ φύσιν, id est, præter naturam. Ille sit contrahentibus & colligentibus sese intestinis supernè deorsum, quo motu infra transmittuntur humores noxij, flatus & feces. Hic contrario omnino motu perficitur, colligentibus sese circularibus fibris infernè sursum, & ἀνω ἄλσις dicitur: in motu hoc & flatus, & chylus, & feces per superiora excernuntur, nihil per inferiora deicitur, ne clysteribus quidem inditis acrioribus, φύσας καλῶς περιεῖναι, ἀλλὰ παλιν δεομεῖν ποίειν: flatum (inquit Galenus) prohibet hic motus infra transmitti, sed ipsum facit supra recurrere. Depravati huius motus causam agnovit triplicem divinus Senex; inflammationem, oppilationem contumacissimam & leuem interdum ulcerationem: inflammatio omnis meatus angustat: oppilatio occludit penitus. Itaque cum præterlabi nequeant feces, expultrix primam observato ordine à Natura instituto, orditur à superiore parte contractionem, ut excrementum pellat; hoc semel & iterum tentat; sed cum inanes & irriti sint conatus, inverso ordine contractionem ab infernis inchoat, idque tanta vi, ut, (proh dolor!) & chylus, & feces per os excernantur: tam diligens & sollicita est Natura de noxij exclusione. Levis etiam intestini exulceratio, motus depravati causā esse potest: nam pruritatio illa afflictum intestinum, transmittit sursum quæ lasura erant, ac mutata velificatione, cursum instælit sursum cōtra naturam: quem olim naturaliter deorsum tenebat. Motum hunc peristalticum naturali contrarium, in miserrimo illo affectu, quem ileum dicunt, experimur, in quo sedes ita clauditur, ut ne acum quidem possis adigere; clysteres verò citissime absorbentur, contractis infernè sursum orbicularibus villis hunc affectum præcipientem & periculosum admodum indicat Hippocrates libro ὀδὲ παθῶν. Ἐστὶ δὲ τὸ νόσημα οὗτο, καὶ πατὴρ ἰατρῶν. Est alter motus quo extruduntur feces, animalis & voluntarius: hic opera musculorum abdominis perficitur; contracti enim muscoli intestina premunt; hinc facum exclusio, hunc motū iuvant diaphragma & peritonæū. Octo enim muscoli, dum abdomen & intestina equaliter comprimunt, ad utrosque meatus, superiorem scilicet, qui est ad stomachum, & inferiorem, qui est ad anum, excrementa pariter pellunt; opus ergo fuit aliquo, quod ad infimas partes pelleret, auerteret autem à supernis, eiusmodi est diaphragma,

Necessitas
expultrix.Motus inte-
stina duplex, natura-
lis, animalis.
Naturalis
duplex.Expultrix
facultas.
Causa deprava-
ti motus
triplex.Fleus affectus
calamitosus.

An clysteres ad ventriculum vsque ferri possint.

QVÆSTIO XIII.



VIA disputantes interdum audiui Medicos de clysmatum ascensu, & Galenum ac Rhasium ea de re diversa planè sentire legi, quæstionculam hanc, cuius demonstratio est Anatomica, hoc loco subtexere volui. Putat Rhasius 9. Continentis, clysteres ad ventriculum ascendere, & sæpè per nares reiici. Si (inquit) magna vi & impetu iniiciatur clyster, ad ventriculum vsque perueniet; si sensim & paulatim, vix crassiora intestina superabit,

Opin. Rhasij.

*Galeni opinio
contraria.*

Opinio nostra.

*Observatio va-
ria in intestino
caeci valvula
consistens.*

Obiectum.

*Solutio.
Causa hinc
Galeni hinc.*

*Obiectum.
Solutio.*

Galenus contra, quantumvis impetu iniiciatur liquor, vix ieiunum intestinum attingere existimavit: nam 5. Methodi, ulcera pulmonum, thoracis & ventriculi per ea quae assumuntur, curat, id est, quae per os ingeruntur; intestinorum vero ulcera & assumptis per os, & iniectis per anum sanat, adhibita hac distinctione, ut si ulcus crassiora obfideat intestina, iniectis mitecat; sin tenuia, assumptis potius: hoc idem repetit 13. Methodi. Ego Galeno potius quam Rhasio hac in re assentior. Observavi enim intestina rescicata septies longiusculum corporis equare, & Hippocrati libello De hominis structura, longitudo intestinorum colitorum est trium & decem: sed non obstatet sola longitudo, nisi anfractus 9 yri & orbes quod plurimi liquoris iniecti vim & impetum sifterent. Existimo itaque iniectos liquores ad caecum tantum ferri, nec ulterius progredi. Proferam hic quae saepe in rescicatis & distentis intestinis expertus sum, nona fortasse, & a paucis animadvertenda. Si per duodenum iniciatur liquor, facile per rectum exibat; contra, si per rectum iniciatur, morabitur in caeci appendice, nec ulterius praeterfuerit, quod arguit adesse in caeci extremo valvulam, quae mira Naturae providentia fecum & inusitum humorum refluxum impediatur, ut in meatu appareat cholydocho, & membranulis cordis. Sed adversari videtur nobis Galenus 3. De symptomatum causis. Nottalis (inquit) clysteres iniecti ita ascenderunt, ut vomitione reiecti sint, non secus ac faeces per lethales volutulos saepe euomuntur. Verum pugnantia non est loquutus Galenus. Aliud enim est de ventriculo bene affecto, differens aliud de ventriculo laborante: si bene afficiatur ventriculus, nunquam ad eum ferri poterit liquor, sed si male afficiatur & famescat, ut in boulinia, trahet ab inferioribus non iniectos modo liquores, sed etiam feces. Quemadmodum enim famelicum hepar crudos & plane incoctos succos a venoso genere trahit, ita ventriculus faeces & iniectos liquores saepe prolecat. Si depravetur etiam naturalis intestinorum motus, colligentibus sese circularibus villis inferne sursum, poterit iniectus liquor ad ventriculum usque ascendere. Obiciunt, clysteres nutriendi ferri ad hepar usque. Respondeo, non ferri eo sponte & impetu iniecti liquoris, sed trahi a venis mesenterij, indeque ad hepar transportari.

De faecum fetore.

QUEST. XV.

*Efficiens causa
faecorum.*

*Materiae
causa.
Cuius hominis
stercora magis
fuerunt.*

MIRATUR vulgus, cur in sanis corporibus, & temperatissimo homine excrementa alvina fateant, cum fetor omnis putredinis sit soboles, & putredo efficientem causam agnoscat ascititium extraneumque calorem. Medici fetoris huius duplicem causam agnoscunt, efficientem quippe & materialem. De efficiente ita philosophantur, calorem nostrum subiecto licet unum, ratione tamen varium, duobus modis considerari, aut quatenus calor est simpliciter, aut quatenus natiuus, & functionum omnium animae instrumentum: quatenus calor est, humidum continuo exhaurit, & depopulat: quatenus natiuus, coquit, assimilatur, procreatur: ita ab eodem calore diversi & penitus contrarii effectus manant. Dum fit in ventriculo chylosis, natiuus calor sese in omnes materiae partes equaliter parièrque insinuat, & quae similia sunt, cogit, quae dissimilia, separat. Quae similia sunt tanquam vitula, a venis mesenterij trahuntur, & ad hepar transportantur: quae vero assimilari nequeunt, extruduntur in crassiora intestina, ibi tanquam inutilia a nativo deseruntur calore: itaque in ea non amplius agit calor tanquam natiuus & directus ab anima, sed tanquam calor, extranei naturam induens, hinc fetor. Accedit materiae aptitudo. Cruda enim sunt, & humido multo scatent superflua haec, hinc putredo: quod si exhauriatur humidum, minor est putredo, leuior fetor. Atque haec unica ratio est, cur hominis etiam temperatissimi stercora magis fateant, quam reliquorum animalium; quia humidissimo alimen-

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 301

10 & Vario vititur homo, vitamque magis desiderem & inertem degit: reliqua animalia sic-
cioribus utuntur cibi, & sicciora sunt eorum excrementa: hanc etiam assignauit Aristotel.
causam sectione 13. Problematum. Cur alui deiectiones diutius retentę minus foetent,
vina contrā diutius retenta magis foetet? Quia, inquit, diutina mora reficcantur
fæces, ita putredini subtrahitur fomentum. Cæterum figurantur fæces in colo inte-
stino, quod concamerata habet inuolucra, & plurimis quasi cellulis discretum extumescit.

De intestinorum substantia & situ.

QVÆST. XVI.



De intestinorum substantia, dissentientes quidem loci conciliandi sunt. Li-
bri Methodi intestina difficile coalescere vult, præsertim tenuia; quia
eorum substantia nervæa est, & membranosa: at 14. De usu partium, in-
testina & ventriculū, quia coctionis erant organa carnosæ, constructa
esse scribit. Hoc voluisse videtur Hippocr. Aphor. 26. sect. 4. A difficul-
tate intestinorum habito, si velat caruncula exeant, lethale. Sanè nervo-
sa est intestinorum substantia, sed tota fibris etiam carnosissimis interstita: ita & membranæ &
carnosa dici potest. Sic vterum nunc membraneum, nunc carnosum vocat Galenus. De situ
intestinorum lenia quedam obuersantur. Errant veteres, dum crassiora intestina inferio-
rem locum, tenuiora verò superiorem occupare existimant. Nam colon omnium crassissi-
mum ad iecoris cauum, & ventriculi fundum excurret: ileum verò ad ossa pubis usque ex-
tenditur. Decepit eos, ut opinor, canum & quadrupedum sectio. Galenus aliquando, ex vul-
gi opinione, crassa appellat inferiora, & tenuia superiora, ut commentario in tertium Epi-
dem. Falluntur etiam nunc Medici penè omnes, qui dysenteriam tenuium & crassorum in-
testinorum ita distinguunt, ut si dolor superiores partes occupet, gracilium sit; si inferiores,
crassorum. De situ coli varij variè sentiunt. Quidam ad ventriculi fundum ideò ferri vo-
lunt, ut illius vicinarumque partium contactu, inueter ventriculi coctio. Alij ad iecoris ca-
uum, quæ parte adest vesicula, ferri existimant, ut sopita coli expultrix facultas, à bile
exudante magis proritetur. Alij putant colon intestinum tenuibus cedere, ea sepimenti in-
star obuallare, & mesenterij centro non admodum esse vicinum, propterea quæ sinistram
corporis sedem occupare, ut grandior dextere venæ portæ ramus, mesentericus ductus,
breuiore ductu tenuibus intestinis infereretur, ac breuiore via cibum ad iecur transferret.
Sunt qui colon fundo ventriculi & iecoris cauo adherere putant, ut earum partium conta-
ctu, reliquæ alimenti, quæ in coli cellulis morantur, perfectius coquantur. Quinetiam editis-
simi sitis rationem assignant, ne tam citò effluerent quæ in eo continentur, atque ita perfe-
cta fieret cremoris exsuccatio, in quem usum etiam cellula, & concamerata illa inuolucra,
nec non monoculum intestinum constructa sunt. Est hoc quidem omnium amplissimum: sed
dum renes & lienem attingit, angustius redditur, ne lienis corpus comprimatur; unde fit ut
quibus lien tumet, flatūs per anum vix possit erumpere, nisi prematur lien.

Conciliatur
Galenus de
substantia in-
testinorum.

De situ cœci-
tatis error ve-
terum.

De situ opini-
ones variae.

Cur colon af-
ferat.

HISTORIA ANATOMICA.

Vena portæ diuaticatio.

CAP. XVI.

Portæ us-
us.

QUONIAM per intestina & mesenterium venæ portæ propages diffeminantur, postulat sectionis ordo, ut venæ huius distributionem hic subtexamus. Sed quoniam libro quarto eius historiam & quæ in ea occurrunt controuersæ accuratè descripsimus, singula hic transcribere, hominis esset otio abutentis: consular ergo studiosus lector caput quartum & quæstionem quintam libri quarti. Hic sufficiat annotare, exquisitam venæ huius & ramorum omnium sectionem peritæ artificis manum postulare.

De ventriculo.

CAP. XVII.

Pars vis-
alis apud
Hippocratem
accepta.

VENTRICULUM cibi portionisque commune receptaculum, & primæ coctionis officinam, veteres Græci, κοιλίαν καὶ γαστήρα antonomasticè appellauerunt. Est enim τῆς κοιλίης apud Hippocratem acceptio multiplex. Sæpe τῆς κοιλίης & γαστέρος nomine, tota illa ventris capacitas, & amplitudo designatur, quæ definitur à steruo ad pubem: sic κοιλίη ὑγρὴ, στερεή, ταχυχώδης, ἐκφυσημένη, ἀπυλημένη, δυσώδης: id est, alius liquida, astricta, perturbata, flatibus distenta, suppressa, fetida, in prognostico, Aphorismis & Coacis dicitur. Interdum κοιλίη conspicuam omnem, eamque internam cavitatem denotat, ut cerebri, cordis, thoracis: sic utrum κοιλίην νεφρωδὴν appellat 2. De morbis mulierum. Aliquando cavitatem omnem etiam vix sensilem designat: sic musculorum interstitia & spatia eorundem vacua κοιλίαι dicuntur, Aphorismis 20. sectionis 6. & libello περὶ τεχνῆς. Sed propriè κατ' ἐξοχὴν, τῆς κοιλίης & γαστέρος nomine ventriculū intelligimus, cibi ac potus receptaculum, & velut proprium quoddam, cuius in œconomia naturali maxima est dignitas, sed necessitas multo maior. Dignitatem hæc inter cetera luculenter testantur, quod maxima sit illius in totius corporis alteratione & immutatione facultas: propterea Quintus Serenus regem appellauit. Videre aureolam hac dēre & obsecrissimam summi Hippocratis sectione 4. lib. 6. Epidemion sententiam: Οἱ θερμοκοιλιοί, ψυχροσάρκοι καὶ λεπτοὶ οὗτοι διαφλεβοὶ καὶ οὖζυμότεροι. Qui ventriculo sunt calido, carnes habent frigidas, sunt venosi & iracundi: ventriculus enim ex æstus chyli gignit nidorulentum & semiputrem; ex praua chylosi non fit laudabilis hæmatosis; impurum sanguinem carnes non trahunt, ita suo genio & viuifico ne clare defraudatæ, refrigerantur; quia tantum habemus caloris, quantum sanguinis; venæ autem impuro hoc sanguine oppletæ turgent; hinc circundia, accensis & putrescentibus succis prohibita transpiratione: hæc ventriculi est dignitas. Necessitatem verò libello περὶ χυμῶν his verbis diuinus expressit Hippocrates: ὥσπερ τοῖσι δένδρεσιν ἡ γῆ, ὥτω τοῖσι ζώοισιν ἡ γαστήρ, id est, qualis terra arboribus, talis venter animalibus: vnde si vel minimum afficiatur, aut diuturna officij vacuitate reddatur ignauior, tota corrumpitur statim atque labascit naturalis œconomia. Sectione tertia lib. sexti Epidemion κοιλίης ὑάκωσις ἢ τῶν ἄλλων ἐγγύχυσις, ἢ τῶν ἐγγύχων ἀκαθαρσία: id est, ventris segnitie omnium confusio, & forumq; impuritas: huius

Quid proprie
κοιλίη.Dignitas ven-
triculi.Interpretatio
loci pulcher-
rime.Necessitas
ventriculi.

præstantissimi & tam necessarij coqui historiam describere iam aggredior. Ventriculus organum est cauū, rotundum & oblongū, membranofum, omni villorū genere intertextum, cibus excipiendis & chylosi conficiendę dicatum. Figuram habet rotundā, sed oblongā, instar cucurbitę aut barbyli pastoritij, vel lyripipij: rotundā quidem, quia figurarum omniū æqualem habentium *περίμετρον*, planarum quidem, circulus, solidarum autem sphaera sunt capacissimę; at ventriculus debuit esse amplissimus, quia ciborum omnium commune erat conceptaculum; oblonga verò ratione bini orificij, quorum altero cibos admittit, altero confectos prorudit in intestina. In quadrupedibus figura hæc magis est sphaerica, in homine oblongior, quia solus homo dorsum habet latum, cætera animalia acuminatum, quæ forma cavitatem amplam in medio constituit. Positus est sub diaphragmate, inter iecur & lienem medius, maior tamen eius pars sinistrum occupat hypochondrium, ut sinistrum latus dextro foret omnino equabile, & hepatis pondus ad lienem compensareretur. Cæterum non statim post os situm obtinuit: tum, quia respirationis organa elatius collocari oportuerat: tum, quia in locum imum releganda erat culina, ne retris nidoribus cor & cerebrum principum facultatum sedes, atque sensus ipsos conraminaret conturbarētque. Cæterum ne dum multis oppletur cibus, pondere suo decumberet aut diuelleretur, eum vicinis partibus firmiter alligauit Natura; superiore quidē parte, diaphragmati; inferiore, omento; posteriore, dorso; dextra, duodeno; sinistra, lienī. Vnicus est in homine, sed capacissimus; & Hippocrati, quinque palmorum amplitudinem habet. Quibusdā animalibus multiplex est; pennatis quidem triplex; ruminantibus, quorum alimenrum siccum est & spinosum, quadruplex. Ventriculi substantia membranea est, duabus propriis tunicis & tertia communi, venarum & arteriarum furculis penē innumeris, necnon amplissimis neruis contexta. Tunnicatum propriarum interior, nervosa est, œsophago, linguę, palato & ori communis, cuius continuitatis euidens signum est oris amaror, quando nimia humoris biliosi abundantia natar aluus. Et Hippocrati in prognostico, iamiam vomituris labrum inferius palpitat. Debuit autem ori continua esse, ut nihil reciperet os quod ventriculo foret ingratum; adde quod primę coctionis præparatio fit in ore. Triplici hæc villorum genere intertexa est; rum ut extendi ad omnes positiones queat ventriculus, tum ut earum ministerio alimentum trahat, retineat, expellat. Interior tunica huius superficies crusta quadam obducitur, ab excrementis tertię coctionis pronata; cuius hunc usum agnoscimus, ne callosior euaderet interior tunica, ne venarum oscula occæcarentur, & ut ad moderatam cibi retentionem aliquid conferrer: lubrica enim & equalis superficies cibos præterlabi finit. Exterior tunica carnosior est, fibras habet transversas quamplurimas, obliquas paucas admodum. Quæ proprias has tunicas extrinsecus obducit, communis est, à peritonæo exorta, omnium crassissima, epiploī anti procreatrix. Hæret autem ventriculo ita validē, ut diuelli vix possit; tum ut firmiores reddantur tunicę proprię, ne alimētorum pondere diuulsę violenrur; rum ad vasorum robur, quæ fortasse dum turgēt ventriculus disrumpi potuissent. Venas habet ventriculus à porta multiplices, à trunco quidem gastricam maiorem, & gastrepiploim; à ramo autem splenico minorem gastricam, coronariam, epiploim posticam, & à summo prope lienem ramo vas venosum: hæc omnes & sanguinem ad vetriculi nutritionem deferunt, & tenuiorem cremoris portionem ad iecoris

Ventriculi
descriptio.

Figura.

Situs.

Contextus.

Numerus.

Substantia.

Compositio.
Tunicæ inter-
ior.

Crustæ usus.

Tunica ex-
terior.
Tertia tunica
communis.

Atterit.
Nervi.

caua transportant. Atteritæ fetæ totidem venas has comitantur à cœliaco tamē. Nervi ad sunt insignes à sexto cerebri coniugio, qui superiori orificio mutuo cōplexu implicati, in reliquum ventriculi corpus multiplici serie distributi, in tenues ramulos exhauriuntur. Præter hæc vasa reperitur intetdum meatus cholidochus in ventriculi fundum ferri; sed vitiosa est hæc conformatio, suntqueij κακοσώμαχοι, & ab ipso statim vitæ primordio miseri, quia bilem euomunt perpetuò, appellanturque *πικέχολοι άνθρωοι*: hæc totius ventriculi est structura, hæc partes sunt similes, quibus vniversum ventriculi corpus coagmentantur.

De partibus ventriculi dissimilariibus, orificiis quippe & fundo.

CAPVT XVIIII.

Orificium
superius.
Eius nominē.



ENTRICVLI partes dissimilares tres sunt, orificia duo & fundum. Orificium superius ob amplitudinē, κατ' ἐξοχὴν σόμαχος dicitur: σόμα enim idem quod os; atque vteri, vt & velicæ, ius est stomachus, primo *καρδιακῶς*. Vetetes Medici καρδίας appellabant, quia exquisitissimo & acerrimo sensu est præditum, & symptomata inuehit cardiaca, hinc eius affectus cardiognus,

cardialgia. Hippocrates in Coacis prænotionibus metonymicā's σῆθος vocat, quod sub pectore & cartilagine xiphoide cōtineatur, dum σῆθος δὲ ἐστὶν καὶ πικρὸν γένος, id est, sterni morsum & amarorem dixit pro cardiognō: & in Epidē σῆθος κατὰ κορὰ vocat, pectora bile abundantia, id est os ventriculi. Hic sedem statuimus appetentiæ & famis animalis. Huius mira est cum corde & cerebro sympathia; cum corde διὰ τὴν γεινίαν, id est, ob viciniam. Extremum enim cordis mucronem tangere videtur, aut saltem ab eo non longè distare: cum cerebro διὰ τὴν κοινωσίαν, id est, ob communionem, quam faciunt nervi insignes stomachici; vnde fit vt eo affecto, melancholica contingant symptomata, & quoties in alimentis penuria suctum sentit, non tantum esurit ipse, sed & cerebrum vibratis nervis lacessit. Fibras habet hoc orificium circulares quantplurimas os angustantes, ne resiliat in cesophagum, & os cibus, prono aut supino decumbente animali. Orificium inferius, Græcis *πυλωδς*, Latinis *ianitor* dicitur, quod prolabentia è ventriculo alimenta, tanquam ostiarius quidam, cohibeat. Hoc os non rectà deorsum fertur, vt somniant veterum quamplurimi, sed superiora spectat, ne quid nisi planè coctum & læuigarum elabatur; postea rectà deorsum in duodenum vergit. Duo hæc orificia & situ & magnitudine inter se differunt: superius enim in sinistra parte spinam versus situm est, circa vnde cimam thoracis vertebram, inferius dextram sedem occupat. Illud amplius latiusque à natura constructum est, quia dura, nec planè contrita famelici plerumque deuoramus: hoc angustius multò, quia è ventriculo nihil elabatur quod non exquisitè attenuatum & comminutum sit. Cæterum duo hæc orificia substantia constant crassiore, quàm reliquum ventriculi corpus, ne forè à transeuntium impetu diuellantur. Sunt autem ambo rugosa & crassiora, fibris orbicularibus, iisque carnosis sphincteris cuiusdam instar prædita, vt dilari, arctari, aperiri & claudi possint. Aperiantur, dum ingerendis in ventriculum cibus aditum, coctis verò exitum præbent: clauduntur, inferius quidem, ne quid elabatur nisi planè coctum sit; superius verò, ne fumi attollantur, qui ad perfectam coctionem plurimum faciunt; sic qui aliquid citò coquere volunt, os ollæ operculo ocludunt vt retineantur fumi; tum ne culinæ

Orificium
inferius.

Quomodo differant orificia duo.

Quomodo aperiantur & claudantur ambo orificia.

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 305

vapores cor & cerebrum feriant. Quibusdam ita hiat hoc osculum ob edacitatem aut intemperiem humidiorē, vt constringi exquisitē nequeat. Hi, vertigini, suffusioni & hemicranie obnoxij sunt; alijs à mœrore ita constringitur, vt solidis alimentis aditum deneger. Vtriusque orificij & apertio & constrictio non fit voluntatis imperio, non membranulatum seu valvulatum opera, non tuberculorum glandosorum veluti annulum constituentium (vt aliquando existimaui) ministerio, sed sola naturæ impulsione. Sic vteri osculum interius clauditur ad conceptionem, apertur ad exclusionē fœtus sine musculo, sine glandula, sine membrana hostiaria. Tertia superest ventriculi pars in medio ferè epigastrij sita, in sinistrum tamen potius, quàm dextrum inclinans latus, *fundum* appellat ventriculi, ciborum promptuarium, & alimentorum vasculum; hic sedem statuunt Medici coctionis primæ: non enim in otificiis, sed in fundo perficitur chylosis, idq; tum ingenta proprietate, formæque specifica, tum insito ventriculi & vicinatum partium calore: propterea sagax & providens Natura ventriculum vndiquaque partibus fouit, quæ non secus atque leberi magno circumiectus ignis coctioni auxiliantur. Dextera parte ventriculum hepar ad vnguem amplectitur; sinistra *lien* rarum *parenchyma*: superiøre adest diaphragma, quod tum proprio calore, tum alieno, quem à corde mutuatur, ventriculum fouet; inferiøre omentum & colum intestinum adipe copioso circumfusum; parte anteriore epiploon, ranquam tegmentum obtenditur, iuuantibus peritonæo, abdominis musculis, & vena umbilicali; posteriore parte adest spina, & spinales vocari musculi; illa, vt propugnaculum, hi, velut substerniculum quoddam molle, tandēque venæ caux & magnæ arteriæ truncus. Connectitur ventriculus cum venoso & arterioso genere per venas & arterias quamplurimas, cum cerebro per netuos insignes, cum œsophago per superius orificium, cum intestinis per pylotum: denique cum partibus in ventre inferiøre contentis peritonæi communione & interiectu. Mouetur ventriculus naturali, non animali, id est, voluntario motu. Ventriculi duplex est vsus. Primus, vt cibi potiusque sit receptaculum: alter, vt chylicet. Illum præstat, quia cauum: hunc verò, à forma & temperie.

Fundus ventriculi.

In fundo fit prima coctio.

Partes ventriculi calore innuantes.

Connectio ventericuli.

Motus ventriculi, vsus.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An orificium superius sedes sit appetentiæ.

QVÆSTIO XVII.



CUM fugax sit animantis cuiusque viuacitas, & triplicis substantiæ perennis fiat effluxus, Natura sui diligens respiratione & nutritu animalium corpora conseruare studet, respiratione spirituosa, nutritu carnosa, & solida substantia reficiuntur: hinc triplex alimentum, πνεῦμα, ποτὸν, σίτιον, aer, cibus, potus. Quoniam verò nutritio sine appetentiâ non fit, singulis partibus Natura desiderium quoddam inuenit, cuius stimulus percite, trahunt suguntque alimentum conueniens & familiare. Sed appetentiâ hæc in singulis partibus sine sensu est: hunc tractum suæque alimenti conuenientis partes non sentiunt. Ne igitur exhausta & famelica marcescerent, solers & erudita Natura partē construxit exquisitissimi sensus, quæ sola reliquarum omnium suæque persentians, animal ad cibi potusque ingestionem impelleret. Si enim suctionis sensus omnibus inisset partibus, languerent perpetuo tempore famis ac siti, essetque animal in ἀνεπαίδεα.

Orificium superius sedes est appetentiæ.

Pars hæc ventriculi est orificium superius, quod veteres Græci, vt annotauit Galenus 5. De loc. affect. 3. De crifibus, & Commentar. ad feft. 3. Prognof. 2. apd' ias appellantur. Hic sedem ftatuunt omnes appetentia animalia, & famis, quæ fuccionis fenfus eft. Senfum hic præbent duo infignes nerui ftomachici dicti, à sexta coniugatione orti. Quomodo autem appetentia hæc animalis excitetur, docuit eleganter Galenus 1. de Symptomatum cauffis. Ad cuius loci illuftrationem hæc annotanda: appetentiam animale[m] duplicem e[ffe]; vnam naturaliter conftitutam; alteram, morbofam & deprauatam: ad illam quinque neceffario concurrunt fymptomata, quæ hoc ordine fe fe conſequentur. Primum, neceffarius eft exhaufus partium, deinde earundem fuftus & tractus, exhaufte enim particule trahunt à vicinis, hæ ab alijs continuatione, donec ad aliquod extremum peruentum fuerit; extremum hoc ventriculi eft orificium superius, vbi ceftat tractus: ex tractu tertium fequitur fymptoma, diuifio oris ventriculi; ex diuifione, fenfus; ex fenſu, appetitus. In deprauata appetentia idem fymptomatum ordo, & ſeries non obſeruatur. Namque in boulimo famis eft ſine appetitu, & in canina appetentia appetitus eft ſine fame. In boulimo partes omnes exhaufte & famelicæ trahunt à ventriculo, hunc vndiquaque lancinant diuelluntque; ſed illius diuifionis nulla fit fenſio; hinc nullus appetitus: reliquæ verò partes defraudate alimentò marceſcunt. Tñs auero notat hoc e[ſt], inſenſibilitatis cauſſa, e[ſt] refrigeratio nerui, obſtruftio eiſdem, exolutio facultatis appetentis: contrà in canina appetentia nulla e[ſt] partium inuitio, ſed fuccionis ſenſus exquisitiſſimus, ob humoris frigidi & acidi præſentiam: curatur thorax, id e[ſt], meri potione apud Hippocratem Aphor. 21. feft. 2. Ex his itaque planum fit & apertum, excitari appetentiam animale[m] in orificio ventriculi, quod tam exquisito ſenſu pollet, vt tangendi organum vocetur, libro De inſtrumento odoratus. Hic vnicus ſupereſt ſcrupulus, quomodo appetendi facultas, cum ad ſentientem referatur, in orificio ventriculi ſedem habeat: conſtat enim animalium omnium facultatum ſedem e[ſſe] in cerebro. Expedita reſponſio e[ſt], appetendi facultatem in cerebro e[ſſe], ſed efficientiam & actionem in ore ventriculi. Sic videndi facultas in cerebro e[ſt], ſed viſio in oculo perficitur. Sic motrix facultas in cerebro e[ſt], muſculus autem voluntarij motus immediatum e[ſt] organum. Si obiciat, hepar appetentis facultatis ſedem e[ſſe]. Dic, appetentis quidem quæ ſine ſenſu e[ſt] & concupiſcibili ſedem e[ſſe], ſed non ſentientis. Cæterum licet ventriculi appetitus cum ſenſu fit, non e[ſt] tamen cum cognitione.

Appetentia
animalis di-
plex.
Quinque ſym-
ptomata ad
appetentiam.

Quid bouli-
mo.
Quid canina
appetentia.

Quæſit.

Solutio.

De orificij ſuperioris ſitu & conſenſu.

QVÆST. XVIII.



E ſitu huius orificij non leuiſ, nec inutilis exiſtit controuerſia: eiſdem diſſolutio litem dirimet, quæ e[ſt] inter Medicos de admotione topicorum. Conuenit inter omnes ad læuam magis, quàm dextram inclinare, ſed ad propius ad ſpinam quàm ad xiphoidem accedat, certatur. Sunt qui ſub cartilagine xiphoidæ ſitum velint; quàm ob id naturam conſtruiſſe putant, vt huius eſſet propugnaculum. Vomitori (inquiunt) dolore ſentiunt ad hanc cartilaginem, non ad vertebram; & Hippocrates ſeſtione 3. libri De articulis, diſtentionem iſtam ventriculi ad partes anticas agnouit: cum ait, ventris repletionem eſſe directionem coſtarum fractarum. Nos cum Galeno ſitum huic orificio assignauimus in ſiniſtra parte ſpinam verſus; non quòd ſpina accumbat vt æſophagus, ſed quòd propius ad ſpinam, quàm ad xiphoidem accedat: propterea laborante æſophago & orificio ſuperiore, parti poſteriori admoenda cenſemus, & anteriori etiam topica. Quæ propoſita ſunt de dolore vomiturientium & directione coſtarum, ad ventriculi ſitum ſunt referenda: neque enim, vt annotatum e[ſt], in orificijs continentur alimenta ingeſta, ſed in ventriculi cau-

De ſitu orificij
ſuperioris.

De admotione
topicorum. La-
borante ven-
triculi orificio.

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 307

tate, eam autem ad xiphoidem potius, quàm ad vertebrae vergere non negamus. Cur autem laborante orificio superiore delect sternum, ratio est Anatomica. Alligatur diaphragma sternum, os autem ventriculi septo adheret amplo foramine; itaque per continuitatem dolet mucronata cartilago, quia in extremitatibus magis sentiuntur dolores quàm in mediis, ut in membranarum sensus videre est. De orificij huius cum corde & membranarum cerebri sympathia, multa extant apud Hippocratem & Galenum. Stomacho enim affecto, syncope, cardiaca, virium omnium exolutio eademque symptomata excitantur, quae corde affecto, unde nomen τῆς καρδίας ei olim impositum. Sauciato capite, colliso, effracto si exponatur aëri dura meninx, cuius appulsus nunquam experta est, statim flava & eruginosa vomit egri; quia ventriculus iure sociatus in στυμνὰς durae meningis trahitur, per generis similitudinem & vasorum communionem; quae praecipua causae sunt sympathiae, ut annotavit Galenus comment. ad sect. 1. lib. 3. Epidemion.

An Chylifis à calore potius quàm à forma ventriculi fiat. Et, cur ventriculus quatuor substantias non gignat, ut hepar.

QVÆSTIO XIX.



IC duo obices amoliti sunt. An calori potius quàm forma specifica tribuenda sit chylifis; & cur ventriculus quatuor substantias non gignat, ut hepar, nec eadem numero excrementa. Vtriusque questionis dissolutio difficile explicatus non habet, ac prior quidem ita definienda. Chylifin non tam caloris vi, quàm insta ventriculi proprietate fieri; certum quidem est coctionem omnem caloris opera & ministerio perfici, propterea

Chylifis à ventriculi forma.

ventriculum omni ex parte, & superiore, & inferiore, & dextra & sinistra, & anteriore & posteriore Natura sonit: sed talis coctio calori non debetur ut calor est (ita enim igneus & febrilis coqueret, qui omnia corrumpit) sed ut est anime instrumentum; chylificatio verò à sola ventriculi forma & proprietate perficitur: neque enim alibi respiciam, quàm in ventriculo chylificat calor, quantumvis validus. Cur autem quatuor substantias non gignat ventriculus ut hepar, ratio duplex affigari potest, quarum una est ex parte materiae, altera ex parte efficientis. Agens calidum est nativum, quod si sit validissimum, heterogenea potentissime separat: at constat inter omnes, hepar tantò esse ventriculo calidius, quàm sanguinea exsanguibus sunt calidiora; hepar quippe viscus est carnosum, ventriculus membranosus: Quare hepatis calor in plures particulas alimentum partiitur, quod debilius ventriculi calor non potest. Accedit ad vim agentis materiae dispositio: liquida enim facilius alteratur quàm solida: at solida excipit alimenta ventriculus, quae magno labore atterit, comminuit, immutat; hepar verò iam tenuatam levigatamque succum excipit, cuius dissimilares particulas nullo serè negotio fecernit, excernitque.

Cur 4. substantias non gignat ventriculus, ratio duplex.

De ventriculi nutritione, an chylo alatur, vel sanguine.

QVÆSTIO XX.



De ventriculi nutritione dissentientes audio Medicos. Sunt qui existiment & ventriculum & intestina chylo ali; alij sanguine crudo, nondum in hepatis parenchymate elaborato, sed in ramis porte inchoato. Avicenna exteriorem tunicam sanguine, interiorem chylo nutriri putat. Zoar, superiorem partem nervosorem chylo, inferiorem carnosorem sanguine ali scribit. Nos totum ventriculum, sanguine puro in hepate elaborato, ut reliquas omnes nostri corporis membranas ali cum Galeno existimamus. Proferam præter vulgares & tritas Medicorum

Ventriculum ali sanguine, non chylo.

Secunda.

rationes, non leuia argumenta. Primum ex dissectione petatur. Vena apparent insignis, & copiosissima per omnes ventriculi tunicas & orificia duo numerosa ramorum serie sparsa, hæ non frustra à Natura sunt condite, non ut chylum ad hepatis causam transportent (nisi fortassis urgente hepatis fame) ita enim crudum veherent chylum, nondum in intestinis perfectum: sed & cum chylosis in fundo ventriculi perficiatur, non in stomacho, numerosiores essent in fundo venarum riuuli, si soli chylo vehendo essent dicatæ venæ: æt ampliores circos apparent: cingit enim totam orificij superioris basim coronaria, stomachica dicta, quia crassiores sunt oris quàm fundi tunica, & copiosiori indigent alimento: sunt itaque ad ventriculi nutritionem comparatæ hæ venæ. Rationem hanc validiore alia fulciamus. In chylo, quantumvis laudabili, remanent adhuc inutiles & excrementitiæ portiones, bilis, melæcholicus succus, serum, quæ non nisi ab hepatis calore secerni & expurgari possunt: at nihil perfectè alere potest nisi recrementis illis fuerit expurgatum. Quomodo igitur chylum conueniens ventriculi alimentum dici poterit? Hoc innuisse videtur Galenus, dum nihil perfectè alere

Tertia.

posse pronunciat, quod coctiones omnes non pertransierit. Quinetiam ali ventriculum sanguine, hæc luculenter demonstrant, quod quæ per hyemem in latibulis degunt animalia sanguine nutriuntur, non chylo, quia per os cibum non assumunt: & quando in vtero continetur fatus, ventriculus puro sanguine per umbilicalem venam delato, alitur. Respondet Valesius, ali ventriculum crudiore sanguinis materni portione, quæ chylo quodammodo similis est: sed indigna tanto viro responsio. Ita enim dicendum esset, cerebrum, ossa, membranas omnes chylo refici, quia piuitioso & crudo aluntur sanguine. Præterea, in summa ventriculi imbecillitate & cibi fastidio, ne contabescat ager, clysteres præscribimus nutriendes ex decocto capi, perdicum, &c. liquor hic ad ventriculum usque non fertur, sed à venis intestinorum fugitur, & ad hepar transportatur, ubi sanguinis formam consequitur: sanguis hic per venas, tanquam tubos singulas partes irrigat. Quis ventriculum tunc temporis chylo refici assueuerabit, cum nulla fiat in eo chylosis? Alitur tamen ut & reliquæ corporis partes. Postremo ex nutritionis similitudine id demonstrari potest. Aluntur sanguine membransæ omnes corporis partes, quidni etiam ventriculus? Concludamus ergo, nutriri ventriculum sanguine, non in venis portæ inchoato, sed vi parenchymatis elaborato. Sunt tamen ex Neotericis docti quidam, Thomas Veiga, & Laurentius Iobertus, qui tenuiore chyli portione ali ventriculum rationibus multis contendunt, quas sigillatim oppugnare non erit difficile.

Inprobatur
Falsi responsio.
Quarta.

Opponent in primis Galeni auctoritatem, qui 3. De natural. facult. & 4. De usu partium, ventriculum chylo refici & nutriri apertissimis verbis docet. Nos ex eodem Galeno duplicem nutritionem agnoscimus: perfectam unam, quæ est assimilatio summum & postremum Natura opus, alteram imperfectam, illius emulam, quæ oblectatio quadam est ex qualitatis cognatione, lasciuam vocat Galenus. Posteriore hac, chylo refici ventriculum voluit Galenus, non priore. Obiciunt secundo, ad ventriculum & intestina ferri tantum venæ portæ propagines, quarum hoc unicum est munus, chylum ad hepar transuehere, nulli autem à vena causa ad ventriculum deriuantur rami: quare non sanguine in hepate excocto, sed chylo alentur nutritionis organa. Ineptissimum (ni fallor) argumentum: namque si soli venæ causæ riuuli alimentarius sanguinem continerent, & portæ rami omnes soli chylo vehendo essent dicati, lien, mesenterium, omentum chylo alerentur, quia nulli à causa ad partes hæ rami disseminantur, sic & crassiora intestina chylum assimilarent, in quibus tamen feces omnino exsuccatas contineri certissimum est. Tertia eorum ratio ex dissectione petitur. Piant tantum venæ ad ventriculum, non disseminantur per tunicas: fugunt ergo potius quàm nutrant.

Quinta.

Deus bone! quæ noua est hæc Anatomæ? Annon per omnes ventriculi tunicas gastrica duplex expanditur? Annon coronaria stomachica totum orificium superius corone instar cingit, ramulôque hinc inde spargit? Similis est (mihi credite) harum & reliquarum venarum in-

Rationes eorû
qui ventricu-
lum chylo ali
contendunt.
Ratio 1.
Responsio.

Secunda.

ferrio.

Refutatio.

ferrio.

Tertia.

ferrio.

Conuelleretur.

ferrio.

ferio. Est aliud doctissimi Veige argumentum. Organa (inquit) prima coctioni dicata ignobiliora sunt, & multo vitiosiore succo constant quam caro. Debent itaque impuriore succo, & nondum in hepate cocto ali. Sed absurdissima ratio, ossa enim ventriculo & intestinis ignobiliora & frigidiora sanguine per venam cauam delato aluntur, & membrana ferè omnes cum proleant sanguinem, qui iam vi parenchymatis excoctus fuit. Accedit quinta eorum ratio, non inualida, ut putant. Si non alitur chylo ventriculus, cur statim assumpto cibo cessat fames, sedatur suis? Respondemus, duplicem esse famem, naturalem vnā, animalem alteram: illa, sine sensu est singulis partibus insita: hæc cum sensu est exquisitissimo soli ventriculo, & præsertim ori propria: illa sedatur sola assimilatione; hæc, cum diuulsione sit sensus, cessante diuulsione, sedatur. Assumpto cibo cessat statim animalis ventriculi fames, quia oppleto ventriculo cessat illius diuulsio & compressio: Naturalis autem ventriculi fames rigatis interioribus tunicis aliqua ex parte sedatur, sed non omnino, nisi perfecta assimilatione, quæ non nisi multa interiecta mora perficitur. Interpretatur Veiga Galeni sententiam, dum scribit, Quicquid nutrit, coctiones tres pertransseat necesse est, hoc ad solam carnosarum partium nutritionem referendum, cum tamen millies mille in locis solum sanguinem idoneum partium alimentum significarit Galenus. Præterea, cum falsum hoc dogma tueri non posse videat, triplicem in ventriculi nutritione coctionem agnoscit, primam omnium chylorum, quæ in fundo perficitur: secundam, hamatosin, quæ in venis ventriculi, tertiam homiosin, assimilationem, quæ in tunicis. Itaque chylum à venis fugi vult, mox verti in sanguinem, tandemque rursum trahi à ventriculo. Sed hic error triplex; primum certum est roborem sanguini non conciliari nisi per contactum parenchymatis. Deinde, non video, cur potius trahatur à venis chylus, quam à tunicis ventriculi, si tanta est chyli & membranarum ventriculi substantiæ similitudo. Postremò, si trahitur à venis chylus, ibique rudimentum sanguinis consequitur, habeo perpetuò ventriculum non ali chylo immediatè, sed sanguine.

Quarta.

Constitutio.

Quinta.

Responsio.
Duplex fa-
mes.

Error Veiga.

HISTORIA ANATOMICA.

De hepate.

CAP. XIX.



PARTIVM in regione infima contentarum vnica est princeps, & absolute necessaria, Græci ἡπαρ, ἡ τὸ ἐπὶ τῷ καρδίᾳ καὶ κεκυρωμένον, Latini iecur vocant, quod iuxta cordis vires potestatem exerceat suam. Huic ventriculus cibum tanquam famulus subministrat; vesicula, lien, renes, regię huius domus illuuiem expurgant, & velut à culina extrudunt. Est hepar τῶν φλεβῶν ἰζύμα, Hippocrati libello De alimento, αἱματώσεως ἡσυχασμός, sed diuina sanguinis, naturalis spiritus autor, venarum principium, non ἡσυχασμός, ἡ δυνάμις, quibus tanquam riuis vniuersam membrorum rempublicam irrigat, & principis instar propriis sumptibus vniuersi corporis familiam alit; vnde Hippocrati primo περὶ γυναικείων, ἰκμαλέον dicitur fons, & origo gratiosi humoris. Veteres quidam τὴν εὐκαρπὸν γλῶν, id est, terram frugiferam vocarunt. Platoni sedes est amoris, & concupiscentiæ, ἀρχὴ τῆς ἐπιθυμητικῆς: huic diuinationem tribuit, vultque τῶν εἰδώλων καὶ φαντασμάτων moueri. Hinc Tirijs fabella, & vulgatum illud, Cogit amare iecur. Medici naturalem facultatem in eo locant. Ab illo enim, quæ nutrici facultati famulatur appetentia, singulis paribus, sed præsertim ori ventriculi communicatur; vnde fit ut qui hepatis ἀτονίᾳ aut scirrhos laborant, sint ἀπόστοι πάντων γευμάτων, cibos omnes auerfentur, maxime q;

Nomen.

Hepatis di-
gnitas.

Situs.

Figura.

Magnitudo.

Compositio.

Substantia.

carnes & vinum fastidiant. Quæ verò ad speciei conseruationem singulis animalibus insita est procreandi libido, à iecore ad testes diffunditur. In huius visceris *ἐνσπαιζή* fundamentum principatum, & facultatum vitalium & animalium situm est, vt in eiusdem *κακονσπαιζή* destructio, & superficiei totius color ab hepatis constitutione immediatè pendet: qualis enim humor, talis color in cute efflorescit; at hepar humorum omnium prima est officina. Maxima ergo illius est dignitas, sed necessitas multò maior, vnde parèchymatum exortu & Natura primum statuitur à Galeno. Situm est hepar in dextro hypochondrio sub diaphragmate & costis nothis; & sepe apud Hippocratem κατ' ὑποχόνδριον hypochondrium dicitur: distat tamen aliquantulum à septo, ne illi quasi flabello præcordia ventilanti obesset. Situm hunc obtinuit à Natura tutissimum & dignissimum; costis quippe quasi sepimentis obuallatum; non vt ventriculus & intestina offibus nudum, quia non extendi hepar vt illa oportuerat, sed in vasorum tantum conpactulis sanguinem continere in tenello factu & recens natis, sinistram etiam occupat hypochondrium, quia oriatur eorum ventriculus, nec ita distenditur; at in adultis non patitur ventriculi distentio spatium illud à iecore occupari. Humani hepatis figuram ignorarunt veteres, & iuniorum quamplurimi. Hippocrates libro De ossium natura, & 6. Epidemion hepar in lobos quinque secatur, pinnas, pinnulas, *fibras* vocat; quibus singulis propria Theophilus indidit nomina. Galenus plures in cæteris animalibus, quàm in homine agnouit lobos; 4. De vsu partium. Sed si autopsiæ credendum, homini continuum est hepar, nec in lobos secatur vt quadrupedibus, quorum ventriculus cum esset magis sphaericus, omni ex parte amplexandus erat: rimam tantum habet ferè in medio (*fissuram* vocant) intra quam vmbilicalis vena embrii nutricula sese penitus abdit, & posteriore parte hepatis portiuncula cernitur, ventriculi similitatem implens. Hepatis continuum hoc corpus infernè & intrinsecus cauum, supernè & extrinsecus gibberum apparet, vnde superna hepatis *κρυπτή* vocant & caput; inferna *συνωλή*. Figuram nullam habuit propriam, quia figura nihil ad alterationem; hepar autem organum erat *αἵματος ποικιλικόν*, sanguificatio similis est actio, quæ à temperie sola & inchoatur & perficitur. Superior itaque eius pars leuis est, rotunda instar laconicæ testudinis & equalis, ne diaphragmatis motui obstat; inferior, inæqualis, nullis velut promotoriis exasperatur, & rupium præcipitiis non est ab similibus, ad venę portæ & meatuum bili expurgandæ dicatorem exitum; adde quod si æquale fuisset hepar, comprimerentur sæpè dum tingeret ventriculus venę portæ rami, atque ita chyli & sanguinis distributio impediretur: sed & dextra parte rotundum est hepar; sinistra verò sensim attenuatur & in acutum quasi fertur angulum. Magnitudo hepatis non eadem omnibus animalibus, sed homini quàm cæteris eius moles amplior, tum quia rariorem & tenuiorem habet cutim, vnde maius effluuium; tum quia plures edit functiones, quæ non nisi à spiritibus, spirituum autem materia sanguis est. Timidis, heluonibus & abdomini natis maius esse creditur. Hepar organum est nobilissimum, pluribus coagmentatum particulis; carne constat sibi propria, tum venarum caua, & portæ radicibus, tertio arteriis, quarto furculis arteriarum; modò cauis bilem in vesiculam deferentibus, demum nervulis, postremò tunica prætenui totum corpus inuestiente. Caro propriam visceris substantiam complet, & ea ratione carnosum viscus dicitur Hippocrati. Gerit autem caro hæc similitudinem sanguinis concreti, & velut ardore tostiprimus Erasistratus *παρέγχυμα* appellauit, vulgus *affusionem*. Eius vsum hunc

De organis naturalib.in imo ventre contentis. 311

agnouerunt veteres, vt vasis affunderetur ne cohererent: tum vt puluinaris instar & mollioris subfterniculi vasa fulciret, stabiliretque. Postremò, vt calore suo venarum hæmatosin promoueret, non secus ac epiploon, lien & circumiectæ partes ventriculi coctionem iuuant. Nos diuiniorem carnis agnoscimus vsum; vt scilicet propria & insita vi sanguinem veta & expressa specie, temperie, rubore omet ac perficiat. Ita principem hepatis partem, eamque solam primò & per se *αἵματοποιτικὴν* astruimus. Venatum hepatis; aliæ chyli tenuiorem portionem ad hepatis caua transportant, *πύλας* vocant: hanc portionem excoquant, attenuant, præparant: aliæ iam confectum & elaboratum sanguinem deducunt ad cauæ truncum. Hæ venarum cauæ, & portæ radices per vniuersum hepatis corpus sparguntur, & miro artificio ita implicatæ, vt longè plures radices portæ, incedant per caua iecoris, pauciores per conuexa; vt venisimile sit, sanguificationem in cauis potius fieri, distributionem & perfectionem in conuexis. Sunt autem admirandæ eorum radicum anastomoses veteribus incognitæ, per quas venæ omnes in hepate, tanquam matrice propria, communionem habent, vt ideò venarum omnium p̄ncipium dici debeat. Cæterum venarum hos plexus in hepate construxit Natura, ad perfectiorem sanguinis elaborationem, vt in illis vasorum angustis ob diuinam moram perfectius coqueretur, & vndiqueque, à parenchymatis etiam per minima contactu alteraretur, ideòque venatum, quæ per hepatis carnem sparguntur tunice, omnium sunt tenuissimæ. Eodem artificio tenuia intestina pluribus gyris intorta, vasa semen præparantia labyrinthicis plexibus capreolis vitium hederæve æmulis implicata, ventriculorū cerebri arteriole mirabili cōtextu fabricatæ fuere. At cut in corde specus duo, plexus nulli; in hepate cauitas nulla, plexus multi? Quia, quæ vel receptura etant, vel mādatura conferim vberem copiosamque materiam, cauitate indiguerunt; quæ verò sensim & modicè, non. Exiles etiam habet iecur arterias ad natiui caloris moderationem & contenti spiritus conseruatione: verum arteriæ caua hepatis tantum attingunt, nam conuexa diaphragmatis motu quasi flabello perpetuò ventilantur. Inter hæc vasa (venas intelligo) tennes deducuntur surculi, arteriarum modo caui, bilis expurgationi dicati, qui in vnum veluti caudicem omnes collecti, desinunt in vesiculam. Totum hoc iecoris corpus membrana tegitur tenuissima à peritonæo exorta, in quam exiles duo sparguntur netui, vnus à sextæ coniugationis ramis, ventriculi orificio & mesenterio implantatis: alter ab eo exortus, qui per costas excurret. Exiles ambo fuere: quia hepatis actio naturalis omnino etat, non animalis, neque ad motum, neque ad sensum animali sanguinem præparabat: adde, quòd exquisito sensu non indigebat, cum vndiqueque inutilibus & noxiis extremenis bile, melancholico succo & sero, à vesicula, liene & renibus expurgaretur. Hepar natiuo temperamēto calidum est humidum. Calidum esse decuit, vt coqueret; at qualitarum omnium hæc maximè est energetica: tum vt alimentorū calor intederetur. Humidum verò esse oportuit, vt suo tepore, vniuersum corpus irrigaret, ideò fons dicitur gratiosi vaporis. Connecitur iecur cetero, per neruos; cordi, per arterias & venam cauam; ventriculo, intestinis, lieni, per splenicum & mesentericum ramum: deniq; vix vlla corporis nostri pars habetur, cum qua iecoti per venas, quæ *ligamenta* appellamus *communia*, non intercedat communio. Sed & connecitur hepar diaphragmati, peritonæo, costas notis, xiphoidi, vmbilico per ligamenta propria. Eorum vno tereti & validissimo phrenibus adalligatur, ac deuincitur, *suspensorium* vulgus vocat. Altero hepatis

Carnis vsus.

Vasa hepatis.

Venarum plexus cur.

Cur cauitas nulla in hepate.

Arteria.

Surculi felles.

Tunica.

Cur exiles nerui.

Temperamentum.

Connectio.

Ligamenta Propria.

Cur felix umbilicus pereat.

Ufus hepatis.
Ex Platone.

Ex Aristotele.
Ex Medicis.
Actio hepatis.

latera costis annectuntur & lumbis. Postremum vena est umbilicalis embryi natrix, quæ foetu in lucem edito, tãquam emerita ac vieta degenerat in ligamentum, prohibetque ne iecur ad posteriora feratur. Barbari, ut suos crudeliter extinguant, nouum supplicij genus inueniunt. Umbilicum orbiculatim secant, eo resecto, pereunt statim suffocati: concidente enim umbilicali vena hepatis vinculo, collabitur hepar, à quo trahitur diaphragma, princeps respirationis organum. De hepatis usu ita philosophatur Plato in Timæo, Quum videret Deus partem animæ, *ἡμῶν* in hunc talem fore, ut rationem non exaudiret, sed simulacris nocte dièq; maximè rapetetur, naturam iecoris procreauit densam, dulcem & amaritudinis non expertem. Aristoteles in hepate præparari tantum sanguinem voluit, perfici autè in cordis sinibus. Medici perfectam hæmatosin hepati tribuunt; hocque naturalis facultatis sedem statuunt. Ex his collige actionem hepatis duplicem, alteram officialem, seu communem, hæmatosin quippe, quæ coctio secunda dicitur: alteram priuatam, seu peculiarem, quam tertia coctio perficit.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An hepar princeps sit pars.

QVÆSTIO XXI.



HEPAR honorifico principis titulo decorandum esse, questione secunda libri primi validissimis rationum momentis à nobis confectum est. Sunt tamen & veterum & iuniorum quamplurimi, qui regia prerogatiua & omnibus suis dotibus hepar spoliare contendunt, hocque nec venarum principium, nec facultatis naturalis sedem, nec ciuium oreos officinam, nec denique spiritus vilius auctorem esse sibi persuadent. De venarum principio & sanguificationis officina, quæ fusa verborum serie iam differuimus nolo hic transcribere; consulat libri quarti controuersias studiosus lector. De spiritu tantum & facultate naturali an insuatur ab hepate, hic breuiter disputatio instituenda.

An hepar naturalem spiritum gignat.

QVÆST. XXII.

Quid spiritus.



QVONIAM in Medicorum scholis satis frequens & peruulgata est de spiritu naturali controuersia, nolo in re tam perspicua diutius immorari: sufficiet in rudiorum gratiam pauca hæc de spiritibus prælibere. Spiritum definit Galenus 6. De usu partium, exhalationem quandam sanguinis benigni: Stoici, animæ & corporis vinculum. Anima enim tam est diuersa à corpore quam empyreum celum à terra. Sunt qui spiritum definiant corpus æthereum, caloris facultatisque sedem ac vinculum, primumque obeundarum functionum instrumentum. Ceterum æthereum dicitur *ἀαλογικὸς*, ob tenuitatem & diuinum operandi modum, natura enim & origine planè est elementaris. Nos spiritum definiemus corpus tenuissimum, perpetuò mobile, ex sanguine & vapore genitum, facultatum animæ vehiculum. Corpus esse voluit Hippocrates, dum inter ea quæ corpus constituunt recenset: diuidit enim corpus in *ἰσχυρὰ ἰσόρρονα καὶ ὀρεκτώτα*, continentia, contenta & impetum facièntia. Corporeum item esse id indicat, quòd egeat canali velut latore, quod partes ipsas distendat, locumque occupet; extincto enim animali & corrugatur pupilla & concidunt membrana oculi spiritus radiis non amplius illustrata. Corpus ergo est: sed con-

nium quæ in corpore continentur tenuissimum, eius namque ut venti magna vis est & incuriosus; sic semen licet crassum viscidumque sit, vasa permeat nullis conspicuis cavitatibus peruenia, quia spiritibus undique est perfusum. Galenus tertio de facultatibus naturalibus, sanguinem tenuem esse vult, vaporem tenuiorem, spiritum tenuissimum. Dixi perpetuò mobile, mouentur enim continenter spiritus non ab alio tantum ut humores, qui sine trahuntur, sue pellantur, ab alio semper mouentur; sed per se, id est, ab innato principio. Adde ut spirituum motus aut ab insito sit principio, aut ab alieno. Ab insito principio mouentur flamma instar, in utramque partem, sursum & deorsum, ut docet Galenus libro de rigore palpi. & libro de utilitate respirationis; sursum, quia leues, ignei enim sunt & aërei; deorsum ratione pabuli. Vterque motus si impediatur, corrumpitur spiritus, idque aut marcore, aut extinctu; marcore hoc est indigentia pabuli, quia deorsum non potest moueri; Extinctu à contrariis, frigido quippe & humido copiosiore strangulante, quia sursum moueri non potest. Mouentur etiam spiritus ab alieno principio, dum pelluntur, dum trahuntur. Pelluntur naturales ab hepate, vitales à corde in sua systole, animales compresso cerebro. Trahuntur, naturales à venis; vitales à singulis partibus cum sanguine arterioso: animales, raro nisi dolore aut voluptate afficiatur pars: ita enim nec obiecti vehementia permittit facultatem à suo munere vacare, nec calor ad se allicere cessat. Est ergo spiritus corpus mobile. Gignitur autem ex sanguine & vapore tenuissimo, ut duplex sit illius materia, sanguinis exhalatio & aër; propterea & sanguine & aëre fouetur, & seruatur, reficitur spiritus omnis. Postrema definitionis particula visum spirituum, qui finalis causæ rationem habet, designat. Est enim spiritus omnis non animæ, sed facultatum eius vehiculum; nam si vinciantur vasa, venæ, arteriæ, nervi, pereunt vita, motus, sensusque, intercepto spiritu, non facultate quæ incorporea est, vinculum quippe nec continuitatem aufert cum suo principio, nec naturalem dispositionem. Hæc spirituum est vniuersalis natura. Spirituum alij sunt insiti, qui tot sunt numero, quot partium genera statuuntur: alij influentes, qui à diuersis fontibus manant; & insitorum vim quasi sopitam ac delitescentem promunt. De horum numero certant Medici. Putat Argenterius vnicum esse spiritum, quia unica est anima; vnicum eius organum, vnicus sanguis, vnicus aër qui inspiratur. Elegantius multo triplicem agnouit spiritum antiquitas; quia tres animæ facultates, naturalis, vitalis, animalis: tria principia, cerebrum, cor, hepar: tria vasorum genera, venæ, arteriæ, nervi. Animalem dari spiritum & docuit sexcentis in locis Galenus, & rationes suadent quamplurimæ. Quorsum enim tot sinibus excavatum est cerebrum? Quorsum plexus illi arteriolarum labyrinthi? quorsum nervorum tam varia propagines? Sed de hoc fusius libro quarto. Vitalem nemo adhuc negavit, nec fuit etiam Poëtis incognitus:

Est Deus in nobis, agitante calefcimus illo.

De naturali tantum disceptatur; hunc è numero spiritum expungunt quamplurimi. Non indiget (aiunt) naturalis facultas vehiculo, cum singulis partibus sit insita: i. De loc. affect. 12. Methodi, & in Arte parua. Deinde nulla est naturalis spiritus materia, quia nulli ductus, per quos ad hepar feratur aër. Quin & nullus est generationis locus, quia nulli in hepate, ut corde, & cerebro, sinus. Adde quod tubi & canales nulli inveniuntur, per quos in vniuersum corpus excurrat; venarum enim tunica tenuiores sunt, quam ut æthereum spiritum continere queant. Et sanè Herophilus eà ratione arteriam venâ sextuplò crassiorem putat quod spiritum contineat, qui ob tenuitatem nisi densiore concluderetur pariete, facillè vaneferet. Præterea cum spiritus dicantur Hippocrati ὁπρῶντα, id est, impetum faciétia, pulsarent eo impetu venæ, si spiritum continerent; non secus ac arteriæ. Postremò, demus per venas ferri hunc spiritum, quo pabulo conservabitur? Calidum enim (ait summus Dictator) frigidò moderatò nutritur: sed aër ad venas nullus fertur. Hæc & similia proponunt qui

Quo sunt spirituum.

Argenterius vnicum statuit spiritum.

O nidiur.

Nullum dari naturalem spiritum.
Ratio 1.
Secunda.
Tertia.
Quarta.

Quinta.
Sexta.

Conuallitur
hæc opinio.

Satisfit ratio-
ni.

Secunda.

Tertia solutio.

Quarta &
quinta.

Sexta.

spiritum naturalem negant. Quæ si æqua lance ponderentur, leuia proculdubio lecta inge-
nitiis videbuntur. Nunquam spiritum hunc negauit Galenus, sed de eo tantum dubitauit: &
videtur etiam capite 5. libri 12. Methodi, de vitali aliquantulum dubitasse, cum tamen cer-
tissimum sit in arteriis hunc contineri. Apertissime 6. De usu partium, in venis paucissimum,
eumque $\nu\epsilon\phi\epsilon\lambda\omega\delta\eta$, id est, caliginosum spiritum contineri scribit. Iustitiam esse facultatem
naturalem admittimus: sed quoniam fugax est insitus singularum partium calor & spiritus
naturalis, dicitur tantum esse, influente quodam simili, quo excitetur, indiget. Volant Ara-
bes hoc naturæ spiritus quasi vectore & duce fieri in vniuersum corpus sanguinem. Licet
enim pars qualibet, magnetis instar familiarem succum proleget, non tamen è distantissi-
mis locis id præstare potest. Sic lapis heracleus plus æquo distans ferrum; sic electrum distan-
tes plus æquo paleas non trahunt. Materiam spiritus agnoscunt aduersarij aërem, cui ad
hepar ductus patent nulli. Quomodo igitur & conseruabitur & reficietur naturalis ille be-
patis & venarum spiritus? marcescet proculdubio conuenienti pabulo defraudatus. An
ignorant $\pi\acute{\alpha}\nu\tau\omicron\ \tau\omicron\ \sigma\acute{\alpha}\mu\alpha$. Hippocrati $\sigma\upsilon\mu\pi\nu\omicron\iota\varsigma$ $\kappa\alpha\iota$ $\sigma\upsilon\pi$ ρ $\omicron\iota\varsigma$, id est, omne corpus
transpirabile esse & transfluxile? Spiritus hic crassus & nubilosus pauco aëre fouetur,
sola transpiratione reficitur. Transpiratio hæc in caua hepatis parte per arterias perficitur,
in gibba verò & conuexa licet arteria nulla sit, adest tamen diaphragma, cuius porum
motu, velut flabello, præcordia ventilantur. Nulla (aiunt) in hepate cavitatis, nulla cisterna,
nullus ergo generationi relinquitur locus. Audacissima sanè cõclusio; sed audeamus nos cum
Galeno fortiter. Non fuit necessarius in hepate sinus, vt in corde: ea enim sola viscera, quæ
vel receptura essent vel mandatura confertim vberem copiosamque materiam, cavitatis am-
pla indiguerunt, minimè verò quæ sensim & modicè. Vitalis spiritus tenuissimus vt celer-
rimè exhauritur, ita citissime reficiendus; non potest autem copiosus affluere, nisi confertim
& ab æthere: necessaria itaque illius generationi est cavitatis, non secus ac pulmone nutriendo
emplissima dicitur vasa Naturæ. At naturalis spiritus crassior vt tam citò non effluit, ita
confertim affluere non debet; sufficiunt ergo venarum plexus illius generationi. Venas in-
eptum esse continendo & deducendo spiritui naturali organum obiciunt, quòd tenuiores sint
eorum tunica, & motu agentur nullo. Nos crassiorem spiritum densò pariete nolimus
concludi. Venas autem idèò non moueri existimamus, quòd facultas $\sigma\theta\upsilon\gamma\mu\iota\chi\eta$, id est, vis
pullifica à corde ad eas nò derinetur, & arterias non à contento feruore & spiritu agitari
putamus, sed à sola vitali facultate, vt disputabitur libro octauo. Postremò cõclusum in ve-
nis spiritum transpiratione foueri, refici & conseruari volumus; habet enim qualibet vena
suam arteriam perpetuò comitem, & sunt quamplurimæ venarum & arteriarum ana-
stomoses. Est ergo naturalis quidam spiritus facultatis & sanguinis crassioris vehiculum,
ab hepate per venas in omne corpus effusus.

HISTORIA ANATOMICA.

De vesicula fellea.

CAP. XX.



QUIA $\alpha\iota\mu\alpha$ τ $\alpha\omicron\iota\varsigma$ coctione perficitur, coctio autem omnis à calo-
re est, cuius imperio quæ homogenea sunt, vniuntur, quæ dissimi-
lia, separantur: non potuerunt chyli omnes partes, quæ diuersi erant
generis, in dulcem & puniceum sanguinem commutari; sed aliæ
in amarum & flauum; aliæ in atrum & acidum; aliæ in serosum &
salis conuersæ sunt; ita vt coctionis huius tria sint excrementa; vnum grauius
magisque terrenum facci respondens, melancholicum succum dicunt; alterum

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 315

leuius magisque aëreum quod per summa innatat, flori confimile, bilem vocant; tertium aqueum & serosum. Tria hæc quia ad alendum corpus minimè erant idonea (solis enim nutrimur dulcibus) à sanguine puro segreganda & in locum aliquem velut proprium conceptaculum releganda fuere. Amara enim bilis si cum sanguine misceretur, spiritum in venis contentum inquinaret, carnes sua acrimonia todens membranâsque lancinans vlcis sensum continuè excitaret, motus denique omnes præcipites & sensationes deliras, quales sunt phreniticorum, redderet. Fœculentus verò ille humor & sanguinem totum conspurcasset, & tetra sua anathimias spiritibus tenebras offundens, animal totum desperatione, mœrote & metu velut exanimaret. Seri autem substantia tota aquea & omni catens pinguedine, perfectam assimilationem impediret. Itaque amaræ bili se cernendæ, vesiculam melancholico succo expurgando, lienem; seroso humori transcolâdo, tenes destinauit Natura. Bilis, fetitate sua & acrimonia magis proripans, prima omnium expurgatur, eiusque cōceptaculum hepatis ita est vicinum, vt ex eius dextra resimâque parte propendeat. Conceptaculum hoc Græci *χολήν χοληδόχον*, *vesiculam biliariam*, Latini, *folliculum felleum* vocant. Substantia eius membranæa est, vt & contrahi & distendi faciliè possit. Vnicam & simplicem habet tunicam propriam, sed validam triplici villorum genere textam: intus rectos habet, quibus bilem in se allicit, & obliquos, quibus retinet: foris autem transversos & orbiculares, quibus eandem expellit in *ἐκφύσιν*. Huic tunicæ alia communis obtenditur, non toti quidem vesiculæ, sed ei tantum parti, quæ extra iecoris corpus propendet. Venulas habet exiguas à portæ trunco, *cysticas* dictas, quibus alitur: arteriolas etiam à cœliaca, & neruulos à costali dextro. Figura vesiculæ oblonga rotundâque est, sensim ad ipsius fundi vsque apicem lōgiotis cuiusdam pyrimido dilatescens. In vesicula tria obseruantur, fundum, ceruix, & meatus bilem deferentes, *πόρος χοληδόχης* vocant. Fundum appello ampliorem vesiculæ partem, bilis conceptaculum: ceruicem verò angustioiorem illam partem. Ductus cholidochi duo sunt: vnus in hepar, inter venâ portæ & cauæ radices numerosis furculis distribuendus, quibus bilem in se allicit, cāmque sinceram, neque viscopiam humore adulteratam. Alter ductus ad duodenum fertur, quo vesicula muria humoris cognitione & familiaritate aliquantulum oblectata, eum ad intestina detrudit, vt acumine eius quasi adhibito stimulo tardiora ad excretionem intestina irritentur & cibi reliquiæ abstergeantur. Meatus hic intet duas intestinorum tunicas non solum obliquo & tortuoso ductu inseritur, sed etiam membranulas habet tanquam ostiola, quæ bilis refluxum impediunt. Ita quidquid clamirent recentiores, bilis ab hepate rectâ ad vesiculam primum fertur, & ab ea per alium ductum in intestina expellitur: non autem ab hepate primum ad intestinum, & ab eo ad vesiculam, vt in Controuersis disputabitur contra Fallopiū: id enim impediunt valuulæ in vtroque ductu conspicuæ: eas autem faciliè deprehēdes, si fistulam in eum ductum immiseris, qui variè in hepar diuaticatur; inflata enim fistula videbis vesiculam non intestinum distendi; si verò altero rubulo vesicam inflaueris, intestinum, non hepar distendi comperies; ita peruius erit tibi, ab hepate ad vesiculam, & ab hac in intestinum ductus. Cæterum duo illi ductus communem habent in medio, ceruicem versus, canalem, quo & trahit vesicula bilem & eandem pellit, sed diuersis temporibus. Fertur autem qui à ceruice ad hepar inseritur canalis, non recto, sed obliquo ductu, quia vesiculæ situs in caua resimâque hepatis parte latitans id impediēbat. Tertius interdum repeti-

*Nomen.
Substantia.*

*Vesic.
Figura.*

*Fundum.
Ductus duo.*

*Valuula in
vtroque du-
ctu quando à
nubis deprehē-
se.
Obseruatio
pulcherrima.*

*Tertius du-
ctus rarus.*

tur ductus, qui ad ventriculi fundum protenditur. Huius meminit Galenus 2. De temperamentis, cap. 8. nec non cap. 74. Artis parua. Vesalius hunc semel se obseruasse affirmat. Sed vitiosa est conformatio, & ita affecti bilem euomunt continuo, vocanturque *πρεσχολοι αἰω*, miserima est sanè eorum conditio. Sic quorum canaliculus ad ieiunum vsque protenditur, appellantur *πρεσχολοι αἰω*: sineque eorum deiectiones perpetuò biliosæ. Verùm de his fusius in Controuersis.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An vesicula bilem trahat, eaque nutriatur.

QUESTIO XXIII.



VESICULAM iccoris cauo alligatam flauo & amaro succofere semper turgidulam, nemo est Anatomie sacris quantumvis leuiter initiatus, qui sæpè non obseruauerit. Sed an sponte ad vesiculam stratur succus, an trahatur ab ea, an vi iccoris amandetur, non ita est exploratum. Ferri sponte & Natura sua, id est, sola elementari forma, nemo nisi amens dixerit: pellitur ergo aut trahitur. Vtrumque voluit Galenus, vtrumque suadet ratio: licet subtilissimus Fallopius pelli tantum ab hepate non trahi à vesicula bilem existimari, contra quem sequenti capite disputabitur ex professo. Enimuerò pelli ab hepate bilem eius natura satis declarat: excrementum est tota natura, & qualitate hepatis noxium; excerni igitur debet, imò celerius quàm reliqua duo supernacua extruditur, quia acriores sunt eius morsus; & ea ratione bilis conceptaculum hepatis cauo affine & connexu visitur; lien verò & renes longius sunt distiti. Trahi autè à vesicula bilem docet Galenus 4. ac 5. De usu partium, & vesicæ ac ductuum eius conformatio satis superque suadent: cum enim plures sint ductus cholidochi, in intestina potius decliuiora quàm in vesiculam, cuius situs elatior est, decumberet bilis, nisi peculiaris adesset & ingentis vesiculæ tractus. Trahit ergo amarum succum, eumque sincerum, & nullo benigno succo perfusum. Verùm an nutritionis gratia, an qualitatum cognatione quadam, an potius incognita nobis proprietate bilem proleat vesicula, quesitum est olim; & hodie disceptatur inter doctos. Edidit hac de re paradoxon Iobertus, valteque bile ali vesiculam, ut lienem melancholico succo, & renes seroso sanguine. Poterit hac opinio his rationibus stabiliri. Axioma est Philosophicum & Medicum, quod libris de naturalibus facultatibus sæpe inculcauit Galenus, nihil trahere propter ipsum trahere, sed ut eo fruatur, id est, tractionem omnem alicuius finis gratia suscipi. Trahit bilem vesicula, ergo ut ea nutriatur: hoc vesiculæ suadet color; tota enim flaua est per assimilationem bilis. Quinetiam perexiguæ sunt & capillares venæ, oculorum aciem ferè effugientes, quæ per vesiculæ tunicas sparguntur. Quomodo igitur interiorum eius substantiam rigare poterunt? Accedit, quòd bile ali pulmones scriptum testatùmque reliquit Galenus; cur ergo vesicula ignobilior, bile aliquantulum impuriore non nutrienda? Hæc & similia proferunt, qui tractionem bilis, nutritionis gratia perfici instituque patant. Nos Galeni auctoritate, & validioribus rationibus fulti, vesiculam bile non nutrirî, sed sanguine per venas delato, tractionemque hanc alterius finis gratia suscipi audacter asseramus. Scribit Galenus 5. De usu partium, cap. 7. ambas vesicas cum sincerum excrementum inutile alendo alliciant, vasis sanguisuius id est, venis eguisse, quorum ministerio alerantur. Cap. 12. lib. 5. querit cur ventriculo & intestinis gemine sint tunice, vesicis autem ambobus unica tantum propria. Respondet, quia in vesicis nulla futura est eorum quæ continentur coctio, nulla ergo nutritio. Auctoritati fauet & astipulatur ratio. Omnis nutritio fit assimilatione:

Pelli bilem ab hepate.

Trahi bilem à vesicula.

Bile ali vesiculam Ioberti opinio. Confirmatio. Ratio 1.

Secunda.

Tertia.

Non alibile, opinio nostra.

Auctoritates Galeni.

Rationes. Prima.

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 317

assimilatione: bilis assimilari nequit, quia excrementum est, non quantitate sola, sed qualitate tota noxium. Sed & cum nihil frustra molietur Natura, quorsum venulas duas, cysticas dictas construxit, nisi ad eius nutritionem? Exiles sunt (fateor) sed tanta earum est amplitudo, quanta ad nutritionem exigui corpusculi & exanguis requirebatur. Flavescit (aiunt) vesicula, ergo per assimilationem bilis. Inepta sanè conclusio: flavescit eolum intestinum contactu vesiculæ, exundante succo per tunicas; at, quis eolum bile illa nutrirî unquam dixerit? dum pulmonis & vesiculæ nutritionem inter se conferunt, non vident aliud esse bilem, aliud biliosum sanguinem? Alitur pulmo bilioso sanguine, id est, tenuissimo in dextro cordis sinu elaborato, sed excrementitia bile nulla pars alitur. Obiiciunt, lienis & renum nutritionem: lien enim excrementitia & faculento sanguine alitur, renes verò seroso. Sed quàm dissimilis sit renum, lienis & vesiculæ ratio, audiant omnes. Lien faculentû sanguinem, renes serosum excrementum trahunt, sed non purum nec impermixtum; amplissima enim sunt eorum vasa, splenicus ramus & emulgentes vena. At que per ampla orificia succum trahunt. (inquit Galenus) non possunt eum purum & sincerum allicere. Trahunt ergo excrementum multo benigno & alimentario succo perfusum, hoc vili & alimentario nutriuntur, noxium verò secerant excrementumque. Vesicula verò bilem in se allicit sinceram, neque alio quopiam humore adulteratam; tum quod vie angustia crassiores illabi non sinat, tum quod eiusmodi attractio maxime ex humoris familiaritate excitetur. Unde cuilibet obuium, apertumque sit, vesiculam nutritionis gratia bilem non trahere. Quorsum ergo bilem hanc trahit? Sanè voluit Galenus familiaritate quadam id fieri & similitudine nobis incognita. Vt enim magnes ferrum trahit & succinum, paleas, ita bilem, vesicula; cuius presentia oblectatur & ex ea incunditatis sensum percipit. Ita enim quinto De usu partium, cap. 10. scriptum reliquit: Trahitur bilis à vesicula ob qualitatis communionem. Siquidem cum tot annos quodque animal superstes sit, in ea tamen vesicula videre est bilis flauæ contineri quidpiam: quin & mortuis ipsis, ablatis ab hepate vesicas simul cum bile diutissime asseruamus, nihil tractu temporis corporis ipsarum patiente: ita unicuique quod est cognatum ac familiare, innoxium est. Sed curiosus quis sciscitabitur, Quomodo excremento eo oblectari potest vesicula, cuius tanta est feritas & acrimonia, ut si paulisper in intestinis cunctetur, vlcera pariat, & si in habitum corporis effundatur, ganniculû vellicando rigorem excitet? Cur vesicula membranosa, proindeque exquisitissimi sensus, acrimoniam eam non sentit, eiusque humoris colluui non leditur? Multa (inquit Lucretius) tegit sacro inuolucro Natura, sunt mirabiles in uniuerso rerum sympathie & antipathie. Oblectatur bilis presentia vesiculæ; itaque acrimonia eius non leditur, quinetiam humoris contactu assueta non patitur. Sic veneno assueti veneficam eius vim non experiuntur, & liquoris guttula arteriam infestat, plena pocula ventriculum oblectant; minime aère torquetur ventriculus, & intestina diris cruciatibus infestantur, copiosissimum autem hauriunt, eoque recreantur assueti pulmones. Qui bilis familiaritatem & cognationem cum vesicula non admittunt, tractionis causam referunt ad uniuersalis nature necessitatem & providentiam, ut scilicet expurgetur sanguis, ne ea labe inquinatus ad alendam reddatur inutilis.

Secunda.

Connellicur
prima opinio.

Quorsum bi-
lem trahet
vesicula.

Cur non ledi-
tur bilis aci-
monia vesi-
cula.

Responsio.

Fallopij laus.



CABRIELI Fallopio subtilissimo atatis nostrae Anatomico multum debemus: quamplurima enim prioribus seculis incognita aperiat nobis. Primus hic humani oculi historiam accuratè descripsit, & cartilagineum illud corpus (trochleam vocat) observavit. Primus Fallopius veterinum penem clytorida dictum indicavit: quinetiam in musculorum, venarum, & nervorum historia multas difficultates mille implicitas involucris explicavit. Sed cum vesicula biliaria usum assignat, dum τὸ πρῶτον χολιδόχος, id est, meatus bilem defcentes describit, quia a veteris disciplina auctoritatem erroris insinuat; miserè fallitur. Vetus est opinio, & longè verissima, duos esse ductus cholidochos; eorum unus in hepar numeroso surculis distribuitur: alter à vesicula ad intestinum fertur. Priore bilem ad se allicit vesicula, posteriore eandem in duodenum amandat. Fallopius contrà, ductus cholidochos, qui per icter disseminantur, non ad vesiculam, sed ad duodenum intestinum rectà ferri continuoque bilem extrudere existimat. Quoniam autem sæpè contingit intestina flatibus distendi, aut distributionis tempore chylo esse turgidula, unde bilis expurgationi aditus intercluditur, ne in hepar bilis regurgitet, sanguinem iterum conspurcatura, vesiculam construxit Natura tanquam diuerticulum, in quo ad tempus asseruetur & colligatur bilis donec intestini meatus aperti sint. Fraque duo astruit Fallopius, primum bilem ab hepate rectà ferri ad duodenum; alterum, vesiculam bilem non trahere, sed eò resluere tumentibus intestinis. Quae duo absurdisima esse, ne dum veritatis pallio velata, & ratione & sensu (certissimis rerum omnium criteriis) demonstrare aggredior. Nihil in structura corporis se ingerit fortuitum: at qui à Fallopio assignatur vesicula usus, fortuitus est & accidentarius: neque enim perpetuum est intestina flatibus distendi, eorumque meatus intercludi, hoc sanis & bene constitutis corporibus rarò contingit: est ergo aliquando quibusdam corporibus inutilis vesicula & frustra à Natura condita, quod vera & solida Philosophia non patitur. Nihil unquam molitur Natura contra causas maleficas, nisi contra eas quae quotidie & necessario contingant: fuit primum naturae institutum sanum, non morbosum hominem creare, partes ergo primò & per se non fortuitò generat: licet una & eadem particula ad varios usus sæpè abutatur. Accedit secundus aries novi dogmatis muros eversurus. Debit biliosum excrementum ad vesiculam prius ferri quàm ad ecphysim: si enim sensim & perpetuò ad intestina flueret, ea ad excretionem non impelleret, quia pauca bilis & gustatim illabens imbecilliter moveret: at quoniam à vesicula trahitur, in eaq; colligitur, tandem confertim & maxima copia irruumpens, repente movet ad interpolatas necessariaeque homini deiectiones. Tertiò, nisi admittatur vesicula tractus & proprietates quadam continendi retinendique bilem ad tempus, quid proderit eam à sanguine separasse? Si enim ab hepate rectà ad intestinum semper descendit, cum chylo iterum miscebitur eumque conspurcabit: patet quippe ad intestinum via, nec chyli distributio, ut somniat Fallopius, tenuissime bili aditum intercludit. Sed & si reslueret tantum ad vesiculam bilis ob interclusum duodeni meatum, non semper, sed aliquando tantum reperiretur vesicula plena; at ea bile semper plena est, etiam in sanis & bene constitutis corporibus. Adde quod, si vesicula diuerticulum tantum esset, quid opus tam insigni cavitate sufficeret exiguum corpusculum, cum primum naturae institutum non sit eò bilem amandare, sed ad intestinum. Præterea si nulla trahendi vi polleret vesicula, cur reslueret potius ad eam quàm ad hepar bilis, cum oblongior sit magisque obliquus ductus? Si enim solum agnoscis refluxum, per patientiores & breviores vias fieri debet: trahitur ergo. Quinetiam nisi traheretur sed reslueret tantum bilis, non retineretur, sed eodem momento tanquam noxia pelleretur, ita irritus foret

Fallopij de ductibus cholidochis mea opinio.

Fallopij error.

Rationes nostrae.

Ratio 1.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Septima.

hæc refluxus: cur enim vesicam non irritaret, ut intestina & ventriculū, si ei cognata & familiaris non esset? Non coniecit (ait Galenus cap. 4. lib. 5. De usu partium) bilem in ventriculū Naturæ, quia noxia erat. Si enim intestina suo contactu statim mouet, ventriculi coctionem labefactaret. Querit Galenus cur intestina duas habent tunicas, vesicæ autem ambe, quæ urinam & bilem continent acriorem, unicam tantum. Respondet, quia intestinis noxia est bilis, vesicæ autem cognata; pauca bilis intestina irritat, non vesicam, quia non trahitur ab intestinis, nec illis familiaris est ut vesicula. Mouit (ni fallor) subtilissimum Fallopiū unica hæc ratio, obliquum esse ab hepate ad vesiculam ductum, ab hepate autem ad intestinum recta ferri, ideoque obliquo & flexuoso eo ductu non posse bilem ad vesiculam prius ferri quam ad intestinum. Sed mollior hæc mihi videtur ratio quam tanti viri grauitas postulet. Alius enim est motus expultricis facultatis; alius tractricis; alius elementaris forme. Qui motus elementarem formam sequitur, rectus est, breuior, patetior & rectus magis sequitur ductus: in tractricis motu qui ab anima est, nihil obstat viarum obliquitas, nihil grauitas: nam & pituitosus sanguis licet grauis ad cerebrum fertur & famis tempore crassiores faeces trahit ventriculus. Quia ergo trahitur à vesicula bilis, non impedit illius motum obliquus ductus: non potuit autem recta ferri ille ductus ab hepate ad vesiculam, quia in cauo iecoris erat sita, descendit ergo meatus, deinde ascendit. Obiicies, si vesicula bilem trahit, quia illi familiaris, cur eam expellit? Qua enim proprietate trahit, eadem retinet ut oblectetur. Responde, bilem non excerni nisi molesta sit, aut copia, aut qualitate; longa enim mora euadit acrior. Quæ autem à quibusdam afferri solent, vesicam bilem non trahere, quia multa animalia ea carent, nihil faciunt: in quibus enim deest vesicula, in illis bilem à vesicula trahi nemo dicet: sed in quibus vesica ad iecoris cauum est sita, eius hunc usum agnoscimus ut bilem trahat. Quod autem in quibusdam deest vesicula, scribit Aristoteles 2. De hist. animal. cap. 15. Fel (inquit) aliis adnectitur iecori, aliis minime. Cervo & dama deesse notatum est, atque etiam equo, mulo, asino, vitulo marino, cervis Aethiæ cognomine, fel contineri in cauda creditur, elephantum quoque ut & delphino iecur sine felle. In Eubœa Calcide nullum pecori, in Naxo prægrande geminumque. Iam verò si ut sentit Fallopius idè verisimile est ab hepate bilem primum ferri ad intestinum, quia breuior est ductus, liceat eadem in eum iacula retorquere: Restuet ergo ab intestino ad hepar potius, quam vesiculam bilis, quia non ita obliquus est ductus, ita nullus erit diuerticuli usus. Sed missis rationum momentis experientiam nostram proferamus. Dico à iecore ad vesiculam ferri ductum conspicuum peruiumque canalem, non autem à iecore ad intestinum; à vesicula verò ad duodenum patet canaliculus alter, non à duodeno ad iecur: in utroque ductu valuiſſe adſunt bilis refluxum impediētes. Id facili deprehendes si fistulam in hepatis ductus immitas & infles, videbis statim vesiculam prius inflari, quam intestina, quia peruius est ab hepate ad vesiculam ductus: quod si in vesicula imponas tubulum, inflabitur intestini ductus, non iecoris; ita fertur bilis ab hepate primum ad vesiculam, à qua mox in duodenum extrahitur. Concludamus ergo, trahi à cauis hepatis bilem à vesicula, in ea retineri ad tempus, tandemq; stato & soli Naturæ cognito tempore amandari in intestina. Hæc fuit admirandū Hippocratis libro 4. De morbis, Galeni & veterum omnium sententia à scholis nostris recepta. At ubi tantus est sapientum virorum consensus & vetustatis totius auctoritas, non facile moueor quòd vnus vel alter ingenij lasciuia quadam dissentire videntur. Ceterum ne quid ad perfectam horum ductuum historiam desiderari possit, animaduersione dignum est, posteriorem ductum, quo vesicula sese exonerat, interdum duplicè esse, id est, duas esse illius propagines, quarum altera ad ventriculi fundum, altera ad duodenum fertur: meminit horum ductuum Galenus 2. De temperamentis, & in Arte parua, & Vesalius semel se obseruasse affirmat. Interdum vnicus simplexque est ille ductus, sed malè à Naturæ

Ratis
Fallopij.

Cancellatur.

Obiecta.

Scholis.

Deficere in
quibusdam
vesiculam.obseruari
nostra.Ductum in vē-
trici fundū
fertur ali-
quando

conformatus: & quibusdam in ventriculi fundum, alii infra duodenum inseritur: illi bilem vomunt continuo, hi liquida & biliosa deiciunt perpetuò; illi appellantur *πικρόχολοι* *ἀντα*, hi *πικρόχολοι κατω*: utroque vocat Galenus biliosos *ἔχει*, habitu & conformatione. Hæc vi illustriora euadant, annotandum, biliosorum hominum apud Hippocratem & Galenum duo esse genera. Sunt quidam biliosi *τῇ φύσει*, id est, naturâ: quidam ex euentu. Naturâ biliosi, vel tales sunt *κατὰ φύσιν*, id est, temperamento, vel *ἔχει*, id est, habitu. Temperamento quidem, qui hepate sunt calidissimo; hepar enim præcalidum, bilem gignit copiosissimam: habitu verò dicuntur biliosi, id est, conformatione, quorum ita conformata est vesicula, ut ad ventriculum aut ieiunum usque excurrat canaliculus felleus; eos appellat Hippocrates libro De victus ratione in acutis *πικρόχολος ἀντα κατω*, biliosos supra aut infra: illi bilem vomunt perpetuò, resfluente sursum bile; hi biliosa multa deiciunt: ambo pituitosi esse possunt temperamento. Extat elegans historia apud Galenum, commentario ad sectionem secundam libri De victus ratione in acutis, de Paulo Rhetore & Eudemo Philosopho: ille toto temperamento pituitosus crebris vomitionibus torquebatur, erat autem illi astrictior alvus: huic biliosa deiectiones, vomitio bilis nulla. Hi omnes *τῇ φύσει*, id est, naturâ, biliosi dicuntur. Sunt biliosi quidam ex euentu, id est, a scititio temperamento, ut qui in labore, vigiliis, ira corpus consiciunt, qui acerbis vescuntur, salis & piperatis. Ceterum an uno & eodem ductu trahat pellatque bilem vesicula, dubitarunt multi. Scripti neoterici quidam magnus Hippocratis interpres, sed in Anatome parum exercitatus, duos canales in vesicula corpus inseri, quorum altero trahat, altero bilem pellat. Sed signata sunt hæc & mera nugæ. Vnicus enim ductus ad vesiculam fertur, quo & trahit, & excernit, sed diuersis temporibus: ab eo tamen ductu communi duo emanant sarculi; aliter ut hepar variè diuaticandus, quo trahit tantum; alter in duodenum inferendus, quo expellit tantum. Hoc voluit Galenus tertio De facultatib. naturalibus, cap. 13. Non est difficile (ait) tractionem & expulsionem diuersis temporibus per eundem meatum fieri, si ventris stomachus gula vocatus, non cibos tantum ducit, sed etiam in nausæi contrario fungitur officio.

Biliosi quæ
modis ducentur.

Biliosi infra.

Vnicus in ceruice vesicæ est ductus.

HISTORIA ANATOMICA.

De liene.

CAP. XXI.



VE M A D M O D V M agricolæ fecundas segetes lupinis circumdant, ut allecto terræ amarore letius dulciusque euadat triticum: ita ex aduerso hepatis lienē construxit Natura, ut expurgato faeculentis sordibus hepate, & crassa ac lutulenta succorum illuuiæ hausta, purior illustriorque reddatur sanguis. Hac ratione splenis visus organum dicitur apud Viaticum: & Plato lienis hunc agnouit usum, ut hepar speculi modo nixens, atque perspicuum ad imagines exprimendas redderet. Hoc depurandi sanguinis munere si frustretur lien, mirum dictum est, quàm grauias inde emergant & suscitentur symptomata. Nam & spiritibus tenebræ offunduntur, & terra ad cerebrumque effertur anathymialis, & liuet pallêque vniuersum corpus: vnde Stratonicus cytharæcedus in Caria dicebat ambulare mortuos, quod lienosi essent omnes. Sicut est lien in hypochondrio sinistro ex aduerso iecoris: vnde 6. Epidem. *ἀεστεδν* per Pleonasmum dicitur: parte sui sima & concaua ad hepar & ventriculum vertitur; gibba verò ad spinarum costarum extrema. Quibusdam paulò elatiorem, aliis decliuiorem situm occupat. Horum meminit Hippocrates sect. 2. li-

Sicut.

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 321

bri 6. Epidemion: *Quibus lien deorsum vergit, his pedes & genua calent, natus & aures frigent.* Lienis figura pro ratione partium, quibus accumbit, varia est & multiplex. Nam quā diaphragmatis cavitatem attingit, leuiter gibbus cernitur, quā ventriculo gibbo & extuberanti innititur, modicè cauus occurrit: huic tamen figuram omnes oblongam & propemodum tetragonam linguæ bubulæ speciem referentem assignant, vnde etiam *linguosum viscus* vulgo dicitur. Hippocrates libro De corporum refectione, plantæ pedis assimilat. Lienis non vna omnibus magnitudo inest, vti neque color vnus: est tamen in vniuersum lienis magnitudo deterior paritate: & quibus corpus floret, lien minuitur, quibus contrā lien augetur, corpus minuitur. Vnde non ineptè Traianus Imperator *fiscum*, lienem appellabat. Quemadmodum enim crescente liene, reliquum extabescit corpus, ita ditescensisco populus depauperatur. Lienis totum corpus carne constat sibi propria, tum venis & arteriis quamplurimis, demum nervulis, postremò tunica totum corpus inuestiente. Caro est velut *παρέρχυμα άραιον καί σπυρσιν* es, rarum, fungosum & solutum, instar solidioris spongiæ, aut læuioris pumicis, hauriendis excipiendisque facibus opportunum. Venæ adfunt insignes in lineam veluti rectam insertæ, & in totam eius substantiam sparæ: oriuntur omnes à ramo splenicohis ductibus crassum & lutulentum sanguinem allicit lien, non purum & impermistum, sed multo benigno succo perfusum, quem arteriarum copia attenuat subigitque, vt sibi similem reddat. Crassior squalidiôrque melancholici humoris portio facis vinacæ æmula, quæ lienis vi attenuari non potuit, nunc in portam & intestina per eundem ramum splenicum, nunc in ventriculi fundum per vas breue aut venosum dictum, nunc in sedem per hæmorrhoidas, nunc in renes per arterias emulgentes amandatur extruditurque. Arteriæ etiam numerosissimæ & insignes in lienis substantiam sparguntur, quarum multiplex vsus est. Primus, vt pulsatione sua faculentum expurgent attenuentque sanguinem: vt enim pulmo vehemēti refrigeratione, ita splen expurgatione insigni indiguit. Secundus arteriarum vsus est, vt crassum hunc sanguinem ex venis in substantiam lienis excidere sollicitent. Tertius, vt lienis calorem faculento succo penè obrutum ventilenr, ne languescat. Postremus, vt vitalem facultatem lieni impartiantur. Circumdatur postremò lienis substantia tenui mēbrana à peritoneo exorta, in quam nervulus à sexta coniugatione inseritur. Connectitur lien, & alligatur parte gibba diaphragmati & reni sinistro, membranarum peritonæi interuentu, parte sinistra ventriculo, tum per venas quas illi largitur, tum per epiploon.

Figura.

Magnitudo.

Compositio.

Caro lienis.

Vena.

Arteriarum
lienis vsus
quatuor.

Tunica.

Concretio.

CONTOVERSIÆ ANATOMICÆ.

De lienis vsu contra Galeni calumniatores.

QVÆSTIO XXV.



DE lienis vsu varia sunt & veterum & neotericorū sententia. Erasistratus lienem frustra conditum existimauit. Aristoteles libro 3. De part. animal. non nisi ex euentu necessarium esse scribit, licet trahere aliquando à ventriculo excrementum, illudque conficere volueris. Vtraque opinio nullis rationibus stabilita, in schola Medica iactationē nullam habuit. Norunt enim Medici Naturam optimum esse æconomum, licet ἀπαιδεύτων, & illam Stoicorum σοφιστῶν sciant in structura corporis nihil esse fortuitum, nihil quod Sapientiæ summæ maiestatem

Erasistrati & Aristotelis opinio.

Concretiur.

Alexandri
& Aretij
opinio.

Rationes eorū.

Couelluntur.

Rondeletij
opinio.

Noua Plinii
opinio.

Rationes Plinii.

Conuelliuntur
Plinii opinio.

non referat. Alexander Aphrodisiensis sect. 2. Problem. Aretaeus lib. 1. De causis & signis chronicorum, & auctor libelli De respiratione, lienem sanguificationis organum esse uolunt, hunc νότον ήπαρ, ής όσπερ όντι ήπαρ hepati appellant. In hoc preparari & excoqui uenosum sanguinem contendunt coniecturis quibusdam tantum persuasi; quia structura utriusq; uisceris similis est; quia in utroque uasa sunt amplissima; quia solet Natura communes corporis ministros uel geminos facere, uel unicum tantum, cumque in medio locare, ut cor, uentriculum, utrum, uescicam, os, linguam, nares; quia ergo in dextris hepar, in sinistris lienem locauit, duo uidentur esse organa uni eidemque actioni ministrantia. Sed leniora sunt haec, quam ut communem & in scholis receptam de lienis usu sententiam labefactare possint. Quomodo enim potuisset Natura duo ita uasta & toti corpori famulantia uiscera in medio subitus cor disponere? Quomodo rursus non superuacanea fuisset, si plura sanguinis conficiendi instrumenta condidisset, cui unum sufficere poterat & debebat? Fuit Rondeletij opinio, lienem non esse humoris melancholici receptaculum, quia is humor totus dum naturalis est, in osseas & alias duras secasque corporis partes impenditur, & cum eius sit in nobis minima portio, sit ut excipiendus illis reliquii, nulla pars dicata sit, ut neque sanguineis recrementis, quae magna ex parte sudoribus & insensili transpiratu abeunt. Pissaniensis quidam Medicus, libello quem edidit De liene, elegantissimo, nouum & inauditum lienis usum commentus est. Uult preparari in liene uitalem spiritum, id est, tenuissimum sanguinem, uitalis spiritus materiam, inde per lienis arterias in sinistrum cordis sinum ferri, ibique cum aëre misceri & perfici, perfectum in arterias omnes, tanquam tabulos & aqueductus refundi. Rationibus satis validis & veri speciei quadam adumbratis nouum hoc dogma stabiluit. Vitalis (inquies) spiritus materia duplex est, aër & sanguis; utraque preparatione & attenuatione indiget: aër in pulmonibus preparatur, sanguis uero nec in dextro cordis sinu, ut uoluit Galenus, quia à dextro ad sinistrum nulli sunt ductus spectabiles, nec in pulmonibus preparatur, ut existimauit Columbus; ergo in liene. Hoc & uisceris structura & symptomata quae lienosos infestant, satis superque suadent. Viscus hoc etiam summi Dictatoris edicto lib. 1. De morbis mulierum, αερίον έστρογόνον σπένδον, καί υδρον κατ'ό τινος κοιλίαν, ratum est & spongiosum, & uelut alter pulmo. Quam etiam in eo, arteriarum adsunt plexus innumeri: at nusquam plexus, nisi ad elaborationem nouam. Sic in cerebro plexus mirabiles, in testibus labyrinthica uasa, in hepate uenarum myriades: preparando igitur attenuandoque uitali sanguini lienem destinauit Natura. Praeterea spleneticonum omnia symptomata, color linidus, sudor fetidus, pediculorum prouentus pedum inflatio, cordis palmos, caloris languidi & exoluti ac impuri spiritus signa sunt certissima. Haec probabilis multis fortasse uideri poterunt, quae tamen si ad ueritatis libellum reuocentur, falsa & erroris plena aequis ueritatis aestimator indicabit. Namque, ut rem in pauca contraham, quomodo preparatus in lienis plexibus uitalis ille spiritus per arteriam magnam ad sinistrum cordis sinum ferri poterit, cum in aortae orificio tria adsint ostiola intus hiantia, foris autem clausa, ne quid per arteriam hanc cor ingreditur? Hoc ipsum aperitissime docuit Hippocrates libello περί καρδιών; cuius uerba, quia sunt quouis tractare suauiora, quouis sole illustriora, libenter ascribam. Oculis arteriarum tres pelliculae subornatae sunt: rotundae, in summo uelut circulus semisectus; & qui eorum peritii sunt mirantur quomodo oscula & aortarum fines claudunt, & si quis corde exempto aliam auferat, aliam reclinet, neque aqua, neque flatus immixtus in cor penetrat; atque haec magis in sinistri uentriculi oculis exactius, & merito sanè subornatae sunt. Haec Hippocrates. Ex quibus hoc colligo, si nihil per arteriam cor ingredi potest, quomodo sanguis ille in lienis plexibus attenuatus cor ingreditur ut putat Plinius? Scio quid respondeat quidam, membranulas illas constructas esse, non ut nihil omnino in-

ires egrediaturve, sed ne simul ac semel & tumultuose quidpiam ingrediatur egrediaturve. Sed diuerticula sunt hæc; debet enim copiosus sanguis confertim in cor ferri ad vitalis spiritus generationem, quod semicirculares impediunt membrana. Verum contra hunc libro obstatio suffus disputabitur, dum nobilem de præparatione vitalis spiritus questionem agitabimus: hæc obiter hoc loco dixisse sufficiat. Cæterum, quod obiicit, ingentes & numerosas arterias in liene frustra non esse conditas, sed ad nouam sanguinis elaborationem, dico arteriarum lienis quatuor esse usus. Primus, ut pulsatione sua feculentum expurgent, attenuentque sanguinem; secundus, ut crassum hunc sanguinem ex venis in substantiam lienis excidere sollicitent; tertius, ut lienis natium calore impuro eo sanguine inquinatum & penè obrutum, ventilem, ne languescat, postremus, ut vitalem facultatem lienis impertiant: ita inutiles non sunt tam insignes arteriæ. Quæ autem spleneticis contingunt symptomata, sanguinis sua face non expurgati impuritate contingunt, & αἵμα τὸ σπένος potius quàm spirituum officina vitata βλασφημία sunt, id est germina. Sed & si lien præparando vitali spiritui esset dicatus, cum illius maxima sit ad vitam necessitas, in omnibus perfectis animalibus reperiretur, et multa sine liene viuunt & vitales conficiunt spiritus. Superioribus annis dissectum fuit Lutetie cadaver iuuenis bene habiti, & sine liene inuentum: splenicus aderat ramus insignis in exiguum corpus glandosum desinens & venæ duæ hemorrhoidales feculentum sanguinem expurgantes. Tradit Plinius libro undecimo naturalis historiae, peculiare cursus impedimentum in liene esse, quamobrem inuritur quibusdam & per vulnus etiam exempto viuere animalia tradunt. Quæ animalia parum habent facultatis sanguinis ea liene carent, vitales tamen generant spiritus. Id testatur Aristoteles cap. 15. libri 2. de historia animal. Lien (inquit) magna ex parte omnibus quibus & sanguis, sed magne parti eorum quæ non animal sed oua pariunt, lien usque adeo exiguus est, ut ferè sensum effugiat, quod in auibus experimur, ut columbis, miluis, accipitribus, noctuis. His ita constitutus iam de lienis usu sententiam nostram aperiamus. Volumus cum Galeno 1. De sanitate tuenda, libro De formatione factus, 6. De locis affectis, 2. De natural. facult. libro De atra bile, lienem ad feculentis sanguinis expurgationem constructum: propterea hunc ex aduerso hepatis locauit Natura, ut crassa ac lutulenta succorum illuue hausta, purior reddatur sanguis. Hunc autem melancholicum succum mira providentia aut familiaritate nobis incognita allicit lien, non purum & impermixtum, ut vesicula bilem, sed multo benigno succo & laudabili sanguine perfusum: quia, quæ per ampla orificia succum trahunt, eum nunquam sincerum sed alio humore adulteratum trahunt. Haustum hunc sanguinem, & delatum per splenicum ramum copia arteriarum attenuat, subigit, excoquit, sibi similem reddit, tandemque puriore eius portione alitur. Hoc indicauit Galenus, dum scripsit lienem sanguinem trahere crassorem, quam hepar, sed nutrirî tenuiore: impurioremque ac squalidiorẽ sanguinis portionem nunc in fundum ventriculi, nunc in venas hemorrhoidales eructare. Hæc vera est de lienis usu Galeni & Medicorum ferè omnium sententia, quam rationum aliquot momentis confirmare lubet. Certissimum est in hepate unà cum sanguine generari tria excrementa: unum tenue, magisque aerium, per summa innatans, bilem vocant; alterum crassius, magisque terrenum feci respondens; tertium aqueum, & serosum. Bili sua acrimonia magis proritans primum amandatur, melancholicus succus lutulentus & impurus expurgatione indiget: ad expurgationem opus est conceptaculo, quod a coctionis officina non plurimum distet. Conceptaculum hoc nec est ventriculus, nec intestina, nec renes, nec venæ cauæ rami: solus itaque relinquitur lien, qui insignem ramum splenicum a porta trunci & cauis hepatis excipit. Id indicant lienis color in omnibus ferè animalibus, ater aut subliuidus, necnon sapor acidus: at qualis in aliqua parte color efflorescit, talis dominatur humor. Præterea lienem trahendæ expurgandæque fecidatam esse hæc docet: quod lien obstructionibus & schirrhosis tumoribus maxime sit oppor-

Arteriarum
usus.Ratibus
Plini satisfic.Animalia
perfecta sine
liene viuunt.
História.Opini Galeni
& vera.Confirmatur
Galeni opinio.
Ratio 1.

Secunda.

tenus; non ratione substantiæ, rara enim est & fungosa, insi ar solidioris spongia aut leuiorū pumicis; non ratione vasorum, amplissima enim sunt: ergo ratione humoris contenti, qui si tenuis esset, obstructions & scirrhus non pareret. Hoc docuit Galenus 13. Methodi: Iecoris (inquit) substantia scirrhus maximè est obnoxia, utpote quæ naturaliter lutosam quidpiam continet, lienis verò rarior est substantia quàm iecoris, sed scirrhosis tumoribus sepius affigitur ob alimentis speciem. & 5. De simplicium medicament. facultat. Lien meatu amplos habet: unde igitur obstructio iam frequens nisi à crasso & feculento sanguine? Ratione huius crassi humoris scribit Galenus 1. De sanitate tuenda, lienem iuuari exercitatione superiorum & inferiorum, ut attenuetur. Et apud Plutarchum, Orchomenos Lacedæmonius lienosus, ita cursu sese exercuit, ut tandem inter pedites palmam obtinuerit. Quinetiam lienem feculenti sanguinis conceptaculum esse ita demonstratur. Obstructo liene, statim refluit ad hepar lutulentus sanguis, qui laudabilem & purum suo colore inficit; hinc totus corporis habitus melancholicus euadit, & icterus fit niger; non secus atque obstructo canaliculo felleo resiente bile: ad hepar, flauescit totum corpus, fitque icterus flauus. Hac ratione existimo veteres risus sedem in liene statuisse: vulgatum est enim:

Cor sapit & pulmo loquitur, fel continet iras,

Splen ridere facit, cogit amare iecur.

Et diuinus Plato ad id alludens, proximum iecori locatum lienem scribit, ut purum hoc semper clarumque reddat, & modo speculi nitens atque perspicuum, ad imagines exprimendas accommodatum. Sed contra huius sententiæ veritatem obici multa solent, quæ dissoluenda sunt. Si lien trahendo expurgandoque feculento succo esset dicatus, essent ductus quidam ab hepate succum hunc deferentes; esset cavitatis quedam excipiens; essent & meatus detrudentes. Sic ductus sunt fellei bilem ab hepate deferentes per uniuersum hepatis corpus sparsi, arteriarum modo cavi; est conspicua vesiculæ cavitatis bilem excipiens; sunt & canales bilem in duodenum trudentes. Sic vehendo sero, emulgentia vasa, excipiendo, renum sunt membranosos, expellendo, ureteres & vesicam destinauit Natura. Sed nulli sunt proprii & peculiare ductus lutulentum hunc succum deferentes ad lienem, nulla in liene cavitatis, quæ continere & excipere possit, nulli ductus eum pellentes. Non ergo humori illi trahendo expurgandoque dicatus est lien. Quod nullus sit canalus asportanda feci dicatus, doceo. Nature hæc est prouidentia, ut statim perfecta hæmatosi expurgentur & separentur à laudabili sanguine quæ noxia sunt & heterogenea, ne eorum contagio, & permixtione impurus reddatur sanguis. At si per splenicum ramum feratur melancholicus succus, Natura hæc lex funditus euertetur: quia totum venæ portæ truncum peruadet, & conspurcabit melancholicus sanguis, omnesque ventriculi, epiploi & vicinarum partium ramos inquinabit. Neque vero lien idoneum melancholici succi conceptaculum esse potest, quia nulla in liene cavitatis, nulli sinus, crassum autem excrementum plus loci occupat quàm tenue. Postremo nulli sunt ductus hunc succum extrudentes; non enim in hemorrhoidales venas, nec in ventriculi fundum relegatur, quia si in hemorrhoidales venas pelleretur, laborarent omnes hemorrhoidibus, cum omnes feculentum eum sanguinem gignant: adde quod qui per hemorrhoides fluit sanguis, tenuis est & purpureus, non ater nec crassus. Quod si in ventriculi fundum reliquias feculenti sanguinis lien eructaret, vomitu tandem aut deiectione excluderetur, ita & acidum vomeremus continuo, & deiectiones nigre secederent. His argumentis pangunt, quasi aculei, qui Galeni de lienis usu sententiam oppugnare contendunt. Sed vulnera hæc per sanare non erit difficile. Splenicum ramum idoneum esse deducendo melancholico succo, vasculum dicimus, à quo, licet ventriculi & epiploi venæ ferè omnes oriantur, non tamen impurum hunc sanguinem partes illas proleclare, sed solum lienem insita familiaritate volumus. Sic serum sanguini permixtum non purum soli proleclant renes per vasa amplissima.

Cavitatem

Puritia.

Obstructiones.

Responso ad
singula

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 325

Cavitatem vero in liene necessariam non esse putamus; quia venarum & arteriarum plexus adsint innumeri, in quibus coquitur, attenuatur lutulentus sanguis: sic in hepate plexus multi, cavitatis nulla; in mammis & testibus plexus multi, cavitatis nulla. Querit Galenus cap. 6. lib. 4. De usu partium, cur renes duo, unica vesicula, unus lien. Respondet, quia plurimum adest feri, minus bilis, minimum melancholici succi, serum tenuissimum est, melancholica fax crassissima, bilis media. Paucio igitur, crasso & difficulter mobili humori maximum & rarissimum organum sufficit; cauum autem esse non debuit, quia non erat subitò excreturum melancholicum succum, sed immutaturum. Quod si melancholici sanguinis supersint reliquia, quis neget per hemorrhoidales venas in sedem, per vas venosum in ventriculi fundum relegari? Neque tamen perpetuò defectiones erunt nigrae, aut vomitus acidi, quia per exigua feculentis sanguinis portio internarum partium calore per habitum digeri potest, ut ossium, cartilagineum & reliquarum partium excrementa. At si quantitate & nimia copia luxuriet, ut melancholicis contingit, quae per anum, per urinas, & per hemorrhoides deiciuntur, nigra apparebunt. Fluit aliquando per hemorrhoides tenuis & purpureus sanguis; quia admotione hirudinum trahitur quod tenue est; quod crassius ob vultu in inflicti angustiam subsidet: & vel dicimus, hemorrhoidas quasdam esse externas, alias internas; haec a ramo splenico, ille ab iliaco oriuntur; haec cacochymia, & faculentis sanguinis sunt vacuatrices, illae plethorae depletrices; sanguinem itaque purum & laudabilem fundant.

Hemorrhoides internae, externae.

Per quas vias à liene ad ventriculi fundum feratur melancholicus succus, & in quem usum.

QUEST. XXVI.

FERRI ad ventriculum humoris melancholici portionem, Medici ferè omnes statuunt, sed per quos ductus & cur, non satis inter eos convenit. Auenenna per venam stephanicam seu coronariam dictam, ad os ventriculi ferri melancholicum succum, priusquàm lienem ingreditur, existimavit. Mirum est (inquit) leuissimum bilis excrementum infernè ad intestina, per ventriculum laderet, relegatum fuisse; gravissimum verò & melancholicum, sursum ad ventriculi os ascendere sperate commoditatis gratia. Galenus varia & diuersa hac de re sentire videtur. Tercio De naturalibus facultatibus, à liene in omentum, ab hoc in lactes & tenuia intestina, per haec, ad pylorum, tandemque ipsum ventriculi fundum pelli melancholicum succum scribit. Libris De usu partium, breuiorem aperit viam, vas scilicet breue seu venosum à summo prope lienem ramo ad ventriculi fundum protensum. Libello De venarum & arteriarum dissectione, vas breue, in quibusdam tantum non in omnibus, reperiri affirmat. Ego, ut ingenuè dicam quod sentio, vas illud venosum perpetuò obseruari. Itaque cum breuissimus sit ille ductus maximèque conspicuus, verisimilius est ab hoc in ventriculi fundum relegari portionem illam melancholici succi faci vinaceae emulam, quae lienis vi subigi & attenuari non potuit, quàm per distantissimas illas vias. Non negarim tamen obstru-cto illo canali remeare in splenicum ramum, & ab hoc nunc in coronariam ventriculi, nunc in hemorrhoidalem, nunc in mesentericas venas. Cur autem in ventriculi fundum effundatur melancholicus succus, vulgaris & vera opinio est, ad excitandam appetentiam id fieri: frigidus enim est & austerus; at frigida omnia quia astringunt & corrugant ventriculi os, appetentiam excitant. Sic aqua vorax apud Hippocratem in Epidemiis, & melancholici omnes voraces. Putat Auenenna melancholicum succum astrictione sua non appetentiam modo, sed etiam retentionem & coctionem iunare, & id voluit etiam Galenus quinto De usu partium. Ventriculum intendit & contrahit ad seipsum, coigitque cibos ad unguem ample-

Auenenna opinio.

Galeni sententia.

Quid sentiamus.

Cur in ventriculi fundum effundatur melancholicus humor.

obscum.

saluta.

Et retinere quousque fuerint concocti. Obijcies, si excitas appetentiam melancholicus humor, cur venosum vas in os ventriculi, quod sedem statuimus appetentie, non implantatur Natura? Responde id factum, ne ventriculi os continuo mordeas & vellicans, famem perpetuam excitaret. Huius rami beneficio fit ut quartanarii hunc amplum sortiti, vomitibus, aut spontaneis, aut arte factis, ante & post accessionem præsertim declinante morbo multum inueniunt. Idem quoque ramus facit, ut in quartanis non lien solus afficiatur, sed etiam os ventriculi; & in melancholico ferè omni affectu laborat ventriculus.

Quomodo per vrinas expurgentur lienosi, & per quos ductus.

QVÆSTIO XXVII.

Melancholicum humorem aquam vocat Hippocrates, & cur.



Experientia.

Melancholicum humorem per vrinas expurgari. Auctoritates.

SPLENETICOS & melancholicos omnes, sero copiosissimo confertos esse, & summi Hippocratis auctoritas, & ratio, & experientia persuadent. Hippocrates melancholicum humorem passim ὕδωρ, id est, aqua appellat, libro 4. De morbis: Εἴχα δὲ ἡ γυνὴ καὶ ὁ ἀνὴρ τίσσας ἐξιδέας ὕγρ' αὐταὶ δὲ εἰσι, φλέγμα, αἷμα, χολή καὶ ὕδωρ id est, Habet tum mulier, tum vir quatuor humidi species: sunt autem pituita, languis, bilis & aqua. Libro De genitura: εἰσὶ δὲ τρεῖς σαρκες ἰδέαι τῶν ὕγρ' αἷμα, χολή, ὕδωρ καὶ φλέγμα: Humidi quatuor sunt species, languis, bilis, aqua & pituita. Per aquam interpretantur omnes melancholicum humorem, quod is humor plurimum feri habeat: frigidus enim est. Itaque eius presentia lienis, ventriculi, hepatis & vicinarum partium nativus calor exsoluitur, hinc crudiatum & aquarum maximum prouentus: addit quod debuit serum crassissimo humori permisceri, ut illius esset vehiculum. Sed & quotidianus rerum enentus id demonstrat: quartanarii enim omnium copiosissime sudant ac meium, & melancholici ferè omnes sunt sputatores: quoniam in eis signa hypochondriaca hoc quasi præcipuum refert Galenus ex Diocle, 3. De locis aff. spiritum copiosissimum. Sit igitur hoc ratum, spleneticos sero abundare. Expurgari autem per vrinas Hippocrates, Galenus, Auicenna, Paulus, Rhasis docent, & nos medicinam facitantes, quotidie experimur. Hippocrates libello De internis affectibus scribit medicamentia que lienosis prescribuntur per vesicam debere purgare: libro De externis affectibus, biliosus qui magnum lienem habent, & ideo prauis ac fædi coloris sunt, malignaque contrahunt vlcera, vult vrinas subduci. Neoterici vlcera sceleratiora lienis vitio contracta, curant diureticis, & iis que sudores promouent. Exstat elegans historia Bionis sect. 2. lib. 2. Epid. Βίον αἷμα τε ἔρπει ὑπὲρ πολὺ ἀνυπόστατον, καὶ αἷμα ἐξ ἀριστέρῃ ἰσθμῷ γὰρ καὶ ὁ σπῆν ὑπὸ τοῦ, καὶ σπληνός. id est, Bion simul multum mingeat sine subsidentia, & languis è sinistra nare manabat: erat enim splen illi in gibbum elatus ac durus. Quartanarios diureticis curat Galenus. 2. ad Glauconē, intestina per infernas deiectiones expurgari vult, ἀσπὴρ οὖν καὶ σπληνὰ καὶ νεφροὺς μὲν τοῖς δι' ἄρων, ut splenem & renes per vrinā. Idem comment. in sextum Epidem. vrinas nigras colligari lienis notas esse scribit. Auicenna fen. 15. tertij, Cum lienosis (ait) se multum exercent, deriuatur humor melancholicus ad vrinarios ductus & fiunt vrina nigra. Obseruauimus ipsi, lienosos quamplurimos vrinarum nigrarum liberali profusione sanatos. Erant autē vrinæ nigre nō liquore, non χυρῶσα, id est, generatione, quia tales in Prognostico, Prorrhetico, Aphorismo perpetuo sunt lethales: aut enim maximum incendium omnia torresaciens denotant, aut natus caloris extinctionem & νέκρωσιν, id est, morticinium: sed nigrae erant permixtione humoris atrij, quem lien expurgabat & deponebat in renes. Verum per quos ductus, per quas vrinas è lienē ad renes serosus & melancholicus succus expurgetur, non ita omnibus compertum & explorat-

Vrina nigra duobus modis

De organis naturalib.in imo ventre contentis. 327

tum est. Duo vasorum genera per lienis substantiam sparguntur, vena scilicet à ramo splenico orta, & arterie quamplurimæ. Rami splenici & venarum emulgentium nulla est communio, nisi distantissima: splenicus enim ramus à porte trunco, emulgens verò à caua descendens trunco emergit; at caua & porte nulla est communio, nisi in hepatis substantia; observant namque recentiores quidam ambarum venarum quamplurimas anastomoses. Ergo si per venas fit expurgatio, resluet melancholicus sanguis à liene ad portam, ab hac ad cauam, à caua per emulgentes ad renes, quod iter longissimum erit. Existimo itaque per arterias potius quàm per venas expurgationem hanc fieri, quia brevior ductu & patientiore à liene ad emulgentem arteriam vacuabitur humor in liene contentus: sic empyricorum, pleuriticorum & peripneumonicorum pus per arterias vacuatur, non per venas, & in arteriis plus feri quàm in venis contineri docet ocularis demonstratio. Qua ratione etià emulgentes arterias insignes constructas puto, non tam ut vitalem spiritum deferant (sufficeret enim exigue) quàm ut serum in arteriis contentum expurgent in renes. Hoc docuit Galenus s. De usu partium, & libro adversus Erasistratum.

Ductus per
quos ad renes
& vesicam
excluditur
melancholicus
humor.

HISTORIA ANATOMICA.

Vene caue descendens delineatio.

CAP. XXII.

EXPURGATUS amaro & lutulento excremento sanguis, rubet, putus & sincerus in venam insignem perlabitur, cuius historiam hic subrexere postulat sectionis ordo. Sed eam libro quarto accuratè descripsimus: inde igitur repetenda est.

De renibus.

CAP. XXIII.

RIMÆ & secundæ coctionis excrementum aqueum & ferolum suo vehendi munere (vnde ὀρχίμα τῆς ποφῆς dicitur Hippocrati) iam perfunctum, tandem è iecoris cauo secernitur, è venis maioribus expurgatur & in propria conceptacula abit. Expurgationi huic, organa trium generum à Natura sunt instituta: alia enim familiaritate quadam nobis incognita serum trahunt, non purum & impermixtum, sed sanguine multo adulterarum, quem non coctione, sed transfusione secernunt, cuiusmodi sunt renes; alia secretum deducunt, ut vtreteres meatus; alia excipiunt, continent, excessum, ut vesica; quæ singula ordine describenda sunt.

Organa sero
expurganda
dicta quot
sunt.

Renes νεφροὶ dicti sunt, aut νεφροὶ ῥεῖς, quod est *ningere & plueri*, aut νεφροὶ ῥεῖς, id est, à *defluxu humoris*. Gemini sunt, ne obturato vno, serosi humoris cessaret profusio. Vnicus isque parvus non sufficebat, quia copiosissimum erat serum; magnus in medio locandus fuisset, non in alterutro latere, ut corpus esset isopropov, id est, in *æquilibrio*; at situs hic, venæ caue descendens transitu impedisset, vnicum ego aliquando renem, interdum tres & quatuor observaui. Positi sunt renes paulò infra iecur, ut celerius eum humorem sanguini adimant & vasa habeant amplissima. Incubant autem musculis lumborum (Ψόας Græci dicunt) qui cruri flectendo dicati sunt, unde calculosorum crus è directo stupore torpet, νεφροὶ τοῦ μὲν καὶ ἔξω (inquit summus Dictator.) Quinetiam utrinque ad latera venæ caue positi sunt, ne sanguinis ad inferiora cursus interciperetur. Eo-

Renes cur ita
dicti.
Cur gemini
sunt.

Sunt.

*Ren alter cur
altero elatior.*

rum vnus altero semper est elatior, neq; ex diametro sibi inuicem opponuntur, ne alter alterius tractui moram afferret, ne serum esset *ισόρρ' ὁσπον*, & vt si feri quædam portio quasi effrenata, præterflueret, ea in alterius sinum incideret. Scribit Galenus, dextrum læuo altiore esse; nos contrà sinistram ferè semper elatiore obseruauimus, quia magnum est in homine hepar, lien verò paruus, in brutis autem deorsum magis vergit lien. Renum figura, fascoli vulgò dicti speciem admodum imitatur, vel, vt existimant quidam, semi-lunæ. Quæ enim venam causam spectant, sinuati sunt & concaui, extrinsecus ad ilia gibberi & oblongi. Hippocrates libr. De ossium natura, renibus formam cordis tribuit, non quidem externa figura, sed quia ventres habent cordis instar; ex visceribus enim sanguine præditis, nullum præter hæc duo sensiles cauitates obtinuit. Renum substantiam Hippocrates inter glandulas collocat, id est, glandosa corpora, vel ob substantiæ similitudinem, vel quia ex multis partibus coagmentantur vt glandulæ, vel quia multa humiditate oblectantur. Galenus numerat inter viscera & parenchymata, quippe quorum substantia carnea sit, tubra, densa & solida, non multum à cordis substantia differens, nisi quòd villis texitur nullis: solida autem fuit, ne immodica laxitate exceptam vrinam sineret fusiùs elabi. Magnitudo eorum tanta, quanti ad expurgationem feri requirebatur. Connectuntur renes lumbis, diaphragmati, colo intestino peritonæi interiectu; vesicæ, per vteres; cerebro, cordi, hepati per venas, arterias & neruos. Renum structura mirabilis est, veteribus incognita & iunioribus ferè omnibus, qui brutorum potiùs quàm hominis renes descripserunt. Ego Fallopij & Eustachij scriptis, dein sectione ipsa & *αὐτοψία* peritior factus, totam renum structuram breuiter aperiam. In renibus externæ & internæ partes considerandæ sunt; externæ quæ primæ occurrunt, sunt membratæ, renum corpus totum inuoluentes, & vasa tum ingredientia, tum egredientia. Internæ sunt renum caro propria, sinus multi, venarum, arteriarum, neruorum elegans & aspectu iucunda diuaticatio, vrinariorum ductuum in plures ramos diremptus, carunculæ papillarum instar, extremos latosque illos ramos & foramina multa operculi instar claudetes. Membranæ duæ sunt, externa & interna, ambæ à peritonæo ortæ. Illa inuolucris modo vndiquaque obducitur, vnde etiam renum fascia vulgò nuncupatur, & adipè copioso circumfunditur, vt renum calorem augeat, ne ob feri continuò delabentis copiam langueret, tum vt puluinaris & mollioris straguli vicem gerat. Interna proprium carnis tegmen, priore tenuior, omni pinguedine carens, & à communi vasorum renes ingredientium tunica dilatata ortum ducens, extrinsecus quidem obducta, substantiâ vnitam continet, & superficiem lubricam reddit; intus verò reflexa, renum portas & ventres subintrans, vasa omnia comitatur, eaque vndique cingens firmiora reddit. Vasa renes ingredientia & egredientia, tibi etiam non secanti occurrunt; vena scilicet insignis emulgens dicta, à caue descendenti trunco orta & in sinum renum partem inserta. Per hanc serosum humorem è venis prolectant renes, *κατὰ quorum* non nutritionis gratia, sed mutua & communi qua inter se conueniunt familiaritare ad id incitati, eam nunc duplicem nunc triplicem aliquando vidimus. Est & vena quædam exteinas renum runicas irrigans, adiposam vocant; in quam sæpè ramulus ab azygo diaphragma permeans inseritur, vnde renum & thoracis mira est societas, si iunioribus fides habenda; nos enim alias expurgationis purulentæ cum Galeno agnoscimus vias. Arteria etiam adest amplissima, non solum vt vitalem spiritum deferat sanguinemque & serum moueat, ne calido humido loco

Figura.

*Substantia
renum.*

Magnitudo.

*Renum structura
incognita
veteribus.*

*Renum partes
externæ.*

*Membrana
renum duæ.
Externa.*

Interna.

Vasa renum.

Vena.

Arteria.

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 329

conclusus stagnatium aquarum more putrescat; sed vt arteriosum expurget sanguinem serumque in arteriis copiosissimum, refundat in renes. Nerui etiam à stomachico ori ad renes feruntur, vnde renum & ventriculi mirus consensus, & in nephritide tanta est ἀναστροφή, tanta ventriculi subuersio, vt omnem fastidiant cibum & iniectum statim eructent. Hæc vasa sunt renum cauum ingredientia. Egrediuntur verò, duo facis insignia, alba, caua, arteriarum instar neruea, vnum vtrinque, vteretres seu vrinarios meatus vulgus vocat, quorum descriptionē mox audies. Hæc tibi priusquam renum sectionem aggrediaris, diligenter sunt aduertenda. Internæ renum partes variæ sunt miro artificio fabrefactæ; ac primum sima eorum pars, quæ vasa tria admitit, tota quasi reorta sæpius in tres, rariùs in quatuor partes diuiditur, eaque diuisio satis ampla est altiusque penetrat. Hic venarum arteriarumque diuaticio incipit, quæ aspectu pulcherrima est; finduntur enim vasa hæc primum in tres aut quatuor ramos: horum rursus quilibet in alios, omnes demum in quamplurimos disperguntur, donec in minutissimos & capillares abeant. Desinunt autem, non in sinum vnicum, vt sentit vulgus, sed per totam renum carnem variè diuaticantur & ad gibbum vsque feruntur; frequentiores tamen ramorum fibræ capillorum instar ad carunculas papillis simillimas excurrunt, vt per eas feri in vrinarij ductus ramos inibi desinens, fiat transcolatio. Nervus verò, non in tunicas externas desinit, vt sentiunt multi, sed interiora renum perreptat. Vreterum verò per renum carnes distributio paucis est cognita. Volunt enim Anatomici ferè omnes, quod ego etiam aliquando credidi, duos esse in renibus sinus secundum visceris longitudinem protensos; alterum ab arteriarum & venarum extremis contextum, qui serum à sanguine fecernat, alterum insigniorem priori occurrentem, ab vterere efformatum, qui serum iam depuratum & sensum instillantem cisternæ cuiusdam instar suscipiat. Sed in homine sinus illi amplissimi & oblongi non reperiuntur. Nam & venæ in capillamenta abeunt, non in vnicum sinum, & vteretres meatus vnicum illum ventrem quem somniant secundum renis longitudinem productum, nusquam effingunt. Qualis autem sit eorum per renum carnes distributio, accipite. Vrinarij meatus renum cauum ingressi, latiores primum euadunt, vnicam habentes cavitatem, sed non oblongam, mox venarum arteriarumque instar in varios scinduntur ramos, nunc plures, nunc pauciores, sed tres præcipuos, qui rursus in alios disperguntur, vt sint in vniuersum nouem aut decem fistulæ. In his ramis duo notatu digna obseruanda sunt. Primum, quòd non abeunt in capillamenta venarum instar, sed in sine latiores sunt; deinde quòd sæpe in medio sunt perforari. Vtrumque factum puto, vt carunculas mammillarum papillis simillimas admittant, nam & extremum horum vasorum quodlibet carunculam excipit, eidemque suis fibris adhæret, & quodlibet foramen papilla illa obrutatur. Caruncula hæc exiguum est corpusculum, ex renis carne efformatum, ex basi latiore in acutum mucronem sensum desinens; extuberat papillarum more. Per has carunculas serum à sanguine separatim transcolatur, & sensum in canales ab vterere efformatos stillat, à quibus tandem in communem ductum corruatur, & ab eo per vteretres in vesicam. Singulare hoc artificium si velis intueri, denudata aliquantulum renis carne, fistulas in venam, arteriam & vas vrinarium immitte, deinde singula vasa alternatim infla; videbis renem totum attolli, nec villos emulgentium vasotum ramos in renum cauum manifestè permeare, aut cum illis qui ab vterere oriuntur coire, sed per carunculas; & aquam si impellas, & statim renum ca-

Nervi.

Internæ renum partes.

Venarum & arteriarum per renes diuaticio.

Nervi distributio.

Sinus duo longi & amplissimi à veteribus descripti non inueniuntur hominibus. Preterea per renes distributio.

Caruncula papillis similes.

Obseruatio.

Renum vsum.

num ingredi & per easdem regredi. Hæc renum est mirabilis structura : ex qua eorum vsum & actionem facile colliges. Vfus communis est, sanguinem venosum & atteriosum suo sero expurgare : trahunt itaque per vasa amplissima ferum sanguini permistum, sanguinem retinent nutritionis gratia, serum vero per ramulos capillares stillat primum in carunculas illas, ab his in fistulas membranosas vreterum propagines, tandemque in vretes corruunt. In renum superiore parte glandulam inueniri insignem scripsit Eustachius. Eam vidimus nos aliquando, sed sæpe etiam deesse obseruauimus.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

De renum vfu & vrinæ matetia.

QVÆST. XXVIII.



ERASISTRATVS & Asclepiades (vt refert Galenus 1. De naturalibus facultatibus) nullum ferè vsum renibus ascribunt. Aristoteles libro De partibus animalium, renes ad continendas & stabilendas venas primariò, & per se constructos putat, sed secundariò ad humorem superuacuum excernendum his abuti Naturam. Nos cum Hippocrate, Diocle & Galeno 1. De natural. facult. 5. De vfu partium, libris De locis affectis, expurgandi venosi & arteriosi sanguinis gratia constructos existimamus. Cum enim triplex in hepate redundet excrementum, biliosum, faeculentum, serosum, & priora duo statim peracta coctione expurgentur, tertium verò sanguinem, aliqui crassum, & ad motum ineptum, vehat, vt expedire in graciles & angustiores venas permeet: æquum est tandem vt munere hoc persunctum tanquam inutile secernatur, expurgetur & in propria conceptacula amandetur: at conceptacula hæc sunt renes. Hoc & eorum substantia sinibus multis excavata, & fistulis quasi colatoris perforata satis indicat, necnon vesicæ urinariæ per interiectos vretes cum renibus continuitas. Sed quomodo hæc expurgatio fiat, an renum tractione, an venarum vi expultrice, an feri proprio motu, an alio quouis modo controuersia non caret. Erasistratus successione ad id quod vacuatum est, id est, fugæ vacui, expurgationem hanc fieri putat. Sed huius opinionis leuitas redargutione nostra non eget. Hippocrates, Diocles, Praxagoras & Galenus 1. 2. & 3. De facult. naturalib. 4. De vfu partium, 6. De locis affect. renes incognita proprietate serum ad se allicere volunt, non purum, sed sanguini permistum. Sanguis ibi conseruatur, & roris modo fusus primum apponitur, mox assimilatur, & in renum substantiam facessit : serum verò alendo inutile secernitur primum, mox ob tenuitatem per carunculas papillarum more extuberantes in fistulas quamplurimas, ab his in sinum membranosum tanquam cisternam corruunt, & ab eo per vretes in vesicam. Recentiores quidam expurgationem feri non tractione renum, sed sola venarum expulsionem fieri contendunt: quia nihil trahit, διὰ τὸ ἔλκεν, id est, propter ipsum trahere, sed vt eo fratur: at renes sero non nutriuntur, nec seroso sanguine: quia densa est, solida & compacta renum substantia, serosus autem sanguis tenuissimus est: pellitur itaque ad renes vrina nature vi, quæ vel copia feri grauat, vel eiusdem acrimonia & sanguine stimulat. Sunt qui contrariam tueantur sententiam, nusquam expulsionem expurgationem hanc fieri, quia fieret venarum & arteriarum compressio, coarctatis superioribus & laxatis inferioribus; quæ ratione non solum serum, sed etiam totus sanguis ad renes compelleretur. Quinetiam renum situs expulsionem aduersari videtur: nam oporteret eos venæ causæ & arteriæ magnæ rectè subiectos esse, non autem ad latera collocatos. Adde quòd in reliquis omnes venas cruales & iliacas non secus ac in emulgentes, fieret expulsio feri, imò in inferiores po-

Renum vsum verum.

Quomodo feri
fiat expurga-
tio.
Erasistrati
fistulam non
dignam.

Quomodo
opinio, sola
expulsione
feri
sero expurga-
tionem non
trahente.

Contraria
opinio.
Renum 1.

Secunda.

Tertia.

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 331

iuis & decliniores. Itaque nec trahi sero sum humorem à renibus, nec pelli, sed eò ferri existimant; alij quidem ex accidenti, ut Erasistratus, qui successione ad id quod vacuatum est, id est, fuga vacui, expurgationem hanc fieri voluit, alij per se, id est, propria facultate, ut Auerroes acutissimus vir, qui non trahi alimentum à partibus, sed ipsum insita vi ad partes ferri annotauit. Dum enim coctione nouam formam accipit alimentum, acquirit etiam facultatem, ut ad hanc vel illam particulam vi sua moueatur; sic elementa forma propria ad sua quæque loca mouentur. Sed nec Erasistrati nec Auerrois opinio probari à quoquam potest: utraque enim facultates anime tollit, præsertim tractricem illam nutriti famulantem. Nos ut dissentientes grauissimorum virorum de seri expurgatione sententias conciliemus, dicimus urinam quandam partim trahi, partim expelli, sed tractionis maiorem quàm expulsionis inesse vim. Quandam expelli tantum, nullo modo trahi: quandam postremo nec trahi à renibus, nec à Natura expelli, sed eò spontè per iter iamdiu assuetum ferri. Urina naturaliter constituta, quæ serum est sanguinis, partim trahitur à renibus, partim venarum vi pellitur, modò in naturali œconomia omnia sint ritè disposita: sed in ea expurgatione seri, renum vis attractrix valentissima est, venarum expultrix leuissima. Cur enim in renes potius, quàm in alias partes decumberet serum, nisi peculiaris adesset renum tractus? In perirrhœa, seu urine profluuiio critico, pellitur tantum, non trahitur à renibus urina. At dum humorum fit σπυγξίς, id est, colliquatio, nec pellitur in renes, quia debilior expultrix, nec trahitur à renibus urina, sed qua data porta ruit fluitque. Hec ut illustriora clariorque euadant, incudi illa reddere, & iterum tundere consilium est. Urina multiplex est materia: primum potio omnis nunc cruda & concolor, nunc aliquantulum immutata: secundò liquor serosus eorum, qui sunt in venis, humorum: tertio, humores omnis generis, necnon corpora quæ liquantur, ut carnes adèpsque. Triplicem hanc urine materiam complexus est Hippocrates sectione 5. libri 6. Epidemion, ὅ ἐστιν ὁ μόριον βρώματι καὶ πούματι, καὶ ὡς εἴωθεν εἶναι, καὶ ὅ πᾶν ὕγρὸν σπυγξίς. id est, Urina concolor cibo & potui, tum qualis esse solet, tum cùm humidi colliquatio est. O breuem, ô dilucidam, ô absolutam doctrinam! Quis unquam tam multa tam paucis verbis expressit? Urina concolor, primam indicat urine materiam, potum scilicet, quam solam & unicam agnouerunt quidam: his persuasi rationibus, quòd animalia, quæ vel nunquam, vel parum bibunt, vesica carcant: quòd animalia, quæ multum potant, multum etiam reddunt urine: quòd ex Medicorum præscripto urine quantitas potui assumpto respondere debeat: quòd in urine suppressione potum interdiciamus, ne augeatur urine quantitas. Quæ sanè maximam ex potulentis urine suppeditari materià faciunt, sed eam solam, & unicam esse non necessario concludunt. Nam & mingit in utero fœtus per vrachon, non potat tamen: & hyeme multò plus mingimus quàm æstate, minus tamen potamus. Et Galenus 1. De locis affectis narrat adolescenti cuidam exiisse urinam ad heminas quatuor, qui integris tribus diebus neque potum, neque cibum sumpserat. Altera particula, quæ sic habet, καὶ ὡς εἴωθεν εἶναι, id est, qualis esse solet, secunda urine materia indicatur, quæ vera est & naturaliter constituta urina materia, serum scilicet quatuor, qui in venis continentur, humorum, propterea οὗτος definit Galenus ὅ ἐστιν τὸν κατὰ τὰς φλέβας χυμῶν. Neque enim audiendus est Lycus Macedo, qui serum renum tantum esse excrementum affirmabat. Nam quomodo exigui renes tantam serosi humoris copiam generarent? Quod si obiciat Galenum aliquando dixisse urinam proprium esse renum & vesicæ excrementum. Respondebo proprium appellari, non quòd in renibus generetur, sed quia à solis renibus trahitur secerniturque. Postrema particula tertia urine materia exprimitur, humores scilicet omnes & corpora quæ liquantur: humores omnes sæpè per urinas expurgantur, ut in profluuiio critico, in perirrhœa purulenta & stranguriosa. Extat hac de re summi Dictatoris edictum solenne, sectione secunda libri primi Epidemion:

Conciliari.

Urina triplex materia.

Prima urine materia, potum.

Secunda urine materia, serum 4. humorum.

Tertia urine materia, humores omnes.

πολλοῖς δὲ ἀπὲρ ῥοῖαι μετὰ πόνη χαλῶδες, ὑδατώδες, πυώδες, &c. id est, multi urinas profundebant biliosas, aqueas, purulentas, abradentes, stranguinosas: quia, ut interpretatur Galenus, uniuersum corpus deponebat ἀευσίαν τῶν μοχλῶν χυμῶν, id est, prauorum humorū abundantiam & varietatē per urinas. Vnde de hac expurgatione fusius libro 3. neque verò humores tantum, sed etiam corpora quæ liquantur, ut adeps & carnes, urina materia esse possunt: hinc οὐ γὰρ ἐλαϊώδες, urina oleosa & pinguis liquefacto corpore à febre tabifica: hæ στυγνῆς σιμῆα, colliquationis signa sunt, de quibus in "Prognostico, πονηρὸν τὸ ἐλαϊώδες οὐρήμιον; praua est urina quæ oleosa meiando emittitur: oleosam autem intelligit non colore & consistentia olei, sed liquefacto adipe. De triplici hac urina materia multa scripsit Ludouicus Duretus, preceptor olim meus obseruandissimus, suis in Coacas Hippocratis prenotationes commentariis doctissimis & elegantissimis. His ita constitutis, cum multiplex sit urina materia, concludimus, non omnem urinam pellici à renibus, sed eam tantum, quæ naturaliter est constituta, quæ serum est quatuor, quæ in venis continentur, humorum. Neque tamen canuturi volumus, quia non omnis tractio nutritionis gratia instituitur: trahit ferrum magnes, trahit palea, succinum, his tamen non aluntur. Urinam verò, quæ materiam habet humores crudos aut alios quosuis, quæq; diebus criticis liberaliter profunditur, pelli tantum, non trahi existimamus. Quod si liquefactis humoribus aut corporibus fluat urina, ea nec trahitur à renibus, quia non est κατὰ φύσιν, nec vi venarum extruditur; quia maxima adest virium exolutio, sed sponte per patentissima vasa ad renes fertur; quia loca illa vacuationi sunt maxime consueta. His iam videor uniuersam rei summam attigisse; quocirca tempestiuum fuerit ad alia sermonem transferre.

Vnde varia calculo laborantium symptomata, rationes ex Anatome petendæ.

QVÆST. XXIX.



DE calculi generatione & causis hic differere non est huius loci atque temporis; ea tantum quæ ad Anatomen spectant, his libris inquirimus. Sed cum nephriticos varia infestent symptomata, quorum ratio non aliunde quam ex Anatome peti potest, non alienum institutis meis arbitror, ea breuiter hic explicare. Nephriticus dolor colicum sæpe mentitur, nec rudioribus modò, sed etiam peritis plerumque imponit. Distinguntur tamen ratione symptomatum, excretorum, & eorum quæ adiuuentur. Symptomatum omnium grauisimum est dolor hic in colico vagus est, in nephritico fixus: colicus ascendit ob situm coli, nephriticus descendit ob veterum continuitatem: colicus totum fere inferiorem ventrem occupat, nephriticus per exiguum occupat loci: colicus epigastricam & umbilicalem, nephriticus lumbarem regionem magis infestat. Obseruat enim quidam ex Arabum doctrina, ieiunio ventriculo minus dolorem colicum, exasperari nephriticum: contra, oppleto ventriculo, augeri colicum: quod ita intelligendum, ut semper vacuato ventriculo & intestinis, mitescat colicus, non semper nephriticus, quia adest semper calculus. Quinimò in doloribus quibusdam nephriticis assumpto cibo mitescit dolor, quia si calculus fixus sit in renibus, præponere deprimitur, hinc dolor: ingesto autem cibo tument intestina quæ renes sustentant, atque ita mitescit dolor. Sunt & dolores quidam nephritici, qui augentur assumpto cibo, ut cum renes inflammatione obsidentur, distentio ventriculi & intestinorum eam auget. Renum dolor præcessit grauis: colicus autem perpetuò lancinans. Quod si obiciat Hippocratem libro De internis affectibus, acutum renum dolorem afferentem, dic ex Galeno duplicem esse grauitatis acceptionem: primam, acerbis et asperitatis, propter quam sit acutus dolor, alteram

Quid oleosa
urina.

Conclusio.

Quomodo ne-
phritis à cal-
co dolore di-
gnificetur.
Dolor varius.

Obiectio de
grauitate do-
loris in ne-
phritici.
Responsio.

alteram

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 333

aliteram ponderis, propter copiam. Acerbi doloris duo sunt tempora; unum in generatione, alterum in expulsiōe: ponderis unicum, totum scilicet tempus, quod est inter generationem & expulsiōem. Vel dic grauem esse dolorem mansione calculi, acutum autem in motu. Sunt & alia nephriticorum symptomata: nam in nephritico dolore *ῥεπρη ἀδελφὴ τῷ μύρῳ κατ' ἔξω*, id est, cruris è directo stupore torpet, non in colico: at in colico nausea, vomitus, cibi fastidium grauiora sunt. Secundo distinguuntur colicus & nephriticus dolor ratione excrementorum, nam in colico retinentur magis excrementa, ut ne flatus quidem exire possit: in nephritico supprimitur magis urina. Urina primum tenues, mox crasse excernuntur: si erumpat flatus aut pituita excernatur, misceat & cessat colicus dolor: at nephriticus non nisi lapidis exclusione sedatur. Sed & quæ admoventur aut assumuntur utrumque dolorem detegunt. Renum verò calculus à vesicæ calculo, doloris proprietate, situ & grauitate distinguitur: vesica in hypogastrio, renes in lumbis sunt collocati: generatio calculi in vesicæ sit citra doloris sensum, ob vesicæ capacitatem; in renibus cum dolore, ob angustiam. In vesicæ calculo supprimitur perpetuò urina, non in renum calculo, quia duo sunt renes: vesicæ calculum stranguria & tenesmus comitantur ob viciniam recti intestini, non renum calculos. Sunt qui ab arenulæ distinctionem petant, quod renum arenula rubeant magis, vesicæ candicent: quod renum calculus mollior sit, vesicæ durior. Sed id non usquequaque verum: durities enim & calor arenularum ad efficientis vim & materiae conditionem referri debent. Itaque pro gradu caloris alba, flaua, nigra esse possunt arenula, & pro natura humoris à pisuita cineritia, à sanguine rubra erunt. Verum hæc fortasse *παρέρχων*; videor enim instituti mei limites prætergressus, redeo itaque. Nephriticis duo hæc symptomata infestare solent, stupor in crure κατ' ἔξω, è directo renis affectu, & vomitus. Stuporis causam referunt doctissimus Langius in Epistolis suis, & Iacotius commentariis in Coacas prænotiones ad venarum repletionem. Vasa inquirunt insignia caue & aortæ descendentium spine substrata sunt, ab his rami insignes ad renes & ad crura diuariantur, quorum repletionem, quæ obstructis renibus, vteribus, venis emulgentibus contingit, nervi & musculi coarctantur, unde stupor. Sed parum Anatomica mihi videtur hæc ratio; neque enim à renum calculo ita implentur vena, ut musculos premant, cum & tabidi quamplurimi, quorum vene exhaustæ sunt, calculo renum laborent, & nihilominus stuporem in crure persentiant. Adde quod plethorici, quorum vene apparent turgidule, stupore crurum & brachiorum non laborent. Alia igitur stuporis inquirenda est causa. Ego duplicem agnosco; prima est compressio musculi, *ῥόας* dicti, cui renes ambo incubant: at hunc musculum cruri flectendo dicatum esse, & in cruris interiorē partem inseri norunt Anatomici omnes. Altera est compressio nervi, qui in cruris musculos omnes expanditur: sit autem compressio à duritie & pondere calculi, nam incipiens lapillus stuporem non parit. Cur autem in nephritide tanta sit ventriculi subuersio & ἀναστροφή, ut omnem fastidiant cibum, & iniectum statim eruant, causa est renum & ventriculi sympathia. Sympathia huius, quæ simplex est, causa non ad viciniam referenda; distant enim aliquantulum à ventriculo renes: non ad generis similitudinem, quia ventriculus membranosus, renes carnosī: non ad societatem operis, in unum siquidem idēque non conspirant opus: ergo ad communionem & continuitatem vasorum ac membranarum. Nervi à stomachico ad renem feruntur, & exterior tunica renes inuestiens, quam fasciam vulgus vocat, à peritonæo ortum ducit, quem ventriculi fundo continuari norunt omnes:

Excrementa
retinetur in
utroque cal-
re.

Renum calcu-
lus quomodo à
vesicæ calculo
distinguitur.

Langij & Ia-
cotij de stupo-
re in nephriti-
co dolore opi-
nio.
Consultatur
ea opus.

Duplex illius
stuporis causa
assignatur à
nobis.

Cur vomitus
in calculo re-
num.

HISTORIA ANATOMICA.

De vteribus & vesica.

CAP. XXIII.

Meatus uri-
narij.

SIM A renum parte vasa oriuntur duo concaua, alba crassaque, arteriarum instar nerues, ad vesicam progredientia. Hæc Græci ab officio *ἐπιτῆρες, καὶ ἐρενας, ἢ πόρος ἐπιτῆρας*. Latini *urinaria vasa* appellant: Celsus à similitudine substantiæ, *venas albas*. Aristoteles venas cauas & neruofas. Simplicii constant tunica, sed densa, villis tantum obliquis texta: ita namque meatus illi distendi ac contrahi faciliè possunt, & iniuriis facilius ob-

Eorum inje-
ctio.

stunt. Adhærent vasa hæc peritonæo, ab eoque communem accipiunt tunicam:

hinc super lumborum musculos, *ῥόας* vocant, super tensa, deorsum ad vesicam prorepunt, cuiusque lateribus non directè, sed reflexu sinuoso & in anfractus conuoluto mirificè implantantur, ne in vesicam illapla vrina remigret. Sunt qui operculum fingant miro artificio fabricatum. Horum vnicus est vsus, vrinam deducere virenum secretam.

De vesica.

CAP. XXV.



RIN A m eadem excipit vesica velut laguncula quædam, quam retinet asseruatque ad tempus, ne continenter & intempestuè eam reddere cogamur; *κύστις οὐροδόχος* dicitur, ab aliis corporis matula. Aristoteles primo De historia animalium, vesicam appellat *τὸ τῆς οὐρῆς ἀερίλωπος δεικνὸν μόριον*, id est, *humidi excrementi conceptaculum*. Sitæ est in hypogastrio, recto intestino villis tenuibus & membranis connexa, idque in viris; nam feminis inter vterum & os pubis est posita. Non continetur autem, vt plerique sentiunt, amplo illo peritonæi ambitu, vt reliqua viscera, nec etiam extra peritonæum est, vt voluerunt quidam; sed intra duas peritonæi tunicas ita latitat, vt sæpe dum vacua est non appareat secantibus: id autem propter ourachon & arterias vmbilicales factum puto, quæ inter duas peritonæi tunicas ad securitatem ferri debuerant. Videtur ergo vesica proprium habere ventrem & peculiare conceptaculum; quod innuebat fortasse Diocles, dum corpus diuidebat in caput, thoracem, ventrem & vesicam. Figuram habet rotundam & aliquantulum oblongam. Substantia membranæ est, vt distendi & contrahi possit. Triplici tegitur membrana, communi vna, & duabus propriis: illa à peritonæo exorta vesicam recto intestino & coxarum ossi annectit, alligatque: hæ solidæ, crassæ & duræ sunt, ne vrinæ copia acrimoniæ & calculorum asperitate diuellerentur. Triplici villorum genere intertextæ sunt: adest interiori parte crusta quædam. In hanc vniuersam vesicæ substantiam venæ complures ab hypogastrica feruntur, sparguntur etiam arteriæ quamplurimæ, quæ illuc vitæ spiritus effundunt. Nervi duo sunt; horum alter à sexta coniugatione, alter à spinali medulla ortum ducit. Præter hæc vasa, conspicuus est canalis è vesicæ fundo in vmbilicum porrectus, quo olim, dum vtero gestaretur infans, vrina in allatroidem effundebatur. Vesicæ partes duæ sunt, fundum & ceruix: in fundo continetur vrina. Hoc sensim in angustiora coarctatur,

Figura,
Substantia,
Tunicæ tri-
plex.

Vasa.

Nervi duo.

Ourachon.

Cervix.

De organis naturalib. in imo ventre contentis. 335

& in cervicem carnosiore[m] definit: musculo cingitur, qui ianitoris vicem gerit, Græci σφιγκτηρῶν vocant. Huius proprium munus est exitum intercludere, ne inuitis nobis effluat vrina. Hoc exoluto & refrigerato inuoluntariè & sine sensu fluit vrina. Vesicæ collum maribus angustius & oblongius, feminis breuius & latius. Atque hæc partium omnium nutritioni dicatarum fidelis esto descriptio.

Fundum.

Cervix.
Musculus
sphincter.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An vesica urinam trahat.

QVÆST. XXX.

DE vesica facultatibus tractricæ, retentricæ, & expultricæ urinae, lenia quædam obuersantur, quæ paucis extricare placeat. Ac primum de tractricæ dubitari potest: nunc enim vesicæ vim eam cõcedit Galenus, nunc denegat. Libro 3. De naturalibus facult. & s. De usu partium, utranque vesicam & felleam, & νεφροδύχυν vim habere proprium trahendi excrementum, scribit. Hoc indicat vesicæ structura: triplici enim villorum genere texta apparet, rectos habet, obliquos & transversos. Cap. 7. lib. 5. De usu partium. Vesica (ait) non ea solum quæ bilem, sed & quæ urinam recipit, purum utraque atque ab aliis secretum cum trahant proprium excrementum iure optimo alia vasa alimentum deferentia postularunt. Aristoteles cap. 15. libri 3. De historia animal. Mortuis (inquit) nihil humoris in vesicam transmittitur, at vivis non solum humor, sed sicca quædam recrementa descendunt, ex quibus fiunt calculi. Quod si decumberet tantum serum, non traheretur, cur non efflueret etiam in mortuis? Contrarium sentire videtur 6. De locis affectis. Dum enim diabetes naturam inquiris eiusque causas rimatur, vesicam serum ad se non trahere affirmat. Sed Galeni hanc sententiam ita interpretor, ut velit in diabete vesicam serum ad se non attrahere, id est, diabetes causam non ad vesicæ tractricem vim referendam, neque vesicæ affectum esse, sed ad renum tractricem validiorem aut retentricem imbecillio[re]m. Itaque in eo affectu vesica tantam urinae copiam non pellicit, sed præcalidi renes & estuantes plus seri trahunt quam continere queant: itaque aut sponte per ureteres ad vesicam corruiatur, aut vi truditur. Quod si omnia nature votis respondeant, trahi ab ureteribus & vesica urinam nihil prohibet. Neque verò excremento eo ali existimamus, cum ab hypogastrico ramo complures venarum & arteriarum riuuli per ambas vesicæ tunicas spargantur.

Explicatur
Galeni loci
de tractricæ
vrinae.
Diabetes
causa.

De retentione & excretionem urinae, an naturalis vel animalis facultatis sint opera.

QVÆST. XXXI.

VESICÆ proprium munus est urinam retinere ad tempus, postmodum excernere; qua autem vi, naturaline, an animali id fiat, controuersum. Utramque actionem, retentionem quippe ac expulsionem naturalem esse contendunt quidam, quoniam viriusque vesicæ & χοληδύχυν & νεφροδύχυν eadem est ratio; at retinet bilem vesicula, eamque extrudit solius Naturæ vi. Adde quod villorum triplex genus in utraque vesica triplicem actionem naturalem, non animale[m] esse persuadet. Contrà animale[m] esse utranque actionem ita demonstrari potest. Retentio animalibus fit organis; ergo animalis actio, animale organum musculus est: at cingitur vesicæ cervix musculo ianitoris vicem gerente, exitumque intercludente, ne inuitis nobis effluat vrina, hunc σφιγκτηρῶν vocant. Expulsionem verò animale[m]

Naturalem
esse retentionem
& excretionem
debetur.

Animalem
esse.

esse id inter cetera testatur, quod ea pro voluntatis arbitrio nunc tardior sit, nunc celerior, nunc debilior, nunc validior; Et quod non nisi operantibus epigastrij musculus perficiatur, Galenus 1. Et 6. De locis affectus questionem hanc soluit, mistam esse vult actionem, retentionem animalem Et voluntariam esse, quæ musculi perficiatur opera; excretionem naturalem, quæ expultricis facultatis ministerio suscipiatur. Ego utramque actionem Et retentionem, Et expulsionem vrine, partim naturalem, partim animalem esse puto; sed retentionem magis animalem, expulsionem magis naturalem. Retinetur in vesica fundo vrina obliquorum fibrarum ministerio; at ea retentio naturalis est; retinetur etiam pro voluntatis arbitrio beneficio sphincteris musculi, Et hac actio purè animalis est. Expellitur vrina vi insita vesicæ, quæ ad exclusionem rei noxiæ Et irritantis stimulat, excretio ea omnino naturalis est. Expellitur etiam vrina volentibus nobis beneficio musculorum abdominis, qui hypogastrium premunt; Et voluerunt quidam paruos abdominis musculos succenturiatos dictos, vrinæ excernende dicatos esse. Mistæ est ergo utraque actio. Obiiciunt quidam, excretionem nullo modo naturalem esse, quia semper excerneretur vrina, cum actiones naturales perpetuæ sint, neque unquam cessent. Respondet Galenus, non omnem vrinam expultricis facultatis obiectum esse, sed eam tantum, quæ vel mordet vel tendit, id est, quæ qualitate aut quantitate molesta est.

Opinio nostra,
utramque
actionem par-
tem naturalem
esse, partem
animalem.

FINIS LIBRI SEXTI.



LIBER SEPTIMVS

IN QVO PARTIVM PRO- CREATIONI DICATARVM, TVM

VIRILIVM, TVM MVLIBRIVM HISTORIA

*primùm accuratè describitur, mox quæ in ea occurrunt
controuersa, explicantur.*

HISTORIA ANATOMICA.

De partium generationi dicatarum necessitate.

CAPVT I.



CONSTANS est Hippocratis libris De diætâ, Aristotelis libello De longitudine & breuitate vitæ, Galeni i. De tuenda sanitate, omnium denique Philosophorum & Medicorum assertio; omnia quæ sunt sub cœcauo Lunæ, quæ citima terris, quæ aëte & aqua continentur, corruptioni & interitui obnoxia esse. Singulare enim quodlibet, aut inanimatum est, aut animatū: si inanimatum, variis ratione vtriusque materiæ, & primæ & secundæ, patitur alterationes. Prima enim nouam semper appetit formam; ergo & mutationem; secunda, quæ ex Elementis est, ob inrestitū eorum dissidiū (contraria enim sunt, à contrario autem omnis corruptio) mixti dissolutionem furrim aggreditur: ipsa verò elementa exta propria loca, tamen si naturaliter, vi tamen quasi quadam alligata, in propriam sedem tendere appetunt. Si verò animatum sit indiuiduum, præter eas quas dixi, alias habet connatas sui inreritus causas, quas nulla ars, nulla humana industria effugere, sed ne reprimere quidem potest; adeo ut animatum omnium præsertim animalium corpora & φύσις, & ἀνάγκη, id est, *Natura & necessitate* fatalia sint. Naturā quidem, ob humidi primigenij à calore elementario exhaustum & petemnem substantiæ triplicis effluxum. Necessitate verò, ob alimenti permissionem & excrementorum prouentum, quorum supptessione patium oppressio, motorum foetura & ilias, tandemque motus ipsa contingit. Natuta itaque, quam τὰ δέοντα ποιεῖν οὖσα libris Epidem. hoc est, *recta facientem*, licet ἀνάδευτον; prouidam libris De diætâ, hinc illa Stoicorum πείρωσις & ordinariam Dei potestatem aliquando prædicat Hippocrates; Natura, inquam, sui diligens & conseruatrix, cuiuslibet enti appetentiam quandam æternitatis in seuit; quam cum in indiuiduo præstare non possit, quia moralis illius natuta, formatum & speciei propagatione consequitur; propterea in Elementis per transmutationem, in metallis per appositionem, in animalibus per generationem formarum fit propagatio: ita enim indiuiduum quodlibet, simili procreatione, quasi repualscens, quodammodo fit æternum. Viuit pater in filio, neque moritur qui viuam sui relinquit imaginem. Perfectorum porro animalium generatio marium satum & foeminarum cœceptu perficitur. In eum usum constituta sunt vtriusque sexus generalia. Hinc ea

Singularia omnia quomodo & mutationi obnoxia.

Quæ modis antiquis corpora dicuntur.

Natura quæm sui sui dolyti.

Quomodo prodividua sunt æterna.

Cur genitalis
sensus ita ex-
quisitus.

procreandi libido singulis animatibus à Natura concessa. Hinc obscenarum partium titillatio & sensus exquisitissimus. Quis enim per Deum immortalem concubitum rem adeò foedam sollicitaret, amplexaretur, ei indulgeret? Quo vultu divinum illud animal plenum rationis & consilij, què vocamus hominem, obscenas mulierum partes tor sordibus inquinatas, & ea ratione in locum imum velut sentinam corporis relegatas attrectaret? Quæ femina maris in amplexum rueret, cum & nonimestris gestatio laboriosa sit, & foetus exclusio diris cruciatibus molesta sæpèque exitiosa, & editi foetus educatio plena solitudinis, nisi incredibili voluptatis æstro percita essent genitalia? Harum partium historiam hoc libro describere institui, quasita distinguere placet; ut aliæ sint virorum, aliæ mulierum. Virorum partes variæ quidem sunt, sed omnes in vnum cōspirant finem, ut scilicet aliquid ex sese fundant expromantque, quod principij rationem habeat, à quo & ex quo novus homo progignatur. Eiusmodi semen est, quod cum partium omnium idæam in se contineat & *μοίρεν περιεωρμένην*, id est, *fatalem moriendi & viuendi necessitatem*, varia eguit præparatione, coctione, elaboratione elegans ergo est partium semini procreando dicatarum in maribus apparatus, & singulare earundem artificium. Nam aliis seminis præparandi ac præfingendi tantum provincia delegata est, ut venis & arteriis spermaticis, quæ admirabili implicatione capreolis vitium hederæve æmula, retiformem velut plerum effingunt: aliæ semen excoquunt, ut Epididymis: aliæ vim prolificam eiconcedunt, illudque vera & expressa specie ornant, ut testes: aliæ excoctum deferunt, vasa scilicet duo eiculatoria & deferentia dicta: aliæ excipiunt, continent, asservant, quæ ad necessarios vsus, vesiculæ scilicet quamplures & prostatae glandulosæ ad vesicæ urinariæ cetuicem positæ: aliæ postremo semen in matris loculos tanquam hortum & agrum feracissimum effundunt ut penis. Mulierum partes, aliæ semen præparant, venæ scilicet & arteriæ spermaticæ: aliæ excoquunt, ut epididymis & testes: aliæ eiaculantur, vasa nempe duo: aliæ excipiunt, continent, fouent, ad conceptum, ut uterus; differunt autem à virorum genitalibus non sicut tantum, ut existimarunt veteres, sed numero, structura, figura. Sed iam virorum partes describere aggrediamur.

Dignis partium
generativarum
dicatarum.
Virorum ge-
neraliter.

Mulierum
generativarum
dignitas.

De virorum genitalibus; ac primum de vasis semen preparantibus.

CAPVT II.

Veneris spermaticarum
descriptio.



As semen preparantia, Græcis ἀργεῖα σπέρματικά καὶ ὀφθαλμικά dicta, quatuor sunt; duæ venæ, totidemque arteriæ: Aristoteles meatus venales vocat; Auicenna vasa lucibaria. Venarum dextra, immediatè à trunco descendens caua oritur, sinistra ab emulgentè ramo. Illius sanguis purior est egregièque percoctus; huius verò aquosior & sero multo dilutus. Qua ratione dictum à veteribus eleganter, mares in dextris, feminas in sinistris & à sinistris generari. Extat illud Hippocratis sect. 4. libr. 6. Epid. *ἡ δὲ ὀφθαλμική ἀνὰ τὴν ἐξω δόρυς δεξιῆς, ἄρσεν, εἰ δὲ εὐδύμος ἐντὶ λυ.* id est, *Hirtire incipiens, si dexter testis intumuerit, masculum; si sinister, femellam portendit*. Cur autem sinistra venæ à ramo emulgentè non à trunco oriatur, id mira Naturæ providentia factum puto; quia aortæ truncus ad leuani inclinans perpetuò diastoles, ac systoles motu agitatæ exilem hanc venam disrumperet. Ita igitur exortē venæ peritonæo in-

Cur sinistra
ab emulgentore
prodeat.

cumbentes & alligant, vnà cum arteriis abdominis cauitatem egrediuntur, & per peritonæi productionem cremastere musculo comitante, ad epididymida & testem vsque feruntur, quò antequam pertingant, quæ prius discreta erant vasa, vniuntur & admirabili implicatione capreolis vitium hæderæve emula, in varicosum corpus degenerant. Vasa hæc tot gyris intorta, tot anfractibus implicita, vulgus pampiniformia & hederiformia vocat. Sunt qui δικτυοειδὲς πλέγμα, id est, *retiformem plexum* appellare malint. In plexibus his labyrinthis conspicua est præclara illa & tantopere celebrata venarum & artetiarum ἀνασώμασις. His præparantibus venis seminis præfingendi, præparandi ac delineandi prouincia delegata est; maximè verò in illis angustis eaque viarum perplexitate dealbatur sanguis, fitque velut rudimentum futuri seminis, nò tam insita vasorum vi, quàm per ἀπὸ τοῦ ὅλου, id est, *irradiationem* testium. Est aliter plexuum vsus, ne libido vehemens crebræque incitetur, vt homini intestinum variè fuerit implicitum, ne (vt inquit Plato) ἀμυνσος esset καὶ ἀφιλόσοφος. Totidem sunt arteriæ spermaticæ vitæ spiritum testibus affundentes, ambæ à trunco descendens aortæ exorta.

Vasa pampini-
formia.

Plexuum
vsus duo.

De partibus semen excoquentibus, epididymide quippe.

CAPVT III.



Q V A T V O R hæc vasa miro artificio implicata, vnicum corpus effingunt, varicosum, candidum, oblongum, quod quia testi adhæret eique incumbit, ἐπιδιδυμὶς dici solet. Anatomici ferè omnes παραστάτας varicosos appellant, παραστάτας, quasi adstantes testibus; varicosos, quòd varicum in morem variè implicentur; licet Herophilo παρὰ τὰς κυρσοειδῆς, varicosi adstites sint vesiculæ illæ iuxta vesicam vrinariam

Epididymis
quid, an quæ + ipsi præparantur.

Parastatæ
varicosi.

posite, in quas eiacularia vasa semen effundunt. Epididymis ergo corpus est oblongum, vtrique testis extremo adhærens, in medio aliquantulum delihescens, excoquendo & dealbando semini dicatum. Corpus hoc altera sui parte admittit præparantia quatuor; altera verò emitit deferentia duo vasa, mediàmque inter vasa & testes naturam obtinet; in superficie quippe membranofum apparet, sed intus glandosum est & σπυγγώδης. Separatur ferè totum à testibus, habet tamen per exiles fistulas cum illis continuitatem, vnde vis illa manat σπέρματος πωτικῆς. Cæterùm vt in hepate venarum tunica tenuissimæ sunt, vt faciliùs alteretur sanguis & excoquatur; ita vasorum, quæ ad Epididymida feruntur, tunica tenuissimæ sunt, vt vis seminis procreatrix à testibus in ea vasa celerius influat.

De testibus.

CAP. IIII.



A B Epididymide per exiles meatus & quasi fistulas in testium substantiam ψαεγνὶ σπυγγώδῃ, hoc est, *astritu fragili & cauernosa* semen corruatur. Ibi formam, perfectionem & fecunditatem consequitur; vnde ob vim illam σπέρματος πωτικῆς, qua soli primò & per se pollent testes, prima gignèdi organa statuuntur, & principatus nomine decorantur. Maxima sanè & penè incredibilis testium est vis, non modò ad fecunditatem, sed etiam ad temperamentum, habitus, substantiæ propriæ & morum alterationem; illis enim exectis, contortis, refrigeratis, pe-

Testium præ-
stantia.

Testis femina.

rit virilitas, omnisque libidinis amor extinguatur. Testes Græcis ὀρχαῖς dicuntur, ὀρχαῖδια, ὀλκοί, μέζα, μήδεα, κύαμοι, quibusdam δίδυμοι, quia gemini; unde in Græcorum monumentis legimus, Didymum tubicinem in adulterio deprehensum, ex nomine suspensum. Testes appellat vulgus, quod τῆς ἀρ' ῥ' ὀτόπτις

Numerus.

μάδρυες εἰσι, quod virilitatis testimonium præbeant; vocantur etiam viriles globuli, colei, lanuini, cliterini ab obsceno vocabulo κλειτοελζαῖν; Plautus valè nuncupat. Gemini sunt ad fecunditatem; dextrum, ἀρ' ῥ' ἐνογόνον masculinum, finistrum θηλυγόνον, id est, femininum vocat Hippocrates, quod illius semen calidius sit magisque excoctum, huius frigidius & sero multo dilutum. Tertium fi-

Situs.

tus in viris nulli non conspicuus est; nam foras abducti, prominēt penduli. Causam referunt Aristoteles & Galenus in castiorem vitam; Animalia quæ plures gignunt foetus, quæque frequentius coeunt, vt aues, testes abditos habent: gignunt autem plures foetus, quia breuioris sunt vitæ. Figura orbicularis est & rotunda, sed paululum oblongior quàm aut latior, aut profundior; his Arabes oui figuram non ineptè attribuunt. Pluribus tunicis seu inuolucris teguntur, de quarum nu-

*Figura.**Tunica testium.*

mero non satis inter Anatomicos constat. Nos alias volumus esse communes, alias proprias. Communes duæ sunt; primam Græci ὄρχαν vocant, quasi bursum

Communes duæ.

diceres; Hefychius appellat ὄρχαν, μαρσύπια, ἢ τὸ τῶν δίδύμων ἀργύρεον, id est, bursum aut vasculum testium. Hippocrates 2. De morbis, & libro De internis aff. ὄρχαν; vulgus scortum aut scrosum nominat, quod coriacei sacculi similitudinem referat: cortea enim veteres appellabant, quæcunque ex aluta aut pelle constabant. Est autem scroti rugosa admodum cutis & satis tenuis ex cuticula & cuti constata. Altera tunica è panniculo carnofo ortu ducit. Hanc Rufus & Aegineta δαρτὸν vocant vel δαρτοῖς, quod faciliè ab externo scroto & aliis membranis separetur.

*Scrotum.**Proprie tunice duæ.*

Proprie testium tunicae duæ sunt, exterior vna, interior altera. Exteriorem quidam ἐρυθροειδῆ vocant, quod carnis fibris conspersa subrubear; alij melius ἐλαιοειδῆ, ob vaginæ & inuolucris similitudinem; in ea enim tāquam ἐν ἐλαίῳ, id est, siliqua, continetur testiculus: Paulus ἐλαικοειδῆ nuncupat, quod ab ea membrana oriatur in qua venarum & arteriarum sunt helices; unde à quibusdam capteolaris dicitur. Interior tunica dura & solida testium substantiam immediatè inuoluit.

Durior.

Galenus δαρτὸν vocat; Ephesius Rufus ὑψία νευράδῃ, membranam nervosam; Vesalius ἐπιδιδυμίδα, sed malè, vt eleganter disputat Fallopius. Cæterum membrana hæc crassa est & dura, tum vt testium laxiorem carnem fulciat, tum vt spermat-

Testium substantia.

tica vasa testibus copulet. His quatuor tunicis detectis, testium substantia sese profert, ψαεξὲ καὶ σπασσὲ γῶδης, mollis, caernosa, glandulosa; assimilis, in qua semen excoquitur perficiturque, vt in mammis lac, in cerebri substantia animalis spiritus. Maximus est horum & superiorum partium cōsensus; unde vetus illud Hippocratis scēt. 1. lib. 2. Epid. ὀρχαῖς οἰδῆσας δαδὲν ἡχέων, ἡσθμὴν καὶ κοινὰν τῆς σπῆς, μελζῶν, γονῆς, φωνῆς, id est, Cum testis intumuit à tussis memoriam renouat societatis per-

Temperamentum.

floris, mammarum, geniture & vocis. Testium pars superior κεφαλή, caput, inferior πύθμελιν fundum dicitur. Habent testes suos musculos cremasteres dictos, id est, suspensores, ne suo pondere vasa seminaria eorumque anfractus extendant. Nervos excipiunt à costali & lumbaribus, venas & arterias à spermaticis.

*Musculi testium.**Vasa.*



EPIDIDYMUS elaboratumque in epididymide & testibus semen, tandem in vasa duo epididymidi continua & ab eo prodeuntia fertur. Vasa hæc Larinis deferentia aut eiacularia dicuntur, Græcis *πρόγι σπερματικοί*. Sunt in exortu satis crassa, fungosa, conuoluta, & ad humillimam testium sedem contorta; mox ubi aliquantulum à testibus recesserunt, netui crassioris instar teretia candidaque apparent, exiguum & ferè insensibilem cavitatem habentia; semen enim igneæ & aëreæ naturæ cum sitatione *τῶν ἐνορμῶντων*, id est, spirituum quibus turget ea facile permeat. Vasa hæc eodem assurgunt itinere, quo præpatantia deorsum deflectebantur, per petitonæi scilicet productionem, unde obliquo & flexuoso ductu ad vesicæ vrinariæ posteriorem & exteriorem partem delata, amplificantur, & in vesiculas mox describendas tota obliquesunt. His unicuique munus concessum est, ut semen è testibus & epididymide in vesiculas tanquam penu & promptuarium transporent; coquendi enim & alterandi seminis nulla vis eis tribuitur.

Vasa deferentia.

Progreffus.

De partibus semen excipientibus & asseruantibus.

CAP. VI.



SEMEN iam veta & prolifica specie ornatum excipiunt asseruantque ad necessarios usus, non modò glandosa duo corpora ad vesicæ cervicem iuxta sphincterè musculum posita, ab Anatomicis omnibus fetè descripta, quæ *πρόσπρωτος ἀδενωσίδης*, hoc est, *glandosus praesides* vocant: sed etiam vesiculæ quamplures à paucis animaduertæ, quas primus, ut opinor, Herophilus in arte Anatomica exercitissimus, obseuauit, & *παροξιστὰς κυρτωσίδης*, id est, *varicosos adfites* appellauit: Neotericis autem primus Rondelerius, & post eum Fallopius eas eleganter descripsere. Duo ergo partium geneta excipiendò & asseruando femini sunt dicata, vesiculæ scilicet quamplures & prostaticæ glandulosæ. Vesiculæ ad cervicis vesicæ initium inter vesicam & rectum intestinum posite; vasorum deferentium videntur esse propagines; geminæ quidem illæ sunt, insignes & membranæ, sed ex multis & anfractuosis cavitatibus constare, variæque varicum in morem implicare, ut plures videantur, ne vno coitu totum semen efflueret: sunt hæc genitali semine perpetuò prægnantes; quod sensim velut per tubulos & helices sicut lac ex mammis, ad vesicæ cervicem exprimitur. Ibi glandosa duo apparent corpora candidissima, semen excipientia & conseruantia, prostaticas appellare solent Anatomici; tenui hæc vestiuntur membrana, cæcis tamen spiraculis peruia, ne semen sponte diffluet, sed velut granulatim exprimeretur. Harum glandularum vatios agnoscimus usus. Primus est, ut semen continent asseruentque ea copia quæ ad coitum sufficiat: nisi enim colligeretur semen, non fieret eiusdem in vteri fundum eiaculario, sed tantum pudendis velut collacrymantibus sensim stillaret. Alter est, ut semen in crassent perficiantque, in cæteris partibus tenue est & fetosum, hic crassius candidiusque. Tertius, ut oleosa & velut saliali humiditate vretam irigent, ne vrinæ leatur acrimonia. Postremus ad Veneris dulcedinem, tenuem enim humorem continuò gignunt, qui pruritum & titillationem excitat.

Vesiculæ ab Herophilo primus descriptæ.

*glandosus praesides
Vesicularum
semen asseruantium descriptum.*

Prostaticæ glandulosæ.

*Prostatum
usus.
Primus.*

Secundus.

*Tertius.
Quartus.*



SSERVATVM in glandosis prostaticis semen, copia turgens & qualitate sua pruriens, uiscansque, exitum quaerit, libidinosas mouet imagines, tandemque venerei obiecti praesentia, per canalem oblongum, fistulae modo excauatum, in matricis loculos, tanquam hortum fetacissimum, effunditur: non enim primarium fistulae huius usum cum plerisque agnoscimus, urinae excretionem; cum eunuchi sine ea urinam reddant; sed seminis in uterum eiaculationem; propterea canalem hunc veteres Graeci & Latini multis nominibus ob miram eius in ueteris rigandis excolendisque fecunditate decorarunt; sua etiam scortatores, lenones, & mulierculae pro arbitrio nomina imposuerunt. Graecis ergo *καυλός, σάβη, πέος, σάβην, τύλος, καπεός, καλή, ἀναγκαῖον, ψαλή, ποσθή, κειθή, σῆμα, ἔμβολον, σπυργώδες νεύρον, φλάψ, γονίμη, οὐρῶ, αἰδώς δέμας* dicitur; Latinis penis, hasta, muto, verpa, mentula, priapus, scapus, veretrum, coles, caulis, virga, falcinus virilis, cauda falax, neruus fistularis, genitale: omnes verò *κατ' ἐξοχῶν, μόρον*, id est, *membrum virile* appellarunt: hoc autem tribuit ei antiquitas propter fecunditatem. Huius situs nulli non cognitus est, externam quippe & extremam imi ventris partem occupat, ossi pubis primum quidem adhaerens & ventri quasi infixum, dein extra ventrem pendens; pars ventri proxima & non pendula *σπῆμα* dicitur; pendula vetò *σῆμα* appellatur. Penis structura talis est, qualis ad uenerios congressus seminis eiaculationem & libidinis stimulos requiebat, ex duobus scilicet neruis cauis, meatu unico membranoso semini & urinae communi, quatuor musculis, venis, attetiis, & neruis quamplurimis membrana neruosa & cute miro artificio fabrefacta. Est autem structurae totius haec ratio elegans. Debuit virile membrum, ut semen recta & impetu in os uteri internū eiacularetur, ex aliqua parte constitui, quae & distendi cum duritiae citra uteri molestia, & flaccescere etiam posset. Os ad id munus obeundum ineptissimum etat, durius enim est nec unquam cedit; itaque si uterum non disrumpat, summa certe afficiet molestia, nihil oblectabit: adde quod nullus ossi spiritus, nullus sensus; at summa cum voluptate emittendum semen: mirro quam fuisse incommodum & indecorum, pudendum prominens semperque erectum & durum. Arteria id fortasse commodius praestasset, caua enim est, tunicam habet satis crassam & duram, quae spiritu sanguineque statim impletur moxque detumescit, sed perpetuus ille diastoles ac systoles motus, in nostra potestate non est, ut nobis pareat. Vena immobilis quidem erat, sed tenuis & simplex eius tunica tensionem validam non ferret. Supererat ergo, ut ex neruosa substantia componeretur. At neruorum cum tria essent genera: voluntarij, qui a cerebro & spinali medulla; tendines, qui a musculorum extremis; & ligamenta, quae ab ossibus oriuntur; voluntarij quia medullofi & molliores, ad eam tensionem non erant commodi, ligamenta ex ossibus orta, sensus omnino expetita titillationis sensum non excitarent: tendines cavitare destituebantur: peculiare ergo corpus, neruosum tamen, construendum fuit, quod & cauum esset, & sensu praeditum: cauum, ut spiritu & sanguine plenum tumeret, eoque vacuum concideret; sensile ad dulcedinem Veneris. Totum ergo penis corpus duobus neruis cauis, utrinque vno, & canali medio constituitur. Nerui illi duo ligamentorum instar ex inferiore ossis pubis & superiore ischij parte orti, primum disiecti, mox coeuntes ad glandem usque feruntur, ipsisque

penis duo
officij, seminis
primarium, deinde
de urinae
excretio.

penis nomina
Graeca.

sim.

penis structura
talis.

structurae totius
ratio.

cur effusus non
fuit penis.

cur non ex
arteria sola
constituitur.

cur venosus
non fuit.

cur non ex
neruis com-
pocuitur.

ex neruis pe-
culiariibus co-
nstitutus penis.

Nerui caui
duo.

in extremo carnosâ glandis substantia obnascitur. Tota horum interior substantia fistulæ modo excavata, nigricans, fungosa & atro sanguine oppleta cernitur, ac si ex innumeris arteriarum, venarum, & nervorum surculis variè implicatis retia efformarentur. Quod videtur fortasse innuisse auctor libelli *ὡς ἐξ ὀφθαλμοῦ*, siue Hippocrates fuerit, siue Polybius, dum venas & nervos ab universo corpore, in pudendum definire scribit: *φλέβες* (inquit) *καὶ νεῦρα, ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος ταῖν ὀφθαλμοῖς ἐς τὸ αἰδοῖον*. Inter duo hæc corpora conspicuus est meatus semini & urinæ communis, quem *ὀφθαλμὸν* vocant, aut fistulam urinariam. Nihil autem est aliud quàm vesicæ substantia ad penis fines elongata, vel, si mauis, vesicæ collium productus. Accedunt tertio ad penis structuram muscoli quatuor; quorum duo secundum illius longitudinem & posteriorè partem feruntur, à superiore ossis ischij parte orti; alij à lateribus ossis pubis orti, per latera penis feruntur. Illi excretioni seminis; hi erectioni & dilatationi penis aliquo modo inferuiunt. Quod autem seminis excretio à musculis iuuetur, id inter cetera testatur, quod in epilepsia, convulsis & compressis musculis, fiat glandularum expressio & excretio seminis inuoluntaria. Sunt etiam venæ & arteriæ quamplurimæ utrumque sanguinem & spiritum deferentes, ut dum coeundi incessit libido, flaccescens & rugosus penis attollatur, tendatur & rigeat. Sparguntur illuc quoque exigui nervorum surculi, quos sacra medulla suppeditat. Totum hoc corpus tam miro artificio cõtextum, membrana nervosa, cute & cuticula tegitur. Nam adipem nullum hic cernere liceat, ne in molem immensam excresceret penis, & ne tensioni ob molliem esset impedimento. Est homini breuior quàm cæteris animalibus, penis, ob rationem coitus. Bruta enim à tergo congregiuntur, neque per mutuum amplexum coeunt; ut homines. Dicunt mulierculæ ad mentulæ longitudinem multum facere, si vasa umbilicalia ab obstetrice statim ediri puello longè ab umbilico deligentur; quod rationi non aduersatur; ourachos enim vesicæ continuus est, ductus autem semini & urinæ communis, qui penis partem constituit, nihil aliud est quàm vesicæ collum productus. Ad penis extremum apparet *βαλάνος* seu glans, caput penis, pars carnosâ; cæteris mollior, ne utrum læderet; in acutum vergens, ut melius ingrederetur; & valde sensibilis, ad pruritus: sanguine & spiritibus impleta distenditur & rubet, illis refugientibus corrugatur & pallet. Habet hoc peculiare, quod etsi prematur digitis & constringatur, non dolet, sed maiori afficitur voluptate; opus, meo iudicio, ridentis Naturæ. Glandis substantia spongiosa est, intus tamen solida, non caua. Huic toti nulla cutis hæret proxime ut nervis cauis, sed membrana tenuissima proxime ipsam inuestit: eam tamen penis cutis producta & velut reflexa tegit, quam præputium vocant à putando, Græcis *πρόστιον* dicitur. Pars verò præputij prominentior *ἀκροπρόστιον* dicitur. Glandem præputio alligat vinculum *κύων* dictum, καὶ κυροδέσμιον, id est, caninum vinculum; aliis *χαλινός*, frenum, fibula. Circulus verò glandem coronæ modo cingens, *κορωνα* appellatur; inferior penis pars in longitudinem vergens, *ράφι* dicitur, quasi futura; quæ verò ad vsq; sedem producitur, *ταύρος*. Postremo spatium penem & anum intercedens *ὡδίναιον* & femem appellatur, aut interfœmineum.

Meatus semi-
ni & urine
communis.

Musculi
penis.

Musculus ex-
cretionem se-
minis iuuare.
Vena & ar-
teria.

Nervi.

Cur adeps
nullus in
penis.
Cur breuior
penis in ho-
mine.

Balanus quid.

Præputium,
Frenum.

Corona.

Sutura.

Taurus.

CONTROVERSIAE ANATOMICAE.

Antestest principes sint partes. QUEST. I.



NON admittunt Peripatetici plura principia; unicum in humani corporis æconomia agnoscunt, cor scilicet; sed eorum opinio iam pridem Medicorum scholis explosa est: Galenum inconstantie & leuitatis accusant multi, in principum partium numero assignando. Nunc enim testes principatus titulo insigniendos putat, ut libris De semine, & in arte parua: nunc testibus principatum denegat, ut 6. De usu partium, & 6. De plac. Nobis dissentientes hos Galeni locos conciliare non est difficile. Testes, quia precipua sunt procreationis organa, procreatione autem sola conseruatur species, partes principes dici debent, & fortasse ea ratione tanto corde prestantiori, quanto species indiuiduo nobilior. Maxima sanè & penè incredibilis testium est vis, non modo ad fecunditatem, sed etiam ad temperamenti, habitus, substantie propriæ & motus alterationem. His alterum innati caloris fontem statuit Galenus. i. De semine. Hic rebus lares focumque contineri vult, quo vniuersum corpus incalcescat. Hinc veteres Egypti in suis Hieroglyphicis, ut regem ipsis ademptum, totasque eius vires fractas significarent, Typhonem castratum pingebant. Temperiem immutari docent, non modo execris, sed etiam attriti, contorti, refrigerati & conuulsi testes; ex calida enim temperie, in frigidam statim fit conuersio. Et sanè testium amputatio fuit olim Elephanticis singulare praesidium, & epibem ita testibus admota mirum in modum roborant. Muliercule maxima ex testibus salutis & mortis indicia petunt, & summus Dictator in Prognosi. ὁ ὄρχος καὶ αὐτὸ οὐκ ἀνέκαστο μὲν; ἡ γὰρ ἀδένεια, id est, Testes & pudenda conuulsa mortis periculum minantur. Sed & Eunuchis ac spadonibus totius habitus & substantiæ propriæ sit immutatio. Nam & prae pinguior est habitus & glabra sunt omnia, sanguinis flos hebescit, nec latitudo venarum vlla inest, omnis denique libidinis usus amorque extinguitur; carnibus vero nouis omnino & sapor & odor conciliatur; castratorum enim carnes suauitate quadam gustatum oblectant: at integrorum carnes euomunt graue quoddam virus acerbissimum. De morum alteratione extat præclarum illud Arabis Auēzōar. In Eunuchis (inquit) præternatam vocem audimus, malos agnoscimus mores, rationis sunt pessimæ, necesse inuentus est aliquis execrator bonæ legis, aut intellectus non diminuti. Claudianus in Eutropium, his verbis in Eunuchos inuohitur.

Adde quod Eunuchus nulla pietate mouetur,

Nec generi natisque cauet.

Septimo tamen institutionis Cyri scribitur, & quierum esse hoc genus, & attentum, & in primis fidele: Sed unde tam subita temperamenti, habitus & morum alteratio? Putat Aristoteles tendi cor à testibus: itaque illis execris laxari cor afficique commune principium, quia vires nervosa in suo principio laxantur, ut in fiduculis apparet, quæ tense acutius resonant. Execris ergo mutari vult in feminam tum voce, tum forma affecto corde: una enim parte opportuna mutata, tota animalis forma immutatur, quia principium licet mole exiguum sit, viribus tamen est maximum. Sed ridicula hæc esse docet Galenus, primo De semine, & nos sequenti exercitatione fusiùs demonstrabimus: nam nec cordis robur ex testium contentione pendet, sed à propria temperie; nec si tensione eguisset cor, testes ad id fuissent commodi. Communis opinio est, recalescere membra à testibus caloris quodam velut repercussu. Verum cum mollis sit & rara testium substantia, fiat autem reflexio valida à densis & cauis corporibus,

Galenus defenditur.

Testium vires maxime.

Temperies immutatio à testibus.

Habitus immutatio.

Morum alteratio.

Opinio Aristotelis.

Causa alterationis illius.

exiguam & leuem illam reflexionem, tanti caloris authorem esse non puto. Galenus ad nativam & insitam testium temperiem refert; in illis enim alterum natiui caloris fontem statuit, 1. De semine. (crediderim ego, non tam nativa temperie calidos esse testes, quia exangues glandibus similes, quàm influente, ratione quippe contenti seminis, cuius presentia totum corpus incalcescit, turgēt, furit: at semen Hippocrati igneum dicitur & æreum). Qualitas ergo seminalis momento totum immutat, ut minima lethalis veneni portiuncula. Postremò animalia non execta pluribus agitatur motibus, motus calorem excitat & auget, quem hebescere cogit quies. Sed video quosdam Galenum Galeno obiicientes. Si (inquiunt) testibus tanta vis inest totum habitum & temperiem immutandi, cur in arte parua singularum partium, calidarum, frigidarum, humidarum, siccarum signa tradens, hepatis tantum & cordis vim illam immutandi totum tribuit, testibus nunquam? ita enim scriptum reliquit; Qui hepate sunt calido, totum habitum calidum habent, nisi cor obstiterit. Qui corde sunt calido, toto corporis habitu calent, nisi hepar vehementer repugnant. At de testibus ne verbum quidem vllum. Nos ita illis satisfaciendum existimamus, caloris influxum duplicem esse, immediatum & mediatum. Immediatè à corde & hepate per venas & arterias insunt uterque spiritus & sanguis; à testibus verò fit quidem in totum influxus, sed mediantibus corde, hepate, & vasibus communibus. Non enim testes peculiaria habent vasa, quæ per totum excurrant; sed vim & facultatem alterandi, per arterias cordi, per venas hepatis, communicant, quorum posthac intermedio totum incalcescit & alteratur. Obiicies vim illam à testibus influere ἐπερὶ τῶν κῶν ὁὐ σῶμα τῶν κῶν: quid opus ergo canali? Dic non influere facultates nisi per spiritus, qui licet oberrent & vagentur per uniuersum corpus, propriis tamen egent conceptaculis, nervis, venis, arteriis. Sic venenum, licet forma specifica cordi aduersetur, fertur tamen momento & insensibili materia quantitate per arterias & spiritus ad cor. Hac itaque testium est præstantia, hæc mirabilis facultas, tum in semine procreando, ut sequenti exercitatione demonstrabitur, tum in temperie, habitu & moribus immutandis: & ea ratione principes partes dicuntur à Galeno. Dum autem 1. De semine, corde vult esse præstantiores, quod bene vivere præstantius sit quàm vivere simpliciter, sophisticam esse argumentationem docuimus questione 4. lib. 1. Contendant tamen aduersarij quidam leuibus argumentis suo hoc principatu testes spoliare. Galenum afferunt huius sententiæ fautorem 6. De usu partium, & 6. De plac. Illic enim principem partem definit necessitate, hæc communicatione facultatis aut communis materie: at testium nulla necessitas: viuunt Eunuchi illis exectis: à testibus nulla facultas; quia animalis à cerebro, vitalis à corde naturalis, ad quam procreatrix refertur, ab hepate manat: à testibus nulla materia toti communicatur, nullus spiritus, vasa nulla testibus ministrantia per totum excurrunt. Sed puerilia sunt hæc. Testes enim ad indiuidui vitam & conseruationem necessarij quidem non sunt, sed ad solius speciei propagationem. Itaque non indiuidui, sed speciei solius ratione principes dicuntur. Speciei propagatio sola procreatione perficitur, procreatio non nisi à semine, semen à solis testibus excoquitur, formamque & perfectionem suam consequitur, quibus subseruiunt spermatica vasculum preparando tum deferendo. Sed audio undique obstrepentes Peripateticos, & testibus vim illam seminis procreatricem denegantes; in eos ergo lubet nunc iacula contorquere.

Opinio nostra

Obiectio.

Solutio.

Influxus caloris duplex.

Obiectio.
Solutio.

Sophistica Galeni argumentatio de testium principatu.

Testes non esse partes principes voluit quidam.

Responsio.

Aristoteles
testium vim
deorat se-
m-
procrea-
tricem.

Triples
testium usus
Aristoteles
Primum.

Secundum.

Tertium.

Impugnatur
Aristoteles
usus.

Non requi-
tur cavitatis
sensilis in va-
sibus deferentibus semen.

Impugnatur
secundus
testium usus ab
Aristotele
enunciatus.



E testium usu varieg sunt, & maxime inter se dissentientes sententiae. Aristoteles 3. De histor. animal. cap. 1. & 1. De generat. animal. cap. 4. testibus vim denegat ἀσπερματόγονοις τε, solisque spermaticis vasibus eam concedit, quod multa animalia testibus careant, ut pisces, & serpentes, quae coeunt tamen, & prolificum semen effundunt: quod taurus quidam ex ceteris testibus statim coeuerit, quod nullam partem meatuum compleant, id est, nullam cum vasibus spermaticis societatem habeant. Itaque alium agnoscit testium usum, eumque triplicem. Primus, ut motum seminis stabiliorem faciant, & vasibus miro artificio intortis appensi, illa contineant, ampliora & patentiora reddant; non secus atque pondera telis textorum appendi solent. Quamobrem illis ex ceteris spermatica vasa contrahi, occidique eorum vias, per quas effundi semen non possit. Secundus testium usus est ad robur cordis: his enim quasi ponderibus tenditur cor, & illis ex ceteris totius habitus & temperamenti mutatio contingit, laxatis quippe habentibus & quasi exoluto cordis robore. Tertium colligo ex problemate 24. sect. 4. ut ponderi suo erectionem, & tensionem penis inuenit. Hae est de testium usu Aristotelis sententia: quam ad veritatis libellam, & Lydium (ut aiunt) lapidem reuocare nunc lubet. Atque ut primum eius usum impugnem; non possunt testium pondere ampliora & patentiora vasa reddi: sunt enim miro artificio intorta, & labyrinthi anfractibus implicita: quare si distenderentur, ad extremum pedem excurrerent. Adde, quod vasa haec vicinis partibus adherent firmiter, & ita alligantur, ut tensionem non admittant. Quinetiam tantum abest, ut ea tensione amplificentur vasa, quinimo angustiora & contrahentiora euadunt. Coeunt enim elongata vasa: debuisset potius testium aliter antrosum, alter retrorsum locari, ut amplior euaderet vasibus capacitas. Sed quid amplitudine ea, & sensilis cavitatis ad seminis excretionem est opus? annon in epididymide & testibus semen continetur, in quibus nulla est sensilis & conspicua cavitatis? Annon per eiacularia vasa ad vesiculas & prostates fertur, ibique asseruatur sine cavitatis seminis? target hoc vndiqueque spiritibus, qui orgasmum, id est, impetum faciunt Hippocrati 6. Epidem. Obiciunt semen arterioso sanguine crassius esse: at eget spirituosus sanguis canali conspicuo, & manifeste vano, arteria quippe. Dic non eandem esse, sed disparem utriusque rationem. Arteriosus enim sanguis copiosissimus esse debet, & continuo suo affluxu partes irradiare, tandemque eade vi & conferim influere. Copiosus autem, continuus & subitus influxus non potest nisi per patentissimos ductus fieri. Sic venam arteriosam insignem & amplam construxit Natura, ut raro pulmone & perpetuis motibus agitato nutriendo sufficeret. Semen vero sensim & paulatim in spermatica vasa influit, in quorum plexibus primum preparatur, mox per exiles meatus, & quasi fistulas, in testium substantiam corruatur, tandem per eiacularia vasa, quae tota sunt, quidem exegit, sed τοῖς λαύς, hoc est, sensilem cavitatem non habent, expellitur. Non igitur ea retinendo, latitudo & amplificatio, quam somniat Aristoteles, requiritur ad coctionem & eiaculationem seminis. Sed pergamus Aristotelem lacerare. Quibus collisi, attriti & refrigerati sunt testes, hi ad Venere sunt inepti, quibus tamen penduli sunt testes. Quibusdam animalibus testes intus sunt dorso alligati, nec vllatenus penduli: & mulierum testes intus sunt reconditi. Sed & si constructi essent testes, ut velut pondera meatus apertos retinerent, deberent in ipso coitu & seminis eiaculatione descendere, ut meatus apertos redderent; sed in coitu contrahi & ascendere testes videmus: non ergo in eum usum constructi sunt quem voluit Aristoteles. Auertros cum harum rationum vim effugere non posset, ab Aristotele, in cuius verba iurauerat, doctrina recedit, testibusque vim seminis procreatricem concedit. Secundum agnoscit testium usum Aristoteles ad robur & tensionem cordis, qui absurdissimus est. Nam

perexigui sunt ponderis testes; nec pendent ex corde, nisi per arterias, non rectas, sed obliquas, atque haerentes & alligatas proximis. Quin etiā quibus pendentes sunt & relaxati testes, iis validius esset cor, quia intenderetur magis: at contrarium experiuntur muliercule, & eos enervatos vocant. Præterea annon arctioribus vinculis spinae & dorso alligaretur cor, si tensione indigeret? Quid? annon iecur situ proximum, mole maximum, insigni vena alligatum, cordis tensioni magis inferuiret, quā exiguum testis corpus? Vasa quæ ad testes feruntur, variè sunt intorta, quæ si extenderentur, ad genu usque excurrerēt. Mulieris & quæ animalia testes abditos habent, cor languidum haberent. Postremo si à testibus tensionem & robur acciperet cor, cordis vires essent violentæ & aliunde venientes, quod in nobilissimo membro affirmare est absurdissimum. Ridicula est igitur & indigna tanto Philosopho sententia. Quem tertium assignat testibus usum Aristoteles, erectionem penis, redargutione nostra non eget. Est enim penis tensio partim naturalis, à flatu & spiritu copiosissimo nervos canos implente, partim animalis, ab appetitu musculos huic tensioni dicatos mouente. Valeat igitur hæc Aristotelis de testium usu opinio. Abeant qui testibus vim denegant seminis procreatricem. Nam quod obiciunt, animalia multa testibus carere, quæ tamen semen effundunt prolificum, nullus momenti est: imperfecta enim sunt, & procreandi eorum ratio manca. Quæ de tauro afferri solent, negamus omnino, vix enim adduci possum, ut credam, statim erectis testibus couisse eum: namque à solutione partium exquisitissimi sensus acerbissimus excitatur dolor, qui libidinis astum atque ardorem extinguere potēs est: vel potuit fortasse seminis iam testium vi elaborati, & in parastatis asseruati portio quedam effundi.

Tertius usus
ridiculus.

Peripetei-
cæ rationes
diluuntur.

De testium usu opinio Medicorum & nostra.

QVÆSTIO III.

SUNT ex Medicis docti quidam, qui testibus nullam inesse vim generandi seminis contendunt, sed totam præparantibus vasibus & epididymidi concedant, quia nulli apparent ductus, per quos à varicosis plexibus ad testes ferri possit. Separantur à teste & epididymis, & præparantia & ejaculatoria vasa omnino illacera, estque in epididymide semen album, in testibus raro observatur. Itaque hunc testibus assignant usum, ut serosum humorem & excrementum seminis exsugant, contineantque, quæ ratione eorum substantia glandulosa constructa est. Est autem glandium hic usus apud Hippocr. ut partium excipiant superuacua: sic cerebro, cordi & hepati sua sunt emunctoria. Sed non video cur seminis excrementum testium substantiam potius ingrediatur, quā semen spiritibus turgens. Sunt testes spongia modo vari, & complures fistulæ in eos ex vasibus propagantur. Sugunt itaque per exiles meatus proleantque insita vis semen. Nam si ad testes alimentū fertur ad eorum nutritionem, & tamen in testium substantia vasa non sunt conspicua, cur non & semen? Glandulosa quidem eorum substantia est, sed glandes dici non debent, ut postea demonstrabitur. Tertia opinio eorum est, qui volunt testes semen non generare, sed instar pulvinaris, & mollioris subterniculi tantum vasa fulcire. Ubi enim (inquiunt) vasorum adest diremptus, ibi glandulas apposuit Natura. Sic in diuisione portæ pancreas, in mesenterij venis glandule copiosissimæ, in ramo subclauio thymus, in axillari & crurali vena adenes, conspicua sunt. Ita ad vasorum spermaticorum tutelam testes appositus sunt; verum Anatomica artis ignorantia no- uam & verè anilem hanc opinionem inuexit. Glandes enim diuisioni venarum appositæ vasa undique fulciunt, stabiliunt, sustinent: at testes tantum vasis appenduntur. Probabilior est Hippocratis, Galeni, & omnium ferè Medicorum opinio, qui testibus vim seminis procreatricem & principatum generationis assignant: eorum enim maxima est in habitu, tem-

Consuetudo.

Tertia opinio.

Confutatio.

Medicorum
opinio verissi-
ma, testes se-
men gene-
rare.

epididymida membranam non esse, sed corpus testis adhaerens, quasi parvus testis ad seminis elaborationem comparatus.

Detestium & thoracis sympathia.

QVÆST. V.



QUAM mirabilis sit testium & partium diaphragmate superiorum consensus, primus omnium eleganter expressit Hippocrates sect. 1. lib. 2. Epid. ὁρχος οἰδῆσας ἀπὸ βηχέων, ἀσθμῆμα καὶ ἰσχυρῶν, καὶ τῶν μαστῶν, γυνῆς, φωνῆς. Cum testis intumescit a tussi, memoriam renouat societatis, pectoris, mammarum, genitum & vocis. In cuius sententia planè aurea explanatione lubet aliquantulum spatium & excurrere. Societatem pectoris & testium

declarat frequens ex tussi in testium inflammationem, & contrà è testium tumore in tussim perτῶσιν. Hoc saepe medicinam faciuntantes experti sumus, & diuini Senis edito confirmari potest sect. 1. lib. 1. τῶν Epid. Πλείστοι δὲ βήχες ἐπὶ αἷμα, τοῖσι δὲ καὶ μετὰ χροῖον φλεγμαῖα μετ' οἰδῆσας ὁρχῶν ἐτεέρῳ ὁπῶι, τοῖσι δὲ ἐπ' ἀμφοτέρω. Multis sicque tusses contingebant, & horum quibusdam multo interiecto tempore inflammationes cum dolore ad alterutrum testem, aliis ad vtrumque simul subortiebantur. Sect. 1. lib. 2. Epid. βήχες χροῖον ὁρχος οἰδῆσας πᾶσι παύονται, tusses diuturnæ superueniente testium tumore cessant. Cur autem & quomodo id fiat iam aperiamus. Tussim siccam interpretor, non eam quæ sine materia est, quæ causam agnoscit, aut intemperiem nudam (qualis flante Aquilone excitatur) aut aspera arteria in aequalitatem, aut simplicem veruofarum partium sympathiam. Quomodo enim abscessus & tumores ea pererit? Sed tussim intelligo cum materia; cuius causa aut est humoris tenuitas, sumidi vaporis & pulmonis aksam subterfugientis, aut eiusdè crassities expulsionem morem non gerens. Hanc per abscessus inferiorum partium, testium quippe, expurgari voluit Hippocr. transfereute scilicet natura crudos & ἀκῆς humores in loca decliniora & maxime cognata quæ translatio propriè διαδοχὴ dicitur: fit enim κατὰ, & in partem totius materia morbisica capax. Ex purgationis porro huius vias patefacere, non ita est facile: dicam tamen quod sentio, & breuius quam res tanta dici possit. Tria vasorum genera ad testem feruntur, neruus, arteria, vena. Horum omnium à thorace ad testes ductus sunt peruij. Costali nervi, qui per latera costarū excurrit, portio conspicua ad testes fertur. Vena ab azygo diaphragma permeans ad renalem & spermaticam definit. Arteria à pulmone quidem (in cuius bronchiis tussis materia continetur) nulla in aortam deriuatur, sed ab arteria venosa in sinistram cordis sinum, ab hoc in aortam eiusque ramulos ferri humorem noxium nihil prohibet. Sic pleuriticorum, peripneumonicorum, empyricorum pus per perirrhæan, diarrhæan & partium inferiorum abscessus sæpè expurgatur, vt fusi lib. nono demonstrabitur. Hac itaque pectoris & testium est κοινωνία, propter quam tusses sicca, superueniente testium tumore, cessant. De mammarum, & genitalium partium sympathia multa Hippocr. 1. ἀπὸ γυναικῶν, & 5. Aphorismor. necnon Galenus 15. De usu partium, & nos libro superiore. Inter ea obiter non audiam, Hippocratem loco citato, nomine τῆς γυνῆς, non semen tantum, sed genitales partes & vterum etiam intelligere. Galenus libello De arte, γυνῆς interpretatur τὰ θυνητικὰ μόρια, partes genitales, in seminis vterū, in viris spermatica vasa, & lib. De vteri dissectione: γυνὴ δὲ λέγεται ἢ τοὶ τὰ θυνητικὰ μόρια, ἢ καὶ αὐτὴ τὴν μήτραν. Postremo testium & vocis societatem exprimit clarius Hippocrates sect. 5. lib. 2. Epid. ἰσχυρῶν καὶ πρὸς λῦσιν, ἐς τὸν ἀριστέον καὶ τὸν δεξιὸν ὁρχῶν, ἀνευ τετένης ἐτέρου ὅσον τε λῦσιν. Vocis gracilitatem varix soluit ad sinistram &

Explicatio sententia Hippocr. de sympathia testium & thoracis.

Quid tussis sicca.

Tussis cum materia.

Via thoracis ad testes.

quid quod Hipp.

est; motus verò, quo cibos nondum belle mactos, attritosque rapit ab ore famelicus ventriculus, naturalis est: ita colis erectio, quia cum sensu est & imaginatione, animalis dici potest. Sed motus ille localis, quo in ampliorem molem assurgit, naturalis est: siquæ à ligamentorum insita & vernacula facultate, qualis est uteri & cordis motus. Filius quidem dum semen prolecat, huius verò dum aërem & sanguinem haurit. Non negaverim tamen iuvari aliquantulum naturalem hunc motum ab animali, quia muscoli illi quatuor, exiles admodum, distentum penem amplificanti, & in eo statu continent ad tempus. Verum obiiciet quis, non omnem colis erectionem precedente imaginatione fieri, neque omnem cum voluptate esse. Nam qui gonorrhæa laborant Venerea, etiam nolentes arrigunt & cum dolore. Dico ex Galeni doctrina 6. De locis affect. cap. ultimo, erectionem penis duplicem esse, alteram naturæ quævis, id est, naturaliter constitutâ, & quævis, alteram, hoc est, præter naturam. Illa à nervi caui insita & vernacula facultate perficitur, hæc spontanea est & iniussa. Illa cum voluptatis stimulis, hæc citra illecebram. In illa primum distenditur coles, deinde vaporoso impletur spiritus, in hac primum impletur, deinde distenditur. Denique eadem est utriusque inflationis, quæ & duplicis motus in corde ratio. In cordis naturali motu, qui à vitali facultate perficitur, quia dilatatatur cor, impletur aëre & sanguine, quia contrahitur, vacuatur: & in cordis motu depravato, πάλιν οὖν vocant, quia impletur, distenditur cor. Sic folles fabrorum quia dilatantur statim ad vacui fugam, aëre implentur; vitres verò, quia vino aut oleo implentur, dilatantur. Naturalis ergo penis erectio perpetuò precedente sit imaginatione, & voluptatem habet semper comitem; de qua quæstionem intelligi volumus. Inflatio autem morbofa, quam priapismum vocat Galenus, sponte & citra libidinis stimulum perficitur. Huius causa est plenitudo à statu crassiore: argumento est motionis celeritas. Violentus enim & subitus motus à spiritu est, non ab humore, Galeno libello De palpitatione. Flatus hic vel in nervis, & ligamentis cauis generationem habet, vel eò per arteriarum ora ampliora transfertur: generatur autem vapor ab humoribus crassis. Sic melancholici priapismo sæpe tentantur, ut & elephantici, quia ratione veteres hunc affectum Satyriasin appellaverunt.

Obiectio.

Responsu.
Inferior colis
duplex, natu-
ralis & præ-
ter naturam.
Quomodo sen-
ter se distin-
guantur.

Causa pri-
apismi.

De situ glandularum prostarum.

QVÆST. VII.

DE glandularum prostarum situ certant Anatomici. Sunt, qui infra mus-
culum σφρυγστῆρα sitas putant: alij supra. Ego & auctores & ra-
tione ductus, posteriori assentior sententiæ. Si enim infra sphincterem
sitæ essent glandule, nunquam sine urina semen excerneretur, & in
gonorrhæa cum semine egrederetur etiam lotium; aperto quippe
sphinctere, qui janitoris vicem gerit. Quinetiam urina super hæc
glandosa corpora semper fluitaret, eaque tandem acrimonia sua ro-
deret afficeretque. Sunt ergo supra sphincterem sitæ glandule, quas & σφραγιδας & δευοειδῆς
vocat, quarum inflammatio & ulcus gonorrhæam parit Veneream. Legite quæ libro 5.
in controuersijs muscutorum, contra Vesalium annotauimus.

Glandularum
situs supra
sphincterem.

HISTORIA ANATOMICA.

De mulierum genitalibus, ac primum de vasis semen præparantibus.

CAPVT VIII.

Quando distinguuntur vasa mulierum genitalia.

MULIERVM partes procreationi dicatas, à virorum genitalibus situ tantum differre existimarunt veteres: quòd his fotes prominent; illis verò ob naturæ debiliorem vim frigidamque temperiem intus lateant. Nos vtriusque sexus genitalia, & litu, & structura, & numero distingui volumus. Nam nec vasorum præparantium eadem est diuaticatio, nec deferentium insertio similis, testium verò figura, magnitudo, substantia, temperies, planè est dissimilis. Postulat ergo genitalium muliebrium historia, peculiarem descriptionem. Sunt autem genitalia hæc, vasa spermatica, tum præparantia, tum deferentia; testes, & vterus. Vasa semen præparantia quatuor sunt vt in viris, duæ venæ, totidemque arteriæ; quorum exortus in vtroque sexu similis est: arteriæ enim ambæ à trunco oriuntur, venarum, dextra à trunco descendens, sinistra, ab emulgente ortum ducit; sed ratio distributionis multum est dissimilis. Nam vasa hæc in viris tota ad testem & epididymida feruntur: at in fœminis, & vena, & arteria bipartito finduntur. Earum maior portio in epididymida & testem assumitur, minor ad vteri fundum spargitur. Prior illa variis anfractibus implicatur ad seminis delineationem, tandemque epididymida effingit varicosum corpus, molle & glandosum.

*Vasa præparantia quatuor.**Distributio vasorum.**Epididymis.**De vasis semen deferentibus.*

CAP. IX.

*Deferentia vasa duo.**Insertio vasorum.**Observatio: intra de ductu quo grauida semen eiiculantur.**Cui in grauidæ meatu ille efformandus fuit.*

A his præparantibus quatuor, duo oriuntur vasa deferentia dicta aut eiacularia, magis flexuosa quàm in viris, vt viæ breuitas flexuum multitudine compensetur. Circa testes lata sunt admodum amplaque, vbi paululum à testibus recesserunt, angustiora sensim euadunt; postmodum ampliora facta, non ad vesicæ collum, vt in matibus, feruntur, sed ad vterum. Est autem horum insertio elegans. Non enim, vt Anatomici omnes sentiunt, tota in vteri cornu oblitterantur, sed in duos velut ramos dirempta; altero ampliore, sed breuiore, in latera vteri, cornua dicta, feruntur, altero angustiore, sed longiore, per latera vterini corporis inter membranas excurrentes, ad finem oris interni vel principium ceruicis desinunt. Illo, semen in vteri fundum eiiculantur mulieres; hoc verò dum conceptione facta contractus est vterus, coniuenteque exquisitè illius oscula omnia, semen in ceruicem effundunt. Nam cum omni die coire possit grauida semenque effundat, non pateret semini cavitatem ingresso exitus; aperiri enim omni die, omni que hora interius osculum non est verisimile; semen autem retineri citra noxam non poterat, quia extra vasa nisi concipiat putret, & veneni naturam induit: effingendus ergo canalus non in fundum, sed ceruicem vteri, semen eructans. Meatus hic, iis quæ non conceperunt ita exiguus est, vt nisi accuratè fecueris, sensum fugiat; in grauidis amplissimus est, propterea grauidas in coitu magis oblectari puto, quia longior est ductus per cerui-

cem membranofam excurrans. Eum primus ego defcripsi, ac in plerisque cadaueribus obseruauī, & Monspelij cum Cabrollo, & Lutetia in ædibus Domini Seguii Parisiensis Medici doctissimi & Professoris Regij, in clarissimorum Medicorum conspectu.

De testibus mulierum.

CAP. X.



MTER lateribus accumbunt testes, utrinque singuli, figura, situ, magnitudine, substantia, temperamento & structura à marium testibus differentes. Figura quidem, quia non ita rotundi & anteriùs posteriùsq; depressi sunt. Situ, quoniam in lumborum musculis insident, nec extra abdominis cavitatem prominent penduli. Magnitudine, quia minores; substantia molliores; multis vesiculis sibi mutuò adnatis instar ferè varicosi corporis reperiuntur. Temperamento frigidiores: structura denique & compositione, quia unicam habent tunicam, non quatuor, ut virorum testes: habent etiam mollius epididymida. Testes construxit Natura ad seminis elaborationem; emittunt enim prolificum semen foeminae ut & mares, quicquid clamitent Peripaterici, sed frigidius. Reconditi autem sunt foeminarum testes, ut essent calidiores magisque fecundi. Vesiculas illas, quas varicosos parastatas vocauit Herophilus, & glandosos prostates non habent mulieres.

Testes virorum & mulierum quomodo differant.

Testium usus.

Quo latent in foemina.

De utero.

CAP. XI.



PRECLARE admirandus Hippocrates I. De diata, & libro De natura pueri, ad perfectam generationem, seminis utriusque miscellam concurrere, & in utroque semine singularum partium ideam, non actus, sed *δυνάμεις* tantum contineri, testatum reliquit. Facultas hæc latens & quasi sopita, alieno indiget, ut excitetur, principio: semina ut permisceantur, in aliquem locum, quasi aruum hortumque feracissimum effundi debent. Fuit ergo in foeminis necessarius omnino excipiendo, concipiendo, nutriendoque semini locus: cuiusmodi autem est uterus; cuius licet ad indiuidui conseruationem nulla sit necessitas (*Ο'λη γδ* inquit *Ægineta*) *ή μήτηρ πολλαίς ισόρειται αφαιρεθῆναι και θάνατον εἶναι τοῖς μη χούεῖς*, id est, *Constat tota plerumque ablata matrice nec mortem inde subsequi*) ad speciei tamen conseruationem & foetus *χούειν και τελείωσιν*, maxima est eius nobilitas. Vterum Græci *υἰδὸν και ἀγρῖον κοιλίην*, id est, *vas foetum conseruans* appellarunt; *δελφύς* etiam dicitur, quod germanos procreet foetus. Hippocrates in *Prorrh.* *χωρίον ἐν τῷ σῶματι ἐστὶν*, locum in quo fit conceptus; 2. *Εἰδὴν γονίω*, sexro Epidem. *ἄγρος* quasi conceptaculum vocat; veteres *μήτρην και ὕστερον*. *Μήτηρ* quidem, id est, *matrem*, *matricem* uel, *ὅτι μήτηρ ἐστὶ τῶν ἐν αὐτῇ* uel *ἐξ αὐτῆς γινόμενον*, quia mater est foetus, aut in ipsa nascuntur, *ὅτι τὰς ἐχούσας αὐτὴν μήτρες ποιεῖ*; uel quod matres efficiat, quæ ipsam habent. *Υἱὸν* uero, id est, *postremam* uocant; non quod generatione ultiima sit (simul enim cum reliquis partibus conformatur) sed *διὰ τὸ ἐχάτω καὶ εἶναι τῶν σπλάγχων*, quia *situs est uiscerum ultiima*. Sunt qui φύσιν eam uocent, *ὅτι φύσις*, quoniam si bene excolatur & statis temporibus sementem accipiat, aliquid per-

Pteri necessitas.

Sine utero uerere potest foetum.

Pteri nomina omnia. Græci & Latine.

Quid vterus.

petuò fundit ex sese: vterum Latini dicunt: Plinius utriculum, quòd in eo velut vtre fœtus contineatur: alij vuluam quasi voluam aut valuam: Lucilius bulgam, quasi folliculum & loculum: Aristoteles nunc locos vocat, nunc membrum feruile. Est autem vterus veluti campus & hortus feracissimus, expièndo virili & muliebrisemini ad sobolis propagationem comparatus. Est matrix nobilissima ac propemodùm diuinà fauilla, ex qua naturæ thesauri conditi depromuntur, unde Platonì ζῶον ἡμιζυμνητικόν, animal concupiscentiæ particeps dicitur, quòd libidinem explendo animal generet. Pythagoræ animal per seipsum distinctum. Et Aræto ἀπλάγχρον ἀγχαῖσι ζωῶδες καὶ ὁκαῖον. ζῶον ἐν ζωῶ, viscus propè animatum & velut animal quoddam in animali. Huius nos structuram & singulare artificium nunc meditamur. Vterum animalia omnia intus habent reconditum, quia iniectum semen calore multo eget vt fuscitur, concipiatur, formetur, foueatur; externa autem iniuriis sunt magis obnoxia. Quadrupedibus omnibus infra septum transuersum situm obtinuit. Homini, in hypogastrio, in ampla scilicet coxarum capacitate inter vesicam & rectum intestinum est situs; illa, anteriore parte; hoc posteriore puluinaris & substerniculi vicem gerunt, ne ossium duritie lædatur tenellus embryo. Vidimus aliquando epiploon inter vesicam & vterum interiectum, quod primus obseruauit Hippocrates 5. Aphorisma, & inter sterilitatis causas recensuit. Situs hic tum ad vsum Venereorum (quia longè à facie & nobilissima rationis arce est distitus) tum ad concepti fœtus incrementum, tum ad perfecti enixum commodissimus est. Medium autem occupat, non dextrum sinistrumve, vt corpus esset ἰσόρροπον. Earum quæ non gerunt, vterus vix ossis pubis & vesicæ altitudinem superat. Prægnantium verò ad ilia vsque extenditur, nunc dextram nunc sinistram partem magis occupas, pro ratione fœtuum qui geruntur. Magnitudo vteri varia est, pro ætate, temperie, Venereorum vfu, muliebri profluuiio, corporis proceritate, & fœtura: nam enixa quàm grauidæ minor est, sed aliquantulum oblonga, piro maiusculo similis, aut (vt voluit Soranus) cucurbitule Chirurgorum, quæ ad tractionem est commodissima: rotundo enim ac lato sine qui ad fundum est incipiens, in angustum osculum sensim desinit. Substantia membranæa est, vt claudi ad conceptionem, dilatari ad incrementum fœtus, cogi ad exclusionem eiusdem, secundarum, & rerum quæ contra naturam continentur, posset; hoc enim soli membranæ conceditur. Tota vteri compositio, ex multis similibus particulis, tunicis scilicet, venis, arteriis, neruis & vinculis constituitur. Tunicarum exterior communis dicta, omnium quæ à peritonæo oriuntur crassissima est; interior verò reliquas totius ventris membranas crassitie superat; non tamen omni ex parte pariter crassa visitur. Namque ad fundi osculum crassissima est; quæ verò in obrulos desinit angulos, tenuior apparet. Triplici hæc villorum genere intertexta est. Rectos primum habet maxime conspicuos, quibus semen è sua ceruice, vt cetus è profundis cuniculis serpentinarum inspirat, allicit; tum obliquos, quibus fœtum retinet; postemò transuersos & circulares ad exclusionem fœtus & sordium. Interior hæc tunica valde carnosæ est, vt ad conceptionem augeatur vteri calor. Augetur minuiturque harum membranarum crassities, non modò per ætatis discrimina, sed etiam per mensium & conceptuum tempora; puellis enim tenues sunt; fluentibus iam mensibus crassiores; crassissimæ his quæ vtero gesserunt. Prægnantibus autem (dictu mirum & veteribus incognitum) iam non membranæa videtur vteri sub-

*Vterus.**Cur inter vesicam & rectum intestinum off situs.**Magnitudo.**Figura.**Substantia.**Compositio.**Tunica dæ.
Externa.
Interna.**Villi.**Membrana
vteri quo te-
pore crassiores
fiat.*

stantia, sed tota ferè carnosà, fungosà, spongix similis, in multos cortices fungorum more facilè diuidua, vt sanguinis & spirituum copiam pro fœtus alimento & vita contineret. Neque verò (vt Medici ferè omnes sentiunt) quantum in dies vteri cauitas ad incrementum fœtus in longum, latum & profundum ampliatur, tantum ambarum tunicarum crassities minuitur & tenuatur: sed contrà dilata-tione crassiot euadit, vt postremis mensibus duorum penè digirotum crassitiem æquet. Vasa vteri quatuor sunt, duæ venæ totidémque arteriæ. Venarum altera à spermatico, altera à hypogastrico ramo deriuatur: illa minor, hæc amplior est; illa descendit, hæc ascendit; illius rami quidam cum huius riuis coeunt, estque ea communio in grauidis, & quibus fluunt aut fluxuri sunt menses, magis cõspi-cua. Excurrunt ambæ inter duas vteri tunicas, sed spermatica exilioribus ramis vteri substantiam irrigat; hypogastrica non modò ad extèrnâ, sed & ad internam tum vteri, tum ceruicis faciem riuulos ampliores diffundit, quorum oscula *κολυ-λιδόνες* seu acetabula à veteribus appellantur, per quæ fœtus cum maternis venis *σύμφυσι* habet, trahitque quod in illis est *τὸ γλυκύτατον*, id est, *dulcissimū*. Qui-dam etiam ramuli in extremam proferuntur vteri ceruicem, per quos, & graui-dis & virginibus menstruum aliquantum erumpit. Totidem arteriæ, sed mino-res, venas has comitantur vitæ spiritus affundentes. Sparguntur etiam nervi quamplures, & à sexto coniugio, & à lumbati sacræque medulla prodeuntes; vn-demira vteri & cerebro, præsertim postico *συμπίπτει*. Postremò ad vteri stru-cturam concurrunt ligamenta propria, quæ quatuor sunt, duo superiora, & duo inferiora. Illa in vteri fundum prope cotinua infetuntur, lata sunt & membranosa. Hæc rotunda & subrubra musculorum instar (vnde à quibusdâ vterini cre-masteres vocantur) ab vteri lateribus ascendunt ad inguina, & musculorum ab-dominis extrema peritonæumque perforantes, ad ossa pubis fetuntur, & in adipe-m ac membranas ossa inuestientes oblitescunt; hæc aliquando ita dilatantur vt Bubonocalem pariant. Horum vinculorum vsus mirabilis est. Cum enim sæ-pè per totum ventrem oberret vterus dum est instructuosus; nunc ad p̄tæcordia & hepar *ἡμαλέον* fontem gratiosi vaporis recutrat; nunc per lateta vegetur; nunc deorsum feratur, dum libidinis futiis agitur; debuit vinculorum opera huius motus tanquam freno coërceri, totumque illius corpus ne ob grauissimum grandioris animalis & gemellorum pondus, ob ingentes conatus & summos in partu enixus procideret, vicinis partibus alligati; laxa tamen constructa sunt om-nia, vt & cum visceretoto extendi, & ipsum sequi citra lacerationem possint; mutari namque ab amplitudine maxima in summam angustiam oportebat vte-rum. Alligatur ergo vterus vicinis osibus per ligamenta illa p̄topria; connectitur etiam toti corpori per ligamenta communia: hepatis quidem & venoso gen̄i, per venas tum spermaticas, tum hypogastricas; cordi & arteriis, per easdem nu-mero arterias; cerebro & spinali medullæ, per nervos; recto intestino & vesicæ, per villos complures; hinc inflatnmato vtero tenesmus & st̄nguria primo *πρὸς ἡωαίσιον*. Atque hæc sunt similes omnes particulæ, ex quibus verum vteri corpus coagmentatur.

Observatio
pulcherrima.

Vasa vteri.

Vena vteri.

Arteria.

Nervi.

Ligamenta
propria vteri
quatuor.

Vinculorum
vteri vsus.

Cur laxa v-
teri vincula.

Ligamenta
communia
vteri.

Vteri nominis
quid intelligi-
gamus.



Vteri totius
divisio in qua-
tuor partes.

Primam partem
vteri pudendi
dicimus.

Pudendi par-
ticulae omnes.

Pubes.

Monticulus
labra.

Rima magna.

Ala.

Nympha car-
unculae.

Caruncula
quatuor flum-
inum con-
fluentes.

Vfus carun-
cularum divi-

Prima meatu.

Clitoris.

VTERI nomine totum id intelligo, quod à pudendo externo ad fundum vsque, in quo fit conceptus, extenditur. Est autem à pudendo ad fundum vnica quidem via, eaque satis patens; sed multæ tum in ipso limine, tum in toto eo ductu occurrunt particulae, varij sinus, thalami, arria, quæ singulate Naturæ in natura ipsa (ita enim vterum veteres appellarunt) artificium commo-stant. Vt autem singula hæc accuratè lustremus, totum vterum in quatuor dissimilares & compositas partes diuidere placer; fundum vteri, quod proprium est vteri corpus; os vteri internum; collum vteri, & pudendum seu orificium colli. Postremum hoc quia secantibus primum occurrit, prius describendum est. Pudendum ergo muliebrem αἰδοῖον γυναικείον, vuluæ & laruæ nomine donatum, primam constituit partem, in qua variae occurrunt particulae; aliae quidem statim obuiæ etiam citra sectionem; aliae sub his latitantes. Obuiæ sunt, pubes, monticulus labra duo, magna rima; latent autem sub his, alæ & nymphae, carunculae quatuor, clitoris & vrinæ meatus. Pubes in anteriore ossis pubis parte sita, Græcis χλεις dicitur ὀρχαῖς ὀπίσθιον, Latinis peccetæ. Monticulus collis instar protuberans & pilis decotatus, mons Veneris dici solet. Labra duo cutacea sunt, sed spongiosa adipæque multo confecta; sita sunt ad latera magnæ rimæ & ossa pubis pertingunt. Rima magna, Græcis ῥισμα, Latinis scissura, fissura, longior est foramine quod penem admittit, quia cutis membranæ crassior, non ita in partu distendi potuisset. Disiunctis aliquantulum pudendi labiis conspicuæ sunt alæ, ἀπὸ γυναικῶν seu ἀπὸ γυναικῶν, molles, spongiosæ, quæ ira aliquando præminent, ut eas excindere cogantur mulieres, præsertim apud Ægyptios. Earum usus est ab ambientis frigore & externis iniuriis vterum ac vesicam rurari, vrinam etiam è cunæ fundo acceptam, tanquam inter duos parietes deducunt, ut sæpè absque labiorum pudendi irrigatione foras profluit Nymphas vocant quidam, quod aquis præ sint, meatui quippe vrinatio, unde vrina tanquam à fonte corruat; alij malunt carunculas mox describendas, Nymphas appellare; sed parum interest. Subalis carunculae apparent valvularum instar, quæ in virginibus quatuor apparèt, membranulis quibusdam coeuntes; anterior vna, vesicæ orificium tegens; posterior alata, & duæ laterales, non transuersim, sed in longum fixæ. Hæ florem virginem garyophilo nōdum planè explicare (ocellum vocant nostri) persimilem, claustrum virginale & hymen tanto perè celebratum, ut eleganter obseruat Pineus, constituunt; membranæ autem laceratis & carunculis velut artibus, perit flos, remanetque eedem caruncula, sed ita disiectæ contractæque ut coiuisset aliquando neges. Earum usus est ab aëre & extrinsecis corporeculis vterum tueri, & in veneto congressu maris pudendum tinnillare; his enim calefactis & spiritu rurgidulis, penis ita constringitur, ac si manu obductus vndique comprimeretur. Est etiam in ea parte conspicuus vrinæ meatus, quem tegit caruncula. Tandem in superiore & anteriore vuluæ apice particula quædam apparet, quam primus inter recentiores descripsit eleganter Fallopius. Non fuit tamè veteribus incognita; hanc Avicenna Albattam vocat, id est, virgam; Albucasis Tentiginem; Fallopius κλειτοριδα, ab obscæno verbo κλειτοριζειν; Columbus Amorem & dulcedinem Veneris; nos mentulam muliebrem & penem fœmineum. Patticula hæc ligamenta habet duo, caua, ab ossibus pubis orta, intrus spongiosa, atro crassiorque sanguine plena, &

na, & exiles musculos quatuor: habet etiā in extremo aliquid glandi simile, quod tenuissima cute instar præputij tegitur. In hoc à virili mentula differt, quòd meatum habeat nullum excernendo semini dicatum. Huius usum agnoscimus, ut perficata torpentem excitet facultatem. Crescit in quibusdam tam importunè, ut extra rimam pendeat mentulæ instar, & ea sese mutuò fricent mulieres, quas propterea tribades seu fricatrices dicunt. Latitat hæc particula in pinguiore pubis parte & artificiosa eget sectione. Secunda vteri pars, collum vteri aut ceruix dicitur, quo nomine totum id complectimur, quod à carunculis iam descriptis, ad os usque internum extenditur. Fallopius maualt sinum pudoris quàm ceruicem appellare; ex ore enim angustiore, in amplissimum sinum definit. Galeno etiam & Sorano *ὁ λῶπος γυναικῆος* dicitur. Canalis est oblongus vaginæ instar & penis virilis receptaculum. Huius substantia in puellis delicatior est, in adultis callosior, in senibus ferè cartilaginea: crebro enim partium attritu & collisione tandem calefcit. Quinetiam dum cōniet ceruix, rugosa cernitur ut Boum palatum; dum verò distenditur, exquisitè læuis, & lubrica apparet, ut in coitu virile membrum amplexaretur & exfugeret. Sinus hic in coitu nunc breuior fit, nunc longior, nūc dilatur, nunc constringitur, ut aut longiori mentulæ cedat, aut eidem breuiori occurrat. In medio ferè ceruicis huius progressu tradunt plerique, in virginibus reperiri membranam in medio perforatam, quæ primo concubitu profuso sanguine difrumpi solet, Græci *ὑμῆα* vocant, Latini hymen & virginalē claustrum. Ego transuersam illam membranam, siue sit in medio, siue in principio ceruicis, si reperiatur, præter Naturæ institutū esse puto; puellas enim & abortiuos fœtus vidi quamplurimos, in quibus membrana illa non aderat. Quis enim illius foret usus? Tertia sequitur pars, quam *σῶμα τῶν ὑστέρων*, id est, *vteri orificium, aut os internum*, cum Hippocrate vocamus. Meatus est satis angustus, in quem vteriamplior cavitās tandem dehiscit. Fallopius ceruicem esse putat vteri; sic ossium angustiores partes, ceruices appellare solet Galenus. Orificium hoc si exteriore parte inspicias, tincturæ piscis vel canini oris nuper in lucem editi speciem præ se ferre videbis. Galenus glandi virili persimilem dicit; in partu rotundum fit coronæ modo. Hoc angusto orificio maris semen proleat vterus, quo concepto ita exquisitè clauditur, ut ne aciem quidē acus aut specilli admitat. *Ὁ κόσμος* (inquit Hippocrates s. Aph.) *ἐν γαστρίᾳ χροῦσι, τούτῳ τὸ σῶμα τῶν ὑστέρων συμμέμικτον*, id est, *Que vterum gerunt, his vteri osculum occluditur*. Crassa quidem est huius substantia, sed paulò ante partum euadit crassior, eiq̃ue viscidum quoddam corpus glutino ferè simile mira Naturæ providentia sensim connascitur, ut distendi citrà lacerationem in partu commodius possit. Conniuet hoc perpetuò etiam non prægnantibus, sed non exquisitè, nisi cum aut semen admittere, aut fœtui mensibꝫque exitum præbere debet. Est autem apertio hæc occlusioque naturalis omnino, non voluntaria: maximo enim speciei damno genituram conceptam nec retinerent, nec forent mulieres, & sæpe maritis versipelle hoc fœminarum genus imponderet, si spontaneus esset orificij interni motus. Tandem postrema sese offert pars omnium nobilissima semini excipiendo, concipiendo, suoque complexu fouendo, ad fœtus procreationem dicata; fundum vteri appellamus, in quo alitur, viuit & augetur Embryo, ut in ventriculi fundo coquitur chylus, & in vesicæ cavitāte continetur vrina. Superior est latiorque vteri pars, vesicæ fundo incumbens, ei tamen non alligata, sed libera, ut extendi ad incrementum fœtus & contrahi facilius possit. In fundo hoc vnicus est sinus, vnica cavitās, quæ tamen

Vteri claudu.

Secunda vteri pars, collum vteri.

Hymen non reperitur.

Tertia vteri pars, os vteri internum.

Orificij figura

Incassatur & pinguis abducitur hoc et paulo ante partum.

Oris apertio occlusioque non debet esse voluntaria, sed naturalis.

Quarta vteri pars, fundum vteri.

Vnica est in vtero cavitās.

in dextram & sinistram partem diuidi solet. Dextram masculinam, sinistram femininam dicunt, quòd dextra parte mares, sinistra foeminae concipiantur. Aph. 48. sect. 5. & Parmenides

δεξιτέραισι μὲν κούρους, λαίωσι δὲ κούρας

Dextra & sinistra pars lo-
nea distinetur.

concludi existimauit. Eam autem conceptus dignitatem, caliditati dextrarum partium tribuit Hippocrates. Hæ partes nullo septo discretæ sunt, sed linea tantum distinguuntur, quam *διχοῦν*, hoc est, *medianam*, vocauit Aristoteles, qualis in scroto & lingua percipitur. Errant itaque & qui plures in vtero cellulas agnoscunt, & qui humanum vterum *διχόλων* id est, *bis sinuatum* putant. Cuius hanc angustissima est, ut quælibet seminis portio ab ea comprehendi possit, non læuis & lubrica, ne semen præterflueret, sed rugis quibusdam exasperata, ut adhærere facilius semen. Ad latera huius fundi processus emicant ad ilia aliquantulum inclinâtes, in brutis mammarum referunt figuram. Vulgus Cornua appellat, & primus Diodes *κεφαλὰς ἀπὸ τῆς κέρατος*, quòd cornuum recens erupentium speciem referant, vocauit. In hos processus, non ita mulieribus ac in brutis conspicuos, semen muliebre excernitur, quia in hos eiacularia vasa desinunt. Tot ergo & similibus & dissimilibus particulis totum vteri corpus constituitur.

Cornua vteri.

CONTROVERSIAE ANATOMICÆ.

An mulierum genitalia solo situ à virorum genitalibus distinguantur, ut existimarunt veteres, & an foemina in marem conuerti possit.

QUESTIO VIII.

Non differre
genitalia vi-
rorum & fo-
eminarum nisi
situ.



ETVS est opinio clarissimorum virorum monumentis & omnium ferè Anatomicorum scriptis confirmata, non differre mulierum genitalia à virorum spermaticis partibus, nisi solo situ: quòd foeminarum genitalia lateant, ob naturam debiliorem vim frigidamque earum temperiem, virorum autem foras promineant. Nam & vasa habent spermatica mulieres, tam & *ἐπισπερματικὰ*, præparatia, quàm *despείρια* seu eiacularia, & testes semen excoquentes & penem, cuius figuram in vtero inuerso deganter expressam volunt. Cervix enim mentula oblongior, fundum autem linea mediana discretum scroti gerunt similitudinem. Id Galenus libris De vsu part. & De Anatomicis administrationibus, saepe inculcauit id *Ægineta*, *Auicenna*, *Rhasus*, omnis denique Graecorum & Arabum familia personat: id Anatomici ferè omnes clamitant. Ad cuius hereseos illustrationem hac vulgo afferri solent, *feminas plerasque solius caloris vi genitalia foras trudentis, in mares esse conuersas*. Non distinguebantur ergo forma, sed solo situ spermatica organa. *Licinio Crasso* & *Cassio Longino* Consulibus, *Cassini* puerum ex virgine in marem effectum, in desertamque *Aruspicum* insulam delatum legimus. Prodidit *Mutianus Licinius Argus* visum a se *Arescentem*, cui *Arescusa* nomē prius fuisset, nupsisse, eique etiamnum mox & barbam & virilitatem superuenisse, uxoremque faustè duxisse. Eiusdem sortis & *Smyrna* puerum se nouisse refert *Plinius* libro 7. cap. 4. in *Africa* *P. Cossinius Tisdritanum* ciuem in marem mutatum, qui pridie *femella* fuerat, se vidisse affirmat. Et libro 8. *Hyenam* ferox & asinum animal, alternis annis sexum commutare scribit *Ouidius*. *Metamorph.*

Historie femi-
narum in ma-
res conuersa-
rum.

--- & quæ modò foemina tergo

Passa marem, nunc esse marem miramur *Hyenam*.

De Iphide idem narrat Pontanus, cuius carmen perelegans:

Vota puer soluit, quæ femina vouerat Iphis.

Volateranus Cardinalis sub Alexandro Sexto Pontifice Romæ virginem se vidisse, cui nuptiarum die subito mentula erupisset, testatur. Narrat Antimeologij author sibi visum Auscis in Vasconia virum plusquam sexagenarium, canum, sortem & hirsutum, qui ad annum decimum quintum ante puella fuerat, tandem tamen ex casu ruptis tenuibus ligamentis, pudenda erupisse, sexumque mutasse, cum ei nunquam antea menses fluxissent. Pontano, Caietana muliercula piscatoris per annos quatuordecim femina, repente vir facta est. Idem contigit Aemilia coniugi Antonij Spense cuius Ebulani anno duodecimo postquam nupserat. Temporibus Ferdinandi primi Neapolitorum regis Carlota & Francisca filie Ludovici Quarna Salernitani annos quindecim nate sexum mutant. Idem apud Conibricam nobile Lusitania oppidum sibi visum testatur Amatus Lusitanus in suis Centuriis. Extat apud Hippocratem nostrum sect. 8. libri 6. Epid. elegans historia, de Phaëusa, que pulso in exilium marito, ita merore confecta est, ut ante diem desierit esse menstrualis. Tòτε, inquit, σῶμα ἡδὲ σώζειν, καὶ ἂν σώζω ἢ πᾶντα καὶ πᾶν γὰρ ἔφασκε, καὶ φωνὴ πᾶν ἐξέφθεσεν, id est, Huic corpus virile factum est, & hirsuta penitus euasit, & barbam emisit, & vox asperior est reddita. Idem contigisse scribit Namysia, Gorgippi uxori in Thaso. Si itaque virilem aliquando induit naturam femina, eiusque genitalia intus latitantes interdum sese promunt, pendentes ut in maribus, solo situ ea differre existimandum est. Hoc credidit antiquitas, & hodie Medici ferè omnes idem sentiunt. Ego veterum doctrinam semper magni feci, nullius tamè, ut loquitur Poëta, addictus iurare in verba magistri, quid hac de re sentiam, aucto-ritatē primū, tum ratione (qui Philosophis soli sunt canes ad venationem caussarum) ductus, paucis aperiam & explicabo. Differunt viriisque sexus genitalia non sicut modò, sed etiam numero, forma & structura. Numero quidem, quia vesiculas illas, quas primus deprehendit Herophilus, & ὡσεί τινας κυρτοὺς αἰσῶς, id est, varicosos adfites appellauit, non habent, nec etiam ὡσεί τινας ἀδενόειδῶς, id est, glandulosos præfides, ad penis radicem, & vesicæ cervicem sitos, in quibus asseruatur semen ad necessarios usus. Iam verò dum cervicem vteri inuersam mentula virilis formam referre volunt, absurdissima proferunt. Nam ceruix vteri unicam habet cavitatem, & que canalis oblongus, vaginæ instar, peni virili excipiendo dicatus: at virilis mentula duobus constat nervis cavis, meatu semini & urina communi, musculis quatuor, neque in virili penè insignem eam cavitatem liceat observare, quam in ceruice vteri. Adde, quòd vesicæ collum productius cervicem vteri totam non comitatur, ut totum penem. Quocunque igitur modo vteri cervicem inuerias, nunquam ex eo penem efformabis: ex unico enim tria efformari corpora caua non possunt: at penem constituunt tria corpora caua, ligamenta duo ab ossibus oria, & ἐπίπλεξ: cervicis verò unica est cavitatis. Obiicies nobis fortasse veterum sententiam, & Fallopij clitorida, mentula virilis speciem præ se ferentem, quippe quæ ligamenta habeat duo, & musculos quatuor. Sed vide quàm sit huius, & virilis mentule dispar ratio. Inoris exiguum est corpusculum, vesicæ nullo modo continuum, sed in vulvæ apice positum. Clitoris meatum nullum habet excernendo semini dicatum: at virile pudendum oblongum est, fistulamque habet in medio, per quam in vteri cervicem semē effundit. Neque verò vterius fundi inuerfi & scroti (ut somniant veteres) vlla est similitudo. Scrotum enim cutis est rugosa, vteri fundum membrana densissima, tota intus carnosæ, & multiplici villorum genere texta. Postremò, spermaticorum vasorum insertio, testiumque virilium & muliebrium figura, magnitudo, substantia, & structura multū inter se differunt, ut in historia Anatomica demonstravimus. Excutiamus ergo ab animis nostris caliginem illā, & mulierū genitalia non sicut modò, sed etiam numero, figura, & structura à virorum spermaticis par-

Opinio veterum improbat.

Quomodo differant viri & feminae genitalia.

Nō eadem est structura penis & sententia.

rias capiti communicent. Sed videntur hac ab Hippocratis mente alienissima. Vult enim reficcatur uterum ad hepar cursum inflectere, & moveri locali motu. Id verba Hippocratis satis declarant. Εὐρυχωρίᾳ δὲ σπλὴν ὄσιν, ὥστε σπένδα, ὅτε τῆς κοιλίας ἐύσης. Est enim ipsis matricibus satis liber & spatiofus locus ut conuertantur, vacuo quippe existente ventre. Libro De natura muliebri; Si uteri ad hepar accesserint muta de repente fit; cum sic habuerit depulsione per manum infra facta sub hepate aut sub precordii fascia deligato & aperto ore vinum odoratissimum infundito. Mouetur ergo sursum ut humectetur. Vt enim uterus seminis appetens, tanto interdum, mouetur impetu, ut deorsum labatur: ita nimium reficcatus & sitiens, cur non ad fontem gratiosi vaporis, hepar quippe recurret? Moueri etiam ad latera, ad ilia & coxas docet Hippocrates locis citatis, ut non sit cunctandum profiteri moueri uterum locali motu. Sed an motus ille animalis sit, vel naturalis, controuersia non caret. Animalem esse voluit Plato. Vterum enim appellat ζωὸν ἄνθρωπον ἰκδόν, id est, animal concupiscentie particeps: quem secutus est vetustissimus Aretaeus, dum uterum σπλάγχχνον vocat ἐγγύστα ζωῶδες, καὶ ὁμοῖον τὶ ζωὸν ἐν ζωῇ: viscus prope animatum, & velut animal quoddam in animali. Quinetiam animalem esse hunc motum ita demonstrant; quod iucundis oblectetur & tristibus afficiatur (ex merore enim hysterica subinde excitantur symptomata) quod odoratis gaudeat, grauiter vero olentia, ut castoreum, & fetentem ex Syria assam auerteret ac fugiat. Hanc opinionem conuellit Galenus 6. De locis affect. quia absurdum est ex multis animalibus constare unum, & animalis omnis motus à musculis perficitur: at in utero musculi nulli sunt. Cur autem iucundis & tristibus afficiatur, & quomodo odores persentiat, mox disputabitur. Nos de uteri motu ita sentiendum putamus, ut sit triplex: primus omnino naturalis, secundus planè symptomaticus & conuulsivus, tertius mixtus. Naturalis à sola sit facultate animæ: conuulsivus, à sola causa morifica; tertius, & à causa morifica, & à facultate simul. Naturalem agnosco motum, dum semen è sua cervice proleat uterum, eique quasi obuiam occurrat, dum contrahitur ad conceptionem, dum cogitur ad exclusionem fetus, secundarum, & rerum quæ in eo contra naturam continentur. Ad motum hunc edendum villos obtinuit rectos, & circulares quamplurimos. Fuit necessarius omnino hic motus, ut exponit eleganter Aristoteles lib. De anim. 10. quia interior sinus remotior est, quam ut è vestibulo quicquam seminis trahere possit. Itaque in anteriorem partem ei prodeundum est. Symptomaticus uteri motus solam agnoscit causam morificam, conuulsionem scilicet. Talis in hysterica suffocatione conspicuus est: mouetur enim sursum uterus, quia conuellitur. Conuellitur autem aut ab exhausto aut à repletione, arefactis aut nimia humoris copia inebriatis ligamentis. Interdum à venenata aëra, ex menstrui sanguinis & seminis suppressione: hic suffocatio, & sæpe respirationis interceptio, sublati respirationis causis finalibus, organicis, efficientibus. Respirationis nullus ferè usus est in strangulatu uterino; quia perexiguus est cordis calor, sola transpiratione contentus. Premitur diaphragma, princeps liberæ respirationis organum: ceterum animalis facultatis (que respirationis causa est efficiens) sedes ac domicilium in uteri affecti sympathiam & contagionem trahitur. Ceterum motum hunc conuulsivum appello, non conuulsionem propriè, quia conuulsio κλινὸς ἐστὶ ἀνακαίρετος τῶν ἀνθρώπων ἰκδῶν καὶ ἰκδῶν: id est, iniussus earum partium motus, quæ sponte nostra mouentur. Vterus autem non sponte nostra, sed sua mouetur: propterea in uterum non cadit conuulsio, sed in musculos tantum. Ita singulum sæpe conuulsionem appellat Hippocrates κατὰ γυναικῶς. Est tertius quidam uteri motus, qui partim à causa morifica, partim à facultate excitatur, ut dum nimium reficcatus & sitiens recurrit ad hepar ἰχθυαλέον. Intemperies sicca καὶ τῆς τάλαιπωρίας, à labore nimio contracta, causa est morifica. Recursus autem ad fontem gratiosi humoris ab appetitu fit naturalis: famelicæ enim & siti-

Moueri reuera uterum sursum.

Moueri ad latera.

Plato animalè voluit esse uteri motum.

Conuellitur Placuius opinio à Galeno.

Quid sentimus. Triplex uteri motus. Naturalium motus.

Symptomaticus uteri motus.

Hysterica suffocatio.

Tertius uteri motus mixtus.

bunde particula humectari postulant. Sic uterus furens saepe prolabitur, & à facultate & à caussa morbifica. Triplex hic motus nunquam nostra sponte perficitur, nunquam ergo animalis dici potest.

Cut, & quomodo vterus odores perſentiat.

QVÆSTIO X.

Uterine ad-
sions affect

Quoniam ad-
res perferantur.

Pteris odores
non sentit sub
odori specie.

*Pierres en
exqu岸it d'un
sens.*

Caroleffa-
sur Seanebe

Refers to:

Cur aromati-
ca & suave
oleum hyss-
ricum suffoca-
tione perunt.

Galario.



AFFICI vterum odoribus, & plerumque ita commoueri, ut varia-
de emergant symptomata, quotidianus rerum euentus & summi Hip-
pocratis auctoritas 5. Aphorismor. 1. & Iuuaenelav, & libro De
natura muliebri, satis testantur. Aristoteles 8. De historia animal.
cap. 2. 4. id confirmant: gravidas enim mulieres ad odorem extinctæ lu-
cerna abortire scribit, Galenus saepe id pronūciavit. Sed quomodo odo-
res persentiat vterus, & qua vi pauci explicarunt. Ego meum hoc de
re iudicium libenter adferam. Quemadmodum color solius aspectus, ita odor solius odoratus
obiectum est: atque ut visus peculiare habet organum, oculum scilicet, ita odoratus pecu-
liare & unicum organū, a Philosophis & Medicis statuuntur nares; non illa quidē exte-
na, sed interna; quas constituit is illud spongiosum, cribrūq; instar perforatum, & processus
duo mammillares ac medullares. Ut ergo solus oculus videt, ita sola nares odores persentiūt.
Absurdum est itaque existimare vterum odores sentire sub odoris specie; quia vterus non
est proprium nec conueniens odorum alio. In Theor. : afficitur tantum ab odoribus rariis
vaporum & materie tenuissime: sic iucundis odoribus recreantur atque exhilarantur vo-
nes spiritus nō ratione odoris, sed vaporis aerei & tenuissimi, qui spiritibus eū & seorsus
est & consocialis, quīq; spiritum familiare & conueniens est alimētum. Multa à Medicis
corpus nostrum dicitur afficere κατὰ γένεσιν, non sub propria, sed sub aliena specie. Sic
melancholicus humor apud Galenum, colore atro, imaginationi tenebris offendere dicitur;
cum tamen id suo colore non praestet, sed temperie frigida; quia non videt sine oculis crebris.
Ita vterum ab odoribus affici existimandum, non sub specie odoris, sed sub aliena, vaporis
quippe & tenuissima aera odorem comitantis. Afficitur autem eo vaporē celerrimē, quia
exquisitissimi est sensus. Et sanē genitales partes acerrimo sensu donauit Natura, ad volupta-
tis illecebram, & speciei propagationem. Quis enim per Deum immortalem concubitus,
rem adeo sordidam, brutamque peteret, amplexaretur, ei indulgeret, nisi effrenis cuiusdam li-
bidoinis aestro percita essent genitalia? At quæres, si odores sub propria specie non percipit ve-
rus, cur oblectatur suauibus; quæ verò ingrati odoris sunt, auersatur? Hoc tibi responsum
feram, fatida omnia incocta esse & prauē permixta: propterea inaequaliter sensum afficiūt,
vel spiritus à sordis tetrusque vaporibus impuriore reddi; unde lipothymia & syncope. Et ge-
nititalia spiritibus turgere, omnibus est exploratum. Sic Aristoteles 8. De hist. anim. gravi-
das mulieres & equas ad odorem extinctæ lucerna abortum pati scribit, quia inquinantur
materni spiritus, quos per arterias vmbilicales trahit fœtus. Unicus hīc superest eximius
scrupulus, qui multorum ingenia quādiutissimē torfit. Cur, si odoratus gaudet & oble-
ctatur vterus, statim quæ suauiter olent, ut moschus, ambrā, & similia, suffocationem hy-
stericā pariunt? Quæ verò ingrati odoris sunt, ut assa, castoreum, eundem affectum sa-
nant? Hunc nodum cum doctissimis viris ita soluendum existimamus. Non quæ suū mulie-
res admotis odoratis hysterica pati symptomata, sed eas tantum, quarum prauē affectus est
vterus: itaque bene olentia cocta & acuta admodum cerebrum primum afficiunt, eiusque
membranas percellunt. In cerebri sympathiam statim trahitur vterus membranosus; qui
affecto, qui prius latitabat in vtero vapores tetri suscitatur, & per arterias aut alios ca-

cos ductus ad diaphragma, cor & cerebrum expirant; hinc suffocatio. Quæ verò fetida siont, quia cruda & malè permixta, cerebri meatus obstruunt, neque interiores eius membranas lancinant. Solvunt autem hystericum paroxysmum; quia fœdi illi vapores natura nostræ aduersantur. Insuper ergo in eos tāquam in hostes insensibilissimos irritata Natura; & cum tertris vaporibus prauos in vtero contentos humores excutit, extruditque. Sic praua humorum qualitate irritata Natura, crises molitur: sic noxia pharmaci qualitate vellicata, vacuatio- nes perficit.

De mirabili vteri cum omnibus ferè corporis partibus sympathia.

QVÆSTIO XI.



M nuper in florentissima Hippocratis vireta diuertissem, non transfu-
ga, sed vi in inspector, exploraturus ecquid inde præcerpi posset, quod mira-
bilem vteri cum omnibus ferè corporis partibus societatem indicaret, tan-
dem occurrit mihi brevis illa sententia, libro De locis in homine, Αἱ ὁρῶνται
πάντων τῶν νοσήματων αὐτῆς αἰσίου: Vteri muliebrium omniū
morborum sunt causæ. Affecto enim vtero, totum corpus in illius xοινωσίαν, & conta-
gionem trahitur, omniūque partium affectarum cerebri, cordis, hepatis, renum, vesicæ, in-
testinorum, ossium pubis, & trium facultatum animalis, naturalis, vitalis, exolutarum signa
elucunt. Cerebri quidem & vteri maxima est sympathia, tum per nervos, tum per membra-
nas spinalis medulla. Hinc occipitis dolor affecto vtero, ut docet Galenus commentar. in 6.
Epid. & in hysterica strangulatione animales omnes functiones motrices sensificæ, & prin-
cipes afficiuntur, motrices in consulsione, quæ deprauatus motus est, sensificæ in oculorum ca-
litatione, aurium sibilo, & totius αἰσίου ὁρῶνται, principes verò pro varia egrotantium na-
tura & tempore variè afficiuntur. Quædam enim nugas garrunt, & absurda loquuntur,
aliæ sandi sunt omnino impotentes, nonnullæ fastidio & contumacia efferuntur in assidentes,
& plerumque ita insaniant, ut in puteos sese precipitent, ut docet Hippocrates libello De
morbis virginum: quædam ita abiecto sunt animo, ut omnia tuta timeant, vitam sibi acer-
bam putent, etiamsi ex illa migrare pertimescant. Cordis & vteri maximus est per insignes
arterias tum spermaticas tum hypogastricas consensus: hinc sæpè lipothymia, Syncope, respi-
rationis & pulsus priuatio; sublato quippe utriusque usu à venenata quadam aura nati-
uum cordis calorem exoluerunt. Hepatis & vteri sympathiam iam demonstrauimus. Resic-
catus enim & sitiens uterus recurrit ad hepar fontem, gratiosi humoris; & malè affectus
idem sæpè icterum, cachexiam, & hydropem accersit. Renum & vteri societatem grauida-
rum & virginum dum menstrua patiuntur, symptomata, dolores scilicet, & tormina lum-
borum, satis indicant. Fit autem communio hæc per spermaticas venas, quarum sinistra ab
enulgerente ramo ortum ducit. Sed & cum vesicæ & recto intestino maxima intercedit com-
munio: inflammatio enim vtero (ut scribit Hippocrates 1. Sed ἰσχυροῦσι, & Aph. 18.
sect. 1.) tenescimus & urina stillicidium; quia inflammatio utramque premit partem, in qua
nec feces, nec urina diu retineri possunt: fit autem consensus hic tum per viciniam, tum per
communione. Communio & per membranas peritonæi fit, quæ uterum his partibus alli-
gant, annectantque, & per vasa communia. Ab eodem enim ramo hypogastrico riuuli ad
vesicam, uterum & rectum intestinum feruntur. Neque verò vteri & ossium pubis, ingui-
næque connexio prætereunda est, quæ per vincula duo fit validissima, cuius ratione in hy-
sterico strangulatu, cucurbitulas inguinibus, & ad latera ossium pubis admonere solemus, ut
his vinculis, quasi chordis, ascendens uterus retrahatur. Hæc sanè communis est vteri &
omnium ferè partium societas. Sed superat omnem admirationem peculiaris vteri & mam-

Vteri mulie-
brium omniū
morborum
causa.

Cerebri &
vteri sym-
pathia.

Cordis &
vteri consen-
sus.

Hepatis &
vteri.

Renū & vte-
ri consensus
quomodo.

Vesicæ & re-
cto intestini
cum vtero cō-
sensu.

Vteri & in-
guinum & os-
sium pubis
connexio.

Strangulatio
vteri & mē-
struū cō-
sensu.

mammarum consensus, quem & frequens humorum μετάστασις ex mammis in uterum, ex utero in mammas; & affectus uteri indicia, quæ ex mammarum inspectione petuntur, & affectionem utriusque partis frequentes θεωρεῖται, postremo fatuuntur in uteris gestatorum dignota, prænotioneque satis detegunt. Quæ singula sigillatim summi magistri Hippocratis auctoritatibus illustranda sunt. Humorum ab utero refluxum ad mammas, & contrariā, expressis elegantiter libello, περὶ ἀδένων, his verbis: Ποιεύσιν καὶ μαζοὶ φύματα, φλεγμαῖος τὸ γάλα δασυήποντες, ἀγὰρ δὲ ἔχουσιν τοῖσιν ἐμπεσθῆν ὁμοίαι. Ἀποσείλει τὴν πλεονεξίαν τῆ ἀλλοσώματος. μαρτύριον τῇσι γυναιξὶν ἥσιν ἀφαιρῶνται γαστὴρ ἢ ἄλλη τινὶ συμφορῇ μαζός, καὶ ἢ φωνῇ θεωρεῖται, καὶ ὑγρά εἰς σώμα χεῖν, καὶ πνεύλιξουσιν, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀλγύνουσιν, καὶ ἀπὸ τῶνδε νοσήουσιν. ἰὼν δὲ ἀπὸ τῆς μήτρας καὶ ὅπου ῥέον τὸ γάλα, ὡσπερ μέλιη καὶ ἐμπεσθῆν ἐς τὰ ἀνωτέρω χεῖν, τὰ οἰκῆα ἐκτὸς ἔχον τεύχεα συντυγχάνει τοῖσι κυέοις τῆ σώματος κάρδιη, πνεύμονι, καὶ ἀπὸ τῆς γαστρίως, hoc est: Porro contrahunt & mammarum & tubercula & inflammationes, lac ipsum corrumpentes. Commoda autem habent superioribus similia, & reliqui corporis redundantiam auferunt. argumento sunt mulieres, quas morbus, aut alia quædam calamitas mammis priuavit. Nam & iis vor aspera redditur, & humores in gulam feruntur, & sputis abundanti, & dolore capitis vexantur, & ab his ægrotant. Rationem subiungit, lac enim veniens fluentique ab utero, seu etiam antea superiora ad vasa ferebatur, propria iam vasa cum non habeat, in principes nobilesq; corporis partes incurrit, cor quippe & pulmonem,

Humorum ab
utero ad mā-
mas refluxus.

História.

sicque suffocantur. Audiuimus mulieres quasdam suppressis menstruis, sanguinem statim periodicis, certisque circuitibus per mammarum papillas profudisse. Lusitanus centur. 2. curatione 2. in binis mulieribus se id vidisse scribit, & Hippocr. Aph. 40. sect. 5. Quibus mulieribus ad mammas sanguis colligitur, furorē significat. Brassavolus in commentario, narrat se vidisse mulierem, a cuius uberibus fluebat sanguis lactis loco. Nutricibus resurgente ab utero ad mammas sanguine supprimuntur menses. Vidi puerperas quamplurimas per uerum & vesicam maximam lactis copiam excreuisse. Frequens est itaque humorum a matris ad uterum, & ab utero ad mammas μετάστασις, quæ κοινωγία designat. Ex mammarum autem inspectione, uteri affectus detegi scripsit Hippocrates, sect. 5. lib. 6. Epidem. τὴν τῶν μαζῶν αἰθνηταί, καὶ τὸ ἐρυθρὸν χλωρόν ἢ; νοσῶδες τὸ ἀγλός. Si mammarum papillæ, & quod in eis rubet, pallescat, morbosum est vas. Nomine autem τῆ ἀγλός, uterum intelligit. Est enim ἀγλός Græcis, conceptaculum. Tertiò dixi affectuum utriusque partis curationes sympathiam indicare. Id docet Hippocrates Aphorism. 50. sect. 5. Si mulieri mēstrua cohibere velis, cucurbitulam magnam ad mammas apponito. Postremo ex mammarum inspectione fatus in utero contenti & atei, & scousi & sanitas demonstratur, lib. De natura pueri: Οὐκ ἔστι κινήσῃ τὸ ἐμβρυον, τότε δὲ ὁμοσημαίνει, καὶ τὸ γάλα τῇ μητρὶ οἷον δὲ μαζὸν αἰσένται, καὶ αἰθνηταὶ ὄργασσι. Simulatq; moueri cœpit fetus, tunc illi notam lac exhibet matris. Statim enim attolluntur mammarum, turgentque papillæ. Si itaque motionis tempus indicant matrem, detegunt etiam puelli etatem: mouetur enim mas tertio, & femina quarto mense. Sexum etiam denotant mamma: ut enim si dextra gracilescat, masculi, si sinistra, femella abortum designat, Aphor. 38. sect. 5. ita si attollatur & turgeat magis dextra, marem, si sinistra, faminam in utero contineri indicatur. Denique mammarum conspectus fetus sanitatem, & morbos denuntiat. Si enim utero gerenti mamma repente gracilescant, abortit. Aphorism. 37. sect. 5. Sunt hæc omnia consensus mammarum & uteri certissima argumenta. Verum cum sympathia simplex ferè omnis per vasorum communionem fiat, quomodo mammarum & uteri vasa inter se communicent, paucis aperiamus. Volunt ferè omnes Anatomici, epi-

Ex mamma-
rum inspec-
tione uteri
affectus di-
goscuntur.
Curatio affe-
ctus utrius-
que partis.

Mammae puelli
etatem scias
& sanitatem
indicant.

Uta aperian-
tur cannu-
nibus mōm-
arum & uteri.

gastrica ascendens ramulos cum mammariis descendens riuulis coire, fierique harum venarum anastomoses. Ego, ut iam libro sexto indiciui, harum venarum coitum non nego, sed patentes & breuiores communione huius vias inuenio. Epigastrica enim vena per vterum non spargitur, sepiusque a ramo crurali ducitur. Mammaria item, quam vocant, per anteriorem sterni partem excurrit, triangularem musculum alitura, neque ad mammas ramulos, nisi forte capillares, diffundit. Existimo itaque per hypogastricam & spermaticam, quæ peculiare sunt vteri vena, refluere ad truncum caue, sanguinem, lac, ceterosque humores, à trunco mox in axillarem, à qua thoracis due insignes exorsa, pectorales musculos & glande sum mammarum corpus irrigant. Contra, à thoracis refluere lac ad axillarem, ab hac in caue truncum, à quo per spermaticum ramum in vterum, per hypogastricum, nunc in vterum, nunc in vesicam feratur; unde plerumque lactes funduntur, urina post partum. Est etiam lactis per urinas expurgationi locus, breuiorque ductus per emulgentes ramos.

De vteri acetabulis, cornibus, tunicis. QVÆST. XII.

RER perum duo venarum paria disseminari docuimus, quorum alterum à spermatico, alterum ab hypogastrico ramo propagatur. Horum extrema cum vena umbilicalis osculis coeuntia, fetus & matris symphysin faciunt. Oscula hæc veteres $\kappa\omicron\tau\upsilon\lambda\delta\omicron\nu\epsilon\varsigma$, Latini acetabula appellarunt, à figura umbilici. Veneris & vasis acetabuli. Meminit tamen $\kappa\omicron\tau\upsilon\lambda\delta\omicron\nu\epsilon\varsigma$ primus Hipp. 5. Aph. lib. 1. $\omega\epsilon\iota\ \mu\upsilon\lambda\iota\kappa\epsilon\iota\alpha\upsilon$, & lib. De nat. muliebri. Recentiores Anatomici acetabula hæc in mulieribus negant, in ouibus & capris tantum conspicua esse volunt, & Aristoteles 3. De hist. anim. & 2. De gener. anim. in solis cornibus reperiri docet. Nos ut Hippocratem ab horum calumniis vindicemus, triplicem acetabuli, apud Galenum, libello De vteri dissectione, acceptionem agnoscimus. Primum acetabulum finis denuo sat conspicuus, in quo vteri vasa desinunt, umbilici Veneris figuram referentes. Acetabula hæc in mulieribus nunquam reperiuntur, in ouibus & capris maxime sunt conspicua. Secundum acetabuli nomine, ora vasorum instar, papillarum tumentia intelligimus. Postremo cotyledones ora sunt vasorum ad vterum desinentia, & cum umbilicibus venis coeuntia. Hac postrema significatione quis in muliebri vtero cotyledones negabit? Hæc oscula apud Hippocratem Aph. 45. sect. 5. si plena mucus sint, abortus cause sunt, quia vteri & fetus symphysin ac continuitatem solvunt. De vteri processibus, qui ad eius latera emicant, scripsit primus omnium Diocles: hos $\kappa\epsilon\pi\alpha\iota\alpha\varsigma$, $\delta\omicron\mu\omicron\ \epsilon\ \kappa\epsilon\gamma\epsilon\tau\omicron\varsigma$, hoc est, à cornu appellat, quod cornuum veruecis recens erumpentium figuram referant. Herophilus semisecti circuli ambitui confere. Galenus, eumque secuti fere omnes Anatomici, cornua hæc in muliebri vtero agnoscunt. Sed si verum amamus, ea tantum in brutis conspicua sunt, maximeque ouibus, capris & vaccis. Tument quidem & aliquantulum attolluntur muliebri vteri latera, in qua desinit ejaculatoria vasa, sed cornuum & processuum mammillarum speciem nullam referunt. De vteri tunicis dissentientes quosdam Galeni locos conciliare non erit difficile. Libro decimo tertio De vsu partium, & 3. De facultatibus naturalibus, vterum & vtraque vesicam vnicam tantum constare tunica scribit. Contra, libello De vteri dissectione, capite sexto, geminas habere tunicas vterum scribit, exteriorem nervosam vocat, interiorem venosam; exteriorem simplicem esse vult, interiorem duplicem. Sed dum vnicam agnouit tunicam, de propria loquitur, quæ omnium totius corporis tunicarum crassissima est, dum duas esse vult, communem illam à peritoneo ortam addit.

Uterus & Vasa

Acetabula vteri.

Triplicem acetabuli acceptionem.

Cornua vteri.

Cornua in vtero muliebri non sunt.

Conciliantur. Galeni loci de tunicis vteri.

De hymene
veteris opinio.



Opinio nostra
de hymene.

Non datur
membrana illa
perforata.

Membrana pro-
pter naturam
adungitur.

Alterum opi-
nio.

Quid sentia-
mus.

Quid sit vir-
ginem sui.

QVÆSTIVM est olim, & nunc etiam magna disceptatione cer-
tatur, an sint notæ aliquot virginittatis. Putant ferè omnes Medici,
membranam reperiri, nunc in medio ferè cervicis ductu, nunc imme-
diatè post os, & eamque transversam sitam, quam vñssa,
ὀψύσας, hymen vocat. Eam exiguo foramine in medio pericam,
alij cribri instar perforatam, vi fluentibus menstruis pateat aditus,
existimant; disrumpi autem & lacerari primo concubitu; propterea
que interseptum virginalè, claustrum virginalè, custodiam virginittatù dicunt. Proferunt
sua ex Bibliis sacris testimonia. Erat enim apud Hebræos in more positum, vi mulier vi-
ris desponsata primo nuptiarum die, non nisi substrato linteo coirent, in quo sanguis collige-
retur, atque id linteum daretur puellæ parentibus; vi esset virginittatis, filia vsque in tam
diem asseruat, testimonium. Fallopius membranam illam admittit. Columbus se aliquando
vidisse scribit. Ego, ut libere dicā quod sentio, & abortivas puellas, & trimenses, & tri-
quatuor, sex, septem annorum virgines diligenter observans, & specillo ad vñs os intromi-
ssusque inmisso, nihil quod resisteret, inveni. Quod si transversa illa membrana in medio cer-
vicis ductu, aut etiam in principio adesset, specillo eam probare facillimū esset. Fistula etiam
externas pudendi partes si inflaueris, videbis & alas, & carunculas contrahi, cervicem au-
tem totam seu pudoris sinum patere, vi ab ore externo, vulvā dicunt, ad internum os vteri
liber sit aditus. Figmenta ergo sunt quæ de transversa illa membrana & perforata scripse-
runt multi. Nam cum Natura nihil frustra moliat, quis foret illius usus? Sed an non Co-
lumbo & Fallopio oculatis testibus habenda fides? Ego membranulam aliquando reperiri
non nego, sed si transversam cum in cervicis medio obtineat sitam, aut circa pudendi osculum
adnascatur, præter Naturæ institutum esse puto, & morbum esse organicum in vitiosa con-
formatione. Sic sæpe ad osculi & vulvæ extremum nunc membrana, nunc caruncula adna-
scitur, quem affectum Avicennas clausuram, Albucasis alaticam vocat; Græci φλοιστον,
φλοισ, & eas mulieres φλοιστας hoc est, imperforatas appellant. Quibusdam à primo orto
id contingit, aliis ab euentu, vi ab ulcere, inflammatione & tumore præter naturam. Legi-
te quæ de eo affectu Aetius tetra. 4. sermone 4. cap. 96. Paulus lib. sexto cap. 73. Cornelius
Celsus libro septimo cap. 28. & Albucasis libro 2. scripserunt. Non ergo membrana illa, si
omnia hæc à φύσει se habeant, admittenda est. Eam negat Oribasius libro 24. Collectægeo-
rum medicinalium. Putare (ait) tenuem membranam esse, quæ sinum pudoris interceptat;
falsum est. Aliud itaque virginalè claustrum inveniendum. Volunt multi cervicis latera
nondum Venerem expertis quasi congelatina coniungere, quæ primus concubitus magna ex
parte diuellat. Almanzor scribit, virginibus cervicem vteri valde angustam & rugosam
esse, rugas verò illas venulis & arterioliis intertextas, quas primus disrumpat concubitus.
Ego existimo in puellis & virginibus carunculas illas quatuor in historia vteri descriptas
non transversas, sed in longum sitas, membranarum tenuissimarum interiectu ita coire, ut
violento concubitu & atterantur caruncula, & lacerentur membranula, effluatque sanguis.
Coitum hunc carticularum Senerinus Pinus Regis Chirurgus doctissimus, libello quæcūque
De notis virginittatis, florem virgineum appellat, quod caryophyllo flori nondum planè ex-
plicato, (ocellum vocant nostri aut vetonicam alitem) sit persimilis; carunculis illis diu-
ctis attritisve perit virginem florem.

LIBER OCTAVVS

IN QVO FOETVS HISTORIA

ACCVRATE DESCRIBITVR, ET

GENERATIONIS PRINCIPIA, CONCEPTVS,

conformatio, nutritio, vita, motus, tandemq; partus ad Hippocratis

ἰδιώσαν, quantum fieri potest accommodatè explicantur.

HISTORIA ANATOMICA.

Quæ requirantur ad generationem perfectam.

CAPVT I.



QVEMADMODVM in elementis per transmutationem, in metallis per appositionem; ita in animalibus per generationem, specierum fit propagatio. Generationis autem huius non vna eademque est ratio. Nam quædam sine coitu, affricatione sola; alia per fœminæ pudendi receptionem; nonnulla sine masculo intra se concipiunt: sunt quæ sola putredine generantur; nunquam partu; quædam modò ex putri materia, modò ex semine. Sed inutilis horum omnium & imperfectus est procreandi modus: quæ ratione ἀνάμα, ἀσθενήσας

Varij generandi modi.

ἡγ' ἐν νόμῳ αἰῶνα, id est, exanguia, & infertilia dicuntur. Nobilior sanè hominis & perfectorum animalium est generatio: quippe quæ tria hæc, sexus diuersitatem, eiusdem amplexum, & materiæ cuiusdam ab utroque sexu manantis, quæ singularum partium ideam & μοῖραν πρὸς αὐτὸν διδάσκει contineat, permissionem requirat necessariò. Sexuum in primis necessarium est discrimen, quia non fit generatio nisi per femina. Hæc in locum aliquem tanquam agrum effundi debent, vt latens & quasi sopita eorum vis susciteretur, & quod tandem conceptum fuerit, foueatur, nutriatur, perfectionemque consequatur suam. Id cum calidior mas præstare non possit (nullæ enim ad fœtus concepti alimoniam ei superessent reliquæ) fœminam necessariò creari decuit, quæ & locum excipiendo concipiendòque semini præberet, & materiam eidem fouendo, alendo, augendòque conferret. Vterque sexus maris ac fœminæ, specie essentiali, forma & perfectione non differt, sed accidentibus tantum; temperie quippe, ac genitalium structura & situ. Est fœminæ non minùs quàm maris sexus, perfectio quædam speciei, neque animal occasionatum aut accessorium (vt loquuntur Barbari) dici debet fœmina; sed ens necessarium, primò & per se à Natura institutum. Errant igitur qui fœminam ἀρρεν πεπρωμένον, hoc est, marem imperfectum, & Naturæ παρὰ βίαν, ἡγ' παρεργον, quasi excursum & præuaricationem dicas, prædicant. Elegantius multò veteres fœminam definiunt animal, quod in seipso, marem verò, quod in altero gignit. Vtrique sexui, ad procreationem, libidinis stimulos, & admirabile congressus desiderium, in seuit iniecitque Natura. His itaque volu-

Tria ad perfectam generationem requiruntur.

Sexus discrimen cur necessarium.

Cui fœminæ creari decuit.

Sexus perfectio & forma non differt.

Definitio maris & fœminæ.

ptatum illecebris, velut cestro thyrsoque perciti, mas & fœmina in amplexus venereos ruunt cœuntque inuicem. Mutuus hic amplexus ad perfectam generationem non sufficit: tertium requiritur quoddam, ab utroque sexu prodiens, à quo, & ex quo nouus homo progignatur. Seminum ergo effusio (quæ principiorum rationem habent) in coitu est necessaria. Vnde ad perfectam generationem tria hæc, sexuum discrimina, eorundem congressus, & seminum emissionem necessariò concurrere existimamus.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

De sexuum diuersitate.

QVÆSTIO I.



AD perfectam generationem sexuum requiri discrimina, sæpe ab Aristotele libris De historia ac generatione animalium, proditum est, & finalis causa, omnium nobilissima, quippe quæ reliquas moueat; ipsa verò non moueatur, satis indicat. Vt enim in plantarum seminio totius plantæ vis & virtus continetur, quæ tamen nunquam in actum sese promittit, nisi telluris excitetur tepore: ita parentum semina singularum partium, ideam in se continentia, nisi in natura agrum hortumque feracissimum effundantur, nunquam in actum erumpent, nunquam vires suas exerent. Est ergo necessarium duplex animal, alterum quod in alio, alterum quod in seipso generet. Illud mas, hoc fœmina dicitur. Mas ab ortu calidior, primum efficiendi principium, & totam ferè vim formatricem concedit. Fœmina frigidior & locum concipiendo semini, & materiam alendo conceptui, ex alimenti reliquiis crudioribus suppeditat. Locus ille uterus est, qui seminis vim quasi compedibus solutam, excitat. Nam in quamcumque aliam corporis partem effundatur semen, non concipietur, sed putrescet. Materia autem sanguis est, excrementum alimenti ultimi partium carnosarum. Hæc sexuum discrimina, essentialia animalis differentias non constituunt, tam quia non reperiuntur in omnibus animalibus, teste Aristotele 2. De generat. animal. cap. 4. & 4. De historia animal. cap. 17. tum, quia essentialia differentiæ constituunt naturas specie diuersas; mas autem & fœmina, sunt semper in eadem specie, Aristoteli 10. Metaphysic. Differunt tantum sexus ambo accidentibus quibusdam. Sed quamam sint ille accidentales differentiæ, non satis inter omnes constat. Volunt Peripatetici naturam semper intendere in maris generationem, fœminam autem per accidens procreari, ex semine debiliore, quod maris perfectionem non potuit attingere. Itaque fœminam vult esse Philosophus Natura & defectu, quasi prolapsionem, metaphora sumpta à viatoribus, qui aberrant & progrediuntur iter institutum. Et cùm monstra sint velut Natura excursum, & πρὸ πάγος fœminam tale quid esse putat, & primum monstrum in Natura. Galenus Aristotelem sequutus, cap. 6. & 7. lib. 14. De usu partium, scribit vim in humano semine formatricem, cùm una sit, vnam tantum intendere nempe marem. Quòd si ab instituto aberret, & marem generare non possit, fœminam creat primam maris imperfectionem, quam propterea animal appellat πρὸ πάγος, mutilum, occasionatum, accessorium. In hoc autem differre putat à mare, quòd marium genitalia foras promineant, fœminarum verò intus lateant ob caloris imbecillitatem, qui foras ea trudere non potuit. Itaque ceruicem inuersam, pudendum virile referre vult, & uterifundum inuersum scroti gerere similitudinem. Verùm hæc Aristotelis & Galeni opinio nobis non probatur. Naturam enim in fœmina, non minus quàm maris generationem intendere existimamus, & fœminam Nature erratum ac prolapsionem dicere, indignum est Philosopho. Omnis siquidem rerum naturalium perfectio ex fine petenda est: at fœminam ita formatricem

Cœtus ad generationem.

Seminum effusio ad generationem necessaria.

Necessaria sexuum discrimina.

Quid mas. Quid fœmina.

Sexus differentia essentialia.

Opinio Aristotelis de sexibus in Natura.

Fœmina primum monstrum in Natura. Opinio Galeni.

Aristotelis & Galeni opinio improbat.

cessarium fuit, alioqui perfecta nunquam foret animalis generatio. Quae verò de genitalium similitudine & situ tantum immutato profert Galenus, absurda omnino sunt, & parum Anatomica; ut fusè latèque in vteri historia differuimus. Nulla enim ceruici cum virili pene, nulla vteri cum scroto intercedit similitudo; neque testium eadem est structura, figura, magnitudo, neque spermaticorum vasorum similis distributio insertioque. Non ergo ea ratione differre marem à femina existimandum, quòd femina mas sit imperfectus, & quòd feminarum genitalia similia quidem sint, sed solo situ differant. Ego utrumque sexum essentiali forma differre non puto, nec perfectione; sed genitalium structura & totius temperie. Uterum habet femina tanquam aruum; excipiendo, concipiendo, fouendòque; semini à Natura institutum: temperiem autem totius corporis frigidiorē quam mas; quia materiā alendo foetui accommodatam suggerere debuerat. Aristoteles cap. 2. libri primi De generatione animalium; in hanc sententiam videtur inclinare. Differunt (inquit) mas & femina, tum ratione, tum sensu. Ratione, quatenus ad generationem vario modo concurrunt; τὸ μὲν γὰρ εἰς αὐτὸ ἀφ' ἑνός, ἡ δὲ γυνὴ τὸ εἰς τοῦτο, ἀπ' ὧν. Quòd enim in seipso generat, femina est, quòd in alio, mas. Sensu verò partibus quibusdam; nam genitalia mulierum sunt matricēs; marium verò penis & testis.

Nulla generatio
lum simili-
tudo.

Quomodo di-
stinguantur
sexus.

De temperamento foeminarum, an viris frigidiores sint calidioresve.

QVÆSTIO II.

DE marium ac foeminarum temperamento non ignobilis est controuersia: quae mihi tanquam arbitro & censori discutienda proponatur, quid de ea re ex Graecorum & Arabum fontibus hauserim, dicam breuiter. Sunt qui mulieres viris calidiores statuunt: alij contrà, feminas caloris excessu longo intervallo à maribus superari contendunt. Non est vtraque opinio suis destituta patrocinis: sed his se fulcit sustinèque rationibus. Si diuini Senis & summi Dictatoris edicta pro lege nobis sint fuerintque perpeiuò, cadet mebercale suacausa mares. Is enim primo οὐκ ἡνωκαίτων, mulieres viris calidiores apertissimis verbis declarat. Φημι τὴν γυναικα ἀχειοσαρκότερην καὶ ἀπαλαττέρην εἶναι, ἢ τὸν ἄνδρα. hoc est, Dico mulierem carnem habere rariorem, quàm virum. At raritas apud Philosophos caloris est opus, secundaria quippe caloris qualitas: & ut frigidi proprium est densare, ita calidi rarefacere. Quinetiam eodem loco τὸ πᾶς τῆς κοιλίης ἔχει τὴν ἰσχυράδα, καὶ τὰ χύον καὶ μᾶλλον τὸ σῶμα τῆς γυναικὸς, ἢ τὸ ἀνδρὸς. Mulieris corpus & celerius & magis humidi trahit à ventte, quàm viri. At maior & celerior tractio, non nisi validissimi caloris opera perficitur. Ita enim carnes, quia calidissimae, attractrices dicuntur sect. 6. lib. 6. Epid. σαρκες ὀλκοί, καὶ ἐν κοιλίᾳ καὶ ἔξωθεν, &c. Tandem, quid ex ea carniū raritate & valida humidi attractione inferat Hippocrates, videamus: θερμότερον γὰρ τὸ αἷμα ἔχει ἡ γυνή, καὶ διὰ τῆτο θερμότερον ἔστι τὸ ἀνδρὸς. Calidiorē habet sanguinem foemina, & propterea viro calidior est. Quid clariùs? quid apertius dici potest? Fuit eiusdem sententiae Parmenides, ut refert Aristoteles cap. 2. libri 2. De partib. animal. Sed stabiliamus hanc Hippocratis sententiam validissimis rationibus. Totius corporis temperies, ex principum partium, praesertim cordis & hepatis, temperie aestimanda est. Id à Galeno libris De temper. & in Arte parua, proditum est. Qui corde sunt calido, inquit, totum corporis habitum calidum habent, nisi hepar obstiterit; & qui hepate sunt calido, toto corporis habitu calēt, nisi cor repugnauerit. Quòd si in eandem temperiem vtrumque viscus conspiret, eadem erit & planè similis totius corporis temperies. At mulieres calidiore habent cor, calidiore hepar, quàm viri: erūt ita-

Mulieres vi-
ris calidiores
demonstratur
auctoritate
Hippocrat.
Rariorē sunt
corne.
Validum tra-
hunt.

Rationibus id
confirmatur
Ratio 1.

que toto corpore calidiores. Quod calidius feminarum sit cor, quàm viri, ita demonstratur. Singularum partium temperies ex actionum robore maximè dignoscitur. Actiones autem & facultates cordis due sunt: vitalis apud Medicos; & θυμωδης, seu animosa, aut irascibilis apud Platonicos. Viraque in femina vegetior quàm in viro; vitalis in pulsu maximè lucet. Sed feminarum pulsus frequentiores sunt, virorum rariores & tardiores: quod docet Galenus libro De puls. ad tyrones, cap. 9. & 3. De causis pulsuum, cap. 2. Quod & Auerroes 4. Colliget, cap. 19. confirmat. Frequentia autem & velocitas caloris vim den-
 tiant. Nam ut frigidi proprium est partes in mouendo pigras reddere, ita caloris continenter mouere, nec ullam ferè quietis partem impertire. Altera verò cordis facultas, quam animo-
 sam, irascibilem vocant, in mulieribus vegetior est: nā mulieres viris sunt οὐθυμότεραι, iracundiores; leui quippe de causa incādescunt, & apud Galenum in Arte parua, οὐθυμώτα, iracundia signum est calidissimi cordis. Sunt etiam animosiores & ferociiores femi-
 nae. Sic in rapacium animalium genere tygridem, vrsam, leonem maribus ferociiores testan-
 tur venatores. Iam verò mulierum hepar calidius esse eadem demonstratione conficio. Natu-
 ralis facultas, quæ sedem habet in hepate, & quæ auētrice, altrice, & procreatrice continetur, validior in femina quàm in mare. Nam & celerius crescunt femina suæque citius ca-
 pēssunt incrementa extra uterum; celerius pubescunt, & semen effundit quàm mares, quod opus est procreatrici; & salaciores sunt multo, & testes (in quibus alterum natui calris fontem statuit Galenus) abditos habent, quorum vicinia recalescit vnuersum corpus. Na-
 trix porro facultas, calidi hepatis certissimum argumentum, in femina perfectior, quàm in mare. Plus enim sanguinis gignit hepar: at tantum habemus calori quāntum sanguini; ne-
 que sanguis hic qualitate sua noxius est, sed copia tantū superfluit, solæque quāntitate luxu-
 riat. Est delicatior præpinguiorquē mulierum habitus insipientibus, non hisus. Postre-
 mō animales omnes facultates in mulieribus sunt perfectissimæ; sensus acutissimi, musculo-
 rum in agnandis partibus maior volubilitas facilitasque, memoria felicior, inuentio subli-
 or; verborum, quæ animi conceptus exprimunt, copia maior. Si ergo facultates omnes &
 vitales, & naturales, & animales perfectiū edunt femina quàm mares, quis eas maribus calidiores esse non concludet? Neque verò silentio prætereundum est, quod annotauit Ma-
 crobius Saturn. 7. Quo tempore virorum corpora cremabantur, denis virorum corporibus muliebri vnum adiici solitum, ut celerius ea conflagrarent. Sunt hæc
 probabilia sanè, & veritatis inuolucris obiecta. Quæ tamen, si Philosophica statuta &
 Medica trutina ponderentur, falsa & erroris plena videbuntur. Præstat ergo contrariam
 tueri sententiam, & mares feminis in vnuersum calidiores adstruere. Hoc ego validissimis
 rationum momentis & grauissimorum virorum auctoritatibus confirmabo. Marem femi-
 na calidiorem multa persuadent, sed hæc inter cetera, principia generationis, locus in quo,
 & ex quo generatur, cōformatio, motus, exclusio tempus, purgatio post partum, partium
 omnium structura & habitus, victus ratio, vitæque institutum, tandemque finalis causa.
 Quæ singula breuiter illustranda sunt. Si principia generationis spectes, mares ex calidiori
 semine generantur. Hoc docuit eleganter Hippoc. 1. De dieta. Cum enim in viroque
 sexu duplex agnoscat semen, masculinum & femininum; ex masculino, id est, prepotenti mares,
 ex femineo, hoc est, imbecilliori feminas procreari vult. Sed & in loco calidiorē generantur.
 Εἰς δεξιὰ τὰ μὲν ἀρσενὰ ἐν τοῖς δεξιότοις, τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖς ἀριστεροῖς μάλιστα.
 Fectus mares in dextris, feminæ in sinistris magis. Aphor. 48. sect. 5. at dextra sini-
 stris sunt calidiora. Neque verò in dextris tantum, sed etiam ex dextris partibus procrea-
 tur mares. Extat illud Hippocratis in Epid. Hircire incipiens, si quidem dextera testis inu-
 mescat, marem; si sinister, feminā generabit: propterea dextrum testem ἀρ' ἢ ἐν ὀνόματι, id est,
 masculinum, sinistrum θηλυγόρον vocat, quia illius semen calidissimum est, ex quo fit perco-

Mulieres cor
habere calidius

Pulsus fre-
quentior.

Ferociiores.

Hepar femi-
narum calidius.

Actio vi-
lidor.
Procreatrix
vegetior.

Natrice valē-
tior.

Animales fa-
cultates: per-
fectissimæ in fe-
minis.

Mares calidi-
ores feminis.

Rationes.

Ex semine ge-
nerantur cali-
dior.

In loco cali-
dior.

Ex dextris
partibus ge-
nerantur ma-
res.

Etum, & ex puriore sanguine elaboratum; huius verò frigidius, & sero multo dilutum; ob spermaticæ sinistræ ab emulgentie ramo exortum. Quæ ratione rustici ad vaccas gignendas dextrum testem ligant, ut non nisi à sinistro prodeat, quod ex libro Hippocratis De superfætatione, didicerunt. ὅτας, inquit, ἡλὺ βέλλειαι ἡρέας, ὄρχαν τὸν δεξιὸν ἀποδῆσαι, ἐπὶ τὸν ἀρσεν βέλλειαι τοῦ τεύειν, τὸν ἀριστερὸν ἀποδῆσαι. Quando femellam generare volet, dextrum testem obliget; quando marem, sinistrum. Jam vero si utriusque sexus ὑπόπωση, id est, conformationem em spectes; mas & citius conformatur, & dearticulatur in utero. Mares enim 30. femina 40. diebus conformatur, lib. 1. De diætâ, lib. De nat. pueri, & in Epid. At conformatio caloris est opus. Mouetur etiam celerius: tertio quippe mense; femina verò non ante quartum; & frequentiores ac violentos magis edit motus, quæ omnia valentissimi caloris indicia sunt. Accedit, quòd septimestres mares violentales sunt, femina autem raro viuunt. Sed & quæ post partum excernuntur, lochia vocant, maris calorem testantur. Longiore enim tempore purgatur quæ famellam peperit; breviori, quæ marem; quia calidior mas suppressi sanguinis reliquias magis exhaurit. Hoc docet, apertis verbis Hippocrates πάλιν μωαιχείων, post puellæ partum inquit, ἡ μέγας τεσσαράκοντα καὶ δύο τὴν χρονία τὴν καθαίρειν; in quadraginta duobus diebus longissima purgatio est: post masculi verò partum, ἡ μέγας ὥνκοντα ἡ καθαίρειν γίνεται καὶ ἡ χρονία τέρη, in triginta diebus, quod longissimum est, purgatio fit. Quod si utriusque sexus habitum & partium structuram perlustres, plura mebercule in maribus indicia comperies. Est mulierum habitus præpinguior, laxior, molliorque: at pinguedo non nisi ab imbecilliori calore. In mulieribus glabra sunt omnia; marium verò carnes solidiores sunt, vasa omnia ampliora, vox grauior. At caloris est amplificare, ut frigoris angustare. Mulier apud Hippocrat. Aphor. 43. sect. 7. ἀμφιδέξιός γίνεται, ambidextera non fit, ob caloris imbecillitatem. Sed & diætâ, id est, victus ratione, vitæq; instituto, mares feminis sunt calidiores, lib. 1. De diætâ. Mares diætâ vtuntur laboriosiore, ὥς ἐκ θερμαίνεσθαι καὶ ἀποξηραίνεσθαι, ut incalecant, & resiccantur. τὰ δὲ ἡλέα ὑγροτέρησι διαίτησι χροῖνται, feminae autem humidioribus vtuntur alimentis: vitam etiam sedentariam & inertem degunt. Accedit ad omnia hæc finalis causæ necessitas. Debit calidior esse mas, quia corpus ad ferendos labores aptum dandū illi fuit, inuictūq; & intrepidus animus ad pericula subeunda. Femina autem, cui masculinum semen excipiendū concipiendūq; erat, gerenda & nutrienda proles, vita sub lecto agenda, oblectādus masculus reficiendūsq; que externis laboribus fatigatus, languidus calor inditus est & corpus molle, humidum, glabrum, politum. Ergo si principia generationis spectes, si locum, conformationem, motum, exclusionem, purgationes à partu, totius corporis habitum, partium structuram, victus rationem, finalem causam; mares feminis calidiores reperies. Si rationibus his, quæ veræ sunt demonstrationes, non cedunt aduersarij; audiant saltem vniuersam Græcorum & Medicorum & Philosophorum familiam. Hoc mirus Hippocrates ante omnem natam Philosophiam diuino afflatus numine, non obscure, sed disertis verbis omnium primus attigit lib. 1. De diætâ, in hunc modum: τῶν δὲ πάντων τὰ μὲν ἀρσενὰ θερμότερα καὶ ἐνέστερα, τὰ δὲ ἡλέα ὑγρότερα, καὶ ψυχρότερα. id est, In vniuersum mares sunt calidiores & sicciiores, feminae humidiores frigidiorisque. Naturæ genius & interpretæ Aristoteles libello De longitudine & breuit. vitæ, mares vult esse longioris vitæ quia calidiores: 3. De partib. animal. mares robustiores & animosiores esse scribit, 1. Polit. cap. 1. & 8. mares in omni actione feminis præstare vult, & Probl. 29. sect. 4. querit cur hyeme viri, æstate mulieres ad Venerem sint procliniiores. Respondet, quia viri calidiores & sicciiores æstate franguntur, mulieres frigida & humida ob caloris inopiam hyeme humorem habent concretum. Galenus sexcentis in locis mares feminis calidiores pronunciauit, sed præsertim cap. 6.

Conformatio celerior.

Mouetur citius.

Exclusio celerior.

Post partum breuiter purgatur, si marem peperit.

Habitus solidior marium. Vasa ampliora.

Mulier ambidextera non fit.

Mares diætâ calidiores vtuntur.

Auctoritatis bus confirmatur mares calidiores.

Auctoritates Hippocratis Aristotelis.

Galeni auctoritas.

libr. 14. De usu part. ubi feminas viris imperfectiores esse vult, quia frigidiores. At qualitatum omnium caliditas maximè est energitica. Ex his itaque cuilibet planum & apertum fit, mares in uniuersum feminis calidiores esse; eosque ab antiqua & celebri Philosophia defecisse, qui contrarium pertinaciter asserunt. Sed videmur parum auctoritatibus & rationibus nostris urgere, nisi contrarias dissoluamus. Diluenda igitur sint aduersariorum rationes singulae. Atque ut ab Hippocratis auctoritate initium sumamus, cum ab hoc Medicum patere nefas sit descivisse, verborum illius vim & dicta sic interpretari consuevit.

Dum ἀραιὸς ἀρὰ καὶ ἐπὶ τὸ πλεονάζον τὸ γυναικῶνα, rariore carne preditam mulierem scribit, raritatis nomen usurpat κατὰ τὴν ἰατρικὴν, pro eo quod laxum est & molle, non pro eo quod foraminibus peruium est. Ita enim rarius est magisque peruium viri corpus, propterea & facilius & liberalius sudat. Sunt ergo rariiores mulieres, id est, laxiores mollioresque, quod libello ἀδ' ἀδ' ἐν τῷ ἀννοτάτω: ἀνὰ γὰρ καὶ οἱ δὲ λόγος καὶ σῆμα, καὶ μαλ' ἔς, καὶ τὸ ἄλλο σῶμα τοῖς γυναικῶσι χαυῖα καὶ μαλακά ἐσσι, &c. Costat & pectora, & mammas;

& totum mulieris corpus laxum ac molle esse. Et paulo ante (suprà enim sic scripsit) τὸ δὲ ἄρ' ἢ ἐν τῷ σῶμα ἐστὶ καὶ οἷον ἄμα ποχνὸν καὶ ὀρεόντι καὶ ἐπαφομῶν. Τὸ δὲ θῆλυ ἀραιὸν καὶ χαυῖον καὶ οἷον ἢ ἐν τῷ σῶμα ἐρεόντι καὶ ἐπαφομῶν; Mas enim plenus est & velut pallium densus & videnti & tangenti: femina verò rata & laxa, & velut fluida & videnti & tangenti.

At laxitas defectum caloris arguit, qui humidum superfluum concoquere & dissolvere non potuit. Soliditas contra ex perfecta assimilatione alimenti optimè cocti & resoluti oritur: mares autem solidiores carnes habent. Dum mulieres plus alimenti trahere scribit Hippocrates, tractionis nomine abutitur etiam, pro eo quod est excipere & continere: cum enim laxius sit mulierum corpus, plus excipit continetque sanguinis. Atque hanc esse Hippocratis mentem colligo ex eiusdem contextu. Illustrat enim sententiam hanc eleganti similitudine. Si quis, inquit, molliores lanas, & vestem optimè contextam eiusdem ponderis sub Dio ponat, lanas grauiorès multò comperiet, quia laxiores & molliores lanæ plus excipiunt continetque humidum: ita verisimile est, laxiores mulierum carnes plus sanguinis excipere & continere, quàm solidas virorum. Quod autem scriptum legitur eodem loco, calidiores esse mulieris sanguinem; proptereaque viro calidiores, id à scholastico quodam adiectum puto; neque Hippocraticum. Ita alias publice interpretantur Eudoricum Duranum præceptorem meum longè doctissimum audiui, cum quod idem sentit Christophorus à Vega, Commentariis suis in Hippoc. Prognostica. Quare Cordes interpretationem probare non possum, qui suppressum sanguinem prohibet à transpiratione extraneum & febrilem calorem induere putat, proptereaque calidiores esse virorum sanguinem.

Nam inepta foret, & Hippocrate indigna mulieris morbose cum viro sano collatio. Quod si viris que sexus morbo si sanguinem conferas, intensior erit maris quàm femine calor, quia siccitatem habet comitem: siccitas autem apud Auerroem, est lima caloris. Ita Hippocratis auctoritati satisfactum puto. Nunc rationum momenta expendamus; ponderemusque diligentius. Pulsus habent frequentiores femina, ergo calidiores; quia frequentia à calore. Respondemus frequentiores esse pulsus, non ab intensiore calore, sed propter organorum angustiam. Cum enim exiles & angustæ arteriæ, crudorum & frigidorum humorum copia oppressæ, tantum extendi & dilatari nequeant; quantum eorum calor licet debilis postulari, merito aequandè huius necessitatis gratia maiori quàm in maribus opus fuit. & velocitate & frequentia. Sic paruitatem pulsus ob angustiam organi, frequentia & velocitate compensat Natura. Virorum autem pulsus validi sunt, ob facultatis robur, & magni; quia in omnem dimensionem extenditur arteria amplissima. Quæ verò de animosa & irascibili facultate obtruncant, ita dissoluenda sunt. Aliud est apud Hippoc. & Gal. ὀξύθυμα, aliud θυμὸς, aliud iracundia, aliud ira. ὀξύθυμα, seu iracundia, pusilli animi est affectus, qui loci

Solentur in contrarium adducite rationes.

Enodatur Hippocratis locus.

Quomodo intelligendum sit, mulierem carnes habere rariiores.

Quid per tractionem intelligat Hippoc.

Reuerendus Hippoc. locus.

Cordes interpretationem non probatur.

Cur mulierum pulsus frequentiores.

Mulieres nam esse animosiores. Iracundia à frigida.

de causa

de caussa exardescit nec sibi imperat. Tales sunt mulieres, pueri, & viri partu fortes: θυμώδεις vero seu irati, intelligitur magnanimi. Galenus com. 2. in lib. 1. Epid. ὀξύθυμους, iracundos, opponit θυμώδεσι, iratis, quod θυμώδεις; ἀνδρείοι sint, virili animo, & rerum humilium contemptiores: at ὀξύθυμοι, μικρόψυχοι. Horum diversa est temperies, iracundi enim frigidi sunt: irati vero calido temperamento. Si itaque iracunde sunt mulieres, id habent à temperie frigida & à mentis impotentia, quia sibi nequeunt temperare. Dum Gal. in Arte parua, ὀξύθυμολα signum statuit calidi cordis, abutitur nomine τῆς ὀξύθυμίας. Esse autem ὀξύθυμίας signum frigidi habitus, docet Hippocr. sect. 4. lib. 6. Epid. οἱ θερμοκόλλιοι, ψυχρόσαρκοι, καὶ λεπτοὶ, αὐτοὶ ὑπερβίοι, καὶ ὀξύθυμότεροι. Qui ventte sunt calido, carnes habent frigidas; tenues sunt, venosi & iracundi. Sunt ergo iracunde mulieres, sed non animosa. αἰθυμοτέρη φύσις ἢ γυναικῶν, inquit Hippocrates libello De morbis virginum; abiecti est animi muliebris natura. Quod autem in rapacium animantium genere fortiores esse fœminas contendunt; dicimus fœtum charitatem illis animos addere. Itaque ferociam potius id appellare liceat, quàm fortitudinem. Sunt animalia quedam, quæ propter amentiam præbent speciem generositatis, ut elephantis fœminæ. Sunt quibus peioris conditionis metus audaciam creat; tales panthera sunt. In cane partim fides, partim inuidia parit feritatem. Dic ergo morosiores & ferociiores esse fœminas, sed non fortiores. Iam vero quæ de naturalium facultatum, auctricis, procreatrix, & altricis robore obtrudunt, leuissima sunt. Celerius aiunt, & incrementa sua capessunt & procreant fœmina, ergo calidiores; imò temperamenti frigidi hac ceratissima sunt indicia. Celerius enim & crescunt & generant, quia finem habet propinquiorem, ob debiliora vitæ principia. Ut enim brevis morbus celerrimè sua quatuor percurrit tempora; ita cùm brevioris sint vitæ mulieres, quia frigidiores, celerius pubescunt, adoleſcunt, & senescunt, quàm mares, & Aristoteli cap. 6. lib. 4. De generatione animal. minora omnia & imbecilliora, ut in Artis, ita & in Naturæ operibus, celerius ad finem deveniunt. Quod salaciores sint fœmina, id ob impotentiam mentis contingere existimamus: est enim libidinosarum imaginatio, brutorum imaginationi similis; quippe quæ rationem repugnantem non habeat. Sic bruti homines, non quia ceteris calidiores, salaciores sunt; sed quia bruti. Coeunt bruti, non ut generent; sed ut libidinentur. Sapientes coeunt, ut ne coeant. Quod testes abdito habeant fœmina, id frigidam arguit temperiem: quia enim frigidi erant testes, occultari debuerunt. Postremo plus quidem sanguinis habere mulieres concedimus, sed non plus generare: plus autem sanguinis congerunt, ob earum temperiem frigidam, quæ alimentii reliquias discutere nequit. Adde quod frigidior est & crudior mulierum sanguis. Concludamus ergo mares in uniuersum fœminis esse calidiores & natia repperie & adſcititia, victus quippe ratione & vitæ instituto.

Non esse feriores fœminas sed morosiores ferociioresque, & cur.

Cur fœmina celerius crescat & generet.

Cur salaciores fœmina.

Plus congerit mulier sanguinis, quia minus digerit.

HISTORIA ANATOMICA.

De principiis generationis, semine & sanguine.

CAPVT II.



V M teste Philosopho omne quod gignitur, ex aliquo, & ab aliquo generetur, præclare ad animalis generationem principia duo concurrere, semen & maternum sanguinem, à veteribus est enuntiatum. Semen principium est, à quo, tanquam efficiente & opifice, fit cōformatio, & ex quo, tanquam materia, spermaticæ partes generantur; sanguis verò materiæ solius & passiuæ principij (liceat vocabulis vti scholasticis, quia ἐμψυκατέρως

Duo principia generationis.

rem exprimunt) rationem habet. Ex eo enim & generantur carnosæ partes & nutriuntur, rum spermaticæ, tum carnosæ. Vtriusque principij ratio obscurissima est, quam nos in hunc modum explicare tentabimus. *Γονή, σπέρμα, ζεύς, semen, genitura,* apud Hippocratem sæpè vnum idemque denotat. Aristoteles aliquando distinguit. Nos, quia verborum aucupes non sumus, nunc semen, nunc genituram vocabimus. Eius varix traduntur definitiones. Ego semen definitio, corpus humidum, calidum, spumosum & album ex reliquiis alimèti vltimi & spirituum vbique oberrantium permistione vi testium excoctum elaboratumque ad perfectam animalis generationem. Definitio hæc, formalem, materialem, efficientem, & finalem feminis causam eleganter exprimit. Humiditas, caliditas, spumofitas & albedo, formam designant. Humidum semen est & *δυνάμει & ουσίαν, viribus & consistentia*. Errauit ergo Cresias Artaxerxis Regis Medicus, qui semen elephati vsque adeò siccescere putabat, vt electro simile esset. Humidum autem esse debuit, rum vt ab agète faciliè terminari posset; tum vt particularum omnium ideam formamque specificam contineret. Calidum est, vt educat formas illas; frigus enim non ingreditur generationem nisi per accidens. Spumosum est, spirituum permistione & motu: vnde à Poëtis Venus *ἀφ' ὧν* dicta, ex spuma equoris nata fertur; & effusum semen statim minuitur exhaustis spiritibus; puerita verò & mucus eandem molem diutius seruant, quia perexiguos habent spiritus. Album est, tum quia in testibus & spermaticis vasis excoquitur, quorum interna superficies albescit, tum quia aëris & spirituum in se habet plurimum, vt audiendus non sit Herodorus, qui Æthiopum genituram atro colore infectam voluit. Materia feminis duplex est, residuum alimenti vltimi & spiritus. Residuum illud sanguis est, non in solidis partibus alteratus & dealbatus, vt existimarunt veteres, sed ruber, purus, & sincerus, à trunco venæ cavae per spermaticas venas ad præparantia vasa & testes delatus. Propterea iis qui supra modum rei veneræ indulgent, cruentum plerumque prodir semen, interdum etiam sanguis purus. Et Soranus semen ex sanguine fieri voluit, propterea veteres, cognatos appellabant consanguineos. Est altera feminis materia, quæ facit vt fecunda sint semina, spiritus scilicet per vniuersum corpus oberrantes, qui singularum partium ideam speciemque *δυνάμει* continètes (aërei enim sunt humidique, alienam formam suscipientes faciliè) per arterias spermaticas ad vasa labyrinthea, epididymida & testes feruntur. Ibi cum sanguine exquisitè miscentur, & ex duobus vnicum fit corpus, vt ex vena & arteria spermaticis in mirabili illo plexu, vnicum fit yas. Duplicem hæc feminis materiam agnouit Hippocrates, dum semen nunc igneum, nunc aqueum vocat; igneum est ratione spirituum *ἐν ορμαίντων*: vnde etiam *γονή διπλή*, dicitur turgens. Ratione sanguinis & corpulentix (date hanc vocem Philosopho) aqueum dicitur. Extat ad eius rei illustrationem locus perelegans i. De diata: *Εστὶ πᾶσι τὰς ἀνθρώπων ψυχῇ, πῦρ & καὶ ὕδατος ἐξ ἑκαστοῦ ἔχουσα. Irrept in hominem anima, ignis & aquæ commodationem sortita. Per animam semē intelligit, quod alibi *ἐμψυχον* vocat, id est, *animatum*; per ignem, spiritus & calidum innatum; per aquam, humidum alimentarium, sanguinem puta. Ignis, inquit, omnia per omnia mouet; aqua omnia per omnia nutrit. Habita duplicis huius materix ratione, semē vtriusque principij naturam sortitur, materialis quidem ratione crassioris corporis & crassamenti, ex quo spermaticæ partes generantur; efficientis verò & formalis, ratione spirituum quibus vndiquaque perfunditur. Dixi, efficiens & formale principium appellari semen; quia efficiens & forma sunt quidem duo*

Seminis definitio.

Forma feminis.
Humidum semen quomodo.

Calidum cur.

Spumosum cur semen.

Cur album.

Materia feminis.

Materia feminis spiritus.

Quomodo igneum semen.
Quomodo aqueum.

Expositio loci Hippocratis i. De diata.

Quomodo semen sit efficiens & materiale principium.

auctores λόγῳ, id est, ratione, ar re non differunt. Nam forma quatenus per totam infusa materiam, facit esse hoc quod est, αἶδος appellatur & ἐντελέχεια: quatenus verò afficit, mouet, disponit, constituit, exprimit materiam sibi pro apto domicilio, ἐνέργεια, καὶ τὸ ποιεῖν dici potest. Semen ratione sui corporis à vasis tantum effluit: ar spirituum, qui per vniuersum corpus oberrant & vagantur, ab omnibus corporis partibus manare potest. Hæc itaque est seminis materia duplex, sanguis & spiritus. Efficiētes & auctores seminis soli sunt testes. Iis solis vim ἀπέρματος ποιοῦντι καὶ primò & per se concedimus, vasis autem spermaticis secundariò, per τὸ πρὶν ὅλῳ scilicet, hoc est, influxum & irradiationem testium. Postrema definitionis nostræ particula finalem seminis causam designat, generationem scilicet animalis, & testium nutritionem. Est itaque ἐσιώδης, perfectà hæc definitio. Semen porrò duplex est, quicquid garriant Peripatetici; alterum maris, alterum fœminæ: quia in vtroque sexu organa sunt præparantia, excoquentia, deferentia, eadem in coitu obscenarum partium titillatio, eadem voluptas, sed maris semen τὸ πρὸν ἔχει ἀρχὴν ζωῆς: fœminæ verò δυνάμει. Maris semen maiorem efficiendī vim habet, quàm fœminæ, vtrumque tamen fœcundum, & ad generandum præpotens. Rursum in vtroque sexu duplex agnouit semē Hippocrates I. De dietâ: alterum robustius & calidius, alterum debilius & frigidius. Illud masculineum, hoc fœmineum vocat, ex quorum variâ permissione & victoria, mares fœminæque generari vult. Atque hoc primum esto generationis principium.

Forma & efficiens ratione solida distinguuntur.

Quomodo ab omnibus corporis partibus semen fluat. Efficiens & auctor seminis.

Finalis causa.

Semē duplex, alterum maris, fœminæ alterum.

In vtroque sexu duplex semen apud Hippocrat.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

Quid sit semen.

QUEST. III.

QUO epitheto Homerus solebat afficere loca montibus subiecta, cum τὸ πρὸς τῷ τῷ appellat πολυπίδακας, habentia multas scatutrigines, eodem titulo affici poterit nostra hæc de semine disputatio. Erit enim læta, vi opinor, & multis fontium scatutriginibus irrigua. Atque vi singula ordine percurram: quid vox ipsa denotet, primum explicare aggredior. Γόνῃ καὶ ἀπέρματι, id est, semen & genitura apud Medicos vnum & idem sonant. Scripsit Hippocrates libellum περὶ γόνις, & Galenus περὶ ἀπέρματος. Geniturâ suo libro ἀπέρμα passim vocat Hippocrat. καὶ ἔστιν, inquit, ἐν τῷ ἀνδρὶ, τὸ γῆλυ ἀπέρμα, καὶ τὸ ἀρσεν καὶ ἐν τῇ γυναικὶ ὁμοῖος: id est, inest vt in viro, ita & in muliere semē virile & muliebri; & Galenus cōment. ad Aphorism. 62. sect. 5. ἀπέρμα ὁνομαζώμενον καὶ γόνιν, καὶ γόνον, semen vocamus genituram. Aliquando θορὴς Hippocrati semen est genitale, & genitura lib. 2. De morbis: περὶ ἑρχεται θορὴς πολὺς καὶ ὕγρῃς; proditi ipsi semen genitale multum & liquidum. Galenus tamen comm. in 1. Progn. θορὴν & ἀπέρμα distinguit; quòd θορὴς propriè ἔστι ἀπέρματος ἐκκρεσις, seminis excretionem potius denotet. Aristot. cap. 18. libr. 1. De gener. anim. genituram à semine distinguit, quòd genitura ens sit imperfectum, & alterum tantum generationis principium; semen vero ens perfectum ex duobus principiis constitutum. Nobis nihil interest, geniturâne an semen vocet, licet frequentius sit magisque usitatum seminis nomē, quàm genitura. Seminis naturam nemo adhuc, quod sciam, definitione perfectâ & ἐσιώδῃ expressit. Hippocrates libello De genitura, semen definit, portionem quandam optimam atq; validissimam vniuersi illius humoris, qui in toto corpore continetur. Pythagoras ἀφ' ἐν ἑξ ἑκαστοῦ αἵματος, spumâ

Semen & genitura idem.

Θορὴς seminis excretionem denotat.

Aristoteles semen à genitura distinguit.

Verâ seminis definitionem. D'efinitio Hippocrat. Pythagoras.

Platinus. optimi & laudabilis sanguinis. *Plato*, τὸν δὲ πῶτα αἷμα μὲν ἐξ ὧσιν ῥ. οἷον, medulla spinalis defluxum. *Alcmeon*, cerebri portiunculam: *Zeno Citiensis*, πνεῦμα δ' ἀνδραίνον δὲ μετρίσιν μετ' ὑγρῶν, ψυχῆς μέγας ἀπαραγματο: hominis spiritum, quæ cum humido emittit, partis animæ spoliū. *Epicurus animæ & corporis fragmentum.* Verum quidam semen definiunt; πνεῦμα ἐνδεσμῶν, ἐν ὑγρῶ ἐξ ἑαυτῆς κινηθέντων; καὶ διὰ τὸν ποτὶ τοῦτο ῥ. οἷον; ὅσιν αἶμα δ' ἐξ αἵματος ἀφ' ἧς ἀφ' ἧς: spiritum calidum in humido per se mobilem, qui tale generare potens est, quale est equo emittitur. *Aristoteles semen definit*, excrementum alimenti ultimi partium solidarum, interdum αἷμα καὶ σπέρμα, excrementum vile. *Fernelius*, id ex quo primo oriuntur ea quæ secundum naturam constituuntur, non ut ex materia, sed ut ex efficiente principio. Verum nulla est harum definitionum quæ seminis naturam exprimat. Priores quinque absurdissima sunt, nolo igitur in illis conuellendis diutius immorari. *Aristotelis* definitio seminis tantum materiam, residuum quippè alimenti ultimi, designat, sed formam: & efficientem non delineat, neque totam seminis materiam exprimit; quia, ut mox demonstrabitur, seminis duplex est materia; sanguis & spiritus. Itaque semen dicere excrementum alimenti ultimi idem est, ac si semen definias sanguinem: quo quid absurdius? *Fernelij* definitio neque seminis formam, neque materiam explicat; & semini vim tantum efficiendi tribuit; cum ipsum etiam materiale sit principium. Perfecta, ni fallor, & numeris suis omnibus absoluta hæc à nobis tradetur. Semen, corpus est humidum; spumofum; & album, ex reliquiis alimentum ultimi & spiritum ubique oberrantium permitione, vi sola testium excoctum elaboratumque, idque ad perfectam animalis generationem. Exposui in historia singulas definitionis particulas, hic materiam seminis paulo accuratius persequar. Materiam seminis duplicem agnosco, excrementum alimenti ultimi, & spiritus. Excrementum esse docet *Aristoteles* eleganti inductione. Quidquid in corpore continetur, aut pars corporis est, aut alimentum, aut colliquamentum, aut excrementum; Semen nec pars corporis est, nec alimentum, nec colliquatio; erit igitur excrementum. Pars non est, quia ex eo permanente nihil constituitur: adde, quod si pars esset, quoties profunditur semen, toties mutilum esset animal: Non alimentum, neque enim excerneretur. Multò minus est colliquatio: nam colliquatio, res est præter naturam, semen quid naturale. Quæ pinguis sunt, magis liquantur: at obesi & pingues parum habent seminis. Colliquatio ab omni humido fit, nec propriam habet sedem; semen propria habet conceptacula. Colliquatio lædit semper; at inuit interdum seminis excretio. Erit igitur semen excrementum; sed quale? In omnibus animalibus visus pars excrementum duplex omnino est; alterum naturaliter constitutum & vile, alterum inutile. Illud alicui est rei aut alenda parti, aut prae suscipiende, & gignende & nutriende vile, ut docet *Galenus* comm. ad *Aph.* 39. lib. 5. hoc tanquam dissimile, assimilari nunquam potest. Illud sola copia superfluit, & quantitate sola excrementum dicitur; hoc qualitate tota noxium est. Chylus qui fit in ventriculo; ipsi ventriculo elaboranti graciosus est, sed tandem tanquam superfluum quid in intestina detruditur: ita quod ventriculi fuit excrementum, fit hepatis alimentum. Sanguine satiatum hepar; quod reliquum est, tanquam redundans, pellit in venas maiores, sic hepatis excrementum, hoc est, superfluum, singularium partium conueniens fit alimentum. Sanguine saturata partes & carnosæ, & solidæ, quod reliquum est, tanquam redundans, relinquit in venis. Reliquia hæc sensim & paulatim trahuntur à testibus, tandemque in seminis naturam accessum. Hac ratione semen excrementum dicitur alimenti ultimi, quia ex reliquiis alimentum generatur. Residuum autem illud sanguis est, non à partibus solidis immutatus, alteratus & dealbatus; nam semini candorem sola spermatica vasa & testes concedunt; sed ruber & purus sanguis à trunco vena cava per spermaticas venas delatus. Argumento est, quod pueri & decrepiti semen non emittunt.

tant, quia his nulle super sunt reliquiae, & iis, qui supra modum Veneri indulgent, cruentum plerunque prodit semen, à testibus quippe & vasis spermaticis nullo modo alteratum. Est altera seminis materia nobilior, quae facit ut fecunda sint semina; spiritus quippe per arterias spermaticas delati, qui ignei, aëreique per uniuersum corpus oberrantes, singularum partium ideam in se continent; neque solis alterius sexus formam, sed & τὸ πᾶν ὡς ἑαυτὸν μὴ ἴσας, fatalem viuendi & moriendi necessitatem habent. Horum spirituum ratione, efficiens & formale principium appellatur semen. Est enim spiritus, idoneum & immediatum Natura instrumentum, quo nobilis illa architectrix membranas extendit, canales in longum producit, & velut sufflatione quadam perforat. Hæc itaque duplex est seminis materia, sanguis & spiritus. Hinc duplex apud Philosophos seminis natura; aërea altera & spumosa, altera aquea & diffuens. Quā aëreum semen est, nunquam congelatur; quā aqueum, statim sub Dio positum, cum spiritus euauerit, liquefit. Et Aristoteles Problēm. 51. sect. 1. semen scribit præ se ferre naturam pituitæ & aquæ, non specie sed colore. Nam cap. 2. lib. 2. de generat. animal. eos refellit, qui semen omnino aqueum affirmabāt, quia & album est colorem aquæ referens, & refrigeratum ad aquæ speciem reddit. Diuersa (inquit) est aquæ & seminis natura, aqua enim non crasse fit calore ut semen, aquea omnia frigore concresecunt, semen sub Dio humescit. Duplex hæc materia, in plexibus illis labyrinthicis permiscetur, in quibus vena arteriam, arteria venam ingreditur, fitque præclara illa & tantopere celebrata vasorum anastomosis. Atque ut ex duobus vasis, vena & arteria, vnicum fit vas; ita ex duplici materia, sanguine & spiritibus, vnicum fit corpus. Sanguis & spiritus ita permixti, rudimentum aliquod seminis in præparandis illis vasis consequuntur, non tam insita vasorum vi, quàm per τὸ πᾶν ὡς ἑαυτὸν irradiationem testium. In epididymide tandem & testibus excoquitur ut propria & insita testium, quorum substantia rara est, cauernosa, & friabilis, à quibus postremo in eiacularia vasa pellitur, tanquam redundans quid, & peculiare testium excrementum. Ex quibus cuilibet obuium apertumque fit, fecundum & prolificum semen à solis testibus excerni, non ab uniuerso corpore, ut sequenti exercitatione demonstrabitur.

Spiritus quo infusus in semine.

Seminis duplex natura, ignea & aquea.

Quomodo duplex seminis materia permiscetur & excoquatur.

An semen ab omnibus corporis partibus sit deciduum.

QUESTIO IIII.

AMPLISSIMVS hic sese mihi ostendat, disputationis campus, in quo liberum est aliquantulum excurrere & spatiari. Antiquissima fuit opinio, semen ab omnibus corporis partibus manare. Hæc fuit summi Hippocratis libello De genitura, De morb. sacro, & De aëribus locis & aquis sententia. Illic enim semen manare vult δὸν παρὸς τὸ ὕψος, & ἐν σωματί τοῖς ὀστέοις, ab omni humido, quod in corpore continetur. Hic conceptis verbis: ὁ γόνος ἐκ ἑταίρων πᾶν τοῖς ἐν τῷ σώματι δὸν τε τῶν ὑγίων καὶ ὑγίων, δὸν τε τῶν νοσούντων νοσούντων: semen ab omnibus prodit partibus; sanum quidem à sanis, ægrū ab ægris, unde mutuli mutilos generant, calui caluos, lienos lienos, &c. Confirmatur hæc opinio quatuor rationibus. Primum, quod in coitu totum corpus oblectetur, & volupate gestiens quasi conuellatur. Unde coitum Democritus paruam appellat epilepsiam. Deinde, quod ex claudis claudi, ex mutilis mutili generentur; hinc morbi hereditarij. Terriò, quod uniuersū corpus ab immodica Venere exoluatur, marcescat, cōtabescat. Postremo, quod nati omni ex parte parentibus sint similes. Exstat commemorabilis historia puelli cuiusdam in Chalcedone, qui stigmata patris brachio dextro inusta; in eodem brachio statim à primo ortu expressa habuit. Verum conuellitur hæc opinio ab Aristotele 1. De gener. anim. cap. 17. & 18.

Semen ab omnibus partibus manare; opinio Hippocratis.

Confirmat & rationibus. Ratio 1. Secunda.

Tertia. Quarta. Historia elegent. Conuellitur hæc opinio ab Aristotele.

Respondetur
rationibus.
Ad primam.

multis, iisque validissimis rationum momentis, quæ hîc transcribere non lubet. Alias etiam subiungit Fernelius cap. 2. lib. 7. Physiol. ad quos studiosum relegandum censeo. Sufficiet hoc loco eorum rationes eludere. Voluptatis & titillationis uniuersa ratio nulla est: nam & in pruritu totum corpus titillatur, at unica pars pruriginè afficitur. Quinetiam si idè perciperetur voluptas, quia semen à toto effluit non à deos, sed sensim, dum ab una in alterâ partem semen illabitur, voluptas perferiretur: non enim credibile est, momentò à singulis partibus in testes & ejaculatoria vasa semen derivari. Aliam igitur voluptatis illius, quo uniuersum corpus gescit, in coitu causam agnoscimus; semen quippe calidissimum, spumosum, spiritu & calore undiquaque perfusum, quod dum genitales partes acerrimi & exquisitissimi sensus confertim suo motu titillat, & velut pruriginem infert, uniuersum corpus in sympathiam trahit. Vt enim affecta membrana, totum membranosum genus dolet, ita eiusdem titillatione totum gescit corpus & commouetur. Ex mutilis mutilis, ex claudis claudos generari non est perpetue veritatis. Nam & mutili plerique perfectos procreant mares, & deauriculatus deauriculatos non gignit. Quod in coitu totum corpus exsoluatur, & contabescat, id exhaustis alimenti reliquiis & spiritibus ab immodica Venere contingit, quibus reliquæ partes defraudatæ marcescunt, propterea scribit Auicenna, quadragesies plus dissoluere seminis, quàm sanguinis vacuationem. Postremò, quod de natorum similitudine obtrudunt, altioris est contemplationis, & suo loco disputabitur. Hoc tamen illis interea responsum velim, similitudinem non tam à materia seminis crassiore, quàm à vi formatrice singulis partibus insidente, testibusque tandem & semini, per spiritus influentes insitis maxime cognatos, communicata, manare. Explodatur ergo vetus illud dogma, quod semen ab omnibus partibus deciduum esse contendit. Sunt qui maximam seminis portionem à cerebro & spinali medulla deriuant. Hanc eorum sententiam auctoritatibus, exemplis & rationibus illustrabo. Auctoritas est Hippocratis lib. De genitura. Semen (inquit) è cerebro in lumbos & spina medullam diffunditur, ex qua in renes, à renibus per medios testes ad pudendum peruenit. Lib. De ossium natura, scribit venas è capite, sphagitides, iugulares dictas, ab utroque latere procedere in testes, eoque semen deferre. Itaq; à cerebro ad testes duplicem statuit seminis viam Hippocr. spinalem medullam & venas ponè aures. Plato in Timæo semen definit τὸν τῆς νωτιαίου μυελῆς ὁρμήοντα, medullæ spinalis defluxum. Alcmeon, cerebri portunculam. Vnde vulgus cerebella ossiumque medullas ad seminis generationem conferre credit. Extant elegantes historie ad huius rei confirmationem, lib. De aëribus, locis & aquis. Prima est τῶν μακροκεφάλων; altera Scytharum. Erant olim apud Europæos quodam macrocephali magno in pretio, & quibus longum erat caput, hi illustres & generosi habebantur. Itaque solebant nutrices capita puerorum mollia, fasciis in longum obductis comprimere & elongare: tandem, quæ prius talia erant consuetudine, natura & conformatione euadebant oblonga, & ex macrocephalis macrocephali generabantur. Scythæ verò cum nullam equitandi rationem haberent, & sine stapedibus equitaret, coxendicis dolore ferè omnes torquebantur: cui morbo ut auxiliarentur, venas ponè aures sibi pratundi iubebant, quibus exetis sterilecebant, præclusis (interpretabantur quidam) semini à cerebro prodeunti viis, obducta cicatrice. Ad quam historiam fortasse alludens Iuriconsultus quidam scripsit, lattonibus aures præscindi, ne latrunculos generent. Prodit ergo maxima seminis excocti & fecundi portio à cerebro & spinali medulla. Hoc rationibus leuioribus suaderi potest. In coitu maxime afficitur cerebrum, spinalis medulla, & oculi, & sæpè ab immodica Venere, ut observat Hippocr. in Epid. & lib. De internis affectibus, tabes contingit νωτιαίος, dorsalis. Memorat Albertus Magnus cuidam petulantissimo & libidinoso histrioni, dissecto post funus capite, exiguam cerebri portunculam reperiã. Præterea ab immoderato coitu contingit caluities: at caluities ab inopia humoris est calidi & pinguis, quem immoderatus

Voluptatis
causa in coitu
explicatur.

Secunda ratio
opponatur.
Tertia soluitur.

Quarta satis-
fit.

Altera opi-
no eorum qui
à cerebro semi-
deriuant.
Auctoritate
confirmatur.

Historia.
Macrocephali
macrocephalos
generabant.

Scythæ venas
ponè aures
secabant.

Rationibus
demonstratur
à cerebro &
medulla ma-
nare semen.
Ratio prima.

Secunda.

exhauit coitus, & nemo (inquit Aristoteles) ante Veneris vsum caluescit. Hoc mil-
 lies Cæsari, ob densas Gallias triumphanti, exprobratum: Urbani seruare vxores, mæ-
 chum caluum adducimus. His itaque & rationibus & historiis & auctoritatibus per-
 suasum plurimum semen à cerebro ad testes manare putant. Qua de re quid sentiam, auda-
 cter proferam. Beatissimum, fateor, & planè diuinum Hippocratis fuit ingenium, quod, ut
 scribit Macrobius, nec fallere nec falli vnquam potuit. Est tamen hac in re excusan-
 dam, quia suis temporibus rudis erat & ferè incognita secandi ars. Itaque multa quæ ad Ana-
 tomen spectant, publicis consignauit monumētis, quæ nec intelligi nec explicari à nobis possunt.
 Nulli sunt, mihi credite, à cerebro & spinali medulla ad testes ductus conspicui, nisi fortasse
 exigui neruuli, qui spirituum tantum, non seminis sunt delatores: neque etiam à ingulari exte-
 na ad testes feruntur rami, nisi ea ratione quæ venæ omnes continet sunt. Absurdum igitur
 est existimare à cerebro per eas venas, quæ ad aures excurrunt, ferri ad testes semen excoctum
 elaboratumque. Quam verò Scytharum historiam obiciunt, qui resectis iis quæ ponè aures
 sunt venis statim sterilecebant; veram, ni fallor, sterilitatis illius causam ignorasse videtur.
 Putant quidam, præsectis illis venis, præcludi statim semini vias, obducta cicatrice: voluit
 Auicenna id fieri intercepto aditu spiritui animali: alij arteriam secari existimant, unde vi-
 tali spiritui aditus prohibeatur. Sed ineptissima hæc & parum Anatomica. Namque vene
 illæ & arteriæ, quæ ponè aures apparent, externa sunt. Adsunt interna vasa insigniora per
 foramina cranij ad cerebrum excurrentia, quibus tanquam riuis, cerebrum irrigatur; per
 quæ potius quàm per exteriora illa cerebrum non attingentia, semen præterfluere. Sed demus
 per exteriores venas ferri semen, an cicatrix aditum præpediet? & vias semini an spiritibus
 intercludet? Minimè gentium. Si enim crassior sanguis per vasa hæc fluit & refluit, cur se-
 men spiritibus surgens eadem non permeabit? Alia ergo sterilitatis inquirenda est causa,
 quàm viarum interceptio. Ego sanè ex Hippocrate sterilitatis illius causas agnosco tres, equi-
 tationem frequentem, dolorem ischiadicum, & nimiam sanguinis, ex venarum sectione pro-
 fusionem. Equitatio frequens lumborum, renum & partium spermaticarum robur excoluit:
 ut equitabant continuo Scythæ, & sine stapedibus. Quod autem cerebrum equitatio sterilitatem
 pareret, docet Hippocrates loco citato, quia, inquit, τὸ τοῦ πύχρονος Σκυθῶν οἱ πλείστοι,
 ὅσοι καὶ οἱ, ἀλλ' οἱ εὐχρηστατοὶ καὶ ἰσχυροὶ πλείω καὶ ἐν μέρει δὲ τὸ ἐπὶ τῷ
 αἵματι οἱ δὲ πλείοντες ἢ ὅσον, ὅσοι ἐπὶ τῷ αἵματι οὐκ ἔστιν. Inter Scythas diuissimi & nobiles ma-
 rime afficiebantur, minimum vero infirmi: & qui genere ac robore illustres erant,
 ob equitationem hæc patiebantur; ignobiles verò minus, quia rarò equitant. Ex
 crebra & frequens equitatio ischiadico dolore corripiebantur, quæ secunda est sterilitatis
 causa. Nam nihil æquè corpus infirmum facit, & ad infirmitatem humorum adiungit cor-
 ruptionem, ac dolor. Ut autem ischiadico dolori mederentur, venas ponè aures sibi pertun-
 dabant, ex quibus copiosissimus sanguis manabat. Hinc tertia sterilitatis causa. Ex im-
 modico enim fluxu sanguinis, qui nature thesaurus est, refrigerabatur cerebrum pars prin-
 ceps, in cuius sympathiam cor & hepatis statim irabebantur: hinc semen aquum, sterile &
 infecundum. Partes siquidem principes tanta conspiratione inter se aptè connexæ sunt;
 ut earum una intercidente, reliquæ pariter emoriantur. Quod refrigeraretur cerebrum ex
 immodico fluxu, explicat Hippocrates his verbis: Οὐκ ἔστιν ἀρχηταὶ ἢ νῆσος ὁπισθεν
 ὅτις ἐκαστὸν φλέβη τὰ μνησιν, ὅταν ὁ δόσος ῥ' ὁλὸν τὸ αἷμα ὑπνος ὑπολαμβάνῃ
 καὶ αὐσθηνέας καὶ καθεύδουσιν. Dum incipit morbus, utraque venas quæ ponè
 aures sunt, secant, statimque liberali proruto sanguine, obrepit somnus præ
 imbecillitate. Ex quibus patet sterilitatis causam non esse viarum præclusionem, sed crebram
 equitationem, dolorem ischiadicum & cerebri refrigerationem, ab immodico sanguinis fluxu.
 Quæ de macrocephalis afferri solent, vim quidem formatricem à cerebro ad testes manare

Excusatio
Hippocratis.

Nullæ sunt
viæ à cerebro
ad testes quæ
semen deferant.

Sterilitatis
Scytharum
causam inca-
gnita.
Cannelluntur
quæ putant in-
tercludi semi-
nis vias.

Tres causas
sterilitatis.

Prima, equi-
tatio frequens.

Tertia refriger-
atio cerebri
ab immodico
sanguinis fluxu.

De macroce-
phalis.

Opinio Empedocle.

Opinio eorum qui à solidis tantum partibus manare semen putant.

Opinio Epicuri à tribus principibus partibus manare putantis.

Elegans mythologia.

Opinio nostra, à solidis testibus manare.

Quæstio.

Solutio.

Opinio nostra, à solidis testibus manare.

ostendunt; sed semen album à cerebro ad testes fluere non consuevit. Quod autem in cona maximè afficiantur cerebrum & spinalis medulla, idè contingere volumus, quoniam mollior eorum substantia celerius exhauritur, minisque tractioni testium resistit. Adde, quod cerebrum extremum est, eoque cessat testium vis trahens. Empedocles, ut scribit Galenus cap. 3. lib. 2. De semine, non à toto manare semen voluit, sed ab alterutro parente mediam partem tantum; à patre quidem præstantiores partes, à matre ignobiliores. Sed in istis negis consuellendis non est quod immoremur. Fuit quorundam opinio, à solidis omnibus partibus semen album decidere, ab istis per minores venas regurgitare in maiores, & nubesque sedimentique instar, reliquis humoribus innatare, tandemque testium insita vi trahi. Hoc consuevit eleganter Aristoteles locis citatis, & Galen. libris De semine. Princeps Arabum Auicenna à tribus principibus partibus, cerebro, corde, hepate, seminis materiam ad testes defluere contendit, quem sequuti sunt iuniorum quamplurimi. Neque etiam Poëtis incognita fuit hæc Philosophia; sed eam ne communis esset, & vulgi tractione ac impari meritis contaminata sordesceret, obscuris fabularum inuolucris & integumentis, quasi aliquid sacrosanctum, velarent. Magnum enim se facinus admittere existimabant, si Philosophie arcana in vulgus temerè euertiarent. Itaque fingunt Venerem cum Marte coeuntem respici à Mercurio, Neptuno, & Apolline. Apollo suis radiis tanquam vinifico nectare eos illustrat. At Apollinis nomine cor intelligunt, cuius tanta est cum Sole affinitas; ut solem cor mundi, & cor solem hominis appellarint. Neptunus, cui maris & totius veli provincia delegata est, hepar iuxta & fontem gratiosi humoris refert. Mercurij varij & ingeniosi nomine cerebrum designatur. Tria igitur illa principia Marti cum Venere coeunti, id est procreationi nostræ præsum. Audiuistis veterum & Neotericorum dissidentes hæc de re sententias, superest ut nostram patefaciamus. Semen corpus illud humidum, spumosum & album, ex sanguinis & spirituum permixtione concoctum elaboratumque, à solidis testibus deciduum esse volumus, neque aliis partibus vim æquiuocantem in se, quam testibus eiusque vas concedimus. Cum autem seminis duplex sit materia sanguis & spiritus; sanguinem rubrum, nulloque modo à solidis partibus alteratum, è venis tantum deciduum esse credimus. Spiritus autem aëreos, tenuissimos, perniciat veloces per uniuersum corpus oberrantes, & eam quam cum in istis habent familiaritatem singularium partium ideam præ se ferentes, & vim earum formatricem deferentes; ab omni corpore ad testes influere existimamus. Et ea ratione fortasse, ab omnibus corporis partibus semen decidere dici potest. Verum quare aliqui, si à solidis testibus semen manat, quomodo exigui testes tantam faminis copiam concoquunt conficiuntque? Dico præclare à Naturæ institutum esse, ut partes officiales non modo conueniens & accommodatum trahant alimentum, sed etiam tam multum & copiosum, ut ad alios sufficiat usus. Sic hepar per venas mesenterij plus trahit sanguinis, quam in sui substantiam vertat. Sic cor spiritus gignit copiosissimos, non sibi soli sed toti. Testes itaque membra officialia & prima generationis organa plus trahunt sanguinis, quam ad peculiarem sui nutritionem sufficiat, & in seminis generatione laborant perpetuo.

Annu-

DE ſeminarū ſemine certant Peripatetici, & Medici. Galenus libris De ſemine, & 14. De uſu partium, controuerſiam hanc eleganter excuſit. Nos que ab eo fuſa & ampla verborum ſerie diſſeruntur, hic in epilogo, velut in certam ſummam, colligemus. Erant autem diſputationis huius tria capita: primo, rationes Peripateticorum proponemus; ſecundo, Medicorum ſententiam illuſtrabimus; poſtremo aduerſariorum rationes ſingulas diluemus. Ariſtoteles libris De generatione animal. mulieres ſemen nec habere, nec emittere contēdit, his rationibus: Quod abſurdum ſit exiſtimare, duplicem ſecretionem à ſamina fieri ſimul, ſeminis quippe & ſanguinis. Quod mulieres & voce, & pilis, & corporis habitu pueris ſimiles ſint: at pueri ſemen non proferunt. Quod interdum ſine voluptate & volūtate concipiant mulieres (Hiſtoriam profert Auerroes mulieris cuiuſdam, quæ in balneo concepit.) Quod ſamina mas ſit imperfectus, vim efficiendi nullam habens: ſed patiendi tantum. Quod denique ſi ſemen emitteret ſamina, cum alterum generationis principium, ſanguinem ſcilicet contineant, poſſent citra maris congreſſum ſotum edere. Adici contrā, ſeminas ſemen proferre validioribus rationibus conſciunt. Hoc primus voluit Hippocrates libro De genitura, & libris De diæta, ubi non modo ſemen in ſemina agnouit, ſed duplicem in utroque ſexu genituram, validiorem & imbecillioſiorem adſeſcripſit. Ariſtoteles etiam 10. De hiſtoria animal. ad conceptum, utriuſque ſeminis concurſum requiri, cogitur ſateri. Galeus hac in re ita ſpatiatur, ut poſteris gloriā omnem præripuerit. Ego certiffimis demonſtrationibus ſeminas ſemen generare conſciam. Primum conſtat inter Medicos & Peripateticos naturam nihil temere, nihil fruſtra moliri: ſed organa omnia ſemini procreando, excoquendo, & deferendo dicata in ſeminis reperiuntur: quid inde ſequatur, vident omnes. Preparantia vaſa quatuor ſunt, due venæ, totidēque arteriæ: excoquentia ſemen, teſtes ſunt: deferentia ſeu eiſculatoria duos in mulieribus omnia hæc admittunt. Anatomici omnes. Scio quid diſcant Peripatetici, in vaſis illis aqueum quid contineri & ſeroſum, ſed nihil excoctum, & eundem uſum conferre mulieribus teſtes, quem mamma viri præſtant. Verum quā miferè hallucinantur, audiant omnes. Si preparantia illa vaſa ſeroſum tantum & crudum continent humorem, quorſum tot gyris intorta, tot anfractibus implicata fuere? Nunquam plexus formauit natura niſi ad coctionem & elaborationē nouam. Adde, quod ſi aqueum tantum & ſeroſum humorem eructant vaſa illa, cur vena ſpermatICA arteriam ingreditur, & ex duobus vaſis vnicum ſit vas, ut in maribus? Annon ut duplex ſeminis materia permiſceatur, & ex ſanguine ac ſpiritibus vnicum fiat corpus? Teſtum verò in ſeminis, & mammarum in maribus non eadem eſt ratio. Nam virorum mamma ad ornatum & robur, ſeminarum verò teſtes, niſi excoquendo ſemini dicatos putes, inutiles erunt. Virorum mamma glandoſa non ſunt, nec lac generant: ſeminarum teſtes glandoſi ſunt, eorūque ſubſtantia $\Psi\alpha\epsilon\gamma\ \chi\alpha\ \sigma\eta\epsilon\gamma\ \iota\sigma\alpha\delta\eta\varsigma$, ut in maribus. Præterea, cur eiſculatoria vaſa, quæ a teſtibus ad vteri latera, cotinua dicunt ſeruntur, mulieribus magis intorta quā viri, niſi ut via breuitas plexuum varietate compenſaretur? Quid tanto artificio ad crudi & aquei humoris eiſculationem opus erat? Hæc ſanè validiſſima eſt demonſtratio, quæ tamen ſequenti fulcietur magis. Certiſſimum eſt, in coitu aliquid à mulieribus excerni: unde voluptas & titillatio: id autem quod excernitur, aut ſanguis eſt aut tenuis & ſeroſus quidam humor, aut ſemen excoctum. Sanguinem eſſe, nemo niſi mētē captus affirmabit: nam fluentibus menſtruis titillatio nulla, voluptas nulla præſentitur, imò quāplurime diu ſtorquentur cruciatibus. Seroſum & incoctum humorem non eſſe, mirabilis vaſorum preparantium & plexuum ſtructura conuincit. Eſt ergo elaboratū quid & excoctum;

Ariſtoteles ſemini non admittit.
Rat. 1.
Secunda.
Tertia.
Quarta.

Quinta.
Medicorum opinio.
Auctoritas Hippocratis.
Ariſtoteles.

Galenus.
Rationes quibus demonſtratur ſeminas ſemen generare.
Rat. 1.

Subterfugium Peripateticorum fallunt Peripatetici.

Secunda ratio.

Tertia. quod excernitur. Id verò semen esse, & color albus & crassities & spirituum, quibus vadi-
 quaque turget, copia satis declarant. Si feminarum, quæ diutius à coitu sibi temperant,
Quarta. organa seces, videbis eorum vasa & testes semine circumfluere. Quid? annon iis, quæ diutius
Quinta. Veneris studia intermiserunt, & salacibus per insomnia copiosissimum semen erumpit? An-
 non & gonorrhæam & priapismum sæpe experiuntur mulieres? & dum semine turgēt eo-
 rum genitalia, libidinis stimulus agitata furias sæpe & rabiem colligunt? quo excreto, omni-
Sexta. no mansuescunt, & feritatem illam deponunt? Docet quotidianus usus castrata animalia,
 feminas dico, nullo iam maris ardere amore, in iisque libidinis stimulos omnino extingui,
 Proculdubio tam validis rationibus fulta Peripateticis quibusdam hæc Medicorum opinio
 visa est, ut etiam multi fæmineum semen admittere coacti fuerint: sed ne ab Aristoteli de-
 cretis descivisse viderentur, semen illud infecundum esse, & nulla agendi vi præditum, ex-
 istimarunt. Itaque totam vim generandi actionem tribuunt mari: marem opifici, fæminam li-
 gno conferunt: marem animam & formam, fæminam materiam tantum præbere volunt.
 Huius scilicet principes sunt Averroes & Albertus Magnus. Cum enim, inquirunt, in omni
 natura debeat alicui agenti aliquod patiens respondere, ex 3. De anima, verisimile est fæmi-
 ne potius datam fuisse vim patiendi, quæ respondeat virtuti agenti maris. Et sane semina
 excipere, concipere, gestare, fætum alere, facultatem patiendi indicant. Hoc illi commento
 Medicorum iacula se evasisse putant, cum tamen in idem lutum ac volutabrum precipites
 sese deuoluant. Nam album, spumosum, & excoctum semen fundere idem est, ac efficiendi
 vim aliquam habere. Spiritus enim per arterias spermaticas delati & exquisiti in labyrin-
 theis plexibus cum sanguine permixti an in prima conformatione otiosi seriabuntur? an ex
 iis, tanquam materia, spermatica partes generabuntur? Aget ergo fæminarum semen, sed
 imbecillius quàm viri, quia minus calidum, minusque spirituosum. Proferam unicum aut
Ratio Galeni validissimum, quod fæminei seminis fecunditatem patefaciat. Fætus aliàs
 patri, aliàs matri similes esse omnibus est exploratū: similitudo hæc aut à semine, aut à men-
 struo: non à menstruo solo, quia semper matri similes essent: non à semine solo maris, quia pa-
 tri semper similes essent: ergo à communi causa, ab utrisque manante: communis hæc causa
 semen est. Respondebunt Peripatetici, fætus nonnunquam avis aut atavis similes esse, qui
 ad generationem neque alitius neque passivè quicquam contulerūt. Sed quid de hereditariis
 morbis respondere queant, non video. Arthritica, arthriticum; epileptica, epilepticum; cal-
 culosa, calculosum gignit, non sanguinis vitio. Quis enim sanguinem menstruum, singularum
 partium ideam in se continere unquam dixit? Impurus quidem sanguis debilem & morbo-
 sum fætum reddet, sed renibus calculosam, articulis arthriticam dispositionem imprimere,
 soli hoc semini, quod fatalem in se moriendi & vivendi necessitatem continet, est concessum.
Altera ratio. Sed & formatio omnis & specificatio à semine est non à sanguine: materia enim ut mate-
 ria est speciem mutare non potest: at fætus secundum speciem matri potius assimilatur quàm
 patri. Nam si ovem caper inierit, ovem duriori lanitio: si capram aries, capram molliori pulo
 gigni ait Athenæus. Ergo à matre vis aliqua formatrix, hæc autem non sanguini, sed semini
 indita est. Sed adversari nobis videtur Galeni locus quidam. Nam cap. 1. libri 14. De usu
 part. semini muliebri vim procreatricem denegat. Fæmina (inquit) cum masculo frigidus
 sit, incoctum & tenuem in parastatis humorem habet, qui nihil ad proles generationem con-
 fert, idcirco suo iam officio functus effunditur: in uterum verò trahitur alius, mariti nempe
 humor. Verum ita interpretandus Galeni locus, in fæminis præter semen, esse humorem
Interpretatur quendam aquicum, qui oblectet, titillet, colluat: & illum ad generationem nihil conferre. Ita
Galeni locum. enim paulò post loquitur. Verum in coitu repente ac simul unà cum semine is elabitur, sen-
 sumque idcirco sui facit; reliquo autem tempore paulatim exit & interdum sine sensu. Con-
 cludamus ergo fæminas semen emittere efficiendi aliqua vi præditum. Huius seminis usus
Semini fæmi-
nei usus.

apud Galenum cap. 11. lib. 12. De usu part. multiplex est. Primus ad generationem; ab eo enim, tanquam opifice, cum semine maris concurrente, figurantur partes, & ex eo tanquam materia membrana factum inuoluentes generantur. Secundus, ut virili semini calidiori cedat in alimentum: calidum enim omne frigido moderato nutritur, Hippocrati libello De alimento. Tertius, ut latera uteri irriget; neque enim virili semine singule uteri partes obliniri poterant. Postremum addit Galenus, ut collum matricis patefaciat. Ridet Argenterius hos seminis usus; quia nihil nutritur quod non viuat, semen autem non uiuit. Deinde non fit muliebris seminis eiactio in latera uteri, quia muliebris uterus cornua non habet. Sed ridicula haec. Nam semen potentia animatum in uterum iniectum & calore uteri suscitatum, statim animae munia exequitur, efformat quippe effingitque partes; ac animatum nihil est quod non viuat. Viuit itaque semen, sed more plantae. Dum uero ali muliebri semine uirile semen scribit Galenus, non de perfecta nutritione intelligit, quae sit assimilatione; quia enim calidius est semen maris faemineo, frigidiori tenuiorque diluendum ac temperandum erat. Sic aere spiritus nutriri dicuntur: sic calidum omne Hippocrati frigido moderato nutritur. Eiactationem autem seminis in latera fieri notissimum est. His ita constitutis, super est ut Peripateticorum rationes singulas diluamus. Duplicem illam secretionem seminis & sanguinis simul & semel fieri nolumus, sed diuersis temporibus: seminis quidem in coitu & conceptu; sanguinis, post primam partium spermaticarum discretionem. Puerulorum & faeminarum non eadem est ratio; illis siquidem nulle supersunt reliquiae laudabilis sanguinis, & quibus semen generari queat; quia sanguinis portio ad nutritionem, altera ad incrementum absumitur. His copiosissimus sanguis superfluit. Quae sine voluptate concipiunt, morbosum & prauum affectum uterum habent. Auerois autem historia merum figmentum est. Faeminam marem non esse imperfectum, sed perfectionem quandam speciei, supra demonstrauimus. Postremam Aristotelis rationem omnium validissimam sic placet eludere. Etiam si materiam & efficientem causam in se contineat mulier, non potest tamen citra maris congressum perfectum factum edere; quia debilius & frigidius faemineum semen. Sic oua subueniunt, quae gallina citra maris opem pariunt, figurata quidem sunt, sed infaecunda: sic & quae galli pariunt oua exigua, nequaquam faecunda esse obseruamus. Vtriusque ergo parentis semen requiritur. Valesij responsum non probo, qui faeminam, si frigidior sit, debilius semen emittere putat, quam ut solum partium conformationem moliri queat. Si calidior, faecundum quidem, & satis per se potens semen fundere, sed deesse alimēti reliquias, quibus conceptum & efformatum semen in utero ali possit. Itaque faeminam calidissimam sine viri complexu generare, sed quod conceperit, alere & perficere non posse contendit. Quae si vera essent, uiragines calidissimae, citra viri complexum frequentes paterentur abortus; & aliquando obseruatum esset septima die genituram iam dearticulatam effluxisse, in qua trium partium principum rudimenta & spermaticarum omnium partium prima stamina conspicua fuissent. Haec enim solius seminis, non sanguinis sunt opera, quia sanguis ad conformationem & discretionem partium nihil praestat, nec nisi post inchoatam spermaticarum partium descriptionem affluit.

Primus.

Secundus.

Tertius.

Peripateticorum
rationibus sa-
tisfit.

Solutio prima.

Secunda.

Tertia.

Quarta.
Quinta.Improbatur
Valesij.

An feminis
excretio natu-
ralis sit vel a-
nimalis.
Naturalis esse
demonstratur.
RATIO I.



De feminis excretionē duo supersunt agitanda. Primum à qua vi, naturali-
ne an animali eius fiat excretio. Tum, cur tanta in eiusdem emissionē volu-
ptas. Vtraque questio difficile explicatur non habet, ne quid tamen in-
telligi à nobis videatur, utramque minutatim excutere placet. Atque vi à
feminis excretionē initium sumam, naturalis omnino esse demonstrari po-
test, quod excrementum omne vi natura pellatur, semen autem excremen-
tum sit. Sic menstruus sanguis, excrementum vile alimentum ultimi partium carnosarum,
certum & statim periodicis solius natura vi per uterum expurgatur: Sic chylus ventriculi ex-
crementum (licet vile) solius ventriculi in sita & vernacula facultate in intestina detruditur:
sic fecum & vrina excretio naturalis est. Præterea feminis excretioni musculos nullos de-
stinant naturam: nam neque in vasīs spermaticis, neque in testibus, neque in glandulis pro-
stat musculus apparent. Dices fortasse musculos adesse cremasteres, qui vasa deferentia com-
primunt, quorum compressione feminis fiat expressio. Sed non cum cremasteris musculi vsum
agnoscimus nam in vasīs spermaticis mulierum musculi tales non reperiuntur, quæ tamen
semen, non minus quam mares excernunt. Accedit summi Hippocratis, aut saltem Polybii
auctoritas, libello De genitura, excretionis causam referentis ad spumantem feminis natu-
ram, cuius ratione turgens, & loco stare vix potens, exitum sibi parat. Contrà, animale
esse feminis excretionem hæc suadent. Quod nunquam nisi præcedente imaginatione, & vi-
gilantibus & dormientibus nobis perficiatur, quod in excernendo semine crura & brachia
contrahantur, atque uniuersum corpus quasi conuellatur, propterea coitum appellauit De-
mocritus, paruam epilepsiam; quod eam excretionem pro voluntatis arbitrio nunc ter-
diorem, nunc celeriorē reddamus, quod denique sit perpetuo cum voluptatis illecebris. Vol-
uptas autem sentiendi facultatis affectus dicatur. Nos eadem de feminis excretionē quæ de
colis inflatione, sentimus; missam scilicet esse actionem ex animali & naturali. Animalis
est, quia præeunte sit imaginatione, & voluptatem habet coniunctam. Naturalis est, quia
stimulata natura aut qualitate titillante & pruriente, aut copia grauante perficitur, iaque
citra musculorum operam. Ceterum de feminis profusione hic loquimur, quæ est natura & co-
itiv: nam quæ symptomatica est, & quæ quorū (gonorrhœam vocant) nec imaginationem
habet prauam, nec est cum voluptatis illecebris, nec natura pellentis robore perficitur, sed
causam agnoscit feminis acrimoniam, vasorum imbecillitatem, eorundem conuulsionem,
& vicinarum partium inflammationem: Hæc tandem extenuationem vniuersi corporis
& tabem inducit. Testis est Satyrus ille in Thaso, cognomento Grypalopex sect. 7 libri 6.
Epid. qui vigesimum quintum ætatis annum agens, cum potu & interdiu semen effunde-
ret, anno 30. contabuit, & mortuus est.

Secunda.

Obiecta.

Solutio.

Hippoc. aucto-
ritas.

Animalis esse
demonstratur.
RATIO I.
Secunda.

Tertia.

Quarta.
Quid sentia-
mur.
Dixit esse
anim.

Causæ gene-
ritæ.

Historia Sa-
tyri.

Vnde voluptas in feminis emissionē.

QVÆST. VII.



Causa finalis
voluptatis in-
ferum in cutu
& feminis
infusæ.

AMIRABILIS Natura providet, ne mortale ac dissolubile indi-
uiduum extingueretur, ad specierum conseruationem, singulis animalibus
libidinis stimulus, & incredibile coeundi desiderium iniecit insensitque.
Quis enim per Deum immortalem, concubitu, rem adeo fedam, ut anti-
dixi, sollicitaret atque implexaretur? Quo vultu diuinum illud animal ple-
num rationis & consilij, quem vocamus hominem, obscenas mulierum partes tot sordibus
inquinatas, & ea ratione in locum imum, velut sentinam corporis, relegatas attraheret?
Quæ femina maris in amplexum rueret, cum & nonimestris gestatio laboriosa sit, & fatum

exclusio diris cruciatibus molesta, sepeque exitiosa; & editi foetus educatio plena sollicitudinis, nisi incredibili voluptatis aestro percita essent genitalia? Sola igitur speciei conservatio, tante voluptatis, qua toto coitus tempore, sed praesertim in seminis emissionem percipitur, causa est finalis. Efficientes vero eius voluptatis causae, variae à variis assignantur. Nos missis lubricarum opinionum fluctibus, tres praecipuas & immediatas agnoscimus. Prima est seminis turgentis & quasi prurientis titillatio. Target autem ratione ἐπομπῶν spirituum; nam semen sine spiritibus, quale per gonorrhoeam profundi solet, voluptatem nullam parit; & ea ratione qui Venere abutuntur, & frequentissime coeunt, minorem percipiunt voluptatem, quia pauciores spiritus. Sola haec causa ad voluptatem non sufficit; requiritur altera, motionis quippe & excretionis celeritas. Vi enim dolor nunquam excitatur, nisi à τρεῖς, confertim & celeriter fiat alteratio; ita semine paulatim fluente, & pudendis velut colla-crymantibus, voluptas nulla excitatur. Postremo ad voluptatem concurrunt spermaticarum partium sensus exquisitissimus, & earundem angustia: ita enim titillatis partibus, & reductis, qua distendebantur, vasis in naturalem situm constitutionemque, voluptas ingens excitatur. Ceterum quòd haec illustriora evadant, duo agitata sunt problemata; primum, Cur per ceteras partes, venas quippe, arterias & nervos, partes membranosas, & acerrimi sensus deerrantes, cum sanguine ceterisque humoribus spiritus voluptatem eam non excitant, quam in vasis spermaticis? An, quia hic sensus solis genitalibus mira Naturae providentia insitus est, ad speciei conservationem; ut soli officio ventriculi diuisionis sensum & appetentiae desiderium insensit Naturae? An, quia in reliquis vasis nulla sit tam cita praecipueque humorum simul & spirituum effusio? Alterum problema est, Cur dormientes in pollutionibus voluptatem persentiant, cum per somnum sensiferae facultates feriantur, & somnus apud Philosophum sit ἡσυχία & ἡσυχία αὐτοῦ, hoc est, quies primis sensorij. An, quia dormientiū imaginatio validior est quam vigilantium, ut in noctambulis appareret? An, quia non ita per somnum sopiti sunt sensus, quin violenti obiecti praesentia non excitentur? Sic dormientes, si acu pungantur, contrahunt membra, & à vehementi sono expergiscuntur. At seminis per somnium excretio validissimum est spermaticis partibus obiectum. Haec itaque sunt voluptatis in seminis excretionem causae. Vtrum autem maior sit viri, quam feminae voluptas, ridiculum est quaerere. Pluribus quidem modis oblectantur mulieres. Nam & semen effundunt & virile prolestant. Qua fortassis ratione Tiresias vates utrumque sexum expertus, mulierum partes visus est tutari. Sed intensior est maris voluptas, quia semen calidius magisque spirituosum, celerius & quodam quasi saltu excernitur.

Efficientis
causae volu-
ptatis.
Prima est se-
minis titilla-
tio, à spiritibus
causa.
Secunda ex-
cretionis cele-
ritas.

Tertia causa
partium sensus
exquisitissi-
mus.
Problemata,
cur in aliis
partibus spi-
rituum volupta-
tem sensum non
excitant.
Solutum.

Alterum
problema, cur
dormientes
voluptatem
eam sentiant.
Solutum.

An viri ma-
ior sit volu-
ptas quam
mulieris.
Responsus.

HISTORIA ANATOMICA.

De materno sanguine, altero generationis principio.

CAPVT III.



ALTERVM generationis nostrae principium, maternus est san-
guis; cui patiendi tantum, non autem efficiendi facultatem con-
cedimus. Ex eo & viscerum parenchymata, & musculorum car-
nes coagmentantur: eo tam spermaticae quam carnosae partes
aluntur, augescunt & perfectionem consequuntur suam. San-
guinem hunc eiusdem naturae esse volumus cum eo, quae certis
circuitibus & statis periodis, singulo quoque mense per uterum expurgat natura. Qua
ratione primus Hippocrates καταμύλον αίμα, id est, mēstruum sanguinem appel-
lauit: alii, μήνες, καθάρσις, έμμηνοί, έμμηνα, γυναικεία dicuntur. Huius natu-

ram mille difficultatum inuolucris implicitam, breuís hæc patefaciet definitio: *Sanguis menstruus excrementum est alimenti vltimi partium carnosarum, quod certis temporibus, & statis periodis, moderata quantitate, per vterum expurgatur, ad animalis generationem & nutrimentum.* Exprimis definitio hæc menstruæ vacationis sex capita, materiam, efficientem causam, tempus vniuersale particulare, quantitatem, vias, & vsum, qui finalis causæ rationem habet. Menstrui materia residuum est alimenti vltimi; sanguis quippe superfluous, qui in muliebri natura redundare consuevit, tum ob debiliorem eius calorem, qui reliquias discutere nequit, tum ob carniū mollitiem & laxitatem, vnde *δυσδιαφόρητον*, & vix perspicabile mulierum corpus; tum denique ob victus rationem & vitæ institutum: nam humidioribus vescuntur alimentis, i. De diætâ; tepidis aquatum balneis oblectantur; integre noctis somnum in multam lucem protrahunt, & vitam inertem degunt ac sedentariam: vnde fit vt in reliquorum animalium genere, sola ferè mulier menstrua fundat. Menstrui hæc materia excrementum dicitur, non quod assimilari nequeat, & qualitate noxiū sit, instar inutilis excrementi; sed quod quantitate nimia luxuriat, à carnibus iam expletis & quasi saturatis, in venas maiores refundatur & euomatur. Hic Hippocraticum affluxum & refluxum cernere liceat. A venis enim turgentibus, ad carnes primum calidas & *ὀλκῆς*, attractrices, affluit sanguis; mox ab his expletis saturatisque, per quandam velut *ναυσίαν*, refluit in venas. Est itaque laudabilis & alimentarius hic sanguis, & vt mirus annotauit Hippocrates *τῷ ἐν ζωῇ καὶ ὡς ζωῇ: χαρὲν δ' αἷμα σὶν δὲ πῶς ἐρεῖν καὶ ταχὺ πῆνυται τῷ ὑγιαίνῃ ἢ ζωῇ*: effluit velut a victima ruber, & citò concreuit, si sana sit. Oppletæ his alimenti reliquiis venæ, & sanguinis sua copia grauantis pondere onustæ, naturam ad excretionem stimulant. Hæc igitur sui diligēs & conseruatric, ea quæ pollet vi excretrice, reliquias pellit: & qua ratione iis qui altero crure, aut viroque sunt mutili, si nihil de solito victu detrahāt, solius hepatis robore, dysenteria contingit *αἷμα τῷ δὲ*; eadem prorsus solius naturæ vi, menstrua hæc vacuatio perficitur. Natura porro cum certis legibus omnia exequatur, non omni ætate, non omni tempore, nec singulis diebus excretionem eam molitur, sed certis temporibus, & statis periodis, quos ipsa per se, nisi laceffita, aut impedita, prætergreditur nunquam. Tempora hæc vniuersalia sunt & particularia. De tempore vniuersali ita statuunt omnes, incipere vt plurimum secundo septenario, hoc est 14. ætatis anno, & deficere septimo septenario, id est 49. aut 50. anno. Cur autē nō ante 14. annum erumpant menses, hæc ratio est; quod & angustiora sint vasa, & calor humoris copia penè obrutus, reliquias pellere nequeat; adde quod ætate puerili maxima sanguinis portio in incrementum absumitur, & ante fecundationis tempus Natura menstrua lem materiam non largitur. At secundo septenario incipit calor emicare, tunc fiunt *ἐκ λυμφῆς*, effluget centiæ, & dominatus calor natui, vnde viarum amplificatio, humorum orgalmos, tenuitasque & expultricis robur. Tūc incipiunt mares *παύειν καὶ ἀφεδῆναι*, hircire, Venerem agnoscere, & vocem asperiores edere. Puellis verò turgent mammæ, corpus libidine titillatur, & noua lanugine insperguntur genitalia. At verò post quinquagesimum cessant menstrua, quia debiliior calor non amplius laudabilis sanguinis reliquias generat, nec eas, si supersint, expellere potens est: mitto quod cessante tunc temporis concipiendi facultate, cessat & nutriendi necessitas. Tempus particulare certum ac definitum statui non posse scribit Aristoteles, & docti ferè omnes ita sentiunt. Nos tamen statos esse Naturæ motus, & certas illius leges, nobis incognitas, existima-

Quid menstruus sanguis

In menstrum sex spectanda.

Materia menstrui.

Cur in vtilitate redundet sanguis.

Cur sanguis excrementum dicatur.

Efficiens causa vacationis menstrui.

Tempora vacationis menstrui.

Tempora vniuersalia.

Cur non ante 14. annum fiunt menses.

Cur cessant 50. ætate.

Particularia tempora.

mus; quas ipsa inuiolatas & immutabiles seruat; nisi viarum angustia, & humoris crassities, eam remorentur; aut qualitatis mordentis acrimonia, aliquodve extrinsecus adueniens irritamentum, eam ante tempus excernere cogant. Itaque semel in mense excretionem menstruam molitur, nunc in plenilunio, nunc decrescen- te Luna; viraginitibus quidem per triduū, mollioribus & otiosis, quas ὑδαράδεις vocat Hippocrates 1. De dicta, per septimanā. Sect. 1. libri 6. Epid. ὑδαταίνεσθον μηναικῶν & ἡμιμήναικον πολὺν, *aquescens mensis diutius perdurat, moderatis vero per quadriduum, quæ tempora sunt particularia.* Quantitas menstrui definiri non potest. Nam vt annotauit Hippocrates libro De natura muliebri, pro varietate coloris, temperamenti, ætatis, habitus, tempestatum anni, nunc parcius, nunc liberalius profluit sanguis. Candidulæ tam copioso abundant humore, vt omni ex parte profluat: his opponuntur nigellæ, sicciore & magis astrictæ. Moderatis & optimè sanis, ad duarum heminarum Atticarum mensuram secedere voluit 1. ἡμιμήναικον. Viæ huic expurgationi dicat, sunt venæ vteri, & vterus ipse. Venæ ab hypogastrico. & spermatico ramo ad vteri fundum & ceruicem excurrunt. Per ceruicis venas in grauidis, per alias in virginibus, & iis quæ vtero non gerunt, fluit sanguis non per diapedesim, sed per anastomosim. Cur autem per vterum expurgetur sanguis, id mira Naturæ providentiâ factum puto, vt scilicet huic itineri assueta natura, statim conceptione facta, ad foetus nutritum & generationem accurrat sanguis. Hinc menstrui sanguinis finem colligimus duplicem, generationem parenchymatum & carnum, necnon puelli nutritum, in vtero & extra vterum. Vnde enim conceptum semen & alimentum & incrementum capesset, nisi ad locos & naturalia cursum inflectat hic sanguis? Foetu autem in lucem edito, eodem sanguine in mammis dealbato alitur. Atque hæc menstrui est natura.

Quantitas.

Via expurgationis ducta. Finalis causa.

CONTROVERSIAE ANATOMICÆ.

An menstruus sanguis qualitate noxius sit.

QUESTIO VIII.

DE menstrui sanguinis natura, tam diuerso olim consilio digladiatum est, & hodie in Medicorum scholis tanta disceptatione certatur, vt singula hic transcribere & piget, & pudeat me. Ne quid tamen prætermisissimæ nobis videatur, præcipua tantum harum disputationum capita persequar, quorum primum erit de menstrui sanguinis materia. Conuenit inter omnes sanguinem hunc excrementum esse: singulis enim mensibus per vterum tanquam redundans quid & superfluum excernitur. Sed cum excrementum duplex sit, alterum naturaliter constitutum & utile, alterum inutile & omnino dissimile, cuius naturæ sit sanguis menstruus, inquirendum. Inutile esse excrementum, & sua qualitate omnino noxium, clarissimorum virorum auctoritas & ratio suadere videntur. Hippocrates 1. ἡμιμήναικον, eius malignam qualitatem his verbis expressit: καὶ ἔστι τι τὸ γινώσκον, καὶ δάκνει τῆς μηναικῆς οἱ ἀνὴρ ἡμῶν, καὶ ἔλκεται τὰς μήτρας. Et radit terram velut acetum, & mordet vbicunque mulierem conigerit, & vteros exulcerat. Aristoteles cap. 19. lib. 4. De natura animal. id genus sanguinis vitiatum agrotansque esse scribit. Galenus cap. 8. libri De atra bile. Singulis mensibus, ait sanguinis portio inutilis & superflua non quantitate solum, sed etiam qualita-

De materia menstrui.

Peccare qualitate demonstratur. Exulcerationes. Hippocrates.

Aristoteles, Galeni.

Florus.
Moset.

Leges Zabro-
rum.

Hesiodus.

Plinius.
Columella.

Ratio & ex-
perientia.

Fernelij opi-
nio.

Contraria opi-
nio, sanguinem
hunc sola qua-
ritate in vultu
esse.

Auctoritas
Hippocratis.

Galenus.

Rationes.
Ratio 1.

Secunda.

te excernitur. Florus apud Plutarchum in Sympofis vitiofum hunc fanguinem effe affi-
mat. Summi legiflatoris Mofis edicto fancitum erat (vt Sacra teftatur pagina) neme-
ftruat mulier templum ingrederetur. Omne fancitum, inquit, non tangeret, nec ingre-
diatur in fancituarium, donec impleantur dies purgationis fuæ. Ex legibus Zabro-
rum, mulieri, cui menftrua fluere, hominum focietas interdicebatur, cremabanturque loca,
in quæ pedem pofuiffet. Vetat Hesiodus, ne in balneis verferetur quis, ubi lauata funt mulieres
menftruate. Plinius lib. 7. & 28. necnon Columella fanguinem hunc non vitiofum modo, fed
venenatum effe putant. Illius enim contactu nouelle vires arefcunt, exuruntur hortorum ger-
mina, fpecula velut tabe inficiuntur. Guftatus hic fanguis canes in rabiem agit, & muliercu-
le fuos amafios hoc fanguine fascinare folent. Vnde Ouidio lunare virus dicitur. Eft ergo
non quantitate fola luxurians, fed tota qualitate noxium, & infefans hoc excrementum.
Eius veneficam vim, & malignam qualitate expeririuntur quotidie mulieres: nam fi fup-
primatur, incredibile dictu efl, quam varia inde emergant & fufcitantur fymptomata. Si,
inquit Hippocrates 1. De morbis mulier. circa uterum & locos ftabiletur, phlegmones, car-
cinomata, eryfipelata, fcirrhus parit: fi ad fuperiores partes refiuat, morbi inde nafciuntur,
qui partis obfefe & humoris morbifici naturam fequuntur. In hepate cachexiam, icterum,
hydropem excitat, in liene obftructiones, fcirrhus, in ventriculo, deprauatam appetentiam,
malaciam, in corde palmon, fyncopen, in pulmonibus vlcera, tabes, in cerebro, epilepfiam,
melancholiam, &c. Ex Neotericis doctiffimus Fernelius fanguinem hunc alimentarium
non effe, nec eiusdem nature cum eo, quo alitur fœtus, libro 7. fue Phyfiologia conuendit,
propterea que & qualitate & quantitate noxium effe putat. Nos contra, validioribus funde-
mentis fulti, & certioribus innixi rationibus, eundem omnino volumus effe fanguinem cum,
qui ftatis periodis per uterum excernitur, cum eo quo & vifcerum parenchymata coarguen-
tantur, & fœtus in utero alitur, atque ita laudabilem effe naturam fuam, & fola quantitate re-
dundare exiftimamus. Fauet opinioni noftræ Hippocratis & Galeni auctoritas 1. Ἐξ ὅ-
ντων τοῦ σώματος τοῦ ἀνδρὸς ὁ δὲ πλεονέκτης αἷμα εἶναι τὸν ἐν τῇ μήτρᾳ, καὶ τὰς ἀλλὰς τὰς ἐν τῇ μήτρᾳ
ἰδίας, id efl, effluit mulieri fanguis, velut à victima, & citò concrefcit, fi quidem
fana fit. Quod repetit libro De natura pueri. At funt laudabilis fanguinis conditiones, vt
ruber fit, & citò concrefcit. Galenus 3. De fymptom. cauffis, fanguinem hunc præter natu-
ram non effe fcribit, fed quantitate duntaxat peccare. Rationibus id demonftrari poteft. Sanguis
hic in muliere fana (nam in morbofa totam maffam inquinatam effe conftat) fanguis,
inquam, quem fingulis menfibus excernit Natura, ab iifdem fit cauffis, à quibus & fanguis
reliquus, quo carnes explemtur. Eadem efl enim materia, idem hepatis calor, eadem venæ con-
feruantur, cur ergo diffimilis qualitas? Præterea, fi (quod fepius inculcat Philofophus) finalis
cauffa omnium efl nobiliffima, vincitque in natura operibus reliquas omnes, cur fuperfluous
hic fanguis in frigidiore mulierum natura redundat, nifi vt fœtui concepto & efformato ce-
dat in alimentum? Cur per uterum potius quam per nares, vt maribus fanguinem hunc ex-
purgat, nifi vt huic itineri affueta natura, ftatim conceptione facta, ad fœtus nutritu-
m & generationem accurrat? Hæc apud Hippocratem, Aristotelem, Galenium, & Medi-
cos omnes, finalis efl menftrui cauffa. Ita, inquit Aristoteles, comparata efl mulierum natura,
vt earum fanguis ad locos & uterum perpetuò curfum infectat, propterea que, fi bene vult,
non nifi menftruales effe folent, nec vnquam varicibus, hæmorrhoidibus, fanguinisque per
nares profluio corripuntur. Si non aliam ob cauffam ad uterum viam affectat hic fanguis,
quam ad puelli nutritum, benignum effe & alimentarium nemo inficiabitur. Nam puro
& dulciffimo fanguine fœtum alii fcripfit Hippocrates, libr. De natura pueri, & 1. De mor-
bis mulierum. Illic trahere vult fœtum, quod dulciffimum efl in fanguine, ἔλαττο δὲ τὸ
αἷμα τὸ ἐς ἐαυτὸ τὸ γλυκύτατον. Hic verò mulierem que utero gerit, totam pallidam

esse scribit, quoniam purus ipsius sanguis ad fœtus nutritionem & incrementum absumentur. Quinetiam purum esse & alimentarium hunc sanguinem, quem in sanâ muliere per uterum exernit Natura, id luculenter testatur, quod ex eo ad mîas resfluente lac generetur; propterea nutritibus supprimuntur menses. At lac ex purissimo sanguine generari testatur Hippocrates lib. De natura pueri. Aristoteles cap. i. libri 4. De generatione animal. eandem vult esse lactis & menstruorum naturam: propterea, nec lactantibus fluunt menses, nec lactantes concipiunt, & si conceperint, exingitur lac. Adde quod si tanta esset menstrui impuritas, qualem plerique fingunt, oporteret utrum gerentibus grauius agrotare, quàm quibus alia de causa menstruum supprimitur; quia dum puriorem sanguinis portionem trahit puellus, reliquus velut effrenis & venenatus relinqueretur in venis. Sed & seuiora essent postremis mensibus symptomata, quod falsum esse docet experientia. Sola igitur quantitate in sana muliere superflui sanguis menstruus, & eiusdem nature, coloris, temperamenti est, ac reliquus qui in caue trîlco cõtinetur, & quo carnes aluntur, excrementũ tamẽ dicitur *καταρρενωός*, quia expleta & saturata carnes, quod reliquum est, in venas refundunt enomuntque. Sic saturatus chylo ventriculus, eum in intestina detrudit. Caterum an secunda vel tertiã coctionis excrementum sit sanguis menstruus, querit Auicenna. Nos & secunda & tertiã excrementum appellare possumus, sed diuersa ratione. Excrementum est secunda coctionis, quia totus sanguis primam in hepate generationem habet, & ab hepate, tanquam redundans quid & superfluum pellitur in truncum vena caue. Excrementum est tertiã, quia à carnibus saturatis post tertiã coctionem exernitur. Quæ contra sententię huius veritatem superius adductæ sunt rationes, leuissimi sunt momenti. Nam ut hæc omnia menstrui incommoda in cacochyma & morboſa muliere admittimus; ita in sana, & optimẽ constituta inficiamur. Quod si eius suppressio in sana muliere grauiſſima interdum pariat symptomata, id sua mora & cunctatione prestat: aut, quia cum sanguine feruntur ad uterum, vniuersi corporis sentiamus & membrum feruile, noxi humores, quorum permisione malignam acquirit qualitatem sanguis. Iam verò quæ afferuntur menstrui incommoda, illius puritatem atquunt: optima enim & citò vitiantur, & in pessima abeunt: sic seminis grauiora sunt, quàm sanguinis suppressi symptomata, quia purius semen, & magis spirituosum. Sic humanum cadaver omnium pessimè olet, quia hominis corpus omnium temperatissimũ, & apud Hippocratem in lib. De affectionibus, alimenta quânto sunt meliora & accommodatiora, si corrumpantur, eorum corruptela deterior est, quàm ciborum, qui & minùs nutriunt, & deteriores sunt.

Tertia.

An sanguis
menstruus ex-
crementum sit
secundæ vel
3. coctionis.
Solutio.

Diluantur
rationes con-
trariæ.

Menstrui in-
commoda cum
puritatem at-
quunt.

An menstruus sanguis variolarum & morbillorum, qui semel
in vita infestare solent, caussa sit.

QVÆSTIO IX.

DE variolarum natura, differentiis & causis omnibus, tum an variola-
rum, morbillorum, exanthematum, ecchymatum, phlyſacion, phicteni-
dœn, papularum, eadem sit ratio, hic differere non est huius loci atque tem-
poris: ea tantum, quæ ad institutum spectare videntur, hic persequi conſi-
lium est. Obscurissima est quæstio, quæ multorum ingenia quàm diutissi-
mè exercuit, An variolæ, quæ semel in vita infestare solent, à menstrui sanguinis
impuritate contingant. Nolo hic amplissimo verborum circuitu dissentientes multorum
sententias in medium afferre: dicam tantum & breui & dilucida oratione, quid sentiam.
Certissimum est inter decem millia vix vnum reperiri, qui huius inquinamenti vires semel
in vita non experiatur: hoc si quis neget, pœna sensus dignus esto. Scribit Auenzoar mira-
culi instar esse, si mortaliū quis labe hac non inficiatur. Est ergo communis, quia omnes ob-

Omnes semel
in vita vari-
lis laborare.
Morbi com-
munes agnos-
cuntur.

fidet hic affectus. *At ex summi Hippocratis doctrina lib. De natura hominis, Communis morbi communem causam agnoscunt. Ο' κότες μὲν τὸ νόσηματος ἐνὸς πολλοὶ ἀνθρώποι ἀλλοιοῦνται, κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τῶν αἰτίων καὶ ἀνατίθενται τῷ ὅτι κοινότετατον ὅτι, καὶ μέλιστα αὐτῶ πάντες καὶ ὁμοῦμα. id est, Cum multi homines eodem tempore eodem morbo laborant, causam statuere oportet communem. Quæ autem communis hæc causa hominibus omnibus esse potest? Non aër, neque enim eundem perpetuò spiramus omnes; fruietur hic puro, ille impuro; incolis hic Septentrionalem, ille Meridionalem plagam. Erit ergo communis huius morbi commune aliud principium. Hoc primi omnium Arabes, Auicenna, Auenzoar, Haliabas, Auerroes sanguinem maternum agnoscunt, quo & viscerum parenchymata coagmentantur, & singula fœtus particule aluntur. Licet enim purus sit & laudabilis hic sanguis; humorum tamen, qui per uterum vniuersi corporis sentinam expurgantur, permissione & colluie impurus redditur: unde fit ut tam solida quàm carnosæ partes ea labe inquinatæ, semel in vita depurari debeant, non aliter quàm vinum in dolis ebulliendo defecari solet. Huius opinionis veritas ut clariùs elucescat, quæcunque huic aduersarij videntur sigillatim excutienda sunt.*

Aliut fœtus purissimo sanguine; & ἔλκει, ait Hippocrates lib. De natura pueri, τὸ δ' αἷματος τὸ γλυκύτατον, id est, trahit fœtus ex sanguine quod dulcissimum est. Nulla ergo labe solidis partibus & carnosis iniuri potest. Respondeo ex Galen. 1. Desymp. causis, cap. 7. fœtum pusillum adhuc & tenellum primis mensibus purissimum sanguinem trahere, sed grandiozem & purum & impurum simul proleclare. Vel sanguinem, quo aluit fœtus, quæmque è venis allicit, purum quidem esse natura sua dicimus, sed humorum, qui per uterum expurgari solent, colluie inquinari. Est enim Aristoteli 10. De historia animalium, uterum membrum ferule, ad ea expellenda constitutum, quibus corpus expurgari debet. Præterea, si à menstrui impuritate excitantur variolæ, cur primis mensibus & annis, quibus debilis est & tenellus fœtus, adestque maximæ & ὁμὸς ἐλκὺς dispositio, non sit perpetuò ea sanguinis ebullitio, sed post multos morbos sepe ad senium usque prorogatur? cur non per febres acutas labe ea depuratur? Dic ex summi Dialectoris doctrina differre ætatem ab ætate; naturam à natura. Latet sæpè per annos venenum, quod tandem suo tempore se prodit, oppressurum vel reuersurum. Sic luis Venereæ virulentia & elephantiorum labe per aliquot annos occultatur, ut & rabiosi canis morsus. Accedit tertia ratio, multos bis tervè bis variolis infestari, aliunde igitur quàm ex menstrui inquinamenti prodire. Sed puerile argumentum: ideo enim repetit morbus, quia fortassis ob expultricis imbecillitatem, reliquæ quedam remanserunt: τὰ δ' inquit Hippocrates, Aph. 12. sect. 2. ἐγκαταλιμπανόμενα ἐν τῷ νόσῳ τὸς ἰσχυροὺς ποιεῖν ἄνωγον. Quæ reliquantur in morbis, relapsus facere consueverunt. Est quarta quorundam ratio. Vertitur sanguis menstruus in partium substantiam nutritione: at partes non patiuntur ebullitionem: absurdum est itaque existimare ex earum feruore variolas gigni. His ita satisfactum iri puto, non effervesce quidem partes solidas, sed maligna ea, quæ ex menstrui impuritate acquiruntur qualitate, humores insicere, qui ebullientes & naturæ molesti, ad cutem excernuntur: adeo ut per effervescentiam in sanguine factam ipsæ etiam partes expurgentur. Sic vasa mucida, inquit Auenzoar, vinum inquinant: quòd si in eis effervescat vinum, depuratur dolium. Quinta ratio eiusmodi est: Si à menstrui impuritate excitantur variolæ, cur mulieres quibus supprimuntur menses, variolis non laborant? Dic suppressum eum sanguinem in vasis tantum contineri, nec per partium substantiam dispergi, propterea quæ malignam eam qualitatem solidis partibus non imprimi. Sexta ratio, cur bruta sanguinea, quæ menstruas purgationes patiuntur, & materiam habent variolarum, & calorem agentem, variolis non tentantur? An, quia & victu sicciore utuntur, & totam vitam in labore & exercitio degunt, unde impuri sanguinis reliquia

Opinio Arabum ex impuritate menstrui contingere.

Contraria rationes.
Ratio 1.
Responsio.

Secunda ratio.

Solutio.

Tertia solutio.

Quarta.

Solutio.

Quinta.

Solutio.

Sexta.

Responsio.

digerantur? Homo autem prima etate & lac temulenter haurit, ab lactatus nunquam cessat comedere, & totum fere etatis sue septenariura primum in otio transigit. Postremo, cum materni sanguinis vitium ab orbe nato ad hunc usque diem perpetuum fuerit, vetustissimum esse debuit hoc malum. At neque Hippocrates, neque Galenus, neque Græcorum quispiam huius usquam meminere, adeo ut nouus videatur morbus, Mauritanis tantum cognitus. Non ergo à menstrui impuritate contingit. Sanè vetustissimum fuisse hoc malum credibile est, sed quia continentioris erant vitæ homines, non ita grassari & furere potuisse primis temporibus existimo. Meminit sæpe Hippocrates libris Epid. ἐξ αἵματός τῶν ἐμρῶν σεσ- γυλῶν σμικρῶν, hoc est, pustularum rubrarum, rotundarum paruuarum, & Aëtiius lib. 14. infantibus papulas per uniuersum corpus erumpere scribit. Non ergo Græcis omnino incognitum hunc affectum fuisse puto, sed fortassis non ita accurate descriptum, quod tunc temporis ob exquisitam victus rationem mitiora essent omnia. Sic hodie obseruamus multos variolis laborare, quos nec febris, nec vomitus, nec seuum aliquod symptoma infestat. Qui ad malignam aëris qualitatem variolarum causam referunt, errant, ni fallor, toto cælo. Nam cum singulis annis, mensibus, diebus puerulos hic morbus corripiat, aërem perpetuo inquinatum esse fateri cogeremur. Neque verò pueros tantum, sed etiam omnes homines peregrinè inuaderet, ut pestis; nec semel tantum in vitâ seuiret, sed quoties inquinamenti conspersus esset aër, ut ceteri pestilentes morbi. Doctissimus Mercurialis libro quem edidit De puerorum morbis elegantissimo, multa eaque obscurissima de variolarum natura & causis soluit problemata; sed dum nouam & hactenus inauditam variolarum causam profert, fallitur, meo quidem iudicio. Putat vir doctus variolas morbum esse nouum, veteribus Græcis incognitum, qui calî & aëris vitio primum cæpit grassari, & in homines fere omnes seuire, qui deinceps labem hanc & velut proprietatem paternam in filios heredes transfulerunt. Vt enim arthriticus arthriticos, elephanticus elephanticos, epilepticus epilepticos generat; cur non, qui variolis semel laborarit, eandem diathesin proli communicabit? Probabilia sanè hac multis fortasse videbuntur: sed si ad vnguem, ut aiunt, excutiantur, vix ea bonus admittet Medicus. Namque ut rem in pauca contraham, hereditarij omnes morbi non nisi per semina liberis communicantur. Semina hæc singularum partium ideam, formam & proprietates de rebus continent. Sic arthritici & calculosi semen articulorum parentis arthriticam, renum calculosam dispositionem habet. Debet ergo in parentum solidis partibus inesse diathesis illa. At iis qui variolis laborarunt, & perfectè defuncti sunt, nulla remanet labes, nulla superest talis dispositio: tota enim per exanthematum eruptionem, & criticam excretionem depurata est, aliòquin periculum esset relapsus. Quomodo igitur eam, quam in solidis & carnosiss partibus iam non habent diathesin, liberis communicabunt? Neque verò morbi omnes hereditarij sunt, sed hi tantum qui facti sunt; sic febris putride & fientes morbi, proli non communicantur. Quo primum tempore cæpit hic morbus seuire, si Mercurialis principiis standum, siens erat morbus, in humorum colluuiæ focum habens; non potuit igitur proli communicari. Præterea si hæc vera essent, sequeretur nos omnes semel in vitâ peste, non minus quàm variolis corripì. Obseruatum enim est aliquando pestem tam crudeliter seuisse, ut pauci è mortalibus exstiterint, qui eius maleficam vim non fuerint experti. Est pestis si- cut & variola, communis morbus, ab aëris vitio & inquinamenti contractus, mortales fere omnes aliquando obsidens. Cur ergo pestiferam illam labem nobis non communicarunt, parentes, ut variolarum inquinamenti? Concludamus igitur, ex Arabum decretis, variolarum causam esse materni sanguinis, quo alitur fetus, impuritatem, quam & cunctatione sua, & humorum, qui ad uterum, tanquam sentinam, decurrunt, permixtione, contraxit.

Septimaria ratio.

Responsio.

Fernelij opinio conuelliatur.

Mercuridij opinio.

Conuelliatur.

Ratiõ prima.

Secunda.

Conclusio.

MENSTRVVM sanguinem certis periodis & statis circuitibus per uterum expurgari, omnibus est exploratum: sed circuitum, & periodicæ excretionis causam explicare difficillimum est. Mirantur multi cur, cum reliqua excrementa singulis expurgentur diebus, solus hic sanguis excrementum alimenti ultimi semel in mense tantum excernatur. Prima coctionis excrementa crassiora, ut quotidie generantur, na-

quotidie deturbantur. Bilis ab hepate in vesiculam, & ab hac in duodenum quotidie amandatur. Serum à renibus in vesicam quotidie transcolatur. Tertia coctionis supernacua, totius quidem habitus per sudores, halitum, insensilem transpirationem, pilos, sordes & strigmenta digeruntur: cerebri verò per palatum, nares, aures, oculos; thoracis per antra, gressus & tussim quotidie excernuntur. Menstruus autem sanguis, cum perennem habeat generationem, cur non quotidie, sed semel tantum in mense expurgatur? Hoc ego singulari Nature providentia, & soli finali causse omnium nobilissima tribuendum puto. Nam si per uterum quotidie expurgaretur sanguis, nunquam fieret conceptio; neque hominum quisquam mulieris in amplexum iret. Primum quidem prohiberetur conceptio; quia effusum in uteri cavitatem semen aut præterflueret aut extingueretur, rigatis quippe, madentibus & quasi inebriatis, quotidiano sanguinis affluxu tunicis, at, inquit Hippoc. Aph. 62. sect. 5. καὶ ὅπως ἔχουσιν τὰς μήτρας, ὡς ὑλοποιεῖται, δὲ οὐδὲν ἔστιν ὅτι αὐταῖς ὁ γόνος, quæ præhumidos veros habent, non concipiunt; extinguitur enim in eis genitura. Quis virò mulierum obscenas partes attrectare vellet? Quis tam sædum concubitus appeteret, si earumdem genitalia perpetuo cruore maderent? Non decuit ergo ad speciei propagationem, sanguinem hunc quotidie expurgari; sed certis tantum ac definitis temporibus singulo quoque mense. Sed cur singulis mensibus hac excretio fiat, non levi disceptatione certatur. Aristoteles 2. & 4. De generat. animal. periodicæ huius excretionis causam refert ad Lune motum; vultque decrescere Luna potissimum purgari mulieres; quia tunc temporis frigidior est humidiorque aer, unde crudi & frigidi illius humoris maior fit proventus. Reprehenditur à quibusdam Aristoteles, quod in plenilunio humidiora sint omnia, ut videre est in conchyliis & testaceis Respondens Peripatetici, duplex esse humidum, visificum scilicet & excrementitium. Auctur illud in plenilunio, quia tunc magis abundat lumen: auctur hoc decrescere Luna, quia tunc aer frigidior: at menstruus sanguis ab imbecilliori calore generatur. Arabes varia statuunt pro ætatum varietate, purgationis tempora. Iuvenes nova Luna, vetulae vetitæ expurgari volunt. Unde extat vulgare illud;

Luna vetus vetulas, iuvenes nova Luna repurgat.

Sunt qui circuitum & menstrualis huius excretionis causam referant ad mensis proprietatem, quasi peculiarem vim habeat mensis, ut dies. Proferam luculentissimum hac de Hippocratis testimonium libro De septimestri partu: Εἰς τοῖς μὲν ταῦτα τέρεται ἐν τῇ ἡμέρῃ γυνόμνη ἐν ἐστὶ κατὰ λόγον; καὶ κατὰ μήνην, ἡμερῆς ταῖς ὕψαις αὐταῖς, φαίνονται καὶ ἕκαστος τῶν μηνῶν, ὡς ἔχοντος ἑ μὲν ἰδὲν δὲ αὐτὸν ἐν τοῖς σάμασι. hac est, In mensibus eadem etiam quæ in diebus ita rectaque ratione fiunt. Singulis enim mensibus mulieribus sanis menstrua prodeunt, quasi peculiarem vim in corporibus mensis habeat. Ego maximas Luna in hac inferiora vires agnosco quidem, sed dierum criticorum, & menstrua eius vacationis causam ad solum Lune motum referendam esse vix mihi unquam persuasi. Numeris & mensibus multa dispensari non inficior, si, d. quantitati & numero, quatenus numerus est, vim agendi aliquam

Cur menstruum sanguis non expurgatur quoties.

Responsio.

Cur singulis mensibus fiat hæc purgatio. Opinio Aristotelis.

Opinio Aristotelis.

Quarundam opinio.

Opinio nostra.

tribuere indignum est Philosopho. Causam ergo periodica huius excretionis ad definitos Naturæ motus & certas illius leges nobis incognitas, referendam puto, quas ipsa prætergreditur nunquam, & inuolatas ac immutabiles seruat, nisi aut lacescita, aut impedita. Lacescita quidem excretionem antehertit, & ante consuetum tempus excernit. Sic cum septenarij tantum verè sint critici, vacationes tamē diebus intercalarijs molitur Natura, & ante tempus excernit ob aliquod extrinsecus adueniens irritamentum. Impedita verò aut ob viarum angustiam, aut ob humorum crassitiem, consuetam vacationem sepe remoratur. Ita fit, ut quibusdam bis in mense erumpant menstrua, alijs vix ante quadragesimum diem. Cur autem singulo quoque mense potius, quàm bis aut ter in mense fluat per vterum sanguis, & cur septenarij potius quàm senarij sint critici, ἀπορροήων τῶν ἐν τῷ μήτρῳ, humani ingenij captu id superat. Pollicetur quidem Hippocrates ad finem libelli τοῦ ἐν ἀρχῶν, ὅτι τῶν φύσεως ἀπορροήων διότι ἐν τῇ μήτρῳ ἔχεται διὰ καὶ τῶν; naturæ necessitatem, cur septenarijs singula dispensentur explicaturum: sed rei, ut opinor, magnitudine, & difficultate perterritus, nusquam id præstat. Verū de his fusius libello nostro De diebus criticis.

HISTORIA ANATOMICA.

De conceptione.

CAP. IIII.



SEMINUM & materni sanguinis (quæ duo sunt generationis nostræ principia) secretio in coitu simul & semel non fit; neque etiam spermaticarum & carnosarum partium delineatio eodem tempore perficitur. Sed si perfecta fieri debeat generatio, semina primū fecunda & pura in vterum, tanquam agrum feracissimum, effundi oportet. Mox inchoatis & adumbratis solidacum partium filamentis, sanguis tum ad parenchymatum straturam, tum ad totius nutritum affluere debet. Mas ergo & femina sacrosancto matrimonij fœdere sociati, suscipiendæ prolis desiderio flagrant, dum in amplexus venereos ruunt, semina simul effundunt. Mas quidem distento & rigido pene in vteri cervicem directè, & impetu semen iaculatur, quod Hippocrates τὸ ἐν γυναικὶσιν his verbis, κατ' ἔξω, καὶ ὁ μὲν ὁδὸν expressit. Femina verò eodem instanti non modò semen in seipsam eiacularur, sed eius vterus τὸν ἐν αὐτῇ ἔχον, quia trahendi seminis (quo nihil est magis ei ὡς πρὸς φύσιν, id est, consociale) desiderio flagrat & ardet, virile semen ore interno, quasi manu, excipit arripitque, & in sinus suos recondit. Effusa in vteri cauitatem hæc semina, statim exquisitè miscentur; alioqui ἐχὼ μὲν ἐφ' ὅρα καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, libello De natura pueri, nec conuertiuntur, nec animantur. Ei τῆς, inquit diuinus Senex primo Dediata, ἀνὴρ ἐν ψυχῇ μὴ προσμυγέει ψυχῇ, ἀφ' ὅρων ὅτιν: si quis animam animæ misceri neget, amens esto; per animam semen intelligit, quod passim ἐμψυχον vocat, id est, animatum. Hæc femininum miscella primum est naturæ generantis opus: statim enim permixtis feminibus, matrix nobilissima, ac propemodum diuina fauilla, colligit, sese contrahit, & ut Arabis dictione vtat, ita corrugatur, ut nullum intus inane spatium relinquat. Hoc scilicet facit, genituræ continendæ, fouendæ, & concipiendæ auida: quin & ne reconditum iam effluat semen, eius osculum ita exquisitè clauditur, ut ne aciem quidem acus & specilli cuspidem admittat. Tunc femininum vires sopitas, & delitescentes suscitatur vterus; & quod δυνάμει tantū erat, in actum erumpit. Hanc vteri actionem, conceptionem propriè appellamus, li-

Sanguis & semen simul in coitu non excernuntur.

Quamdiu mas & femina semina effundunt.

Seminum permixtio.

Quid concepit.

Signa conce-
ptionis

Signa concepti
maris & fe-
minæ

cet conceptionis nomen à comprehensione deductum esse velit Galenus 1. De semine. *κύνμα* ergo aut *κύνος* viuificatio est seminis foræcundi ad formandum foetum, pendens à proprietate corporis vteri. Cōceptionis signa quædam aperuit Hippocrates libro *αἰδὲ ἀρχῶν*, & 5. Aphor. Sunt qui ex singulis ferè corporis partibus concepti foetus signa petant. Nos mulierem concepisse existimamus, si in seminum concursu totum corpus leuiter cohorrerit, aut titillatur quodam vi- rum contrahi perceperit, si exceptum cum voluptate semen non exciderit, si vteri os internum exquisitè conuiueat, si lenis doloris sensus circa vmbilicum & hypogastrium oberret, si menstrua subsistat purgatio, si mammae obdurescant, extuberent, perdoleant, si Veneris appetentia languescat, si occysimè letetur, & subinde mœrore afficiatur, denique si in eduliis fastidium. Marem verò fecundamve an conceperit mulier, difficile est iudicare, ita tamen ex summi Dictatoris doctrina coniiciendum, quòd quæ marem gerit *εὐχρῆς ὄντιν*, bene colorata est, quæ feminam, *δύσχρῆς*, decolor, Aphor. 48. sect. 5. Quòd mares *ἐν τοῖσιν δεξιόσιν*, dextra parte; feminæ, *ἐν τοῖσιν ἀριστερίσιν*, sinistra magis contineantur, Aphor. 48. sect. eiusdem. Quòd si marem cōceperit, tumeat magis dextra mamma, si feminam, sinistra, Aphorism. 38. sect. 5. Verùm hæc omnia *σοχασμοί* sunt, non *τεκμήρια*.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An ad conceptionem semina simul effundi, & cum voluptate debeant, statimque misceri.

QUEST. XI.

Enervatio
nis de seminis
eiaculatione.

Conuelliunt
Auerroes.

Ratio.
Secunda.

Tertia.



AD perfectam generationem semen vtrumque & masculinum & femineum necessario requiri, iam à nobis confectum est. Sed an simul in coitu effundi debeant, nondum est explicatum. Auerroes seminis eiaculationem in vterum non semper necessariam esse contendit, vultque sine viri amplexu faminam concipere posse. Profert historiam mulieris, quæ balneum ingressa, in quod virile semen effusum fuerat, concepit: tam valida fuit vteri in proleclando semine facultas attractrix. Sed miror Philosophum in re tam aperta ita miserè hallucinatum; & in muliercularum deliramentis ita credulum: nam id sibi relatum à vicina affirmat, at versipelle genus samæ consulens suæ, hanc finxit technam, qua deluderet seculi credulitatem. An immemores, ô Auerroes, eorum quæ præceptor Aristoteles 2. De gener. anim. scriptis mandauit? Semen totum esse acreum, & spumosum, statimque aëri expositum liquefcere, aquescere & infæcundum reddit? Sed & 1. De gen. anim. cap. 6. scribit, animalia, quæ penem habent oblongum, ideò esse infæcunda, quòd ob viæ longitudinem semen refrigeretur. Si ergo in proprio conceptaculo refrigeratur; multò magis in aërem & aquam effusum. *ἄπο πρὸς διαίτοι*, quibus per vinculum, meatus semini & vrine communis contorquetur, generare non possunt, non quòd semen sæcundum non habeant, sed quòd in virgæ flexibus aliquantulum hæret, ferri rectà nequeat Galeno cap. 3. lib. 15. de vsu part. Annon sterilitatis causam agnouit Hippocrates 1. *αἰδὲ γυναικῶν*, vteri perner- sionem, distortionemque, quòd semen rectà ad os vteri internum ferri nequeat? Necessaria est igitur, ô Auerroes, virilis seminis in vteri cervicem eiaculatio, quæ & rectà, & impetu fiat. Quia porrò in brutis ea quæ rectà fit seminis eiaculatio magis est cōspicua, cōcunt enim à tergo: fit vi vno coitu ferè semper concipiunt, faminae variis; impeditur etiam ea seminis iaculatio à motu belluæ à natura edocta in coitu manent quiesc. Quòd si eodem tempore semina semen suum eiaculetur, & celerius & perfectius fiet conceptio, quia libidinis furor

incensus uterius, semen maiore aviditate alliciet & amplexabitur. Hoc primus omnium docuit Hippocrates 1. De morbis mulierum, his verbis: καὶ τὸ τὸ δὸν ἔσθ' ἐνδὲς ὁμοῦ ὁβὴ κατ' ἑξιν τὸ δὸν τῆς γυναικὸς τὰ χυμῶδες καὶ οὐροῦ. Si quæ à viro prodeunt simul, & secundum rectitudinem, cum iis quæ à muliere excernuntur concurrant, celerius concipiet. Dixit ὁμοῦ ὁβὴ, metaphora ducta à remigibus, qui uno nixu consensuque & equali temporis intervallo, remos immergunt in aquam, statimque attollunt. Quod autem celerius concipere scripsit Hippocrates, argumento est non esse perpetuò necessariam utriusque seminis simul & semel eiaculationem; sed posse aliquando conceptionem licet tardiorē fieri, si paulò ante, aut paulò post seminum fiat emissio. Quod si multo post aut antequàm mulier, vir semen emittat, exhaustis dissipatisque spiritibus non fiet conceptio. Hoc idem voluit Aristoteles libro 10. De historia animalium, quem doctissimis commentariis illustravit Scaliger. Sunt (inquit) qui putant concipi non posse, nisi utrinque eod. in tempore seminis iactus fiat. Hi falluntur, quia corpus bene habitum citius emittit. Ergo cum id semen valentissimum sit, non corrumpitur, sed attractum servatur ad eam missionem quæ futura est. Ex quibus patet, ad conceptionem simpliciter non esse utriusque seminis eodem tempore necessariam perpetuò eiaculationem, sed ad celeriorē tantum cōceptionem. Vtrum vero sine voluptate fieri possit conceptio, quaestum est olim. Plures hodie comperias, quæ ne quidem titillationis scintillulam ullam per sensisse affirmant. Dinus non semper excretionem seminis & conceptionem, cum voluptate esse putat, nempe ubi non accedit ad uteri os eiactio, sed ad cavitatem, cuius est sensus hebetior. Sed errat bonus ille vir. Non enim ideo voluptas excitatur, quod ad uteri os semen feratur, sed quia per vasa spermatica exquisitissimi sensus decurrit, alioqui gravida, quæ semen non in osculum interius, sed mediam cervicem eiaculantur, voluptatem nullam perciperent; at gravidæ maiore frui voluptate certissimum est, quia per ductus longiores fertur earum semen, ut capite De superfatatione suis explicabitur. Soluit quaestionem hanc Hippocrates libro 2. De apyxy. Vbi enim conceptionis signa quedam aperuit, hæc non omnibus contingere scribit, sed iis tantum quarum pura sint corpora; crassius verò, mucosis & impuris nihil tale contingere affirmat. Idem nobis de voluptate nunc liceat dicere. Sana mulier sine voluptate nunquam concipit. Impura autem, mucosa & crassa, sine voluptatis & titillationis sensu, potest concipere. Postremò, an ad conceptionem seminum permixtio requiratur, dubitant quidam, quia absurdum est existimare species misceri, deinde si miscerentur, fieret ut essentie intenderentur ac remitterentur. At essentia omnis impartibilis. Item, ex duobus entibus per se non potest unum ens per se fieri. Verum cum semina actu animata non sint, nec ipsa per se speciem animalis constituent, sintque etiam ex Philosophi decretis entia imperfecta, misceri ea necessario oportet, alioqui, nec nutriri, nec animari poterunt, ut scribit Hippocrates lib. De natura pueri. Et 1. De dieta, eos accusat qui dubitant, an ex duplici igne tertius exurgat. Si quis, inquit, animam animæ, id est semen semini misceri perneget, amens esto. & statim initio lib. De natur. pueri. Si generitur a utriusque permanserit in utero mulieris, primum semel miscetur.

Non est necessesse utrumque eiaculationem simul fieri.

Aristotelis auctoritate id demagistratur.

An fiat sine voluptate conceptio. Dinus opin.

Refellatur Dinus.

Quæstio semine ex Hippocrate.

An semina miscuantur.

An uterus vim habeat agendi aliquam in conformatione fetus.

QVÆSTIO XII.

A. duplex.

Causarū effici-
centiū apud
Medicos tria
genera.

HIVVS questionis dissolutio difficile explicatus non habet. Nam cum ex Philosophi doctrina, agens duplex sit, alterum principale, adiuuans alterum & promouens tantum: utrum agens principale nemo dixerit, quia sola mulier, sine viri complexu conciperet, & perpetuo femina, nunquam mares efformarentur. Agit ergo uterus, ut causa sine qua non, quia vim seminis sopitam promouet, & desinentem suscitatur. Medici efficientium causarum tria statuerunt genera, aut enim principalis est, aut adiuuans, aut sine qua nihil efficitur. Sic in catharricis causa princeps purgationis, est medicamenti proprietas; causa adiuuans, temperies calida; causa sine qua non, natiuus noster calor, sine quo medicamenti vis sopita, in altum baudquaquam erumpere. Ita in fetus conformatione causa princeps, semen est spiritus dico seminis, quibus nobilis illa architectrix (animam intelligo) domicilium sibi parat functionibus suis edendis accommodatum. Causa adiuuans, laudabilis seminum & uteri temperies. Causa sine qua non, est, uterus. Cum enim semina actu non sint animata, sed de se, tantum, alieno indigent ut excitentur principio. Agit itaque uterus multis modis. Primum, ut semen in sua ceruice, ut ceruus est profundis cuniculis serpentem narium in spiratu allicit. Non enim, ut somniantur veteres quidam, effunditur virile semen in uteri cavitatem, sed in ceruicem. Ei ergo occurrit obuiam: hoc ore interno, quasi manu, trahit arripitque, & in sinum suum recondit. Et quemadmodum, ut scribit Galenus 1. De semine, famelicus ventriculus cum fundo suo ad stomachum adcurrit, ac eo, veluti quadam vititur manu; ita uterus concupiscentie fundus seminis appetens, ei totus ad pudendum obuius occurrit. Hac itaque prima est uteri actio, seminis masculi tractio. Secunda uteri actio, seminum est permixtio. Permiscetur enim aut a se aut ab alio. Non a se, quia nec eodem tempore perpetuo emittuntur, ut Hippocr. & Aristotelis auctoritate superiori exercitatione confestim, nec in eundem locum ei aculantur. Virile siquidem in ceruicem, femineum vero semen per latera (continua dicunt) in sinum uteri funditur, fit ergo ab utero seminum hac permixtio, quam Barbari aggregationem vocant. Tertia uteri actio, seminum est retentio, in qua manifestum uteri motum presentis mulier. Colligit enim, sese contrahit, corrugatur, suumque osculum ita exquirit claudit, ut ne specilli quidem cuspidem admittat. Postrema uteri actio seminum est suscitatio, quam conceptionem vocant. Suscitatur autem seminum facultas non tam utero calore, quam eius ingenua proprietate. In quamcumque enim aliam corporis partem, etiam calidior em, effundatur semen, non concipietur, sed computrescet. Conceptione facta, cessat uteri actio. Totā vis agendi, efformandi nutriendi, augendi statim relinquatur. Hoc tantum prestat uterus, quod factū continet, conseruat, fouet, quia locus locati est conseruatio.

Quot modis
uterus agat.
Prima actio est
seminis tra-
ctio.Secunda actio
seminum per-
mixtio.Tertia est se-
minum re-
tentio.Postrema actio
uteri est con-
ceptio.

De vitiosis conceptionibus, ac præcipue de mola.

QVÆSTIO XIII.

Quæ requir-
tur ad perfe-
ctam concep-
tionem.

CONCEPTIONEM insita & vernacula uteri solius proprietate fieri, id inter cetera luculenter testatur, quod in quamcumque aliam corporis cavitatem semen effundatur, nunquam eius vis suscitabitur, nec in altum erumpet; adeo ut conceptio peculiaris sit uteri, ut chylosis ventriculi alio. Ut autem perfecta fiat conceptio, semina primum pura, & secunda effendi ac retineri debent. Pura interpretor cum Hippocrate, quæ morbosæ non sunt, nec sanguine illo per-

ullo permixta. Neque enim ad generationem sanguis affluere debet, nisi post inchoatam spermaticarum partium descriptionem; alioqui sanguinis copia obrutum semen, nec opus aggre-
dictur, nec inchoatum unquam perficiet, & exquisitè delineabit. Quod si infecunda sint se-
mina, quanam inde futura sperabilis esse potest? Quinetiam ad perfectam conceptionem uteri
requiritur eū xegioia, laudabilis tēperies. Quae enim calidos, frigidos, humidos, siccos
habent, uteros non concipiunt; Hippocrati c. Aph. Hæc si deficiant, xun, u. a. i. Sa. xūes, con-
ceptus legitimus sperari nequit; sed aut nullus omnino, aut depravatus & vitiosus, qua-
lem esse molam fatentur omnes. Depravatum autem conceptum plerūque molitur. Natura,
potius quam nullum; quia aternitatis & speciei propagandæ ita est avida, tamque sui dili-
gens, ut aliquid etiam imperfectum, & nature nostræ noxium creare malit, quam nihil. Sic
vermes vetriculo & intestinis molestos dum generat Natura, melius facit quam si nihil om-
nino generet; quia ex re immobili rem per se mobilem, & ex humore putri, animantem fa-
bricatur. Huius vitiosi conceptus, quam molam vocant, naturam & causas scrutari non-
erit ab instituto opere alienum. Molam Græci μύλω xai μυχίωος appellant. Sunt qui
nomen hoc à pistrinaria mola deductū velint, quod eam & duritiē & figurarum unda refe-
rat. Apud Persas Moli, informe quidpiam denotat. Afranius Poëta molucrum vocat.
Aristoteles sæpe μόλωσιν; quod sit, quasi crudor quidam. Molam definit Galenus cap. 7.
libri 14. De usu partium, σάρκα ἀπὸ τῆς αἵματος, id est, carnem otiosam &
imperfectam. Sed definitio hæc totam molam naturam non exprimit; potest enim caro que-
dam informis, & sine motu generari, quæ mola non sit. Generantur ubique caruncule, quas
mola nomine nemo insigniendas dixerit: perfecta hæc à nobis tradetur mole definitio: Mola
caro est otiosa, informis, & dura, in solo mulieris utero genita, ex femine imbe-
cilliori, quod conformationem quidem aggreditur; sed sanguinis copia obrutum
finem suum assequi non potest, & animalis loco carnem generat. Huius definitio-
nis singulas partes, sigillatim minutatimque excutere lubet. Mola caro est, quia carnosa eius
substantia, rubraque concretum sanguinem referens, intuentibus nobis apparet. Otiosa est:
id est, vacua omni motu animali; neque enim mouetur mola, nisi ad uteri motum. Informis:
non quod suæ forma careat, habet enim (ut loquuntur Philosophi) suum esse, sed quod anima-
lis, neque αἶδος, neque μορφὴ, neque speciem, neque formam habeat. In solo mulieris
utero gignitur, quia, ut scribit Aristoteles, sola mulier menstruo abundat, ob vitium ratio-
nem humidam, vitæq; institutum. Quæ autem de vrsa obiciuntur, quæ informes fetus edit
perpetuò, eosque lambendo perficit, aut fabulosa sunt, aut informes tantum apparere fetus,
non esse vera dicimus; quia cum per hyemem in latibulis degant puerita mucosa implentur,
quam parens lambendo latitantem formam detegit. Reliquæ definitionis nostræ particule
generationis modum & mole causas elegantèr explicant. Scio varias esse de mole generatio-
ne veterum sententias. Voluit Plutarchus sine viri consuetudine generari posse molam: quem
secuti sunt, qui à solo muliebri semine & sanguine confertim affluente, eam fieri existimant.
Convellitur hæc opinio à Galeno, cap. 7. lib. 14. De usu partium. Nam in gressibus nul-
lum unquam sine virili semine conceptum, quantumvis vitiosum, fieri posse apertissimis ver-
bis declarat; cum formationis omne principium à virili semine prodeat, quasi τὸ πρῶτον
ἐξ ὧν ἀρχὴν φύσις εἶναι. Adde, quod si ex solo muliebri semine conciperetur mola, virgines
aliquando, quæ nocturnas pollutiones patiuntur, molam gestarent, quod nunquam observa-
tum est. Non fit ergo sine coitu mola coagmentatio. Sunt qui existiment generari molam,
ut reliquas carnes ex solo sanguine confertim affluente, qui uteri calore cogatur. Verum cum
sanguis agendi nullam vim habeat, sed patietur tantum, non video quomodo ex eo solo gene-
rari possit mola, quam & vinculis utero alligari, & membranis vestiri, (quæ conformatio-
nis inchoatæ rudimenta sunt) cernimus. Neque etiam audiendi sunt; qui ex seminibus tan-

Cur depra-
vatum concep-
tus quæ
nullum mola-
tur Natura.

Idem nomen

Definitio
Galen.

Imperfecta
est.

Definitio mo-
le perfecta.

Caro est.

Origo
Informis.

Cur in sola
muliere gi-
gnatur mola.

De generatio-
ne mole.

Opinio Pla-
tarchi.

Convellitur.

Mercurialis
opinio.
Refellitur.

Opinio Hippo-
cratis.

tum crudioribus & corruptis, aut ex fœmineo masculum superante eam generari volunt. Verum generationis modum diuinus expressit Hippocrates 1. αἰὲ μιναιεύων, & libro De sterilibus, cuius verba quasi ex tripode dicta, hic subscribam: αἰὲ ὁ μύλης κύνισις τὸ δὲ αἴτιον. Ἐπὶ τὴν πολλὰ τὰ θημύνια ἔοντα γονιῶ ὀλίγω καὶ νοσῶδες ἐυλαάωσιν, οὗτε κύνια ἰθαθύες γίνεταί, καὶ ἡ γαστήρ πληρὴς ὥσπερ κύνος. De mole conceptu, inquit, hæc vera est ratio. Cum sanguis copiosissimus semē paucum & morbosum acceperit, legitimus conceptus non fit, & venter intumescit,

Explicatio.

quasi vtero gereret. Quid breuius? quid apertius dici potuit? Duo ad mole generationem requirit Hippocrates, primum, ut semen adsit virile, sed paucum & vitiosum; deinde, ut sanguis affluat copiosissimus. Semen paucum & vitiosum formationis opus aggreditur, & membranas effingere conatur. Est enim ferè omnis mola villis & membranis tecta. Sed dum inchoatum opus perficere tentat, affluxu sanguinis copiosissimo impeditur partium discretio neque enim, ut iam docuimus, ante spermaticarum partium delineationem affluere debet sanguis. Itaque ob sanguinis prædominium, illegitimus fit conceptus; & loco animalis, quæ prima erat naturæ intentio, caro generatur informis, vitæ quædam habens principia, sed adeò imbecilla, ut statim extinguantur. Nam quod quotidie augetur & crescat, id non præstat vera nutritio, sed appositio. Sunt qui carnem hanc inanimam non esse, omnino velint, sed ἡ κίττω. Nunquam igitur sine virili semine molam generari voluit Hippocrates; & principium omne coagmentationis mole semper est à semine. Id confirmat Aëtianus definitione sua; Mola, inquit, est tumor carneus, qui principium, & quod habet compactum, sumit à femine prolifico. Sed hæc de mole natura & causis dicta sint satis. Nunc quibus notis à vero conceptu distinguatur, aperiamus. Hippocrates primo De morbis mul. & libr. De sterilibus, mole signa ab his quatuor, tumore ventris, motu, lacte & gestationis tempore petenda putat. Primum quidam à ventris tumore. Nam celerius ex mola, quàm ex vero fœtu venter intumescit, & maiore cum duritie tenditur, ac difficilius gestatur. Secundò, molam à vero conceptu discernit motus: si enim post tertium aut quartum mensem nullus persentiat motus, vitiosus est conceptus: τὸ μὲν γὰρ ἄρσεν τελευτῶν, inquit Hippocrates, τὸ δὲ θῆλυ τετραμήνον τὴν κίνησιν ἔχει. mares namque tertio, fœminæ quarto mense mouentur. At mola planè est immobilis, nec nisi per accidens

Signa quæ bini
dignoscantur
mola ex Hip-
pocrate.
Primum ex
tumore ven-
tris.
Secundum
ex motu.

Diffimilis mo-
le & puelli
motus.

Tertium si-
gnum ex lacte.

mouetur cum vtero. Quod si motus quidam appareat tremulus & palpitans, non tam à mola excitari volumus, quàm ab vero inutile pondus excutere contendente. Iam verò mole & infantis motus planè est dissimilis. Puellus enim in omnem partem vertitur sponte sua, mola autem instar globi, nunc in dextrum, nunc in sinistrum latus prout in hanc aut illam partem inclinat vterus, prouoluitur. Mola manu compressa statim loco cedit, sed mox in eundem recurrit. Puellus cui non cedit, sic neque recurrit. Tertium mole signum à lactis natura petit Hippocrates: ὅς, ὅς, inquit, τὸ δὲ τετραμήνον μέγα ἐν τοῖσι τιτθῶσι γάλα ἐκέρχεται. Est hoc maximum & certissimum mole indicium, quod in mām lac nullū apparet, at si legitimus fuerit conceptus, lac in mammis generatur. Extat aureola libello De natur. puelli sententia: simulaturque cœperit moueri fœtus, tunc lac sui notam exhibet matri. Nullum autem generatur lac, si molam conceperit mulier, quia deest causa finalis, infantis quippe nutriticus. Postremum & omnium certissimum mole signum à gestationis tempore petendum putat Hippocrates. Si enim vndeicimum mensem, qui terminus est gestationis longissimus, excedat ventris tumor, nec ulla hydropis appareant indicia, molam in vtero gestari, non infantem, asseuerandum; αὐτὴ γὰρ, inquit præceptor, δὲ οὐ ἔταρα πολλὰ καὶ ὅ καὶ τετραεὶς ἔχει. mola enim nonnumquam biennium, sæpe etiam triennium totum manet, & Aristoteli cap. 7. lib. 4. de gener. animal. mola durat per annos quatuor, imò & tota vitæ, ut & consenscat, & commoriatur. Rationem adfert 10. De bist.

Postremum ne
gestationis
tempore.

animal: quia cum non sit animal, nullum ei motum, neque uterum sollicitat, ut puer, qui calcitrando exitum querit. Deinde non spirat mola, nec aëre indiget: non ergo cum appetit ad exeundum. Addunt recentiores, quod quae molam concepit, tota est pallida & decolor, & uniuersum ferè corpus contabescit.

Cur mola per
fructum in
utero marceat.

Demonstris & hermaphroditis.

QVÆST. XIII.



AD deprauatos & illegitimos conceptus referri debent monstra, de quibus paucula quaedam hic annotare non erit ab instituto alienum. Monstra appellat Aristoteles *παρὰ τὴν φύσιν*, excursions, digressiones naturæ, metaphora sumpta à viatoribus, qui aberrant & progrediuntur iter institutum. Nam cum natura quod vult & intendit perficere non potest, ne nihil agat, facit id quod potest. Desinit autem monstrum 2. physicon peccatum naturæ agentis ob aliquem finem, quo tamen frustratur aliquo principio corrupto. Contingunt monstra multis modis: suntque eorum innumera differentia; ego præcipuas tantum persequar.

Monstri de
natu.
Differentia.

Monstra vel fiunt in sexu, vel in conformatione vitiosa. In sexu dum incerti est sexus, ut dubites, siue mas an femina, aut dum utrumque habet, ut hermaphrodita. Hermaphroditas, androgynas *ἀνδρῶν ἑκ μέρους* & *ἀρσενῶν ἑκ μέρους* vocant. In maribus id tribus fit modis; cum in perineo seu inter femineo, muliebri pudendum exiguum videtur; cum iidem in scroto, sed nullo excrementi profluvio; cum ibidem exeunte lotio. In feminis unico; cum penis supra genitalis fastigium in clitorio & ima pube prominet. Addunt quidam in maribus, cum supra penis radicem muliebri natura extat; in feminis cum penis ad inguina vel in perineo profertur. In conformatione monstra sæpiissime fiunt. Ad conformationem refero figuram, magnitudinem, situm, numerum. In figura monstra contingunt, si quadrupedum more figuram habeat pronam homo, si faciem caninam, lupinam, vulpinam, &c. In magnitudine excedente, deficiente; si partium inæqualis sit proportio, caput scilicet amplissimum, aut ita exiguum, ut cum cæteris partibus non consentiat. In situ, ut si oculi in media fronte, nares in lateribus, aures in occipite sint, & similia. In numero excedente, ut si duo corpora, duo capita, quatuor brachia; deficiente, ut si monocolus, si aures nullæ, &c.

Monstra in
sexu.

Quot modis
fiunt Hermaphroditæ.

Monstra in
conformatione
in figura.
Monstra in
magnitudine.

In situ.

In numero.

Finis mon-
stra fiunt.
Causa variæ.

Per a causæ.

quatuor brachia; deficiente, ut si monocolus, si aures nullæ, &c. De causis, varij varia sentiunt. Theologi ad diuinam uisionem referunt; Astrologi ad astra. Alchabitius gradus quosdam esse dicit, in quibus si luna fuerit dum aliquis concipitur partus monstrosus editur. Sunt qui igni tribuant formas illas monstriferas, id est; mobilitati igneæ tanquam artificii ad formanda corpora celandasque effigies. Nos ad materialem & efficientem generationis causam omnia referenda putamus. Materia semen est. Efficiens seu agens; aliud est primum & princeps, hocque duplex, vis scilicet formatrix & imaginatio; aliud instrumentarium, loci nempe & qualitates quædam, ut calor. Materia in vitio est tribus modis, vel enim deficiit, vel superfluit, vel variè permiscetur. Si spermaticæ materiæ sit inopia, monstra fiunt in magnitudine & numero deficiente. Si redundet semen, fiunt bicipites, quatuor erunt brachia, &c. Si seminum adsit confusio permixtiôque, diuersæ speciei monstra gignuntur, sic Sodomitæ & qui cum brutis rem habent, terrifica sæpe generant monstra. Sic in Ægypto & Aphrica ob animalium diuersæ speciei permixtionem, frequentissima monstra contingere dicebat Aristoteles. Itaque ergo ex parte materiæ fiunt monstra. Ex parte agentis vario modo contingere possunt. agens primum, aut est vis formatrix, aut imaginatio. Imaginationis vires suo loco explicabimus; hic sufficiat annotare ex Arabum doctrinâ posse validam imaginationem producere formas, non secus atque intelligentiæ superiores formas metallorum, plantarum & animalium producant. Legimus in conterminis Pise, mulierem puellam edidisse pilis camelorum similibus refertam, quia imago B. Joannis ante oculos ei perpetuè observabatur.

Ex parte agē-
tis quomodo
fiunt monstra.

Hystoria.

Agens instrumentarium calor est & locus conceptus. Calor mobilitate ignea mira sepe fabricatur. Loci etiam, id est vteri peruersio & praua conformatio deprauata figura causa esse potest. Theologicas & Metaphysicas rationes pratero; hic tantum quæ physica sunt persequimur.

HISTORIA ANATOMICA.

De partium conformatione.

CAP. V.



Spiritus animæ organum quid nuncietur in generatione.

QUÆ prius in semine sopita erat, quasiq; intercepta genetandi facultas; calore & ingenta vteri proprietate suscitata, statim in actum erumpit. Tunc nobilis & diuina illa architectrix opus suum aggreditur, & idoneum functionibus suis edendis sibi ædificat domicilium. Id autem cum sine organo præstare nequeat, spiritui, quo vndiqueque spumofum turget semen, tanquam opifice & pictore, ad singularum partium delineationem vitur. Spiritus hic per totum seminis corpus vagatur, & quoque versum se diffundit. Is ille est, qui ὁμογενῆς μένῃ confluit, extendit, & velut ex sufflatione quadam perforat, ut solent vittarij. Huic ordinationem, secretionem, concretionem, densationem, rarefactionem, contractionem tribuit Philosophus. Hunc vocat Galenus 2. De semine, artificem fingentem, gignentem, formatem partes hominis; & ut dicebat Mercurius ille Trismegistus, spiritus omnem viuificat in mundo speciem, omnia dispensans, gubernansque, secundum propriam cuiusque dignitatem. Spiritus ergo primum & immediatum animæ instrumentum, per totam seminis molem discurrens, singularum partium, tam simularum, quam organicarum, quarum ideam in se continet, conformationem nudi primum penicillo, pictoris instar, adumbrat, mox vario pigmentorum genere singulas illustrat perpoliq;que, ordine modò hanc, modò illam perficiens. Totum hoc conformationis opus admirandus Hippocrates, ut refert Galenus 1. De semine, quatuor distinxit temporibus. Primum tempus id est, quo seminis species præpollet, γόνιμῃ appellat (nihil enim præter semina coagulata & crustula obducta videas.) Secundum, κύμωα vocat, quo rudis partium quædam adumbratio, & moles quasi carnea conspicua est. Tertium, quo trium principiorum, & partium omnium spermaticarum prima stamina cernere licet: eam animalis constitutionem, ἐμψυον vocat. Quartum & postremum, cum perfecta est partium omnium discretio descriptioq;que, πρᾶσιον tunc καὶ κῆρον, id est, puellum & infantem nominat. Præclara hæc quidem, ne dicam diuina, sed rudioribus non perspicua. Nos totum conformationis opus, & quo ordine singulæ partes delineantur, clarius explicabimus. Spiritus animæ instrumentum, in seminis molem sensu quidem vniformem, sed reuera heterogeneam, dum agere incipit, dissimiles eius partes primum secernit, tenuiores quidem, nobiliores & magis spirituosas intro recondens; crassiores verò frigidiore & viscidiores, quas foemineum semen ferè semper suppeditat, extrinsecus obducens. Ab his frigidioribus viscidioribusque formationem inchoat, membranas quippe effingit, extenditque, mirabili sanè providentia. His enim quasi sepimentis, nobilior seminis pars obvallatur, & interni concluduntur spiritus, qui ob tenuitatem facillè vanescerent. Adde, quòd nisi prius efformarentur membranæ, tenellus embryo eiusque princi-

Quatuor tempora conformationis quædam Hippoc.
Primum.
γόνιμῃ.
Secundum.
κύμωα.
Tertium.
ἐμψυον.
Quartum.
πρᾶσιον.

Ordo generationis partium.

Prima omnium efformantur membranae & cur.

pes partes, vteri duritiæ læderentur. Vt enim D E V s Opt. Max. ignem aëris spatio, & aquarū diuortio diuisit à terris; sic diuini operis imitatrix & æmula Natura harum membranarum ineriectum puellum ab vtero separauit. Quàm tristis semper & querula puello vitæ foret si molle duro collideretur! Harum membranarum non eadem est in humano fœtu, quæ in brutis ratio. In brutis enim præsertim cornutis, membranas tres sæpe obseruauimus, chorion, amnion, & allantoidem. Chorion tota vtero adhæret venarum & arteriarum vmbilicalium ineriectu, in ea conspicuæ sunt cotylidones carnosæ & spongiosa substantia contextæ. Amnios priore tenuior totum cingit fœtum & sudoris creditur receptaculum. Tertiâ à farciminis figura allantoides dicitur; fœtum non omni ex parte ambir, sed à mucronata cartilagine ad ima vsque tantum illa fœtum cingit instar zonæ cuiusdam, aut reniæ latæ; vrinam continere dicitur. In humano fœtu, duæ tantum reperiuntur membranæ, chorion & amnios. Chorion nervosa est validaque omni ex parte fœtum ambiens, vnde forrasse *χωρλον* dicitur ἢ *χόριον*, aut quod circuli & coronæ instar fœtum ambiat, aut quod fœtus sit *χωρητός*, id est, *conceptaculum*, aut quod ei *χορηγός* hoc est, suppediet alimentum. Hæc subterniculi & mollioris puluinaris instar, venas omnes & arterias vmbilicales fulcit sustinetque. Non enim tutum erat vasa puelli extra vmbilicem prodeuntia, denudata & sine propugnaculo longo itineri committere. In ea cotylidones non sunt, id est tubercula illa papillis mammarum similia, vt in brutis: sed massa quædam carne ex infiniris venarum & arteriarum ramusculis miro artificio implicatis, & sanguine velut affuso contexta, eorum vicem gerit. Placentam vocant recentiores, affusionem orbicularum, vetricum hepar; cuius hunc usum agnoscunt, vt sanguinem ad fœtus nutritionem præparet excoquaturque velut alterum hepar. Ego corpus hoc rotundum & subrubrum, orbi plenæ lunæ simile, & alteri tantum vteri parti hærens, nec fœtum omni ex parte ambiens, malo appellare. *πρόσχωρεας* aut *καλλύχωρεας*, eundemque illi usum assigno; vt scilicet vmbilici vasa per chorion numerosa ramorum serie sparsa, tutò suffulciat, eisque puluinaris instar subiiciatur. At cur acetabula illa chorion vtero firmiter alligantia, non habuit humanus fœtus? An quia tam numerosam prolem non gerit mulier? An quia quadrupedum vterus magis extuberat, qui nisi validioribus vinculis neceretur, vix fœtum posset gestare? Altera tunica puellum immediatè inuoluens, ob molliorem & tenuitatem *ἀμνιὸς*, agnina appellatur, ab aliis conceptus armatura, cartavirginea, indusium, ab Arabibus, abigas. Libera est omni ex parte præterquam in regione placentæ, vbi chorio ita adnascitur, vt vix ab ealeparari possit; vrinæ & sudoris est conceptaculum; vnde non exigua puello commoditas; innatat enim puellus aquis, & in iis innocenter vt in balneo sedet partusque inde spectatur facilius, quia leuius est & lubricum magis vteri osculum. Tegmina hæc sibi mutuò connata vnum videntur constituere, quod Græcis *δευτέρων καὶ ὑσέων*, Latinis, *secunda* vel *secundina* dicitur, aut quod in pariendo vltimum sit, aut quod secundum sit ab vtero fœtus domicilium. His tunicis obuallata seminis interior & nobilior pars, audacius formationem aggreditur. Tunc temporis per totam seminis molem vagatur spiritus, & cum procreatrici facultati duæ famulentur, imbutrix & conformatrix: primum seminis materia alteratur, & disponitur, mox eodem ferè memento parrium omnium spermaticarum prima itamina rudioribus quasi lineis simul & semel adumbrantur. Tunc res ampullas, quasi guttas pellucidas, bullis similes, quas aqua pluvia suo in flumen illapsu exci-

In brutis mēbra tres.

Chorion.

Amnios.

Allantoides.

In humano fœtu duæ tantum membranæ. Chorion cur ita dicatur.

Moles carnea loco cotylidonom.

Vfus placentæ secundum recentiores.

Vfus noster.

Cur humanus fœtus non habet illa acetabula ut brutus. Amnios cur dictus.

Quid puello profint aquæ.

Simul iacimus cur partum fundamur.

*Ex bulla &
mille filamen-
ta.
Hippocratis
operta.*

*Septimo die
omnium sper-
maticarum
partium rudi-
mentum consti-
tuta sunt Hip-
pocrati.
Ordo perfe-
ctiorum partium.*

*Ossa alia cele-
rius perficiun-
tur alia.*

*Quota die fiat
spermaticarum
partium ab-
solutio.*

*Secunda for-
tus conforma-
tio ex san-
guine.*

*Quo ordine
carnes effin-
guntur.*

tar, principum partium rudimenta, & mille filamenta vasorum, & spermatica-
rum partium velut stamina cernere liceat. Vt verisimile sit, quod diuino afflatus
numine primus omnium prodidit Hippocrat. 1. De diæta, & libro De locis in
homine, omnes partes simul inchoari, non tamen simul apparere, nec perfici.
Quoto autem die, quintone an septimo singula hæc figurari incipiant, solus, qui
fœtum plasmauit, nouit creator. Si tamen Hippocrati & experientiæ fides adhi-
benda, ὁ γόνος ἐν ἐπτά ἡμέρησιν ἔχει ὁλόκληρον πρὸς τὸν ἔχον τὸ σῶμα: *generata*
septimo die habet quæcunque corpus habere debet. id est, ut ego interpretor, septimo die
partium omnium spermaticarum prima apparent rudimenta, quæ si in aquam
coniecta attentius inspexeris, facile deprehendes. His ita iactis spermaticarum
partium fundamentis, singulæ suo quæque ordine perficiuntur. Nobiliores &
magis necessariae omnium primæ, vtriq; principia, & eorundem πρῶτα, ve-
næ, arteriæ, nerui. Venæ ab hepate ad chorium vsque propagantur, arteriæ ab
iliacis ramis ad eandem membranam excurrunt, & cum vasorum vtriq; osculis
coeunt, adeo ut vasa hæc vmbilicalia dicta, per quæ spiritum ducit puellus, inte-
riorum vasorum propagines sint, contra vulgi opinionem. Duriores verò & soli-
diores partes simul quidem figurantur, sed non simul perficiuntur. Nam ex ossi-
bus alia celerius perficiuntur, alia tardius. Costæ, gena inferior, auricularum ossi-
cula, clauæ, os hyoides, primis diebus ossæam acquirunt naturam. Brachij, ubiq; &
femoris ossa imperfectas habent epiphyse & omnino cartilagineas. Maxillæ su-
perioris vtriusque manus, spinæ & sterni ossa, cartilagineæ tantum sunt. Causa
celeriores formationis & perfectionis ad vsus, id est finalis causæ necessitatem re-
ferenda. Costæ enim quia thoracis cavitatem efformant, ne comprimerentur
viscera, ossæ statim construendæ. Gena inferior infanti edito statim necessaria
erat ad suctum & motum; auricularum ossicula ut melius resonarent, sicca & du-
ra esse debuerunt. Clauicula, brachium & scapulam trunco connectens, ossæ sta-
tim efformanda, ut & os ipsyloides linguæ pro stabilimento substratum. Idem
de cæteris partibus statuendum; in quarum delineatione laborat perpetuò vis il-
la formatrix, neque cōquiescit vnquam, donec absoluta fuerit earundem discre-
tio, descriptioque; quæ matribus quidem trigésimo, fœminis 40. aut 42. perfici-
tur. Hippocrates lib. De natura pueri, & De septimestri partu; τὸ μὲν ὅλον τὸ
πρῶτον πηξὺν ἐν τεσσαρῶντα ἡμέρησιν, καὶ δύο τὸ μακρότατον τὸ δεῦρον
ἐν βήκοντα ἡμέρησιν, τὸ μακρότατον. hoc est, *fœmina quidem conformationem pri-
mam duobus & quadraginta diebus, quod longissimum est, consequitur; masculus diebus,*
quod longissimum est, triginta. Atque hæc prima est fœtus conformatio, tota ex se-
minis corpulentia, quæ eius molem non excedit. Si enim, ut scribit Philosophus
septimo De Histor. animal. cap. 3. in gelidam coniiciatur, formicæ maiusculæ
magnitudinem vix superabit: ego tamen fœtum 40. dierum longitudinem di-
giti auricularis excedere sæpè obseruavi. Est altera fœtus conformatio, ex altero
generationis principio, sanguine scilicet, ex quo carnosæ partes, ut è semine, sper-
maticæ effinguntur. Sanguis hic, quidquid existimarint veteres, non prius affluit,
quàm delineatæ sint spermaticæ partes. Affluit autem per vmbilicalem venam,
quæ potest esse propago, sparia inter fibras vacua, quasi rimas, expleturus. Cæterum
cum triplex sit caro, quæ visceribus innascitur παρέγχυμα dicunt, quæ muscu-
lorum fibris adhæret, carnem absolutè vocant, & quæ cuilibet parti peculiaris est.
Triplicem hanc carnem non simul & semel, sed ordine generari volumus; pri-
mumque parenchymata, mox peculiarem partium, tandem musculorum carnes

coagmentari existimamus. Parenchymatum primum omnium est hepatis, quia sanguinem eo primum refundit umbilicalis vena; deinde cordis, tum reliquorum viscerum. Hęc nimirum est tota foetus ac singularum eius partium conformatio.

Hepar primum omnium parenchymatum

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An omnes partes simul conformentur.

QUEST. XV.



HIVS questionis tam ardua est & tanta obscuritate involuta inuestigatio, ut Galenus libello, *An omnes particule simul fiant*, soli Deo & Natura cognitam esse libenter fateatur. Quid enim prima hominis formatione divinius? quid admirabilis? quid magis reconditum? Hoc Regius ille Propheeta caelesti numine plenus, cecinisse est visus: Cōfitebor tibi Domine, quia mirabiliter sū formatus, informem massam meam viderunt oculi tui, &c. Cum itaque qua-

Quæstio difficultas

tionis huius dissolutio humani ingenij vires obscuris vallatas cæciliis excedat, si quid paulo liberior in eius explicatione propositum fuerit, φιλιδ' ἄρ' ὅς omnes obtestor, ne id tam exilitati ingenij quam rei magnitudini tribuendum putent. Quoniam verò expugnantium opinionum velitatione veritas, ut ex mutuo lapidum attritu & collisione ignis, elicitur, quid veteres hac de re opinati fuerint, primum videamus. Alcmaeon cerebrum omnium primum efformari voluit, quod scilicet hoc rationis sedes, & anima domicilium sit, & quod in puerulis maior sit cerebri & capitis, quam reliquarum omnium partium moles: fortasse legitur apud Hippocratem in Epid. ex capitis magnitudine ossium & totius magnitudinem æstimandam esse, quasi omnia ex capite conformentur, ab eoque pendeant. Docuit olim publice Pelops, ut narrat Galenus cap. 2. lib. 6. De placitis Hipp. & Plat. vasa omnia a cerebro ortum ducere, quod voluit etiam Persarum ille philosophus, quem Avicenna Theleum Perseum, alij Syarmor Cabronensem vocant. Sed cum cerebrum motus tantum sensusque & facultatum principum auctor sit, non egeat autem facultatibus his in prima conformatione factus, non video cur cerebrum prius quam reliquæ spermaticæ partes effingi & efformari debeat. Democritus ut refert Aristoteles cap. 5. libri 2. De generatione animal. exteriora primū fieri putabat, deinde interiora ut lignea & lapidea animalia. Orpheus animal constitui ut rei nexum volebat, id est ordine. Empedocles iecur primum formari existimabat, Stoici omnia simul fieri contendebant. Aristoteles 2. De gener. anim. cor primum omnium generari vult, & ab illo reliqua omnia membra produci, ipsumque, veluti filium emancipatum à patre, regere ac dispensare totum corpus. Hoc primum & unicum esse principium scribit, primum ζωτικὸν, κινητικὸν, καὶ αἰματοποιητικὸν; quia postremū omnium vita privatur. At quod ultimum moritur, id primum vivere debuit. Quod autem ultimum moriatur, id & quotidianus euentus docet, & Galeni auctoritas cap. 1. lib. 5. De loc. aff. Numquam mors, inquit, nisi affecto corde, & nisi ad immodicam cordis intemperiem. Est ergo necessarium prius creari τὸν δυνάμει, cor scilicet, quam τὸν ταμίαν, id est, iecur. Hanc Aristotelis sententiam sequutus videtur Arabs Avicenna, quam aliquot rationibus fulcit; quia nutriri non potest animal, nisi vivat, & caloris influxu participet. At cor natiui caloris fons est uberrimus. Deinde formatrix facultas nutritione non eget primis diebus; quia tunc resolutio nulla effatu digna partibus accedit, sed calore, & vitali spiritu semper est opus: debet ergo cor prius formari quam hepar. Verum hac Aristotelis decreta iam pridem à Medicorum scholis explosa sunt. Quod enim unicum nō sit, nec primū principium cor, quæstione 2. libri primi fusè latèque differuimus. Quod autem primum omnium

Alcmaeonis opinio.

Pelopi.

Aristotelis opinio.

Cur ultimum moriens Aristotelis & Galeni.

Avicenna sententia.

Aristotelis opinio censetur.

Secus primū

Ratio contra
Aristot.

Cor nō est pri-
mum viuens.

Quid sit vi-
uere.

Galeni opinio
varia.

Successiue
partes gene-
ratur.

Hepar primum
formatum.
Rationes.

Non admi-
tenda Galeni
opinio.

Rationes.

Obiectio.
Solutio.

non generetur, & sensu & ratione, quæ duo sunt rerum omnium *εὐκρίτεστα*, demonstrari potest. Sensu quidem, quoniam tres bullæ trium partium principum rudimenta perperis si- mul apparent, neque unicam solam quisquam umquam obseruauit. Ratione, quod cordis opera primis diebus non eget embryo. Cum enim vitam planta uiuat, nec pulsatione nec spiratione, nec influxu caloris eget, si se suo se calore, & spiritu in suo fouens. Quod autem primum viuens esse contendit Aristoteles; quia sit ultimum moriens, negamus id inde sequi, quæ enim in generatione prima sunt, non semper in dissolutione sunt postrema. Sic in mixti generatione materia formam præit, & tamen formæ abolitio mixti corruptio est. Ergo anguillis & serpentibus vita principum erit in cauda; quia demortui iam cæteris partibus penitusque immobilibus facti uiuere mouerique adhuc uidentur. Vita quidem ultimum priuari cor volumus quia perfectio & absolutio facti, vitalis calor, à solo corde, tanquam uberrimo fonte, manat; sed primum uiuere plane inficiamur. Quia uiuere, aut esse nutriti, aut esse animatum. Cor nec primum alitur, nec primum animatur. Nutritio namque omnis à sanguine, sanguis non nisi per uenas; at uenæ omnes ab hepate; & umbilicalis uena embryi nutritula sanguinem prius in hepatis quam cordis paræchyma refundit. Neque etiam prius animatur cor, quia si non auctum in actum erumpit, dum formationem incubat, totum actum est animatum. Ergo singula eius partes actu uiuunt, sola calidi in humido participatione. Valeant igitur Aristoteles, Cbrissippus, Stoici, & quicumque cor primum *καὶ πρῶτον* xet *αἰματωτόν τε* appellant. Galenus de partium conformatione dissentientia loquutus uidetur: nunc enim cor & hepar simul formari uidetur; nunc hepar prius efflori, nunc uenam umbilicalem: in hoc tamen sibi ipsi consensit; quod successiue partes generari, non autem simul & semel existimet. Id illustrat exemplo eorum que in arte fiunt. Non enim tota simul edificatur domus sed primum fundamenta, mox parietes, tandem tectum. Ita & in fœtu pars una prius conformatur, quam alia, ea scilicet, quæ embryoni magis est necessaria. Tale existimat esse rector, quia uiuunt fœtus primis diebus vitam plantæ, nutritioneque sola eget, ut planta: hepar autem alimentis est officina. Ut ergo planta cordis non eget opera, ita nec fœtus primis diebus. Quinetiam rector primum generari eius indicat magnitudo, & generationis facultas, sit enim ex sanguine tantum fuso concretioque. Adde quod umbilicalis uena ad hepar prius fertur, quam ad cor. Hæc autem omnia uera esse docet Galenus cap. 3. lib. De format. fœtus, quia in pueris naturales facultates tanquam primæ omnium sunt ualentiissime imbecilliores quæ à corde, imbecillissime, quæ à cerebro. Accedit, quod generatio omnis sit ab imperfecto ad perfectum: prius ergo formatur hepar, deinde cor; postmodum cerebrum. Hæc est Galeni & omnium ferè eum ueterum, tum neotericorum Medicorum de partium conformatione sententia. Ego cerè hæcenus uisui, ut nullius iurare in uerba magistri assueuerim sed cum eos tanquam heroes nostros plurimi, ut æquū est, fecerim: si quando tam in rationi pugnantia proferant, non erubuerim ab eorum discedere placitis. Icor itaque, quicquid sentiat Galenus, primum conformari non puto; quia iccoris opera ante singularem partium delineationem non eget fœtus. Neque enim affluere debet sanguis, nisi post partium spermaticarum discretionem, descriptionemque, alioquin sanguine obrueretur fœmen, & loco ueri conceptus, mola generabitur. Et quam ex sanguine fingit Galenus nutritionem, auctoremque, tantum abest, ut ad primam formationem necessariam dicamus, ut potius obesse cum Hippocrate & Aristotele asserimus, adeo ut eadem in Galenum iacula, quæ ipse in Aristotelem, etiam retorquere. Non eget, dicebat Galenus, cordis opera fœtus, ergo non debuit cor prius formari, quam hepar. Non eget, dicitur nos, hepatis opera fœtus, quia non alitur nisi post absolutam spermaticarum partium delineationem: non ergo debuit hepar prius formari, quam cor, & cerebrum. Obicietis pro Galeno; vitam desinari nutritione: si ergo uiuit embryo, nutritione eget. Dico in perfectis animalibus, nihil uere,

quod

quod non nutriatur. Imperfecta autem exanguiaque sine alimento ad tempus vivere; sic animalcula quaedam per hiemem in latibulis degunt; & planta per hiemem non alitur, satis est si seipsam vivificet: Tenellus ergo embryo totisque exanguis vivit primis diebus, non alitur tamen; quia nutritionis nulla necessitas, nullus quippe partium exhaustus. Superest nunc ut nostram de ordine conformationis partium sententiam brevis & dilucida oratione aperiamus, quae, ut tyrunculis clarior illustriorque evadat; hi prius adhibendi sunt elorisimi. Partium alias esse foetus proprias, quibus toto vitae tempore utitur; alias facti tantum, quamdiu in utero continetur, inservire, cuiusmodi sunt tegmina illa coriacea, & membranula foetum involuentes. Rursum hoc annotandum, partes aliq̃ae esse spermaticas, ex seminis crassamento genitas, alias carnosas, quarum ortus immediate sanguini acceptus referendus. Et harum tria esse genera, ut triplex est carnis genus. Aut enim caro esse viscerum, *παρ' ὅνυχμα* dicant, aut caro musculorum, proprie & absolute *σὰρξ* dicitur Hippocrati; aut peculiaris cuiuslibet partis caro, quae proprium nomen non sortitur. His ita constitutum, membranas, amnion, & chorion, primas omnium efformari existimamus; quia his, velut sepimentis, obvallanda erat seminis interior nobiliorque pars, ut sequenti exercitatione fufius demonstrabitur. His tunicis efformatis, spermaticarum omnium partium rudimenta, & prima flamina simul & semel delineari volumus; quia eadem est materia tam a calore disposita, & alterata, idem artifex, spiritus quippe per totam seminis molem diffusus; eadem causa finalis, id est, singularum partium usus; cum enim in prima delineatione, nec hepatis nutritione, nec cordis influxu, pulsationeque, nec cerebri sensu indigeat fatus; sed suo se calore foveat, cur hanc prius, illam posterius formari existimabimus? Si dum puris coctionem aggredditur natura, totam materiam ad aequalitatem simul perducit, & in omnes materie partes pariter aequaliterque sese insinuat, cur in prima hac spermaticarum partium delineatione, singularum partium, quarum ideam in se continet formatrix illa facultas, descriptionem simul & semel non inchoabis? Haec mea non est, sed venerandi Senus i. De dieta, & libro De locis in hom. sententia. *διὰ πρῶτον αὖ ὅ (inquit i. De dieta) τὸ μέλει αὖ μὴ πάντα καὶ αὐξεται, καὶ ὅτε πρότερον, ὅδ' ἐν ἑτέρῳ ἐτέρῳ, ὅτ' ὕστερον, τὰ δὲ μέλλ' ὡς φύσει περὶ τοῦ φαίνεται αὖ τῶν ἐλασσόνων, ὅδ' ἐν περὶ τοῦ γινόμενα.* Delineantur partes simul omnes, & augentur, nec prius alia aliis, nec posterius, sed maiores natura priores apparent minoribus. Libro autem De locis in homine statim initio, in haec verba erumpit: *ἐμοὶ δοκεῖ ἀρχὴ μὲν ἐν ὁστέμειν εἶναι τῷ σώματι, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως ἀρχὴ καὶ πάντα τελευτῇ.* Mihi quidem principium corporis videtur nullum esse, sed omnia similiter principium & omnia finis. Quid quaso appositius? quid brevius? quid divinius dici aut excogitari potuit? Partes ergo spermaticae, solidae & primae simul & semel adumbrantur, sed mox suo quaeque ordine perficiuntur: nobiliores & magis necessariae omnium primae; ignobiliores & minus necessariae, postremae. Post spermaticarum delineationem, carnosae effinguntur, ac primum carnes parenchymatum, mox caro peculiaris partium, tandem spatia musculorum vacua implentur. Inter parenchymata primum omnium hepar coagmentari volumus, quia umbilicali vena eo sanguinem prius refundit, quo fuso concretioque fit caro: & hoc fortasse voluit Galenus, dum hepar primum omnium gigni scribit, ut excusari hac in re possit.

Quid sentiamus.

Differentia partium factus.

Membranae primae omnes generantur.

Partes omnes simul conformatur.

Hippocrati quatuor.

Carnosae omnes sunt oblique.

Quomodo excusari possit Galenus de excusatione hepatis.

An membranę fortū inuoluentes omnium sint primę; & an à vi formatrice fiant, tum an à muliebri semine.

QVÆSTIO XVI.

Membrane
primę effin-
gentur.

Experientia.



E membranarum, quę fœtum ambiunt, exortu tria hic breuiter inquirenda. Primum, an ab his formationem inchoet vis formatrix, id est, an primę omnium effingantur. Ego sanę & experientia & ratione persuasus, membranas primas omnium efformari existimo. Experientiam proferam Hippocratis, Aristotelis, Galeni, & meam. Genitura, inquit Hippocrates, postquam permixta & retenta fuerit, quocunque die &

hora excernatur, pellicula quadam quasi crusta, perpetuò tecta cernitur. Idem scribit Aristoteles lib. de generat. animal. & Gal. 1. De semine. Vidi ego sapiissime genituram conceptam solis membranis tectam. Quis vnquam conceptum, quantumvis vitiosum & deprauatum vidit, qui non pellicula quadam velut tegmine, vestiatur? Mola, licet infirmis pellicula sua tegitur, argumento sanę, vim formatricem in omni conceptu opus suum à membranarum delineatione perpetuò inchoare, sed impediri plerumque nec vltius progredi. Experientia fauet & adstipulatur ratio. Debuerunt membrana prius formari, ut his ob-

Ratio.

2. Quæstio.

An mem-
brana à vi
fieri forma-
trice.
Auctoritas.
Ratio.

Opinio nostra
fieri à vi for-
matrice.

Experitur
auctoritas.

Ratio satis-
fit.

An mem-
brana à virili
aut muliebri
semine fiant.

2. Quæstio.

membrana non in sunt, quomodo igitur vim illam tegmina effingendi habebit? Ego membranas tres à vi seminis formatrice generari existimo, non autem à solo calore uteri; quia non tantus est uteri calor, qui tam paucò tempore seminis superficiem assando, membranas genere queat. Si enim ad eum caloris gradum perueniat uterus, nunquam fiet cœceptio. Que, inquit Hippocrates 5. Aphor. uterique habent præcalidos, non concipiunt: quia calidior vir-
rus semen ardore torret & exurit. Auctoritas Hippocratis, sententia nostra non aduersatur: similitudine tantum & exemplo rem aliqui obscuram illustrat, quasi diceret: Quemadmodum panis, crusta quadam, ita fœtus, pellicula circumdatur: modum autem generationis similem esse nusquam affirmat. Quod aiunt, semen partium tantum, à quibus manat, ideam in se continere, membranas autem has nec in patre, nec in matre actū esse. Dico formatrici facultatis tantas esse vires, tamque diuinas, ut eas de semine in semen diffundat. Si ergo auro-
rum note in nepotibus sepe elucescunt post plures affinitatis gradus; cur non vim eam, quam alias habuit ipse parens, dum esset tenellus, semini imprimet vis formatrix? Adde, finali-
canassa necessitatem: decuit fœtum membranis vestiri; eas igitur nobilis illa architectrix fa-
bricatur. Vtrum autem à muliebri an à virili semine membrana generentur, quod tertio loco inquirendū erat, nunc videamus. Vetus fuit opinio gigni à solo muliebri semine, quoniam id frigidius est minusque fecundum. Itaque nobiliores seminis partes intro recondit natura; ignobiliores verò sepimenti instar, extrinsecus apponit: at ignobilius fameineum semen. Quis etiam perexigua est masculci seminis moles, quę internis & externis partibus delineandis non est satis: suppetias ergo à femineo petit. Ego sapius quidem à femineo semine membra-
nas generari puto: sed ab eo solo solas, ut dicunt, efformari, plane inficior. Nam quomodo si exiguum virile semen fingendis omnibus fœtus membris satis est, vnus chorij generatio-

ni impar aestimabitur? Si femineum semen solas membranas gignit: quomodo ex illius victoria trium generum femelle procreabuntur, ut auctor est Hippocrates 1. De dietis? Annon in seminum permixtione vincit plerumque femineum semen? Cur ergo huic soli vim effingendi membranas, virili autem debiliori, facultatem totum fatum delineandi concedam? Concludamus ergo membranas ex utroque semine generari posse, sed ex femineo saepius, & ex femineo semine non segmina tantum haec, sed etiam reliquas spermaticas partes efformari posse. Arantius libello, quem edidit De humano foetu, membranas amnion & chorion, ^{Arantius refellunt.} primas omnium non generari contendit, sed propagines esse tunicarum internarum: amnion, quidem à membrana carnea oriri vult, & chorion à peritoneo: quae & experientiae & rationi aduersari statim initio huius capitis exposuimus.

De vasorum umbilicalium numero.

QVÆST. XVII.

L VASORUM umbilicalium historia duo obuersantur inuoluta, numerus ^{De numero vasorum communis.} scilicet vasorum, & eorundem exortus. De numero non satis inter Anatomicos constat; alij tria tantum statuunt, alij quatuor, alij quinque. Quot tria agnoscunt, unicam venam & duas arterias statuunt: qui quatuor esse volunt, addunt illis tribus vrachon: qui quiuarianum assignant numerum, duas venas totidemque arterias & vrachon numerant. Ego ^{Opinio nostra.} in homine, & in ceteris animalibus quatuor vasa perpetuo obseruaui. Primum omnium vena est embrii nutritula; quae solitaria & simplex ab hepatis scissura, ad umbilicum fertur: ubi autem umbilicum permeauit, bipartito finditur, duosque statim diffundit riuos; hi in alios atque alios sparguntur, & membrana illa, quam chorion diximus appellari, suffulti, cum venarum utriusque oculis coeunt; in quibus quidem & subius per corylidones & acetabula, umbilici figuram referentia; in hominibus verò per molem illam carneam, quam placentæ cathem, & uterinum iecur, nescio qua ratione, recentiores Anatomici vocauerunt. Non enim in ea carne sanguinem preparari & excogui puto; sed eius cum usum agnosco, quem glandoso corpori, πλάκας dicto, veteres assignauerunt; ut scilicet vasorum innumeras propagines per chorion distribuendas, puluinaris instar, tutò suffulciat. Vena ergo ab umbilico ad hepar unica est, & solitaria; ab umbilico statim finditur, & duplex apparet. ^{Quomodo simplex & duplex dicatur à Galeno.} Ita conciliandi sunt dissentientes Galeni loci, quibus nunc unicam venam, nunc duas esse scribit. Arteriae umbilicales duae sunt; una utrinque, non à corde, sed à ramis iliacis aortae descendentes prodeuntes. Quartum superest vas, in quo totius disputationis cardo versatur, vrachum veteres appellauerunt, quod eo canali urinam effundat foetus in membranam. Hoc ^{Vrachui.} ferè omnes Anatomici iniuniores in humano foetu pernegant, & in brutis tantum reperiri contendunt, cum tamen in homine ego semper obseruaui. Nam à fundo vesicae hominibus, non minus quam brutis, ad umbilicum ferri productionem nerueam, nemo, ut opinor, Anatomicus negabit. Quorsum productio hac in humano foetu? non ut ligamenti solum vicem gerat, (alligatur enim adheretque vesica firmiter vicinis partibus, fibrarum multarum à peritoneo exortarum interiectu) sed ut eadem, qua in brutis, ratione urinam deferat. ^{Dari hoc va probatur.} Confirmauit opinionem meam historia puellae cuiusdam, cui cum suppressa per multos dies fuisset ^{Historia.} urina, tandem per umbilicum eam profudit. Narrauit id saepius in scholis nostris Bartholomaeus Cabrolus Chirurgus expertissimus, mihi amicissimus, & Academiae nostrae dissector ordinarius. Similem refert historiam Fernellius cap. 13. lib. 6. Cuiusdam (inquit) annum agenti ^{Historia Fernelli vrachui confirmant.} trigessimum, obstructa vesica ceruice, urina affatim tanquam è mictione ex umbilico in multos menses profluxit, idque citra tumorem, citra ullam aequè in abdomine collectionem, & citra valetudinis offensam. Quum hinc multi admiratione tenerentur, audirem verò re-

Quomodo
umbilica va-
sa coeant &
funiculo du-
cantur.

De vena um-
bilicali obser-
uatio varia.

veni in lucem edito, male vinctum umbilicum nunquam coaluisse, exhincque semper notan-
tibus stitisse, sensui nondum in aruisse vrachum, & nunc illi perinde atque dum vtero gestare-
tur vrinam ē vesica in vtrilicium resluere. Sunt ergo quatuor vasa umbilicalia, vena vni-
ca, duę arterie & vrachus, quę circa umbilicum coeunt & velut canali quodam longo, ner-
ueo, tortuoso includuntur, funiculum vocant, laqueum, intestinulum, aliqui huc illuc ve in-
certo & vagabundo ductu fluere, aut rumperentur, aut implicarentur. Quatuor hæc vasa
factu in lucem edito, tanquam emerita & vieta degenerant in ligamentum. Vasa est tamen
umbilicalis vena in quibusdam prouecta, rursum in venam laxissimam mutari. Vt Nori-
berge in virgine triginta quatuor annorum vidit Volcherus Coster.

De ortu vasorum umbilicalium.

QUEST. XVIII

Explicitur
Galeni locus
de ortu vena
umbilicalis.



Concessitur
eorum opinio,
qui venam
umbilicalem
venarum pri-
marum agnos-
cunt.

E horum vasorum exortu non minor est, quàm de numero controuersia.
Sunt qui a vasis vteriprium ducere existiment, quòd scilicet illis continua
sint, & a factu prius quàm ab vtero diuellantur. Hoc voluisse videtur Ga-
lenus libro De dissectione vteri. Vasi, inquit, quod in chorio est, principium
dat finis illius, quod per vterum propagatur, ut duo hæc vnum esse dicere
possis. Osculis enim ita vniuntur, ut vena a vena sanguinem, arteria ab arteria spiritum
hauriat. Idem scripsit Aristoteles cap. 8. lib. 7. De histo. animal. Umbilicus (ait) velut
putamen est circa venas, quarum origo est ab vtero, habentibus quidem acetabula, ex acet-
bulis, non habentibus vero, ab ipsa vena. Sed paulò liberius & more vulgi, non autem ex
sua sententia loquutum fuisse Galenum puto. Vt enim vasorum sumpuon, & quasi con-
tinuitatem indicaret, dixit finem vnius vasis principium esse alterius. Principium, utquam,
non physicum Hippocras, id est, originis, sed mathematicum, id est, quantitatum, ut loquun-
tur Barbari. Sunt quę venas & arterias umbilicales, primas omnium generari, ab usque ve-
narum & arteriarum radices omnes manare contendunt, quia vena ab hepate, arterię a cor-
de manant. At prius formatur umbilicalis vena quàm hepar: non enim coagmentantur sine
sanguine parenchymata, non fertur sanguis, nisi per canales. Debit ergo umbilicalis vena
prius formari quàm hepar. Probabilis sanè hæc alias mihi ipsi visa est opinio: sed singula di
paulo accuratius intueri cæpi, falsam eam, & erroris plenam iudicavi. Quomodo enim ab
exiguo ramulo, tam insignes & numerose venarum radices, per totum hepatis parenchyma
sparsę orientur? Quę partes ab aliis oriuntur, sibi ipsis continua esse debent: at umbilicalis
& canis, nulla est continuitas, nisi per radicem portę anastomoses. Quid, quęso, ab sordius,
quàm existimare ab umbilicali ramo primum effingi parenchyma hepatis? mox ab eo vena-
rum omnium radices manare? Annon spermaticę partes carnosę prius delineantur? Jam
verò arterias omnes ab umbilicalibus propagari quis dixerit, cum hæc recta ad cor non se-
rantur, sed ad ramos iliaco? Laudandusne esset economus, qui parietes prius, quàm fun-
damenta edificaret? Scio quid dicant, vasa hæc radices esse, quibus alitur factus more plantę:
radices autem prius efformari. Sed sciant non prius ali factum, quàm delineata sint sperma-
tica partē: quia nutritionis nulla necessitas. Statuamus ergo vasa hæc cum ceteris sperma-
ticis partibus simul inchoari, & venam umbilicalem, venam portę, cui continua est, esse pro-
paginem: arterias duas rami iliaci descendētis aortę riuulos esse: vrachon verò a vesica
fundo ad umbilicum ferri: prius tamen venam & arterias umbilicales perfici, quàm alia
vasa existimo, quòd eorum maior sit necessitas ad carniū coagmentationem.

Quid sentia-
mus.



QUOD primus sit conformationis dies, quis item ultimus, solus qui factum plasmauit, nouit. Creator. Si quid tamen ea de re statui potest, non aliunde quam ex Hippocratis fontibus hauriendum puto. Voluit diuinus Senex lib. De nat. pueri, & ἀπὸ τοῦ ἑβδόμου, septimo die spermaticarum omnium partium rudimenta apparere. Perfectam autem descriptionem & dearticulationem foeminae quidem duobus & 40. diebus, maribus vero diebus (quod longissimum est) 30. perfici. Hoc autem de prima tantum conformatione intelligendum putamus. Neque enim musculorum carnes, eo tempore perfecte efformatas, & omnino coagmentatas volumus, sed 3. aut 4. mense tantum, quo tempore moueri incipit foetus, adeo ut duplicem statuamus conformationem; vnā ex semine, alteram ex sanguine. Illa praecedit, & propter ea πρῶτον πῆξιν vocat Hippocrates lib. De septim. partu, & De nat. pueri. Haec spatia tantum fibrarum opplet infarctique. Strato Peripateticus & Diocles Carisius fetus fabricam per septenos dies, ad Platonice septenarij maiestatem alludentes, dispensarunt. Abij 45. dies terminum conformationis longissimum statuunt. Nam sex dies spumificationi, quatuor lineationi, 8. lineationis repletioni, quatuor & decem carnificationi, decem & tres afformationi concedunt. Minimum vero numerum 30. dierum esse volunt. Soles sex spumificationi, duos lineationi, quatuor lineationis repletioni, nouem carnificationi, totidem afformationi attribuunt.

Conformatio
nis, septima.

Duplices con-
formatio.

Stratonis &
Dioclis op. m.

Sex in lacte dies, tet sunt in sanguine terni.

Bis feni carnem, ter feni membra figurant.

Diuinus sane & clarius Hippocrates: mares 30. foeminas 40. aut 42. die conformari scriptum. Cur autem mas celerius in utero conformetur quam foemina, haec autem extra uterum celerius perficiatur, & incrementa capeat, inuestigatione dignum est. Hoc scriptum reliquit Hippocrates sect. 2. libri 6. Epid. συνεκρίθη, συνεσθῆ, ὁ δὲ ὑπερὸν κινηθῆν, ἐμολύνθη, καὶ βραδύτερον αὐθιγεται καὶ ὅτι πλεονάζον: Articulatum est, consistit, celerius motum comprimitur, tardiusque augetur & diutius. quod etiam sect. 3. libri 3. Epid. scripsit, quod citius motum est ac discretum, rursum augetur etiam tardius, & ad longius tempus. Huius rei demonstratio ex eodem Hippocr. petenda est, mas celerius conformatur in utero, quia calidior, conformatio autem caloris est opus: mares 1. De dicta ex calidiori semine, foemina ex frigidiori generantur. Et libro De natura pueri expressis verbis, αὐτίον ὁ βῆν ὅτι τὸ θῆλυ πῆγνυται ὑπερὸν καὶ διαρρηθῆναι, ὅτι ἡ γυνὴ ἀσθενέστερη ἐστὶ καὶ ὑπὸ τῇ τῆς θηλείας ἢ τῆς ἀρρενός: Cur foemella posterius & conformetur & dearticuletur, haec ratio est, quod imbecillius & humidius est foeminae semen, quam maris. Accedit natura & conditio loci: mares enim ut plurimum dextra foemina sinistra uteri parte generantur, Aphor. 48. sectionis quinta. At dextra sinistris sunt calidiora. Cur autem foemina extra uterum celerius perficiatur, demonstratio ex Aristotele petenda, libro De ortu & interitu. Tempora perfectionis & imperfectionis proportionem sibi respondere debent: corruptio imperfectio est, accretio autem & generatio perfectionis species dicuntur: quidquid celerius interit, celerius perfectionem suam consequitur. Sic acutus morbus & brevis citissime sua quatuor percurrit tempora, & ad statum celerius peruenit, quam chronicus: At foemina in vniuersum celerius intereunt, quam mares, & breuioris sunt vite, ob debiliora vitæ principia: celerius ergo incrementa sua capeunt. Accedit mollities totius corporis, unde & facilius & celerior extensio. Hippocr. quem nihil latuit, libro De septimestri partu, haec breuiter & dilucide expressit his verbis: ὅταν

Cur mas celerius in utero conformetur.

Cur foemina extra uterum celerius perficiatur.

Ratio Aristotelis.

χρησιζῶσιν, τῆς μήτος αἰδυγατέρες τῶν χέρων θάσσον ἢ αἰσι, καὶ φρονέουσι, καὶ γρηγοροῦσιν, διὰ τὴν ἀσθενίαν τῶν σωματίων, καὶ τὴν διαγῆαν. Postquam à matre segregare fuerint puellæ, celerius quàm masculi pubescunt, sapiunt, & senescunt, cum propter corporum imbecillitatem, tum propter victus rationem. Itaque duplicem agnoscit causam: prima est imbecillitas, adeo ut quæ causa erat tardior in utero conformationis & motus, eadem causa sit celerioris extra uterum perfectionis. Fœmina enim res est imperfectior masculo, & finem suum habet propinquior em, ideo minoris eget opera. Altera causa est, victus ratio; vitam enim degunt inertem & in otio: ac ignavia, inquit Celsus, corpus hebetat, labor firmat; illa maturam senectutem; hic longam adolescentiam reddit. Nec potest, inquit summus Dictator, lib. De victus rat. in ac. homo integrâ sanitate frui, nisi laboret. & scilicet. 4. lib. 6. Epid. ἀσκησις ὑγίης, ἀκορὴν ῥοφῆς, ἀορνὴν πόνων; optimum est studium sanitatis, citra saturitatem velci, & impigrum esse ad laborem.

Vnde natorum similitudo.

QUEST. XX.

*Triplex forma.
Triplex similitudo.
Quid speciei
similitudo, &
a quo.*



UEMADMODVM apud Philosophos cuiuslibet animalis triplex est forma; prima specifica, secunda sexus, tertia individui, per quam hoc dicitur aliquid, ita apud Medicos similitudo triplex statuitur; prima in specie, secunda, in sexu; tertia in effigie, id est, forma & individuali (liceat sic nobis loqui per Ciceronianos manes). Figura, speciei similitudinem appellant, dum similis procreatur species, ut ex homine homo, ex cane

canis, non enim quodlibet agit in quodlibet, nec quodlibet à quolibet patitur: sed agens omne indeterminatè agit passum. Quare ex femine & sanæ uine humanis tantum fit homo. In hac specifica similitudine multum materiali causa tribuitur; propterea in vniuersum factus matrem potius referunt, quàm patrem: Plus enim materia confert mater in generatione, quàm pater. Sic ex capra & ariete capra gignitur, ex oue & hirco, onis. Sexus similitudo (id est, cur mas & fœmina procreentur) causam habet seminis temperiem, victorium, & permixtionem. Si enim calidissimum sit, utriusque parentis semen, fient mares; si frigidum, fœmina. Si in seminum permissione masculinum vincat, mas procreabitur; si fœminæ, fœmina. Hoc primus omnium docuit eleganter Hippocrates 1. De diata. In utroque enim sexu duplex agnoscit semen, alterum masculinum, calidiùs, validiùsque; alterum fœmininum, id est, frigidius, ex quorum varia permissione mares & fœminas procreari vult. Marium itaque & fœminarum triplicem generationem ita distinguit. Si ab utroque parente masculinum effundatur semen, fient mares egregij, illustres heroës, λαμπροὶ τοῖς ψυχαῖς, καὶ τὸ σῶμα ἰσχυροί. Si à viro masculinum, à fœmina fœmininum prodeat semen, vincat autem masculinum, mares procreabuntur, sed ἡσσον λαμπροί, minus illustres & validi. Quod si à fœmina masculinum, à viro fœmininum secedat, superet autem masculinum, mares generabuntur ἀνδρόμοιοι, id est, molles, abiectioni & effœminati. Similis est fœminarum generatio. Nam si ab utroque parente fœmininum semen prodeat, mulieres nascuntur θηλυκώταται, καὶ ἐκφυεσάται, mulierosissimæ & debilissimæ, quas ὑδαταυγέσας, aquescentes vocat scilicet. 1. libri 6. Epidemion. Si à muliere fœmininè, à viro masculinè decedat, superet autè fœmininè, θρασύτεραι καὶ κόσμιαι, audaces & moderate procrebuntur fœminæ. Quod si à viro fœmininè, à fœmina masculinum semen prodeat, superet autem fœmininum, quæ inde nascuntur fœminæ, τολμηρότεραι καὶ ἀνδρείαι, feroces & viragines erant. Seminis ergo temperies, & in permixtione victoria, similitudinis sexus, id est, marium & fœminarum causa est, quas uteri temperies & loci conditio non minimum iu-

*Quid sexui
similitudo &
unde.*

*Triplex ma-
rium genera-
tio ex Hippoc.*

*Triplex fœmi-
narum gene-
ratio.*

uant. *Mares enim dextrâ (ut saepe antè dixi) semina sinistra parte ut plurimum generantur. Tertia superest similitudo, quæ tota in effigie, forma & accidentibus individui consistit. Eam in partium differentis, & membrorum formatione existere voluit Galenus 2. De semine: per hanc hic albus, niger alter, hic adunco, ille simo naso; hic cæcis oculis, nigris alius esse dicitur. In hac individui similitudine tota propòsitæ quæstionis difficultas versatur, quam minutatim in animo est excutere, hinc ducto exordio. Fetus aliàs matri omnino similis est, interdum patri omni ex parte, nonnumquam & trique parentis; hoc est, quibusdam partibus matrem, aliis verò patrem refert. Sæpe nec patris, nec matris, sed aui aut abavi similitudinem gerit: interdum amici aut ignoti cuiusdam, *Æthiops* puta, qui nihil ad procreationem contulerunt, effigiem representat. Harum omnium similitudinum multa extant apud probatos auctores exempla. *Populi Cammate* uxores habent communes, & quisque filios in effigie patris agnoscit. Apud *Chinenses*, filij patribus similes sunt, naso, oculis, fronte & barba. Fuerunt in quibusdam stirpibus gentilitia quædã signa, ut *Spartis*, *Thebanis*, lancea: quibusdam stelle; *Thyesti*, cancer, innata & insita statim ab ortu, quæ interdum extincta in filiis proximisque nepotibus, longo post tempore in remotis posteris velut reuiuiscerent. De *lenco* eiusque posteritati anchoræ imago in femore visibatur, & *Iulia Augusti* filia, licet adulteros haberet multos, filios tamen marito similes edebat. Rogata quæ arte id faceret, Respondit faceret se non admittere uentorem nisi plena naue. Mitto quæ de *Lentulo* & *Macrocephalis* afferri solent. Præstat in causarum inuestigatione tempus contere. Huius tam variæ similitudinis & effigiei caussa, valde controuersa est. *Empedocles Pythagoreus*, similitudinis caussam, ad solam refert imaginationem; cuius tanta vis est, ut si- cut plerumque corpus cogitantis immutat, sic & in conceptum semen vim suam conferat. *Arabes* tantum imaginationi tribuerunt, ut existimarint animam virtute imaginationis sic extolli posse, ut non in proprium corpus modò, sed etiam in alienum agere quæat. Sic nobilitas animas permutare elementa sanare, debilitare quos velint, miracula edere, denique imperium in omnem habere materiam. *Aristoteles* scet. 10. *Problematum*, *Problemata* 12. bas imaginationis in conceptu vires agnouisse videtur. Querit enim cur hominis partus ita inter se sint dissimiles? quia, inquit, in homine cogitationum velocitas, ingenique varietas, multiformes notas imprimit. *Galenus* libello De theriaca ad *Pisonem*: *Æthiopi*, inquit, cuidam vt pulchram prolem susciperet, consului, vt formosam imaginem ad pedes lecti apponeret, quam uxor congressus tempore attentè intueretur. Consilio huic paruit, neque defuit euenus. Propterea nolebat *Hesiodus* coniuges dare, operam liberis, dum è funere redirent, sed cum è conuiuiis aut ludis. Exiat ad huius rei illustrationem *Sabini* cuiusdam uxoris historia, quam *Thomas Morus* eleganti versu cecinit, Et *D. Hieronymus* quæst. super *Genesin*, refert mulierem adulterij suspicionem non carentem, eo quòd infansem enixa esset qui maritum nullo modo referret sese hac arte liberafse, quòd picturam infanti non absimilem in cubiculo haberet. Hoc artificio olim vsus *Jacob*, *Genesios* 30. obiectis, passimque stratis variegatis virgultis, maximam sui gregis partem versicolore & variegato vellere præstitit. *Plinius* 7. naturalis historia multa de his memorat. *Fernelius* 7. sue *Physiologia* libro hanc unicam tam variæ similitudinis & effigiei caussam agnoscit imaginationem, à quâ sola, vim formæ effectricem duci & regi putat. Sed non est verissimile, unicam imaginationem eius similitudinis caussam statuere. Nam imago & quælibet alia facultas, quæ cum cognitione est, non agit nisi obiectum habeat præsens, à quo moueatur, at sæpe incognitum refert puer. Sed & in coitu intercipiuntur fere omnes animæ facultates, vt vix imagines eas concipiat vis fictrix. Adde quòd, si sola imago similitudinis caussa esset, nullus infans deformis nasceretur, nunquam morbi cõtingerent hereditarij: non enim malum hoc liberis suis exoptat mater. *Astrologi* similitudinis*

Quid simili-
tudo induci-
dum.

Variæ exem-
pla similitudi-
nis.

Prima opinio
eorum quæ re-
ferunt ad so-
lam imagina-
tionem.
Quid Arabes
sentiant.

Quid Ari-
stoteles.

Quid Gale-
nos.

Historia

Non à sola
imaginatione
fieri.

Astrologorum
opinio.

causam ad astra referunt. Quoties Sol in centro horoscopi fuerit in diurna genitura, patribus filios similes gigni putant; filias autem matribus similes dicunt, quum Luna in nocturna genitura, aut Venus in diurna cum centro Heroscopi fuerit; sed mera sunt nugæ. Est altera quorundam opinio, qui effigiei causam ad solum seminis motum, & vim formatricem referunt. Hæc fuit Aristotelis sententia 4. De generatione animal. & Galeni libro 2.

De semine. Aristotelis præclara est, sed obscura admodum philosophia. Plures enim statuit in semine motus: alij sunt ἐνεργεια alij δυνάμεις. Illi rursus aut sunt vniuersales; qui scilicet animal aut hominem generant; aut particulares, qui & mares & tales, id est, tali forma, magnitudine membrorum, tinctura, & habitu generant. Motus qui potentia in sunt, ex aui, ab aui & matre prodeant. Si horum motuum quispiam, ille scilicet qui proximus est, & particularis, intercipiatur, fiet transitus in proximum motum; hic si deficiat, fiet transitus in contrarium tandemque in vniuersalem. Hæc quæ satis videntur inuoluta, exempli vnius appositione illustriora euadent. In semine Socratis vis inest materiem sibi omnino similem generandi: mouetur ergo semen hoc ad formam Socratis. Motus hic si impediatur aut à femineo semine, quod fortasse validius est, aut ab æteri frigidiæ, aut alia quauis causa, soluitur primus ille patris motus, qui actus erat in Socrate, sique transitus in motum aui aut ab aui, qui potentia erat: unde mares aui aut ab aui procreantur similes. Quod si secundus iste motus soluatur, fiet transitus in motum contrarium, in motum quippe matris, qui Aristoteli contrarius dicitur: quia natura primò, & per se in mati generationem perpetuò intendit. Itaque loco maris, summa generabitur mati similis, aut auiæ aut ab auiæ, quarum effigiem ipsam femina semen potentia continet. Hic tertius motus si intercipiatur, tandem in motum vniuersalem fiet transitus, & animal generabitur, aut homo parentibus neutiquam similis. Galenus lib. 2. De semine, tam varios seminis motus non agnoscit, sed similitudinis causam referi ad seminis temperiem, variamque permutationem, necnon ad robur formatricis facultatis. Doctissimus Erasius effigies & similitudinis individualis vnicam agnoscit causam, vim scilicet formatricem; reuocat vires imaginationis, quia animalia cæca maribus similes generant catellos. Non habet (inquit) opus exemplari vis formatrix. Vt enim in semine lactuce existens vis illa, absque exemplari generat, & fingit lactucam, sic & in semine humano opus suum perficit. Sed quid dicit Erasius de muliere alba, quæ fixis oculis Æthiopis imaginem conspiciendo, prolem nigram genuit? Quid de illa quæ puellam peperit omnino hirsutam, quia imago S. Joannis in conceptu ei obversabatur? Nos, vt è medijs harum dubitationum fluctibus, in tutum & tranquillum portum nos recipiamus, variæ huius similitudinis, quæ in effigie, forma, & accidentibus individuui consistit, duplicem causam agnoscimus. Alteram ordinariam, quæ perpetuò agit, nisi impeditur. Hæc autem facultas est formatrix semini insita. Alteram extraordinariam, quæ non semper ad generationem concurrat, sed extrinsecus adueniens, & priore nobilior, suam tenello sæui effigiem plerumque imprimit, hanc imaginationem seu cogitationem vocamus. Prior illa vis fructrix, formatrix quæ cum singularum partium ideam in se contineat, si liberè agat, & in toto formationis tempore à nullo impediatur, vt in animalibus & plantis contingit, vim semini insitam sæuis perpetuò imprimet; itaque perpetuò erunt parentibus similes sætus: patri quidem, si virile semen omni ex parte vincat, matri omnino, si feminæ superet; quibusdam partibus matri, alijs patri, si portio quedam seminis ab alterutro vincatur semine. Licet enim videatur semen homogeneum, habet tamen partes, alijs alijs crassiores tenuioresque. Nonnumquam aurorum & ab aurorum effigiem referet sætus; quia latet adhuc in patris semine quedam aurorum & ab aurorum facultas, & voluit Aristoteles extendi parentum species ad progenies quatuor. Perinde enim ac magnes vim suam per coherentes ordine acus, in quartam & ultra effundit: ita vis illa formatrix de semine

Secunda opinio eorum qui ad matrem seminis omnia referunt. Opinio Aristotelis elegans.

Motus seminis vniuersi etiam dicitur.

Galenus quid sentiat.

Erasii opinio.

Nos quid sentiamus.

Vim formatricem quid possit.

Cum patri, matri, aui, ab aui non sint similes puelli.

in semine transmittitur. Sic Helidem, quæ cum Æthiopo cœcubuerat, legimus non filiam Æthiopen genuisse, sed natum ex filia Æthiopen fuisse. Et Nicæus poeta Byzantius à candidis parentibus genitus, in auum Æthiopen degeneravit. Si ergo libere agat viâ illa formatrix, foetus perpetuo parentibus similes procreabit. Verum si primo conceptionis aut conformationis tempore formatrix hæc facultas à superiore & diuiniore imaginatione quippe impediatur, non illius sed huius fiet impressio; atque ita dissimiles erunt foetus. Est enim imaginatio superior formationis; quia formatrix facultas procreatrix species, ad naturalem refertur. Imago *ἡ γερμολογία*, & princeps est facultas. Quid autem in prima conformatione & post conformationem possit imago, iam demonstratum est. Quibus hæc pro questionis coronide addere lubet. Sepe tenello adhuc foetui eius rei imaginationem in sculpi, quam prægnans ardentius exoptavit: quod soli phantasiæ acceptum referendum. Non enim fictus aut mori realis species, sed spiritalis tantum ad uterum fertur: foetui autem potius, quam utero imprimitur, quia facilius fit in molliori cera, quam in durissimo ferro impressio. Modum porro impressionis expressit Auicenna lib. 5. De animalibus. Fortis inquit, imago spiritus aëreo & natura sua mobiles statim mouet, hisque optatæ rei speciem in sculpi: spiritus sanguini proximo foetus alimento permisti eandem figuram imprimunt. Quomodo autem spiritus imaginationis spectra effigietque tam celerrime excipiat, altioris est contemplationis. Existimo ego, ut aëri calorum vi formatrix imprimatur, eorum animalium, quorum generatio est æquiuoca, eadem prorsus ratione spiritibus aëreis imaginationis formas in sculpi. Ut ergo aër formarum est plenus (ut in visionis natura fusiis deceptabitur) ita spiritus nostri species omnes admittunt facile. Sic semen ratione spirituum per singulas corporis partes oberrantium, singularum partium ideam imaginemque in se continere docuimus.

Æthiopia.

Quid possit
imago ad
similitudinem.Cur tenello
foetus sit coram
impresso, quæ
ardentius exoptat mater.

Religio.

Quomodo gemelli & multiplices foetus generentur.

QUESTIO XXI.

IN MORTALIS Dei providentia, brutis ferè omnibus, (quia & breuior sunt vite, & non homini modo ad victum vestitumque inferuiunt, sed etiam sibi ipsis sunt præda) ne eorum species extingueretur, vim multiplices foetus edendi concessit. Homini omnium temperatissimo & viuacissimo unicum tantum, aut duos, ad summum, gestare, ex natura præscripto licet; quia unicus est in muliebri uteri sinus, duæ tantum eius partes, dextra & sinistra, nullo septo discretæ; geminæ tantum mamma gemellorum nutritioni dicatæ. Quod si numerosior interdum edatur soboles, ea Philosophis & *ἱστορίαις* quæ, & quasi portentosa videri debet. Extant de multiplici partu elegantes historie. In Ægypto, ubi fœtifer Nilus, ter gemini nascuntur. Aristoteles 7. De historia animal. mulierem quandam quatuor partibus viginti pueros, qui adolere potuerunt, edidisse affirmat. Reperitur in Peloponeso quinos quater enixa. In Ægypto septenos uno utero simul gigni auctor est Trogus. Prodidit Albertus mulierem in Germania conformatis iam in utero duorum & viginti infantium corpusculis, abortum fecisse; aliâque eiecisse in peluii embryonum auricularis digiti magnitudine centum quinquaginta corpuscula. De Margareta Hollandiæ comite ferunt uno partu 364. foetus peperisse viuos, qui omnes sacri baptismatis lauacro abluti sunt, & statim expirarunt. Fuit autem masculis Ioannis nomen, feminis verò Elizabeth impositum. Extat adhuc marmoreum regiumque sepulcrum in cœnobio quodam monialium in Hollandia. Sunt & alia numerosæ partus exempla rara, quæ lubens sciensque prætereo. Malo in causarum inuestigatione studium operamque meam impendere. Veterum quamplurimi causam gemellorum, & multi-

Cur huius
multiplices
partus nas-
cantur, ut
vires.Historia mul-
tiplicis par-
tus.Causæ gemel-
lorum.

*Varia cellularum im-
probatur.*

*Pericium in
utero finis.*

*Gemellorum
caussa ex
Hippocrate.*

*Asclepiadis
opinio.
Auicenna
quid sentiat.*

*An uno co-
itu mas & fe-
mina genera-
ri possint.*

*An eadem
membranis
concludantur
gemelli.*

*Cur gemelli
ita inter se
sint similes.*

plicis partus referunt ad suam varietatem. Septem enim in muliebri utero $\kappa\omicron\lambda\pi\alpha\varsigma$ & cellu-
las statuit tres in dextra uteri parte, miribus dicatas, totidem in sinistra feminis, septiman-
in medio, in qua hermaphrodita generentur. Verum commentitia sunt hec, & aniculatorum,
figmentis proxima. Vnicus enim est in utero sinus, ut in vitriculo unica cavitat, qui tamen
in dextram & sinistram partem dirimitur. He partes nullo septo, quicquid sentiant Auicen-
na, Haliabbas, & plerique Anatomei, discrete sunt, ut in ouibus, sed linea tantum quadam,
quam Aristoteles $\delta\iota\alpha\pi\acute{\upsilon}\nu$, appellat, id est, medianam, Siutpsi autem vocabulum hoc ab
Hippocrate in Coacis prenotionibus, $\gamma\lambda\acute{\omega}\sigma\sigma\eta\nu$ & $\tau\omicron$ $\delta\iota\alpha\pi\acute{\upsilon}\nu$, &c. id est, lingua ad
medianam delibuta, &c. Præterea cellularum varietatem multiplicis fetus causam esse
non posse, id inter cætera manifestè declarat, quod viginti & triginta fetus unico partu edū-
tur: non sunt autem tot in utero cellule, neque etiam in cæteris animalibus tot sunt sinus,
quot fetus. Id satis patet in piscibus, in quibus non sunt $\delta\iota\alpha\pi\omicron\alpha\varsigma$, tamen infinitos in se conti-
nent fetus. Erasistratus gemellorum causam referi ad repetitam conceptionem. Empedocles
ad seminis copiam. Ptolomeus ad varios siderum posus: nam si quando & in bicorporibus
fuerint dominantia loca, & pluribus stellis configurata, plures duobus nasci contingit. Ve-
ram gemellorum & multiplicis partus causam agnouit Hippocrates lib. 2. De dicta, seminis
diuisionem, $\omicron\upsilon\tau\omega\tau\omicron$ $\delta\iota$ $\alpha\upsilon\tau\alpha$ $\gamma\alpha\upsilon$ $\sigma\iota\delta\iota\nu\alpha$ $\kappa\iota$ $\epsilon\pi$ $\alpha\mu\phi\omicron\tau\epsilon\varsigma$ $\tau\omicron\varsigma$ $\mu\eta\tau\epsilon\varsigma$ $\omicron\upsilon\delta\iota\omega\varsigma$, sic
necesse est dispergi semen in vtrumque vterum similiter. Sepe enim in coitu totum
semen uno mixtu & impetu non eiacularur sed per vires: $\kappa\alpha\iota$ $\epsilon\kappa$, inquit, Præceptor, $\epsilon\varsigma$ $\alpha\pi\alpha\lambda\epsilon$
 $\chi\alpha\pi\epsilon\eta$ η $\gamma\omicron\nu\eta$, α $\mu\alpha$ $\kappa\alpha\iota$ $\delta\upsilon\varsigma$ $\kappa\alpha\iota$ $\tau\epsilon\varsigma$ $\beta\epsilon\beta\epsilon\sigma\sigma\epsilon\tau\alpha\iota$, non semel ac genitura proce-
dit, sed bis, & ter effluere cit, ac eiacularur. Portio igitur seminis altera in hanc uteri
partem, altera in illam fertur, unde duplex partus. Asclepiades gemellorum causam refert
ad seminis præstantiam, quod si validum sit, multa ex se fundere potens est. Addamas ex
Auicenna uteri motum: vterus enim virile semen proleciat, varièque permiscet: itaque se-
minis partes in hanc & illam uteri partem recondit, unde multiplex partus. He sunt gemel-
lorum in vniuersum causæ omnes. Ut autem horum conceptus & conformatio clarius in-
notescant, tres questiuuncule agitando sunt: An scilicet uno coitu mas & femina generari
possint: tum, an isdem membranis concludantur gemelli, & in diuersis locis continentur:
postremo, cur ita inter se sint similes. Triplicem questionem ex summi Hippocratis doctrina
dissoluemus. Atque ut à prima ordiamur, Mares duo, femella gemine, mas & femina si-
mul uno coitu concipi & efformari possunt. Modus ita exprimitur 1. De dicta, & libro
De natura pueri. Si masculum ab utroque parente decedat semen, masculi fieri duo: si fe-
mineum, femelle: si partim masculum, partim femineum, ex illa portione masculus, ex altera
femella procreabitur. Mares porro gemini & femella gemine vires ferè omnes sunt.
At si ex uno conceptu mas & femina procreentur, femina vix erit vitalis, aut saltem de-
bilissima erit: quia non eodem conformauerit & perficitur tempore, quo mas. Id clarius ex-
pressit Aristoteles cap. 6. libri 4. De generat. animal. Si (inquit) gemini fiant mas & femi-
na, raro seruantur: hominibus enim hic concursus præter naturam est, cum non pari tempore
mas & femina discernantur, sed aut marem cunctari, aut feminam præuenire necessum
sit. Secundam questionem soluit Hippocrates libro De superfetatione. Quæ (inquit) gemel-
los gestat, eadem die parit, habet autem virosque puellios in una secunda. Itaque qui gemelli
vnius sunt sexus, isdem secundis inuoluuntur; sua quisque tamen vasa habet umbilicalia:
qui verò diuersi sunt sexus, diuersas tunicas accipiunt: qui item vnius sunt sexus, eadem uteri
parte gestantur, dextera quippe mares ambo, sinistra femella gemine: quod si diuersi sint
sexus, mas dextera, femina sinistra uteri parte concluditur. Tertia inter questio, cur ita inter
se sint similes. Hippocrates 1. De dicta, similitudinis triplicem causam agnoscit. Aequalis
(inquit) primum sunt loci, in quibus augentur, siue dextera, siue sinistra uteri parte concipiantur.

tur, quia dextra finistris sunt aequalia mira naturæ providentia; ut totum corpus esset ὁμο-
 ῖοτον, hoc est, in æquilibrio. Deinde simul concipiuntur: postremo iisdem utuntur ali-
 mentis; eundem enim sanguinem sugunt, & eodem spiritu materno per arterias umbilicales
 hausto fruuntur. Atque hæc de gemellis; nunc de superfætatione differendum.

Quomodo fiat superfætatio; cur sola ferè mulier grauida coitum
 appetat, & per quas vias eadem semen ei aculetur.

QVÆSTIO. XXII.

SUPERFOETATIONIS natura & ratio tantis difficulta-
 tum involucribus est implicita, ut plerique eam fieri non posse existimarint:
 sed audendi non sunt. Nam & Hippocrates libellum edidit De super-
 fætatione, & nobile superfætationis exemplum legitur libro quinto
 Epidem. in muliere Laryssea, cui quadragesimo post partum die præpo-
 sterè conceptus fœtus eiectus est. Nobilis quoque Alcmea partus Hercu-
 lis & Iphicli fratrum. Aristoteles cap. 5. libri 4. De generat. animal. Animalium (in-
 quit) alia nunquam superfætant, alia superfætant; & horum quedam nutritre suos conce-
 ptus possunt, quedam aliquando possunt, aliquando non. Cap. 4. lib. 7. De historia animal.
 proferi superfætationis quedam exempla. Adultera (ait) quadam, alterum suo marito, al-
 terum adultero similem peperit, & cum geminos quedam ferret, tertium superfætavit. Alte-
 ra cum primum septimo mense peperisset, qui mortuus est, mox duos iusto mensium numero
 edidit qui vixerunt. Galenus varò meminit superfætationis. Rhazis 22. continent. Alza-
 raius & Aulcenna mulieres eas superfætare volunt quæ grauiditatis tempore menstrua
 fundunt. Plinius cap. 11. libri 7. scribit Proconestam ancillam eiusdem diei coitu, alterum
 domino, alterum procuratori similem edidisse, & aliam, unum iusto partu, alterum quinque
 mensium peperisse, rursusque aliam septem mensium edito puerperio, insequens mensibus
 geminos enixam esse. Narrat persimiles ferè historias Dodoneus in suis observationibus. Da-
 tare ergo superfætatio. Est autem superfætatio, quam Græci Πῆλυνον dicunt; nihil aliud,
 quàm secunda conceptio, cum grauida iam mulier, iterum cum viro coeans concipit, qua-
 si sit noua quædam supra iam conceptum puellum fætatio. Hæc non omnium animalium est
 propria, ut docet Aristoteles 4. De generatione animal. sed mulieri frequentius, quàm cæte-
 ris animatibus contingere solet, si lepores & sues exceperis. Est tamen perpetuè & ὁμοῖον,
 præter naturæ institutum. Mulieres autem sapius solent superfætare, quia sola ferè mulier
 post conceptum maris congressum appetit. Reliqua animalia grauida nunquam, aut saltem
 raro marem admittunt. Cuius rei causam scrutari placet. Putat Dinus Commentariis suis
 in librum De natura puelli, reliqua animalia postquam conceperint, marem non appetere,
 quia tota seminis materia ad fœtus nutritum absuntur: itaque libidinis stimulis non per-
 celluntur. Mulier autem quia humidò abundat copiosissimo, vasa habet semine turgida,
 unde obscenarum partium titillatio. Sed non probatur mihi hæc ratio: licet enim sanguinis
 ferè omnes reliquias exhauriat fœtus, non tamen matris particulas suo defraudat genio, neq;
 testibus vim propriam sanguinem trahendi & alterandi aufert. Sic mulieribus sexagenariis
 sanguinis nulle super sunt reliquæ, ideoque desinunt menses. Seminis tamen procreatio ad ex-
 tremum usque senium durat. Coeunt enim & semen emittunt, quòd licet ea non sit ætate ad
 generandum prepotens, ad titillationem tamen & voluptatem est satis. Nos alias huius rei
 causas agnoscimus, easque physicas: nam morales, de quibus Lactantiùs lib. De vero cultu,
 Theologis relinquimus. Prima ad vterum situm & conformationem referenda: brutorum
 namque gestantium uterus valde extuberat, totus ferè propendet, & ori externo maxime

Varia super-
 fætationis
 exempla.

Quid sit sui
 perfætatio.

Cur mulier
 sepius super-
 fæcet quàm
 bruta.

Cur bruta
 grauida ma-
 rem non ad-
 mittunt, ut
 mulier.
 Dicit opinio.
 Refellatur.

Causæ tres.

Prima vteri
 conformatio.

propinquus est: itaque maris pudendum oblongum, sine succussatione & valida percussione non fert: ex percussione dolor, à dolore fuga coitus. Muliebris vterus profundior est, nec pendulus: maris ergo amplexum facilius fert. Quin etiam brutis animantibus ad speciei tantum conseruationem Veneris sensus est datus: si itaque conceperint, quia cessat finalis causa, cessat etiam coeundi appetitus. At homini voluptatis illecebra, & coeundi desiderium iniecit natura, non solum ad sobolis propagationem, sed etiam ad humana vite miseras demulcendas. Mito lepidissimum Poppia M. Agrippa filia responsum, quæ bruta, ubi conceperint ideo non coire respondit, quia bestia sunt. Redeo ad institutum. Mulier sæpius superfætare solet, quàm reliqua animalia; quia grauida mulier maris congressum sæpius appetit. Quomodo autem fieri possit superfætatio, nunc inquirendum: Certissimum est, vterum seminis auidi, conceptione facta ita contrahi, ut nulli inane spatium relinquat, eiusque osculum interius ita claudi, ut ne vel minimum quidem debiscat. Hoc docuit excentis in locis Galenus, & Hippocrates Aphor. 51. sect. 5. Quæcumque vtero gerunt, his os vteri comprimitur. Quomodo igitur masculinum semē ad secundam conceptionem in vteri sinu ferti poterit? Fære ex veteribus quamplurimi, qui vterum certis temporibus, mira Natura prouidentia, ad noxiorum exclusionem, aperiri somniant. Si ergo ea hora coeat mulier, poterit virile semen, cuius desiderio fremit & ardet, excipere: inde superfætatio. Sed deliramenta sunt hæc, & mera nuga. Si enim certis temporibus toto grauiditatis tempore vterus aperitur, ut superuacua expellat, cur retinentur lochia toto nouem mensium spatio? Poterint ea hora qua fæda humorum illuxie expurgatur, vterus semen concipere: extinguetur mehercle, & obruetur genitura. Sunt ex neotericis, qui vtrum semper biare, neque exquisitè claudi contendunt: suumque dogma his rationibus stabiliunt. Flauus sæpissime vtero gerentibus menses pallidi, pituitosi, nigri, qui in vteri cavitare latitabant. Non ergo ita exquisitè eius osculum intercluditur. Deinde, mulier grauida in coitu semen effundit, quod per pudendum effluere sentit. Non potest autem per pudendum exire, nisi ab vteri cavitare per osculum eo decedat: quia mulier semen suum per cornua, id est, latera, in cavitatem & fundum vteri eiacularur. Hiat ergo perpetuò osculum, vnde facilis superfætatio. Hi rationibus magnum se quidpiam fecisse putant, cum tamen ob Anatomica aritū imperitiā, Hippocratico splendore tenebras offundant. Nāque ut primā eorum rationē impugnet, an ignorant per vterū duarū venarū propagines spargi, quarū aliæ ad internā vteri cavitatē feruntur, satū aliture: alia ad exteriorē vteri partē, cervicē & pudendū vsq; excurrunt? Per has toto grauiditatis tempore sanguinem fluere, & corporis superuacua expurgari quid prohibet, interiore vteri osculo nullo modo biante? Postrema ratio urget magis, nisi à nobis deprehensi essent duo ductus, semini muliebri excernendo dicati. Prior ductus ad cornua, hoc est, latera vteri emicantia fertur, quo semen in vteri fundum, si grauida non sit, eiacularur: breuior enim est & patentior via. Alter ductus, veteribus & neotericis etiam incognitus, à nobis sæpe in publicis sectionibus obseruatus, priori continuus, sed aliquantulum oblongior, per latera vteri ad cervicē & pudendum desinit. Hoc grauidas semen effundere existimamus, & ideo maiore in coitu voluptate frui, quia vasa semini deferendo dicata sunt oblongiora, & per cervicē membranosa excurrunt. Valeant ergo veteris doctrinæ impugnatores, & eorum de superfætatione opinio explodatur. Verūm superfætationis modum primus aperuit Hippocrates lib. de æt. & causis mor. E' πικρὴ στυγὴ τὸ τῶν γυναικῶν, ὡς ἀνὸς ὁ σώματος μετὰ τὸ πρῶτον κύημα ὃ συμμεινὴν κάρται. Superfætant autem mulieres, quarum vteri os post primum conceptum non exquisitè clauditur. Si enim eo tempore rursus coeat mulier, virile semen facile excipiet, & in sinus suos recondet, vnde secundus conceptus. Id autem de tertio aut quarto post primum conceptum die intelligi debet: neque enim potest toto conformationis tempore vterus

Secunda.

Lepidissimum
responsum.Quomodo fieri
possit superfæ-
tatio.Potant qui-
dam aperiri
vterum cer-
tis temporibus.
Errant.Alia opinio,
hiare semper
vterum.
Ratio 1.

Secunda.

Impugnatur
primæ ratio.Secunda ratio
refellitur.
Duo ductus
in grauidis ad
excretionem.
Semini, vete-
ribus incogni-
ti.
Obseruatio
infra.
Superfætatio-
nis modus ex
Hippocrate.
An post se-
cundum aut
tertium con-
ceptum mes-
sem possit ape-
ri vterus.

*Præparatio editæ
coctionem fo-
etui.
Vterus nutri-
tione modus.*

Coctionem tantum & temperiem sibi similem: propterea nec chylosin vllam, nec nouam hæmatosin, sed tertiam tantum coctionem, quæ singularum partium peculiaris est nutritio, foetui concedimus. Huius tertie, & solæ coctionis, in puellio hæc vera est ratio. Foetus materno utero vasorum & membranarum interiectu alligatus, per oscula venarum miro artificio coeuntia, maternum sanguinem trahit, eumque purissimum. Hunc per venam vmbilicalem, quæ portæ est propago, & ad tecoris fissuram fertur, in hepatis corpus refundit. Ibi magis magisque perficitur. Mox per portæ radices crassior crudiôrque eius pars in ventriculum, lienem, & in testina distribuitur: cuius reliquæ per splenicum & mesentericum ramum in cauitatem intestinorum amandantur, ibique sensim colliguntur, & diutina mora ita resiccantur, vt & crassitiem & colorem atrum, myconio similem, acquirant. Purior autem magisque percocta sanguinis pars, in caux truncum, à quo per ramos, tanquam riuulos, in singulas corporis partes diffunditur. Quoniam verò sanguis suo sero, qui illi est instar vehiculi, non caret; minere suo perfunctum serum, partim per sudores, & habitum digeritur, partim à renibus trahitur, & ab his per vtteres in vesicam transcolatur. Sudori excipiendo & vrinæ continendæ membranam, *amnion*, dictam, dicauit natura. Ceterum non per pudendum vrinam eò refundit, sed per vrachon, qui canalis est oblongus exanguisque, à vesicæ fundo ad vmbilicum productus. Huic musculum nõ præfecit natura, quia nullum tempus foetui erat intempestiuum ad eius generis excrementa excernenda vt in iam perfectis.

*Excrementa
foetus.*

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An foetus alimentum per os trahat; an solo sanguine nutriatur,
& an vnâ tantum coctionem perficiat.

QUESTIO XXIII.



MOT A hæc de foetus nutritione disputatio tribus capitibus absoluetur. Primo, vias aperiemus, per quas alimentum trahit; secundo, quale sit illius alimentum; tertio, quomodo immutetur; & an tres coctiones subeat. Quod ad primum attinet, existimauit Alcmeon ab vniuerso corpore, quod rarum & spongiosum est, alimentum trahi, & vt spongia humorem omni ex parte sugunt; ita & foetus à maternâ venâ & vteri substantia sanguinem haurit. Fuit Democriti & Epicuri opinio, vt refert Plutarchus lib. 5. De placitis Philosophorum, foetum in utero per os alimentum trahere. Quod voluit etiam Hippocrates lib. *de ætiâ prædictâ*, puer in utero comprimens labra, ex utero matris sugit, & tum alimentum, tum spiritum cordi intrò trahit, ubi mater respirat. Duplici ratione hanc sententiam confirmat. Primum, quod nascantur puelli sterces in intestinis habentes; deinde, quod editi in lucem statim ore lac sugant, quia in utero sugere consueverunt. Diuinus sane fuit Hippocrates, & ideo in omnibus fere suspiciendus, & à nobis venerandus: hic ergo aut excusandus, quia radis erat, & nondum satis explorata suis temporibus anatomica cognitio, aut adducta hæc, vt alia pleraque, existimandum. Libello enim *de τὸ τροφῆς*, plane aureo, & enigmatico, vias alimenti hoc oraculo nobis aperuit: ὁ ἀρχαῖος ἐν τῷ τῷ διὰ τῆς μήτρας ἐν τῷ φιλῶδῃ: hoc est, antiquius alimentum per abdomen vmbilicus: quasi dicat, primum animalis alimentum per vmbilicum trahitur, qui in medio abdomine situm habet. Quomodo enim per os traheret, cum vasa nulla ad

*Per quas vias
foetus alimen-
tum trahat.
Trahere ab
ore, Hippocr.
anticarius.*

*Excusator
Hippocrat.
Opinio Hippo-
cratis.*

vos ferantur? neque ullam cum materno vtero symphyfin habeat fœtus, nisi per vasorum extrema cœuntia; quæ omnia ad vnum umbilicum desinunt. Quin etiam lib. De nat. puelli, factum per umbilicum & spiritum & alimētum trahere apertissimis verbis scripsit: κατὰ δὲ μέσον τῆς σαρκὸς ὁ ὀμφαλὸς ἀπέχει, δι' ὃ πνεῦν καὶ τὴν ἀδὴσιν ἵσταται. In medio carnis umbilicus fecernitur, per quem spirat & incrementum capessit fœtus. lib. etiam De octimestri partu, ὁ δὲ ὀμφαλὸς, inquit, δι' ὃ αἱ εἰσοδοὶ εἰσι τοῖσι παιδοῖσι μὲν ὅν τ' ὁ σώματος τ' μήρι, ἀποσέχει. Umbilicus per quē & alimentum & arētis fœtui alendo via est, & ingressus solus ē reliquo corpore matri cohæret, per quē hanc viam introeuntium in corpus particeps fit fœtus. & lib. De natura pueri, Obstetrices statim ac exiit infans, umbilicum ligant tanquam non amplius nutriendo fœtui necessarium, simulque os ipsius diducunt, ut alius alimentum sumendi usus non ostendatur. Cum itaque omnibus his locis umbilico, non ore & alimentum & aërem trahere scripserit Hippocrates, addititium locum supra citatum esse existimo. Quæ enim Hippocrati falsò adscripta sunt rationes, tanti viri doctrinam non redolēt. Non enim editus infans ore lac sugit, quia in vtero sugere consuevit, sed quia à natura indocta doctus. ἀπαὶ δὲντος ὃ ἡ φύσις ἐῴσα, καὶ ὁ μαθεύσα τὰ δέοντα ποιεῖ. 6. E' πιδ. natura non docta quod non didicit, tamen id rectum facit. & libello περὶ σοφῆς, φύσις πάντων ἀγνοῦσθαι: natura omnium à nullo doctæ. Sugit ergo statim infans non à consuetudine sed à natura, aut à voluntate, quæ est κατ' ὁμολ., ab instinctu. Nam cum adoleuerit idem efficitur, si opus habeat cum electione, quia ut scribit subtilissimus Scaliger, exercitatione C C X X I X. eadem est vis quæ seruit animæ ad corporis commoda, & habet coniunctam speciem suæ conseruationis. Quæ autem editus infans statim per aluum extrudit, primæ coctionis & chylosecos excrementa non sunt, propterea feces & stercora dici non debent, sed impurius & crassioris sanguinis recrementa, quæ per splenicum & mesentericum ramum à liene intestina amandantur, ibique diutina mora & calore resiccantur. Non igitur ore, sed umbilico tantum alimentum trahit fœtus.

Locus lib. vi
De carnis
non esse Hip-
pocratis, sed
additum.

Cur sugat
puellum statim
atque editus
est.

Quæ puellus
per aluum ex-
trudit, feces
non sunt.

An sanguine solo nutriatur fœtus, & an vnā tantum coctionem perficiat.

QVÆSTIO XXIII.

DE natura & specie alimenti, quo tenellus embryo quandiu materno concluditur vtero, alitur, non leuis est controuersia. Hippocrates materno sanguine eoque purissimo fœtū alī existimauit. Extat i. περὶ γυναικείων, locus perelegans: Mulier, inquit, vtero gereas tota fit cum virore pallida: ὅτι αὐτῆς τὸ αἷμα τὸ ἀχραινὸν εἰσὶ κατ' ἡμέραν ἡ μέριον ὑποελθεταί ἐξ τῆς σώματος, καὶ κατ' ὅρυται ὅτι τὸ ἐμερὸν, quoniam purus ipsius sanguis (quem lib. De nat. pueri γλυκύτατον vocat) quotidie ex eius corpore detrahitur, & ad fœtus nutritionem descendit. Galenus i. De sympt. caussis, cap. 7. factum pusillum adhuc & tenellum, primis mensibus purissimum sanguinem trahere vult, sed grandiorē & purum & imparum simul proleclat. Hippocrates lib. De nat. puelli, multa, eaque obscurissima de fœtus alimento scriptis mandauit. Duplex enim agnoscit alimentum, sanguinem & lac. Sanguine puro primis mensibus fœtus alī existimat, sed dum moueri incipit, portionem sanguinis ad mammas resuere, & verri in lac, rursumque à mammis ad vterum, tanquam chymico & circulari modo, per venarum communionem ferri ad nutritum scribit, καὶ τὸ παιδίον, inquit, ἀπ' αὐτῆς ἐπαυ-
εῖσθαι ὀλίγον, & eo lacte fruitur modicum puellus. Sed non video cur, & quo-
modo lacte alatur infans, cum totum eius alimentum per venas ad hepar primum feratur,

Alii sanguine
puro fœtum.

Non lacte nu-
tritur puel-
lus in vtero.

Explicatur
latus Hippo-
cratis.

Quæstio.

Solutio.

Si tres in
puello sunt
coctiones.

Si tres in
puello sunt
coctiones.

Nisi velis lacte frui puellum grandierem, id est, sanguine mammarum venis contentis, qui proxime ad lactis naturam accedit. Exhausto enim primarum venarum sanguine, ab aliis, præsertim communioribus, & quorum est maxima εὐρυχωρία, sanguinem trahit: at venarum uteri & mammarum mirabilis est societas. Hic quaeret fortassis quispiam, quomodo sanguinem purum proleat puellus, cum is sero multo dilutus sit, quod indicat vrinæ collectio. Dico puritatem sanguinis serum naturale non tollere: imò si sero suo careret, in vitio esset. Damnat perpetuo Hippocrates αἷμα ἀκρὸν τοῦ. Tertium superest inquirendum, quomodo immutetur & alteretur puelli alimentum, an scilicet tres coctiones subeat: an duas: an unicam tantum? Sunt qui velint sanguinem per venam umbilicalem ad porta ramos ferri, ab his in ventriculum, ubi in substantiam, cremori per similem, transmutetur, mox per mesenterij venas ad hepar transportari, & in sanguinem verti, ut ea ratione & χυλῶσις & αἰμὴς ὥσις in puello perficiantur. Nam & sanguis, si ore hauriatur, & in ventriculum ingeratur, priorem exuens, novam cremoris speciem induet. Ego (ut ingenue dicam) quid sentio? unicam in sætu coctionem agnosco. Quid enim chylosi, quid noua hamatosi opus est, cum sanguinem maternum hauriat, cumque purissimum? Perfici quidem & magis magisque excoqui tum in maioribus, tum in exilioribus vasis fateor, ut maior sanguini cum tenello sætu intercedat similitudo: sed novam formam induere planè inficior. Idem enim est sanguis, eadem alendi vi præditus, perfectione tantum differt & quibusdam accidentibus. Neque verò necessaria fuit in sætu chylosis, quia chyloscos excrementum crassum & seculentum mole ac pondere nimium gravaret, sætisque valde molestum esset: ærum huic excipiendo, consensendoque membrana nulla dicata sint. Adde, si vis, ingratum, secum fetorem.

HISTORIA ANATOMICA.

Quomodo vitales facultates exerceat fœtus.

CAP. VII.

Diffimilis fœtus
vita.



Mirabilis ob-
servatio Gale-
ni de vasis
cordis amant
infanti.

Diversa vas-
cula cordis &
structura in
fœtu.

VIT in utero fœtus dissimili prorsus modo, quam dum in hunc est editus: nam nec thoracem distendit, contrahitque (quia spiritum ore non ducit) nec vitales vlos gignit spiritus, quia maternos haurit; nec denique cordis & pulmonum motu atque operâ indiget, sola transpiratione & arteriarum pulsatione singulorum partium calorem fouet, conseruat, reficit. Dissimilis hæc vita dissimilem habet vitalium organorum structuram, substantiam, & vsum. Quod cum sæpe omnibus huius sæculi Anatomicis fuerit incognitum, à Galeno autem omnium primo accuratè, sed obscurè 6. & 15. De vfu partium, descriptum; placet breui & elucidica oratione explicare. In cordis basi quatuor apparent insignia vasa; duo in dextro sinu, venâ caua & venâ arteriosa; totidem in sinistro, arteria magnâ & arteria venosa. Horum in nobis iam editis hic est vsum. Vena caua (quæ cordi patentissimo ostio hiat) sanguinem in dextrum sinum, tanquam cisternam, effundit, ibi excoquitur & attenuatur sanguis, tum ad generationem vitalis spiritus, tum ad pulmonum nutritionem. Eius itaque portio per septum medium in sinistru sinum exudat; pars altera per venam arteriosam fertur in pulmonum substantiam tenuem, raram, & spongiosam. Arteria venosa inspiratum aërem, & in pulmonibus preparatum deferret in sinistru cordis sinum, ibi cum sanguine miscetur, ex qua permissione spiritus fit vitalis; spiritum hunc cor in aortæ truncum, cuiusque tubos pellit. In fœtu horum omnium dissimilis est ratio, diuersusque va-
rum

rum vñs. Non enim in dextrum sinum sanguinem effundit vena caua, quia nec attenuato sanguine indiget pulmo, totus in foetu ruber, crassus, & immobilis, nec vlla fit spirituum vitalium generatio: venosa arteria aërem in sinistram sinum non deferit, quia non respirat, sed transpirat tantum foetus: aorta vitalem spiritum à corde non accipit, sed ab arteriis vmbilicalibus. Fungitur itaque vena arteriosa non venæ, sed arteriæ munere: vitalem quippe deferit spiritum, non sanguinem. Arteria autem venosa venæ fungitur officio, sanguinemque crassum & rubrum ad pulmonum nutritum continet. Quoniam verò à vena caua ad arteriam venosam nulli erant ductus, Natura vasa hæc, quæ erant coniuncta, amplo & rotundo foramine sociavit, per quod sanguis à caua ad arteriam venosam liberè profueret. Huic foramini membranam tenuem & pellucidam, operculi instar, præfecit; ut sanguini à vena caua impetu affluenti cederet quidem; prohiberet verò, ne sanguis in cauam remearet: tum ut celerius à partu glutinaretur, incipiente nimirum consolidationis principio ab eadem basi. Venam verò arteriosam & arteriam magnam, quia distabant inter se aliquantulum, tertio quodam canali arterioso oblique coniunxit, ut ab aorta ad venam arteriosam vitalis spiritus liberè permearet. Hæc mirabilis est vasorum cordis in foetu unio, venæ scilicet cum arteria venosa, & arteriæ magnæ cum venâ arteriosa. Sed superat omnem admirationem horum vasorum paucis post partum diebus præclusio & ressecratio. Foramen enim amplum ita obcæcatur, ut nullum illius appareat vestigium. Canalis verò primis quidem diebus totus emeritus & vietus apparet: tandem ita exiguus est, ut aliquando extitisse neges. Ex his cuilibet planum & apertum fit, foetum per arterias vmbilicales spiritum maternum trahere, solaque arteriarum pulsatione contentum viuere, ut cordis opera & motu ne minimum quidem indigeat.

Mirum quomodo præcludatur & ressecetur vasa cordis edito foetu.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

De communione vasorum quatuor cordis in foetu. QVÆST. XXV.

Exercitatio prima, in qua Galenica demonstrationis veritas illustratur.

MIRABILEM eam quæ in foetu percipitur vasorum cordis communionem, venæ scilicet caue cum arteria venosa, & arteria magnâ cum venâ arteriosa, primus omnium ita accuratè & eleganter descripsit Galenus sexto & decimo quinto De usu partium, ut nihil in toto eo opere apertius, nihil clarius, nihil diutius ab eo fuerit enuntiatum: sed in horum anastomoseon usu explicando mentem non satis videtur aperuisse. Nam libro decimo quinto, solius pulmonis gratia ambas anastomoses constructas putat; at libro sexto, cordi etiam, ad vitalis facultatis munia obeunda, aliquo modo inferre scribit. Itaque quia variis locis, varia, non tamen unquam ex diametro aduersa, protulit, calumniandi occasionem iis omnibus præbuit, qui aut contradicendi studio, aut ambitionis stimulo, aut nescio qua ingenij lasciuia, explosa veterum doctrina, vera & solide Philosophiæ frugem querunt in iniuniorum agellis. Ego licet hæcenus is fuerim, qui nullius iurare in verba magistri assueverim; malo tamen veterum, dum recta sapiunt sentiuntque, vestigiis insistere, quam nouis & falsis iniuniorum decretis assentiri. At quàm sit elegans & accurata Galeni demonstratio iam explicare aggredior. Querit Galenus decimo quinto De usu partium, cap. 6. cur pulmo in foetu ruber non autem ut edito iam animali subalbus. Respondet, quia alius sanguine rubro & crasso per vasa simplicem tunicam habentia delato, id est,

Galenus de communione vasorum cordis elegans demonstrat.

per venas: ut à vena caua in pulmōnes nulli erant ductus: fuit ergo hæc in arteriam venosam necessario pertundenda. Hic ergo forāminis illius primarius est vsus. Alterius autem communionis, quæ ab aorta in venam arteriosam per interiectum canalem fit, vsus, ad palmonis vitam referendum putat. Vita enim omnis à spiritu est vitali & arterioso sanguine, hunc deferunt arterie riuuli, qui cum pulmōnem nullo modo attingant, debuit arteria magna cum vena arteriosa vniri. Hæc Galeni est demonstratio, quæ multis obscura fortasse videbitur, sed faciam ut quouis sole illustrior euadat. Pulmo in fœtu ruber est: hepatis carnem referens, & crassior quàm in edito iam animali; ruber quidem, quia ex rubro sanguine & generatur, & alitur, crassior, quia nec aëre inspirato attenuatur, nec perenni agitur motu; non enim moueri thoracem in embryo existimamus immoto thorace, pulmōnem distendi contrahique non est verissimile, quia non propria & insita vi mouetur pulmo, non à facultate cordis pulsantis, non à cerebro, sed à thorace ad solius vacui fugam. Dum verò in lucem editum est animal, rarior statim tenuiorque & ferè subalbus euadit pulmo, quia perpetuo motu aërisque inspirati permissione attenuatur. Non eadem est igitur pulmōnis substantia dum in vteri laebris delitescit infans, & postquam lucis vsura frui capit: non idem igitur alimentum. Rarior pulmo sanguine eget tenuissimo in dextro cordis sinu astuante elaborato; quæ ratione dextrum finem solius pulmōnis gratia constructum putat Galenus, & vi primus obseruauit Aristoteles, quæ pulmōnem non habent, dextro etiam carent sine. Crassior autem, subruber & immobilis embryi pulmo, attenuato non eget sanguine, sed crasso & sibi simili. Crassum hunc & rubrum sanguinem soli deferunt vena caue riuuli. At quomodo à vena caua ad pulmōnem ferri sanguis poterit, cum rami nulli à caua in pulmōnes dinascuntur? Sunt enim tria tantum pulmōnis vasa, arteria venosa, vena arteriosa & aspera arteria. Hic ergo Natura miro artificio venam cāuam in arteriam venosam, quæ illi erat contigua, pertudit, ut ab hac in illam liberè ferri posset sanguis, ad carnosum visceris nutritionem & incrementum; ad eò ut arteria venosa in fœtu venæ tantum fungatur officio, & vena absolūtè dici queat, tum officio, tum structura. Hic itaque patet illius forāminis verus est vsus, hæc præclara illius anastomoscos necessitas. Confirmauit Galenicam hanc demonstrationem princeps Arabum Auicenna. Pulmo (ait) non est nisi rubecus in tenello fœtu, quia non respirat, & non albificat ipsum nisi aëris inspirati permissio; sanguine itaque nutritur rubeo, & idè factum est à vase in vas foramen, quod edito animali statim occluditur. Neque verò ad nutritionem tantum pulmōnum hæc anastomosis facta est, sed etiam ad primam pulmōnis, id est, parenchymatis generationē. Certum enim est viscerum omnium carnes ex fuso concretoque sanguine coagmentari, rubrum hunc sanguinem sole continent deferuntque venæ; at à caua vena ad pulmōnem nulli erant ductus; factum est ergo à caua in arteriam venosam foramen amplissimum. Addam ego tertium huius communionis usum, ut à vena caua efformaretur venosa illa arteria: Non enim à sinistro cordis sinu crassissimo & densissimo oriri poterat vas tenue & venosum, debuerat autem vas hoc & in sinistro esse sinu, & tenue esse, ut inspirantibus nobis, celerrimè aërem exciperet, & expirantibus, fumidos vapores expelleret. Debuit itaque vena caua cum arteria venosa vniri, ut videatur arteria venosa caue esse propago, primusque illius ortus non à corde fit, ut vulgus existimat sed ab hepate, per venæ caue continuitatem. Alterius communionis, quæ est ab aorta ad venam arteriosam per interiectum canalem, usum ita illustro. Vniuit in tenello fœtu pulmo; ergo vitali eget ad sui conseruationem spiritu & arterioso sanguine. Vitalem hunc sanguinem soli deferunt arteria magnæ rami: at ab aorta in pulmōnes nulli erāt ductus: Natura igitur, ne pulmōnes viuifico necitare defraudaret, arteriosum canalem ab aorta in venam arteriosam peruium construxit, per quem arteriosi sanguinis & vitalis spiritus portio in pulmōnum substantiam effundi posset. Agnosco alium etiam huius commu-

Illustratio Galenicæ demonstrationis.

Anastomosis quæ in vasis cordis sunt primus vsus ad pulmōnum nutritionem.

De vsu anastomoscos. Aut. spiritus.

Anastomosis secundus vsus, generatio pulmōnum.

Tertius vsus.

Alterius communionis vsus.

Alter vsus.

nionis vsum, ut ab arteria magna arteriosa illa vena ortum duceret. Debuerat enim dextri sinus vena esse arteriosa, id est, tunicam habere crassissimam arteriarum instar; at arteriarum fons in sinistro erat sinus; propagatur ergo arteria magna & canalem de se emittit in dextrum sinus, ut venam arteriosam efformet: adeo ut vena arteriosa arteria magna, & arteria venosa vena caue sint propagines. Sic itaque se habent in fœtu pulmonum vasa, ut arteria venosa, vena, vena arteriosa, arterie fungatur officio, aspera autem arteria omnino sit otiosa. Hæc duplicis illius *κοινωτης* vera est demonstratio.

SIMONIS PETREI Parisiensis Medici clarissimi, noua de vfu
vtriusque communionis demonstratio conuellitur.

EXERCITATIO II.

NAM verò ut Galenica demonstrationis veritas reddatur illustrior, quæ à neotericis quibusdam de horum anastomoseon vfu sunt prodita, ad Lydium (ut aiunt) lapidem reuocare placet. Putat Petreus, ambarrum anastomoseon opus, ad cordis potius & totius corporis vsum, quam ad pulmonis nutritionem & vitam referendum esse. Est autem noue illius demonstrationis hæc summa, hisce verbis (propria enim refero) expressa.

NATURÆ primum institutum est omnia exquisitè perficere; sed eam accuratam operis perfectionem semper assequi nequit, propter materiæ subiectæ *κατασκευη* & dispositionem alienam, quæ necessitas hypothetica & materialis constituitur ab Aristotele. Sed quæ necessitas naturam cœgit eiusmodi anastomoses vasorum producere? Magna quidem, sine qua earum historiam vix percipere quisquam possit. Vfus & actio finis est naturæ operantis, & opera naturæ scrutantis medici scopus, quo neglecto, incerta omnis Anatome & inspectio partiū obscura. Aristoteles monuit sæpe propter vsum instrumenta cōparari, non vsum propter instrumenta. Vnde Galenus in primis vsum proponit, ut ad eum partis cuiusque compositionem & cōformationem reuocet. Vsum igitur & necessitatem anastomoseon vasorum cordis aggredior. Arteriz vmbilicales sanguinem arteriosum & vitalem à matre transmittunt in foetum, in cuius artiasiliacas inferuntur: ex his sanguis in truncū magnæ arterie, imò ad eius ostium vsque ascendit, quod in basi cordis est; sed ibi eum subsistere necessum fuit, quippe arteriæ magnæ ostio natura tres valvulas tanquam pessulum obdidit, ut egredienti sanguini pateat exitus, sed affluenti & accedenti extrinsecus occludatur aditus. Huic incommodo & obstaculo natura præfens remedium adhibuit; nam cum videret sanguinem eum materni cordis sinu elaboratum & preparatum, itineris longitudine, conuenire nutriendo pulmoni regerendum curauit in venam arteriosam quæ dicata est pulmonum nutritioni. Ad eam rem parauit ductum arteriæ magnæ & venæ arteriosæ communem; supra basin cordis perspicuum, quem anastomosin appellamus. Restat ad alterius anastomoseos demonstrationem progredi. Statuimus arteriosum sanguinem acceptum à matre in pulmonis nutritionem absumi; iam operæpretium est explicare, quomodo sanguis viuificus diffundendus in omnes foetus partes generari possit: non enim aer deducitur per arteriam venosam in læuum cordis sinus; quippe foetus non respirat in utero; nihil per arteriam magnam cor ingreditur; nec enim quidquam admittunt valvulæ, quæ intus foras spectant. Inutilis igitur erat sinister ventriculus cordis, defectu materiæ & locorum incommodo, nisi natura vias sibi faciles in-

uenisset à nullo edocta, & omni admiratione maiorem alteram anastomosis effecisset, quæ est à vena caua in arteriam venosam, per quam anastomosis sanguis pulmonis superfluous, continuo transmittitur in lævum cordis sinum, ubi elaboratur, conficitur, vitalisque facultatis *σφραγίδα* figillum recipit, vnde mox ad magnam arteriam coniungam & vicinam diuertit, vt per eam toti deinceps corpori distribuatur. Hanc ego demonstrationem verissimam esse reor; vt istud anastomose non opus, & nature miraculum potius ad corporis totius usum, quam ad vnius pulmonis eiusque inuicilis commodum referatur. Nec video quâ ratione pulmo plus alimentei & sanguinis tum mereatur, cum immortis sibi tantum studet, vt in embryo, quam fœtu edito, quum ad publicum respirandi officium perenni cietur motu. Si enim ex anastomoses pulmonis causa fierent, ex magnis illis ductibus audis totum sanguinem exhauriret, quem ex vena arteriola in adultis tantum trahit. Præterea hoc sequeretur absurdum; vt vitale facultatem cordis in fœtu toto gestationis tempore otii. Hæc est Petrei demonstratio, que ut eam in pauca contrabam, duo contendit. Primum, canalem arteriosum in eum usum constructum, vt arteriosum *εἰς* vitalem sanguinem, quem per arterias umbilicales trahit fœtus, in vñum pulmonem refundat, adeo vt arterias duas umbilicales non totius sed solius pulmonis gratia constructas velit. Alterum, ex sanguine à caua foramine in arteriam venosam delato, non ad pulmones; sed totum eum sanguinem in sinistram cordis sinum transmitti ad vitalis spiritus generationem. Quæ duo quàm sint absurda, ne dum veritatis palio velata, ratione & sensu (certissimis rerum omnium *κρυπτοῖς*) docere institui. In vñu cõmunionis illius quæ per canalem arteriosum ab aorta in venam arteriosam fit, pugnantia multa video, falsa & absurda inuenio quamplurima. Nunc enim, Petree, ambas anastomoses ad corporis totius usum, non vnius pulmonis commodum constructas vis; deinde in toto tuo scripto eum canalem, qui est ab aorta ad venam arteriosam, soli pulmonis inscribere scribis. Ita erat dicendum, vt tua constaret demonstratio. Ex anastomosis, ea quæ est à caua ad arteriam venosam, ad corporis totius usum est referenda; illa vero quæ est ab aorta ad venam, ad solius pulmonis nutritionem. Manifesta est ergo contradictio. Mitto, quom malè & improprie ductum & canalem arteriosum appelles anastomosis. Putat enim Aristoteles verborum curam indignam viro sapiente. Voluit quidem Galenus fieri venarum & arteriarum quamplurimas anastomoses. Est anastomosis apud eundem osculi apertio, & anastomotica medicamenta sunt, quæ vim habent aperiendi. Potest etiam anastomosis de humoris confluxu, qui mutua fit vasorum apertione, intelligi. Anastomosis alio modo usurpat Aristoteles libello De mundo, dum *ἀνεὰνδρ* dicit *ἀνθρώπων*, vertis Budeus oceanum in fauces se comprimentem; sed ductum, canalem, vas ipsum appellare anastomosis, monstrum est in Grammatica, in Philosophia, in Medicina. Sunt autem tuæ hæc verba: Ad eam rem parauit ductum arterie magnæ & venæ arteriosæ cõmunem, supra basin cordis conspicuum, quem anastomosis appellamus. Vide quò terapiat nouitatis æstus. Sed leuiora sunt hæc; nunc grauioribus telis res geratur. Scribis arteriosum sanguinem, quem per arterias umbilicales trahit fœtus, totum in pulmonis nutritionem absumi, & insignes eas arterias solius pulmonis gratia efformatas. Quo quid absurdius dici aut excogitari unquam potuit? Evoluè Græcorum omnium, Arabum & Latinarum scripta, videbis arterias umbilicales totius corporis, non solius pulmonis gratia constructas. Transpirat per arterias illas spiritumque maternum haurit totus embryo, non solus pulmo. Est ergo communis arteriarum usus. Hoc mirus Hippocrates libro De naturâ pueri, & De ostimestri partu indicauit his verbis. *κατὰ τὸ μέσον τῆς σαρκὸς ὁ ὀμφαλὸς ἀπ' ἐξου, δι' οὗ πρὶν καὶ τὴν αἰχμην ἔχει*, id est, in medio carnis umbilicis se-

Petrei opinio
impugnatur.

Contradictio
in Petree de-
monstratione.

Malè ductum
appellat an-
astomosis.

Arterias um-
bilicales soli
pulmonis ser-
uire malè pu-
tat Petree.

cernitur, per quem totus transpirat & incrementum capessit foetus. *Art. nunquid*
arteriarum umbilicalium communis est
usus.
 aërem trahunt in diastole, fumidosque vapores expellunt in systole arteriae? Funt ab
 arteriis in venas quamplurimae anastomoses; ergo ab arteriis in venas, non ab his in il-
 las fertur aër. Galenus quarto & sexto De locis affect. libello De usu pulsuum, comment.
 ad sectionem sextam libri sexti Epidem. transpirationem per arterias, non per venas fieri
 docet, & libro primo De femine. Membranarum (inquit) foramen circa umbilicum
 semper patet ob sanguinis & spiritus transmissionem: ex venis quippe influit
 sanguis, ex arteriis verò spiritus cum tenui, paucò & calido sanguine. Quid clarius?
 quid apertius? Hoc idem voluit princeps Arabum Avicenna. Hoc denique vniuersa Grae-
 corum & Arabum familia personat. Nobis sanè grauissimorum virorum hæc placita pro
 lege sunt fueruntque perpetuo. Tu verò primus & solus hac in re veteris doctrinæ auctori-
 tatem erroris infirmas. Tecum ergo non amplius autoritate, sed rationum momentis pu-
 gnandum. Axioma est Aristotelicum, viuientia omnia animalia spirare. Vt enim flamma
 angusto conclauis coercita & aëre non ventilata marcescit, ita natus noster calor nisi aëre
 quasi flabello ventiletur, extinguitur. Est autem spiratio hæc, Græcis πνῶναι πνῶα, du-
 plex. Altera insensibilis, διαπνῶν dicitur, id est, transpiratio, quæ per arterias & cæca spi-
 racula fieri solet. Altera sensibilis, quæ per conspicuos ductus, os quippe & nares, perfici-
 tur, διαπνῶν, id est, respirationem vocat Galenus. Fatum in utero non respirare
 certissimum est, quia nec debet, nec potest, ut sequenti quæstione docebitur. Transpirat igitur,
 non per umbilicalem venam, non per durachon; ergo per arterias duas (quatuor enim tan-
 tum hæc vasa in umbilico agnoscimus.) Est itaque arteriarum umbilicalium communis hic
 usus toti foetui, non vnicò & solo pulmoni accommodatus. Jam vero in arteriis non solum
 aërem, ut voluit Erasistratus, sed vitalem quandam spiritum & arteriosum sanguinem
 contineri docet Auerroës. Arteriosus iste sanguis, quem per umbilicales arterias trahit
 puer, annon ad embryi totius vitam & natiui caloris cōseruationem est comparatus? Egè-
 ne pulmonis parenchyma rubrum, crassum nulloque agitato motu tam copioso & tenui
 sanguine arterioso? Si unica vena, quam embryi nutriculam vocant, sufficit toti alendo
 foetui, cur non arteriola unica nutriendo fovendoque pulmoni sufficiat? At duas construxit
 natura umbilicales arterias, easque insignes admodum, quæ per chorion innumeris frui-
 tantur ramis. Quinetiam si totus ille sanguis quem per arterias umbilicales prolestat fo-
 etus, in pulmonis nutritionem absumitur, hæc consequentur absurda; pulmonem nec sanguine
 sibi simili ali, nec puro: refundunt quippe arteria umbilicales sanguinem in ramos iliacos,
 & ab his in aorta truncum; itaque miscbitur arteriosus matris sanguis cum arterioso san-
 guine foetus, quem in laevo cordis sinu vis generari, indeque in aorta tubos diffundi, sic alter
 alteri erit incommodus. Erunt in eo vase simul & semel duo motus contrarij perpetui, san-
 guinis ab illis ad pulmonē ascendenti, & arterioso sanguinis à corde in crura descendenti,
 quod ut in criticis excretionibus & egregijs naturæ conatibus interdū fieri admittimus, ita
 perpetuū esse omnino insciamur. Excutiamus ergo ab animis nostris caliginem illā, & ar-
 terias duas umbilicales totius corporis, non solum pulmonis gratia constructas statuamus.
 Iam ad alterius anastomoseos usum accedamus. Vis, Petreæ, venam cavam in arteriam
 venosam esse peruiam, ut effundatur in laeum cordis sinum sanguis, ad vitalis spiritus ge-
 nerationem, nec alium illius foraminis usum agnosceris. Ego verò cum Galeno ad pulmo-
 nis generationem & nutritionem efformatum fuisse puto. Nam si ex sanguine per venam
 cavā delato, nona sit vitalis spiritus in sinistro cordis sinu generatio, ut in pro rato astruis,
 quid eo foramen opus fuit? Annon patentissimo ostio hiscit & adaperitur cordi vena ca-
 uæ, quod in dextram thalamum tanquam cisternam sanguinem effundit? Cur non ibi exco-
 quetur & attenuabitur sanguis, moxque per septi foramina in sinistram sinum exudabit,

*Spiratio du-
plex.*

*Foetus non
respirat.*

*Totus sanguis
arteriosus non
absumitur in
pulmonis nu-
tritione.*

*Impugnatur
alterius cava-
rum generatio.*

Ratio prima.

ubique vitalis spiritus & *φωσφωριδα* recipiet. Purior erit & defacior ille sanguis in dextro
 sinu iam attenuatus, quàm si à vena cava per eam anastomosis in laeum cordis sinum effun-
 datur. Nulla itaque illius foraminis ad vitalis spiritus generationem erat necessitas, sed ad
 2^a ratio secunda pulmonis nutritionem maxima. Præterea axioma est *Medicina* & *Philosophicum*, quod to-
 ties inculcauit Galenus, nunquam fieri elaborationem perfectam nisi præcedat præparatio:
 sic in cerebri plexibus labyrinthicis preparatur animalis spiritus, in vasis spermatici miri ar-
 tificio intortis semen delineatur, in venis mesenterij sanguis rudimentū aliquod cōsequitur, in
 exilibus cuiusque particule venulis fit tertia coctionis præparatio: at si ex tua hypotefi à ca-
 uia in arteriam venosam, quæ illi cōtigua est, & ab hac in laeum cordis ventriculū effunditur
 sanguis, ubinam præparabitur & attenuabitur sanguis ille? Probabilius fuisset dicere (si
 noua illa vitalis spiritus in factu generatio admittenda est) effundi à vena cava sanguinem
 in dextrum sinum, ubique preparari, cū membrana nulla impediatur ipsūque septum
 foveis quāplurimis peruium sit. Volunt enim docti omnes dextrum sinum præparando vi-
 tali spiritui esse dicatum. Quin & certissimum est, vitalis spiritus duplicem esse materiam,
 aërem & sanguinem: at non vis aërem in cor ferri, quippe non respirat in utero fetus.
 Quomodo igitur & generabitur & conseruabitur vitalis ille spiritus? Marcescat procul du-
 bio aut extinguetur conuenienti pabulo defraudatus. *πᾶν δὲ τὸ ζῶον* (inquit diuinus Se-
 nex libro De natura pueri) *τὰ ὑπερὰ τὴν φύσιν*, id est, calidum omne frigi-
 do moderato nutritur. Sufficit quidem exiguo calori conseruando transpiratio; sed ad
 perennem vitalis spiritus generationem in sanguineis animalibus, aër copiosissimus requiri-
 tur, quem sola respiratio suppeditat. Sed pergamus Galeni hos calumniatores laceſcere. Si
 nouum hunc & unicum foraminis usum admittamus, ut scilicet à vena cava per arteriam
 venosam in sinistram sinum totus feratur sanguis, quo sanguine aletur pulmo? Aperi nobis
 vias, cedo mihi venam pulmonis? Iam tota hac arteria venosa deferendo in cor sanguinē ubi
 est occupata; vena autem arteriosa solum deferit vitalem spiritum & arteriosum sanguinem,
 quem ab aorta per canaliculum accipit. Eritne sine alimento pulmo? Respondes arterioso
 sanguine, eoque materno ali, & in eum usum arterias duas umbilicales constructas. Sed iam
 ignoras partes omnes duplici sanguine egere, venoso & arterioso? Venosus in partibus substan-
 tiam vera assimilatione facessit; arteriosus nativo singularum partium calori, qui fugax est,
 conseruando, reficiendo, fouendo dicatus est. Admitto quidem portionem arteriosi sanguinis
 cuiusque materni per canalem arteriosum ferri in pulmonem ad eius vitam & natui caloris
 tutelam, sed eo pulmonem ali, planè inficior. Crassior namque est, densior & grauior embrii
 pulmo, quàm editi iam animalis. Ergo crassiore alendus sanguine. Est enim hoc perpetua
 veritatis axioma; nutriri nos similibus. Tu natura hanc legem euerit funditus noua tua de-
 monstrazione, quia tenuiorem suggeris sanguinem pulmoni factus rubro, graui & crasso,
 quàm materno, quem subalbum & tenuiorem esse non negabis. Nutritur enim maternus
 pulmo sanguine in dextro cordis sinu attenuato, & per venam arteriosam delato; tu embrii
 pulmonem non alio quàm arterioso sanguine in sinistro materni cordis specu feruidiſſimo
 elaborato & per arterias umbilicales delato ali, pertinaciter adstruis, ut scilicet compenſe-
 tur immobilitatis incommodum. Hic manifesta contraditio. Tenuiorem faceris editi ani-
 malis pulmonem, crassiorem embrii; & tamen hunc aëreo, spirituosus & arterioso sanguine
 aliis, illum vero crassiore. Dum Galeni autoritate nixus, pulmonem vis ex sanguine spu-
 ma conſlari, ergo tenui & arterioso sanguine alendum; non vides de editi iam animalis pul-
 mone locum intelligi debere: in factu enim nec spumofus est, nec subalbum pulmo, sed ruber, gra-
 uis & densus, nec factum modo, sed etiam recens natorum pulmo eruius est & subruber,
 unde fit ut multi primis diebus suffocentur, quia non liberè sese explicat pulmo, aut à prauo
 in dorsum decubitu, aut à thoracis compressione; attolli debent puerorum capita, ut grauior

Contradictio
 in demonstratio-
 ne Petri.

Pulmo factus
 & recens na-
 torum ruber
 est.

pulmo thoraci sese contrahenti & distendenti facilius obsequatur. Qui ita intereunt suffocati, si secentur, pulmones habent crasso sanguine plenos & saturato rubore suffusos. Audi Galenum tenelli foetus pulmonem accuratè describentem decimoquinto De usu partium, cap. sexto, quo libro historiam foetus ex professo enarrat. Cur pulmo in foetu ruber, non autem ut in edito animali subalbus? Quia sanguine alitur per vasa simplicem tunnicam habentia delato, deinde subiungit; Dum respirare incipit animal, perpetuo agitur motu, quo fit ut sanguis à spiritu inciluis motu duplici tenuior adhuc seipso & mollior ac velut spumofus efficiatur, ob eamque causam caro pulmonis ex rubra, graui ac densa, in albam, leuem ac raram trasferitur. Quid clarius, quid apertius dici potuit? Est in foetu rubra, grauis & densa pulmonis caro, quæ posthac tenuior & velut spumosa euadit: Ergo eget embryi pulmo sanguine rubro & paulo crassiore: sanguinem enim soli deserunt vena caue riui, non aortæ tubi: At à caua ad pulmones nulli erant ductus: Natura igitur mirabilem eam anastomofin ad pulmonis nutritionem effecit. Ita erat philosophandum, Petree nec debueras quæ de editi pulmonis nutritione scribit Galenus, in embryi pulmonem transferre. Si rationibus his, quæ veræ sunt demonstrationes, non cedis, ad tribunal veritatis, ad auctorem ipsam te sisto. Si tenelli foetus pulmonem feces, videbis arteria venosa riuulos omnes sanguine rubro & crasso plenos. Vnde quæso sanguis ille, nisi ab eo vena caue ostio? Non ergo ad vitalis spiritus elaborationem, sed ad pulmonis generationem, nutritionem & incrementum facta est præclara illa anastomofis. Vides (vir doctè) quàm durum sit contra veritatis stimulum calcitrare. Ceterum si quid paulo libentius in hac nostra exercitatione dictum putes, precor te per candorem animi tui, ne in deteriorem accipias partem, & eam impugnandi libertatem condones mihi ex philosophica militia prerogatiua. Debeo id præceptori Galeno, debeo id veritati, cuius semper fui & ero acerrimus propugnator.

Francisci Rosseti Regis Medici doctissimi noua de usu anastomosean demonstratio.

EXERCITATIO III.

CUM nostras de horum anastomosean usu dissentientes sententias vidisset Franciscus Rossetus Regis Medicus, doctrina, ingenij acumine & experientia clarus, nouum viriusque communionis usum se inuenisse scripsit ad me, misitque tabellulam quam hic depingendam curauit. Putat ambas anastomoses soli aëri deducendo dicatas esse, eum priusquam ad cor veniat ad pulmones dirigendo, & cum utroque sanguine venoso & arterioso iam in hepate & liene preparatis, miscendo. Vt enim in natis animalibus aër externus, non crudus in cor fertur, sed per arteriam asperam delatus, in pulmonum rara substantia preparatur, sique cordi eundem spiritum, id est, cōsocialis: ita in nondū natis eundem finem, ad eosdem pulmones aër internus accedat necesse est, peculiarem ibi castigationem, antequam ad cor accedat subiturus. Quin etiam ex eius aëris subtilitate & micacionis cardiace motu, necessario hoc accedit commodi pulmonibus, quod eorum in embryo parenchyma & vasa interna assuescunt fieri in foetu mox nascituro motibus alternis obsequiosa; meatus enim ibi fitos in aër amplificat, vagitibus & voci edende postea necessarios. Sunt ergo anastomoses amba in foetu, & trachia in natis ut Castor & Pollux, quorum altero in lucem veniente, alterum occumbere in satis erat.

Opinio Rosseti,
de usu anastomosean.

IN INFANTULO

| NASCITVRO: | | NATO. | |
|--|---|--|---|
| OPERANTVR | OTIANTVR | OPERANTVR | OTIANTVR |
| 1. Chorion ventriculo otiante. | 1. Ventriculus chorio operante. | 1. Ventriculus chorio cessante. | 1. Chorion ventriculo operante. |
| 2. Vasa vmbilici vasis mesenterij oriosis. | 2. Vasa mesenterij, vasis vmbilici operantibus. | 2. Vasa mesenterij vasis vmbilici quietis. | 2. Vasa vmbilici vasis mesenterij agentibus. |
| 3. Vrachus vrectra quiescente. | 3. Vrectra vrachio operante. | 3. Vrectra vrachio cessante. | 3. Vrachus vrectra operante. |
| 4. Anastomoses cardiacae aspera arteria otianre. | 4. Aspera arteria anastomosis operosis. | 4. Aspera arteria anastomosis cessantibus. | 4. Anastomoses cardiacae aspera arteria operante. |

Expositio superioris tabellulae.

ERgo ut primorum trium, nempe chorij, vasorum vmbilici & vrachi, cum aliis tribus primis ex aduerso positis, scilicet ventriculo, vasis mesarei & vrectra, una & eadem cum suo singulatum consortie aut vicario, communisque & sibi diuersis temporibus respondens, in re eadem ad vitam necessaria est operatio, & sua cuique ab eodem opere, diuersis, etiam temporibus respondens quies. Sic quartus huius ac postumi consortij, & quasi mutui vicariatus (scilicet anastomoseon cardiacarum & aspera arterie) sibi ex aduerso respondentium, in vnius rei ad vitam pernecessariae ministerio, eadem quoque est non in istis temporibus tam operatio, tum quies.

Cum enim nihil in toto penitus corpore excogitari possit quod trachea arteria in utero cessantis, officium eius loco ibidem faciat, ad vitam necessarium, praeter anastomoses cardiacas, tunc quidem operosas, sed à partu mox cessaturas, arteria aspera ad agendum vicissim iam iam properante, consequitur, ut earumdem anastomoseon utilitas, eadem omnino aetate fuerit in utero, quae paulò post partum trachea arteria omnium consensu fore agnoscitur. nimirum aeris ad pulmones infantuli undecumque venientis transuectio. Operatio namque siue potius ministerium & utilitas trachea arteris, citra ullam controuersiam in iam natis est admissio aeris, sed tunc externi ex ambiente venientis, ad pulmones cum cordi aere sic alterato egenti, preparatos, antequam ad illud veniat. Ergo & anastomoseon in nascituris duntaxat utilium, verum munus erit, eiusdem aeris, sed tunc interni & ex materno utero per chorion & vmbilici vasa, ad eosdem fatulus pulmones, cum cordi preparatos venientis, transuectio. Haec Rossesi opinio est: quae hoc unum contendit, ambas anastomoses soli aeri ad pulmones deducendo dicatas esse, & per eas respirare infantulum, moueri, quae pulmones ad nouam vitalis spiritus generationem. Ego vero nec respirare infantulum, sed transpirare tantum volo, ut sequenti questione docebo; nec si aer in pulmones ducendus sit, tam insignes anastomoses necessarias fuisse puto. Cum enim imperfectis & vocalibus animalibus vnica sufficiat arteria aspera, cur non in fetu adhuc imperfecto & nondum vocali sufficiet vnica anastomosis? Verissimilius fuisset dicere ex duabus anastomosis al-

terram aëri deducendo, alteram sanguini exportando dicatam fuisse. Præterea, si aer solus per eas anastomoses ad vasa pulmonum fertur, cur in arteria venosa sanguis ruber apparet, & in vena arteriosa arteriosus sanguis & spirituosus? Quo sanguine aletur pulmo ruber & crassior? Sufficit in tenello fœtu exiguo calori conservandoque transpiratio quæ per arterias fit & cæca spiracula. Concludamus ergo ambas anastomoses pulmonis generandi nutriendique gratia primario constructas, quia cùm infantuli & iam editi pulmo colore, crassitie & densitate differret, dissimili egebat alimento.

An respiret in utero fœtus & pulmonis opera cgeat.

QVÆSTIO XXVI



E respirationis natura disputabitur ex præfesso libro nono, hic sufficiet annotare, respirationem ἀναπνοήν describi à Galeno commentario in librum De salubri dieta, τὴν διὰ τῶν σπυγμάτων ἔξω τῆ καὶ ἔσω σπυγμάτων τοῦ σπυγματος, cùm spiritus per os intro & extra fertur: adeo vi & distendi contrahique thoracem, & moveri pulmones sit necesse in respiratione. Si itaque nec aerem per os duci, nec pulmones thoracemque in infantulo moveri confectro, consequens fiet eum non respirare, sed transpirare tantum.

Respiratio quid.

Vitalis facultas in sanguineis & calidissimis animalibus, duobus indiget ad sui conservationem, respiratione & pulsu: exanguia vero, imperfecta & quæ parum habent caloris, sola arteriarum pulsatione & transpiratione contenta viuunt. Sic ἐντόμα & quæ per hyemem in latibulis degunt, transpirant, non respirant. Sic hysterica mulieres, quarum debilis est & languidus cordis calor, à venenata seminis aura excolutus, viuunt sine respiratione ad tempus, & multæ pro mortuis sunt elatæ, quæ adhuc vivebant. Fœtus quia parum habet caloris estque in utero ante diem partus velut imperfectum animal, sola transpiratione contentus est: itaque spiritum per os non ducit, neque thoracis & pulmonum opera vitatur. Quin etiam solus cordis gratia instituitur respiratio, ut scilicet aere quasi flabello quodam refrigeretur, expurgetur & reficiatur spirituosâ substantiâ, quæ in sinistro cordis specu feruidissimo & æstivante stabulatur: at nulla sit vitalium spirituum in fœtu generatio, ut mox demonstrabitur. Non igitur respiratione est opus, deficiente enim finali causa, quæ reliquas omnes movet, nihil unquam aggreditur sapiens Natura. Non ergo respicit fœtus, quia non debet. Sed neque etiam id potest. Nam materno obclusus utero & membranis circumseptus, fore aperto spiritum duceret, cum aere, aquas quibus innatat, & in his innocenter ut in balneo sedet, simul traheret, & primo haustu haud dubie ita suffocaretur, ut qui in amnem demersi obrui solent. Adde quod aerem non habet quem ore trahat infantulus, nullum enim in utero spatium est quod non impleat, uteri vero osculum interius ita connuet, ut ne flatum quidem admittat. Sed & pulmonum substantia & color aerem nullum per os & nares inspirari satis indicant: quæcumque enim animalia per os aerem ducunt, ea pulmonem habent subalbum & tenuem: at pulmo in fœtu ruber est & crassior, sanguineque alitur crasso per vasa simplicem tunicam habentia delato: Non respicit ergo in utero fœtus, quia nec debet, nec potest. Obiicit Rossetus copiosissimum per ambas anastomoses aerem ferri ad pulmones, qui thoracem distendat contrahatque. Sed si id verum esset, sequeretur thoracem ad pulmonis motum moveri, inflatus enim ab inspirato aere pulmo, thoracem amplificaret & deumescens ab aere expirato, eundem comprimeret: ita non quia distenditur thorax impleteretur folium instar, sed quia impletur, distenderetur utrium in morem. Quæ absurdissima esse docet Galenus mille in locis: sequitur enim thoracis motum pulmo, & ad vâni fœgam movetur, ut libro nono fusiùs explicabitur. Neque verò thoracis distensio con-

Transpirat etiam fœtus non respicit.

Respirare non potest nec debet fœtus.

Argumentum Rosseti, Connellitur.

Respiratio non
est absolute ad
vitam neces-
saria.
Respirare in-
fantulum de-
cetur.

Authorita-
tes.

Solutio.

tractioque ad vitam simpliciter est necessaria: viuunt namque & τὰ θαλερώτα & αἱ
& mulieres quedam sine eo thoracis motu. Non ergo necessaria est in tenello fetu respi-
ratio. Respirare tamen infantulum voluerunt quidam exemplo vrinantium in aquarū ab-
sis piscatorum per horas aliquot morantium; ibi enim cunctari in auras emergenti alacris
& piscibus onusti. Quid non tale aut maius (aiunt) faciet in vitro calidulus fetus, aspera
arteria ad hoc obsequium aliquod prestante, si piscator algidus aërem ex se ipso ore attra-
hit, aqua frigida undique circumclusus? Hoc ipsum grauiussumorum virorum authoritati-
bus confirmant. Hippocrates libro De natura pueri, Primum (inquit) modica spiratio
fit & sanguis modicus ab utero procedit, spiratio verò amplior redditur, cum
sanguis magis trahitur & vberior in vterum descendit. Galenus lib. De loci affectis,
Si cor (inquit) respiratione priuetur, hominem ilicò interire necesse est. At fetus
nonne homo est? Præterea moueri sentiunt fetum matris motu animali; cur ergo pulmo &
cor non mouebuntur? Vt ergo primis mensibus moueri incipientes fetus non minus mouetur,
ita respirans obscure, non minus respirare dicendus. Galenus libro 4. De causis pulsuum pre-
gnantibus pulsus maiores, celeriores fieri ait quā isdē non grauidis, quod nō sibi
solis respirare, sed etiam fetibus cogantur. Veram omnia hæc transpirare tantum infantu-
lum, non autem respirare consuevit: in respiratione namque distenditur cōtrahiturque tho-
rax, & aër per os ac nares inspiratur, at nec moueri thoracem, nec aërem per os duci in co-
bryo iam demonstrauius: fertur per arterias umbilicales in vniuersum corpus aër cum
spirituoso sanguine, & ab arteriis in venas sunt quamplurime anastomoses, vnde fit et
ligatis arteriis, non statim animal extinguatur.

An vitalis facultas spirituum procreatrix in fœtu sit otiosa, & an propria vi
moueat cor paradoxon.

QVÆST. XXVII.



Paradoxon, vi-
talem facul-
tatem cordis
esse in fœtu
otiosam.
Demonstratio.

Vegetans fa-
cultas à vitali
Medicorum
distinguitur.

Latine prima.

E fetus vita, id est, quomodo vitales facultates exerceat, noui dogma, id
que παρὰ τὸν, placet excutere; quod multis primo obtutu absurdum
fortasse videbitur, sed paulò accuratius in spectantibus, ita firmum tam-
que validis suffultum demonstrationibus, vt nullo contentiosorum impetu
labefactari possit. Paradoxon tale esto. Nulla in fœtu pulmonum &
cordis est necessitas, quia vitæ munia exequitur fœtus sine cordis
& pulmonum officiali actione. Hoc si confecerò, vniuersa Aristotelis & Peripatetice-
rum de cordis principatu doctrina corruiet. Huius noui dogmatis demonstratio tota erit
physiologica & anatomica. Anima facultates ab Aristotele tres statuuntur, vegetans,
sentiens & intelligens: à Medicis totidem, sed aliis nominibus insignitæ, naturalis, vitalis,
animalis. Vegetans illa facultas apud Peripateticos à naturali non distinguitur. Vt cuius
naturalis autrice, altrice & procreatrice continetur; ita easdem facultates vegetanti im-
seruire voluit Philosophus secundo De anima. Vegetans animalium omnium est propria;
nutriuntur siquidem animata omnia: at vitalis hæc Medicorum facultas spirituum pro-
creatrix, quæ in respiratione & pulsu lucet, in stirpibus & exanguibz non apparet, quia
frigidiores crassiorēque eorum spiritus nullam ferē sui patiuntur iacturam. In calidioribus
latere esse focumque oportuit, quo fugax singularum partium calor, alterius influxu reces-
setur. Est vero vniuersum illud nectar, vitalis spiritus, quem cōρ ἀπὸν τοῦ ὕδατος καὶ
τοῦ ἔλαιου, mirabili suo motu, Euripi instar, ex sanguine & aëre simul mistis continū gi-
gnit. In fœtu vitale hanc Medicorum facultatem non lucere, nec moueri cor propria &
insita vi, nihil tamen minus viuere ipsum posse existimamus, his persuasi rationibus. Mo-
uetur cor, vt vitales gignat spiritus cōsque è sinistro suo sinu tanquam è ingi fonte inorta

viuos diffundat, quò fugax singularum partiù viuacitas recreetur. Hæc perennis illius mo-
 tus est necessitas, hæc caussa finalis. At nulla fit in sinibus cordis vitalium spirituum gene-
 ratio, nec à corde infatuli vitalis spiritus in arterias cortiuatur: Nullus ergo est cordis mo-
 tus, nulla illius in fetu necessitas. Maior propositio natura sua lumine clarissima est. Quis
 enim non videt per diastolen utramque spiritus materiam aerem & sanguinem in cor tra-
 bi? aerem per arteriam venosam in sinistrum sinum, sanguinem per venam cauam in dex-
 trum: per systolen verò & expurgari fumidos vapores spirituum recrementa, & pelli vi-
 talem spiritum in aorta tubos tanquam canales & aquæ ductus: ad eò ut vnica hæc videat-
 ure esse cordis actio officialis spirituum generatio, quam perenni suo motu perficiat. Minor
 propositio ita confirmatur. Vitalis spiritus ex aere & sanguine simul mistis generatur.
 Vtraque materia priusquam ad sinistrum cordis sinum feratur, preparatione indiget. Aer
 in pulmonis substantia familiarem innato spiritui qualitatem logiuscula mora recipit. San-
 guis verò in dextro sinu, quem *φλεβώδης* & sanguineum vocant, preparatur. In fetu nec
 aer copiosus in pulmones fertur, osiatur enim arteria aspera, nec sanguis in dextrum sinum
 effunditur: Nulla ergo vitalis spiritus est officina. Quod aer & sanguis in cordis ventri-
 culos non ferantur, vasorum structura in fetu aperte declarat: vniuntur enim vasa illa,
 vena quidem & arteria venosa per foramen amplissimum; arteria magna & vena ar-
 teriosa per canalem arteriosum. Itaque vena caua non in dextrum sinum, ut nobis iam
 editis sanguinem effundit, sed in arteriam venosam per foramen illud ad pulmonis nutri-
 tionem. Arteria venosa, non aerem sed sanguinem defert cumque crassum: aorta verò non
 à corde spiritum haurit, sed ab arteriis umbilicalibus, quem per canalem interiectum in
 venam arteriosam refundit. Quod si vitalis spiritus in sinistro cordis ventriculo genera-
 tionem haberet, quid eo canali opus esset, cum patentissimum adsit in corde vas per totam
 pulmonum carnem sparsum, arteriam intelligo venosam? Est sane validissima hæc de-
 monstratio, cuius vim nemo, nisi in arte Anatomica sit peritus, assequi poterit, tota enim
 exoculari demonstratione & sensuum fide pender. Eam aliis rationibus stabiliamus.
 Nulla in fetu communis illius spirituum officina est necessitas, sanguinem enim arteriosum
 & cum eo vitales spiritus robres ac purissimos gemina suppeditant umbilicales arterie.
 Nichil in structura corporis se ingerit fortuitum; cur ergo geminas eas satisque insignes con-
 struxit Natura, si nouus sanguis arteriosus in corde generandus? Dices inutilem esse arterio-
 sum cum matris sanguinem & minus ad fetus vitalitatem idoneum, propterea noua cordis
 coctione indigere. Sed aperi nobis vias per quas arteriosus ille sanguis in laeum cordis sinum
 transmissi queat. Lam per aortæ ostium totus ferri non potest, quippe arteria magnæ orificio
 Natura tres valvulas tanquam pessulum obdidit, quæ intus foras spectant, licet nos portuincu-
 lam sanguinis cor ingredi ad eius vitam & nutritionem cum Galeno sentiamus. Ab aorta
 per canalem interiectum in venam arteriosam liberè quidem effunderetur, sed à vena arteriosa
 in cor ductus non patent: Sunt enim huius vasis membranula foris apertæ, intus clausæ, quæ
 egredienti sanguini patent quidem, sed eidem remeanti occluduntur. Cum itaque sanguis iste
 arteriosus arterias non deferat, huiusq; in laeum cordis sinum denegetur aditus, nouam illam
 preparationem non admittimus. Lam verò si maternus ille spiritus & arteriosus sanguis pul-
 moni alendo eiusque nativo calori conseruando accommodatus est, ut Petreus contendit, cur
 non eiusdem spiritus influxu & illustratione viuunt reliquæ corporis partes? aut si embrii
 cor vitale spiritum ad totius vitam generat, cur pulmonis exiguo conseruando impar esti-
 mabitur? Viuit itaque fetus propria vita, sed nec novos gignit spiritus, nec motu cordis uti-
 tur. Non tamen propterea otiosum dici debet cor, quia otiosum id est apud Philosophos, quod
 cum debet, aut potest agere, non agit. Embryi cor nec debet, nec potest novos vitales spiritus
 conficere. Non debet, quia purissimum & copiosissimum gemina suppeditant umbilicales

Motus cordis
 necessitas.

Vitalis spiri-
 tus nulla fit
 generatio in
 fetu.

Ratiocinandi.

Vitalis spiri-
 tus nouus nulla
 est in fetu ne-
 cessitas.

Tertia ratio.

Cor fetus non
 otiosum dici
 non debet.

mut quidem quòd vis ea quæ mouet secundarum arterias à corde ipsius foetus proficitur, simul autem & quòd à venis per anastomoses arterie spiritum nanciscuntur. Eodem libro, Cor (inquit) in foetu ab arteria venali spiritum & sanguinem attrahit seipso dilata-
to. Cap. nono libri De fatus formatione, Ventriculos ubi cor habuerit & susceperit
sanguinem tum venosum, tum arteriosum, pulsat, & arterias simul cum seipso
mouet, vt non solum veluti planta, sed iam etiam vt animal ipse foetus gubernetur.
Potest hæc opinio rationibus confirmari. Cum sit cor viscus omnium calidissimum ac
veluti focus ignis, si ipsum motu priues, non habebit unde refrigeretur; neque enim ex transpi-
ratione id assequetur, cum sit coëctus calido & angusto loco: neque externi aeris appulsus,
id enim membranarum quibus ambitur soliditas prohibet: adde quòd excrementa illa aquo-
sa perspiratum impediunt. Neque verò ex maternis arteriis cordi foetus aliqua accedit refri-
geratio, nouæ materia aut spiritus accessione: nihil enim ab arteriis foetus potest in ipsius cor
influeret, propter membranulas quæ aorta osculo incumbunt: necessarius ergo est cordis motus,
cuius beneficio tum sanguis, tum spiritus in ipsum trahitur, indeque toti corpori comunica-
tur. Huius opinionis fidem augent historiae. Testantur enim multe, plurimos ex matre
mortua excoles incolumes, vt Scipionem & Manilium. Iurisconsulti cum necis reum dam-
nant, qui grauidam sepelierit, non prius extracto fætu, quòd spem animantis cum grauida
permissæ videatur. Quæ Medicorum consensu lata lex, satis demonstrat fætum matri su-
perstitentem esse posse. Narrant Gorgiam Epirotam ex matre mortua, iamque elata in funus,
vixit prodiisse, quòd nunquam accidisset, nisi cor foetus vitalem facultatem obtineret, quam
citra materni cordis communionem, ad alicuius, licet exigui temporis usum, suppeditare
possit. Sed his omnibus facile satisfactum iri puto. Galeni primum auctoritas cum ea in re,
sibi non constet, exigui nobis momenti esse videtur. Quid si dicam, experimentum Galeni esse
inter alia & uerum? Vix enim umbilicales foetus venas arteriasque intercipere poteris, nisi ma-
tre mortua & caeso matris utero, tuncque respirat non transpirat foetus. Cor dicunt,
nisi insita vi moueatur, non habebit unde refrigeretur. Respondeo fætum in uteri ergastulis
contentum eorum animalium modo quæ *ὡλεῖσθαι* *ἐλπί* vocant Græci, habere satis
subsidiij ad vitam tuendam ex maternis arteriis: deinde cum aquis innatet & in iis innocen-
ter vt in balneo sedeat, earum tempore aliquantulum refrigeratur. Virgere quibusdam fortasse
videbitur postrema ratio, multos ex matre mortua viuos prodiisse. Sed expedita responsio est,
vitalem eam vim per arterias omnes diffusam, etiam citra cordis communionem, posse ad ali-
cuius, licet exigui temporis prædicationem seipsam conseruare. Vidimus (inquit Galenus
secundo De placitu) victimam auulso corde ambulasse; quod nos in cane sepe sũ-
mus experti. Quid si dicam matres eas pro mortuis elatas fuisse, quæ tamē adhuc
viuebant, vt sæpè in hysterico strangulatu contingit? Maneat igitur firma opinionis
nostre veritas, & cor & arterias foetus vi à corde & arteriis maternis manante pulsare,
non propria & vernacula facultate, nouumq; sanguinem spirituosum in cordis sinistro sinu
non generari, cum & copiosum & purissimum suppeditent arteriæ matris. Discant hinc Pe-
ripaterici quàm malè cor primum *ὡρῶν*, *κινῶν* *ἰκὼν* *καὶ* *αἵματος ποινῶν* *ἰκὼν* appella-
rit Aristoteles: nam & prius mouentur arteriæ foetus quàm cor, & sola arteriarum pul-
satione uiuit cor; denique quandiu materno concluditur utero infansulus, nec arteriosi san-
guinis, nec vitalis spiritus officinam in corde esse existimamus.

Ratio prima.

Ratio secunda.

Aulæi ex ma-
tre mortua in-
columes exco-
les sunt.Respondetur
ad singula.

Causæ.

Peripaterici
mus de cordis
principium de-
brina cernit.

HISTORIA ANATOMICA.

De motu & situ puelli in utero; quæ facultates sunt animales.

CAPVT VIII.

*Primum tempus motus in factu.**Situs puelli animalis est.**Situs puelli in utero.*

NIMA cum sit ἐντελέχεια corporis naturalis organici, functiones suas sine conuenienti organo non edit. Itaque primis mensibus ob cerebri imbecillitatem, & neruorum mollietatem, tenellus foetus membra iactare non potest: ubi verò firmati ceperint ossa, & nerui, membranæq; ac vincula humore lento ac mucoso plena, resiccari; tunc calcitare & moueri incipit.

Huius motus primum principium statuit Hippocrates libro De natura pueri, & i. *ἡ δὲ γυναικείων*, in maribus tertium mensem, in foeminis quartum, ad eò ut cōformationis & motus certa sit & definita proportio, duplexque inter conformationem & motum ferè semper intercedat tempus. Mares ergo, quia trigésimo die conformantur, nonagésimo mouentur, nonagésimus autem dies tertium mensem complet: foeminæ, quia quadragesimo secundo die conformantur, vigésimo & centésimo mouentur. Motus hic naturalis non est, sed spontaneus; musculorum quippe sese contrahentium opera ac ministerio perficitur. Contrahuntur muscoli, ita imperante anima: imperiũ hoc deferret neruus per corporeũ spiritum, cuius in cerebri sinibus, ex vitali per arterias vmbilicales delato noua sit generatio. Ad morticem hanc facultatem referri debet puelli situs: nam & Hippocrates in Prognostico, egrotantis situm & decubitus pronum, supinum, & in aliter utrum latus, ad morticem refert imbecillitatem, ac robur. Situs puelli naturalis ita describitur libro De natura pueri: τὸ ὕψαιδιον ἐν τῷσι μνήσῃσι ἐὼν τῷ χεῖρι ἔχει πρὸς τοῖσι γόνασι καὶ τὴν κεφαλὴν πλησίον τοῖν ποδῶν. *Puer, ut est in utero situs, manus habet ad genua, caputque pedibus proximum.* Totus itaque quasi contractus & conglobatus sedet in utero, manibus genua apprehendens, in quæ caput dimittit, ut oculi utrinque manuum pollicibus velut affixi heciant, nasus verò inter genua procumbat. Hæc figura licet exquisitè media non sit, ad eam tamen accedit proximè, propterea nec molesta nec laboriosa foetui est, sed gestanti primum utilis; quia minus occupat loci, nec ita in altum assurgit, ut diaphragma & ventriculus premat: deinde puello exitum quærenti cōmoda est, facilius enim inuertitur, & in caput fertur.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An spirituum animalium fiat in foetu generatio, & qualis eius sit in utero situs.

QVÆST. XXVIII.



MOVENDI facultas à cerebro per neruos tanquam funiculos in musculorum carnes influit, non per irradiationem solam & simplicem qualitatem, sed per substantiam corpoream, quam animale spiritum vocant Medici. Cum ergo sponte moueatur in utero fetus, & nunc in dextrum, nunc in sinistrum latus contorqueatur, sæpèque calcitret pedibus, animalis habeat spiritus necesse est. Hos autem an à materno utero trahat, ut vitales; an propria insita vi in cerebri sinibus generet, dubitatum est olim. Ego in cerebri ventriculis generari

existimo, hac ratione persuasus; quòd nervorum vteri & fœtus nulla sit σύμφοις, nulla communio, ut venarum & arteriarum: at solus nervus spirituum animalium est lator. Obicitur spiritum animale ad sui conservationem & expurgationem aëre indigere, aërem autem nullum inspirari, quandiu materno concluditur utero puellus. Respondebo, transpiratione quæ per arterias sit, umbilicales foveri, expurgari & temperari animale hunc spiritum, cuius eandem generationem in fœtu agnoscimus, quam in nobis iam editis. Primum enim in plexu illo arteriolarum labyrinthico, quem mirabilem & choroidem dicunt, præparatur, dein in tertio sinu excoquitur, tandem in quarto elaborationem perfectam adipiscitur, unde in spinalem medullam & nervos excurrit. Cæterum de motus tempore variè sentire videtur Hippocrates. Nam 1. *ἡ δὲ γυναικὶς*, tertium mensem in maribus, & quartum in feminis primum statui motus terminum. At 2. Epid. sect. 3. septuagesimo moveri fœtum; his verbis scribit: *ὅτι ἐν ἐβδομήκοντα κίνηται*, ἐν ἑπτασίοις τελευτᾷ: quidquid in septuaginta movetur, in triplicatibus perficitur. Et libello *ἡ δὲ ῥοή*, ἐς τὸ πῶν λέ ἐλέιοι, ἐς κίνησιν ο, ἐς τελεθὸς τῆς σί: triginta soles fœtum formant, 70. movent, 210. perficiunt. Conciliabitur, meo quidem iudicio, Hippocrates si dixeris, motum alium esse obscurum, alium ita manifestum, ut & aspectabilis sit intuenti, & manuum hypogastrio admoventi tractabilis. 70. die moveri potest fœtus, sed nec tractabilis, nec aspectabilis est, nisi post tertium aut quartum mensem. De situ autem puelli, qui ad motricem facultatem refertur, dissentientes quidam loci conciliandi sunt. Voluit Hippocrates lib. De natura pueri, ita in utero situm esse puellum, ut caput habeat pedibus proximè: *καὶ ἔκ ὅν*, inquit, *ἀρξάν κέναι ὅδ' ἂν ἴδης ἐν τῇσι μήτρῃσι τὸ παῖδ' ὄν, πότερ ἐν τῷ κεφαλῷ ἢ ἐν τοῖς ἰσχυρῶν καὶ τῶν*, id est, Nec verè iudicare possis, ne si in ipso quidem utero puerum videas, supràne an infra situm caput habeat. At lib. De octim. partu, caput superiore parte situm esse ita scribit: *ὅντα ὅδ' πάντα ἄνω τῷ κεφαλῷ ἐχόντα*: signuntur siquidem omnes caput sursum habentes. Aristoteles cap. 8. libri 7. De natur. anim. videtur hos locos ita conciliare: Omnibus, inquit, animalibus caput primis mensibus superius est: sed cum creuerint, exitumque appetuerint, deorsum deducitur. Rursum lib. De natura puelli, in omnibus ferè codicibus ita legitur; τὸ δὲ παῖδ' ὄν ἐν τῇσι μήτρῃσι τῷ ἰσχυρῶν ἐχὼν *ἡ δὲ τοῖσι γυναικῶσι*: puer in utero situs, manus habet ad genas; cum tamen omnes interpretes vertant, ad genua, *ἡ δὲ τοῖσι γυναικῶσι*. Ego utraq; lectionem defendi posse existimo: habetur enim utraq; sed in variis codicibus. Nam & ad genua & ad genas manus habet puellus: vola quidem & interiore manu genua apprehendit: exteriore verò manus parte, utramque genam attingit. Si enim, ut scribit Aristoteles prædicto loco, homo in semet conglobatus ita situs est, ut nasum inter genua, oculos super genua, aures extra genua habeat, manibus autem genua apprehendat; debet proculdubio utramque genam supra manum firmare. Cæterum quæ de diverso marium ac feminarium situ scribi solent, commentitia sunt. Quæ verò Aristoteles 7. De natu. anim. de vario animalium situ prodidit, pulcherrima sunt: ea tamen hic transcribere non libuit.

Spiritus animalium generatio in fœtu. Obicitur solutio.

De tempore motus varia Hippocr.

Conciliatio locorum Hippocratis.

De situ puelli conciliantur loci Hippocr. dissentientes.

Explicatur diversa lectio.

HISTORIA ANATOMICA.

Infantis exclusio seu partus.

CAP. IX.



PERFECTIS & firmatis omnibus tenelli fœtus particulis, ipse grandior calidiórque in dies euadens, copiosius alimentum postulat, & transpiratione iam non contentus liberiore amplioréque aëre frui exoptat. Vtrumque alimentum & aëreum & solidum cum nequeat mater per venas arteriasque umbilicales alendo & refrigerando fœtui

*Consep-
tim.*

par suppeditare, ex vteri latebris exilire affectatis puer principium motionis ag-
greditur. Itaque calcitrando membranas quibus inuoluebatur, dirumpit, & va-
lido impetu sese conuolutans viam sibi facit, exitumque, qua potest contentio-
ne, quarit. Vterus autem distentionem eam grauius ferens, & foetus nimium
aucti mole onustus, facinam suam deponere studens, totis viribus, pro ea qua
pollet vi expultrice, ad foetum strenue excludendum connititur. Atque tum ex
pari foetus ac vteri contentione, prodit in lucem puer, non in pedes, nec oblique,

*Qua forma
prodeat puel-
la.*

sed *ἐν κεφαλῇ*, inquit diuinus Senex, *ἐκ τὰ φύσιν* in, id est, *in capite, si modo*
secundum naturam prodeat. Grauioribus enim sunt partes superiores ex umbilico ap-
pensae, tanquam est statera quadam, & ea quidem ad amussim posita. Iuuat autem
eam foetus & vteri contentionem, tum voluntarius parturientis conatus, qui sit
contacto spiritu & depresso diaphragmate; tum obstetricis artificiosa manus,
que puerperam recte collocat, bene prodeuntem foetum molliter excipit, infeli-
citer prodeuntem dirigit; secundinas haerentes vtero suauiter excipit. Felici-
maortalem Dei prouidentiam miratur Galenus 15. De usu partium: quod enim

*Naturæ mi-
raculum in
partu.*

roto grauiditaris tempore tam exquisitè connixerat vteri osculum, nunc ita de-
hisceat, ut per id foras exeat, ossibus pubis illiūque non ita ut voluerunt quidam
distrahis diuulsisque. Partus hic certum non habet nec definitum in homine,
ut ceteris animalibus, tempus; sed toto anno & incerto editur spatio; quia ceteris
animatibus statim per tempora anni concubitus, homini omnibus horis dictum
nocturnumque. Ceteris fatietas in coitu; homini propè nulla; cetera animalia eo-
dem semper vtuntur victu, homo multiplici & intempestiuo. Mitto phantasie
& pathematum, quibus omni hora tanquam furis agitur in alterandis corpo-
ribus, vires. Tēpora porro humani partus sunt septimus, octauus, nonus, decimus

*Homini in-
certum par-
turi tempus.*

& vndecimus mensis; septimus mensis, primus est terminus, & ante eum, vitalis
nullus editur foetus, nec partus nomen, sed abortus meretur. Vndecimus vero vl-
timus est, quem si excedat quis, fallitur in conceptionis tempore, & dierum lo-
gismo: intermedij sunt nonus & decimus. Mensē autem hūc cum Hippocrate
intelligimus solarem, qui triginta dierum est, (sol inquit Philosophus, & homo
generant hominem) non quod propterea septimestres, nonimestres, decime-
stres, septem, nouem & decem menses integros complere debeant. Nam septi-
mi mensis, ut & decimi, maximam latitudinē esse volumus; ut qui in principio,
medio & fine septimi mensis nascitur, is septimestris dici debeat. Principiū septi-
mi mensis designauit Hippocrates libro De septimestri partu, dum septime-
stres centum octoginta diebus edi vult, accedente diei particula. Finem vero
septimi mensis indicauit libro *ἐκείνου*, ubi septimestres tribus hebdoma-
dum decadibus, id est, ducentis decem diebus constare scribit: septies enim tri-
ginta eum numerum perficiunt. Octimestres nulli vnquam viuunt, nisi fortasse
in Ægypto, ob cæli & soli clementiam. Nonimestris partus maximè est legiti-
mus, & naturæ valde familiaris: decimus satis frequens, vndecimus rarissimus.

*Cur septime-
stri partus
vixat.*

Cur autem septimestres vitales sint, & nonimestres, non octimestres, Pythago-
rici ad numerorum vim & præstantiam referunt: Geometre ad duplam confor-
mationis ad motum, & triplam motus ad partum proportionem: Astrologi ad
varios syderum aspectus: sed meræ sunt nugæ. Medici certas naturæ leges, & sta-
tos eiusdem circuitus statuunt; quos, nisi lacerata sit impedita, prætergreditur
nunquam. Cum itaque septimo mense perfectus sit puer, nihilque ad perfectio-
nem partium in eo desideretur; si eo mense satis validus sit, membranas dirumpi-

*Rationes me-
dica.*

pet, exitum sibi parabit, eritque superstes (quia perfectus) praesertim si fuerit mas. At octauo mense, si prodeat, licet perfectus sit, vitalis non erit, quia duas afflictiones sibi inuicem succedentes ferre non potest. Superiore enim mense plurimum colluctatus est, nunc eundem conatum repetit, nondum relictis viribus, succumbar ergo necesse est. Quinetiam octimestris vitalis non est, quia venit post diem partus, qui septimestris esse debebat, ante diem verò illius, qui nonimestris erat futurus: vnde sinistri aliquid contigisse existimandum, quod vel septimestrem partum tardarit, vel anteuerterit nonimestrem.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

De partus natura & differentiis.

QVÆST. XIX.



MASTVMSanè & mirum est hoc de humani partus natura, temporibus, & causis disputationis mare, in quod si semel vela pandimus, longa nobis erit & grauis fortasse ex concertatione perferenda nauigatio. Quot enim, Deus bone, dissentientium opinionum sese hic offerunt fluctus? quot in mensum & dierum logismo Syrtis? quot in causarum inuestigatione scopuli? quot saxa, in quæ nisi rationis gubernaculo quis regatur, faciliè & cum aperto discrimine impingat? Verùm tam vtilis & necessaria est hac ipsa nauigatio, vt eius astu etiam nolentes rapiamur. Periclitemur ergo aliquantisper audaces & intrepidi: fluctuantes fortasse animos eriget salutaris & prospera cuiusdam stellæ fulgor. Argon autam habemus & ducem optimū diuinum Hippocratem, qui, vt ait Macrobius, nec fallere, nec falli vnquam potuit. Ex eius libris De septimestri & octimestri partu, De nat. puelli, De principijs, De alimento, &c. De morbis mul. demonstrationes nostras hauriemus. Vt autem tota hac de partu disputatio ordine ac methodo progrediatur, nè ve rudiorum ingenia obruantur, eam tribus distinguam capitibus. Primo partus naturam, eiusque differentias omnes aperiam: secundo, partus tempora, quot & quæ sint, explicabo, annos, menses & dies computando: postremo, varietatis partus causas vniuersales, particulares, phisicas, medicas, arithmeticas, geometricas, astrologicas patefaciam. Atque vt à primo incipiam; Partus Græci τὸκος definitur, à nobis perfecti & absoluti omnino in vtero factus editio; adeò vt quocunque mense, die & hora exeat factus perfectus, ea editio propriè & verè partus dici possit. Ad eam autem perfectionem non sola requiritur partus dearticulatio: ita enim quadrimestris editio partus appellaretur, sed etiam earundem robur & παχύτης, corpulentia; quam cum non ante septimum mensem assequatur puellus, nullam ante septimum mensem factus exclusionem partum appellare liceat, sed aut abortum aut effluxum. Abortum Græci ἀποφορὰν, ἀμβλώσιν, διαφορὰν, ἐκτρώσιν, ἐκβολὴν, ἐκτρώμα, χύμα, ἀνεμιαῖον dicunt; vnde ἐκτρώσκειν, ἀμβλῶναι, ἀμβλίσκειν, διαφθεῖναι, abortire, abortiri, abortum pari, factum extinguere, aut, perdere. Abortum ergo definiamus immaturi factus aut foras editionem, aut in vtero extinctionem. Sunt qui abortiuum factum appellare nolint, nisi postquam moueri ceperit, vt à tertio mense tantum, ad septimum vsque abortus dici debeat; ante motum verò non abortus, sed effluxus nomen mereatur. Verùm Hippocratis διαβολὴν non videtur assecuti. Nam & ante motum, & post motum, postquam conformatus fuerit embryo, si ante tempus exeat, abortum solet appellare Hippocrates Aphorismo 44. sect. 5. Quæcunque nimium extenuatæ sunt, bimestres abortiunt & Aphor. 45. eiusdem sect. Quæ naturaliter sunt constituta, ἐκτρώσκειν, ὀβελῶναι, trimestres abortiunt. Quod si ante con-

Quid partus.

Quæ requiritur ad perfectionem partuum.

Quid abortus. Error quorundam de abortu. Abortus ante motum & post motum.

formationem excernatur genitura, non abortus propriè, sed ἐκρυσίς dici debet. Id docuit Hippocrates libr. 4. De septim. part. ὁ γομαίεται ὁ τῆλεαὐτα ἐκρυσίς, ἀλλ' ἔσται σμολ, quæ primis post conceptum diebus fiant corruptiones, effluxus propriè, non abortus nominantur. Aristoteles 7. De natur. anim. cap. 4. eas corruptiones, quæ ante perfectam formationem incidunt, effluxiones vocat. Non itaque impietatis aut periculi accusandum Hippocrat. quod à psaltria seu cantrici ancillule abortum consulerit. Neque enim eo saltem abortiuium edidit fetum, sed ἐκρυσίς tantum; genituram quippe septem dierum nondum dearticulatam. Neque verò abortum tantum more vulgi hic appellamus immaturi fetus foras editionem, sed etiam in utero abortire mulieres, etiam si non exeat fetus, nec propulsetur foras, existimamus. Hoc voluit Hippocrates 1. Ὡς ζωαίκεται: ὅταν, inquit, ἡ γυνὴ ἐκ τῆς ὥσας, καὶ τὸ παιδίον μὴ ἐξῇ. Cum abortit mulier, & puer non excluditur, &c. addo ut abortus non solum exclusionem fetus ante tempus denotet, sed etiam eiusdem in utero ante tempus extinctionem. Gestari namque in utero potest fetus, quamvis mortuus, per annos plures, ut multorum exempla testantur; sed inter cetera, portensiosa illa lithopædi seu petrefacti embryonis per 28. annos gestatio, quam eleganter descripsit Joh. Albosius Regius Medicus doctissimus. Quid ergo sit partus, quid abortus, quid uero effluxus ex Hipp. doctrina satis explicasse videor. Partus perfectus est in utero fetus editio, siue vitalis exeat, siue non: unde non leuiter errant, qui octimesitrem partum abortum vocat, quia vitalis non sit: nõ enim est de essentia partus simpliciter & absolue ut vitalis prodeat, sed ut perfectus: at octimesitris perfectus est. Vitalem esse, non vitalem, legitimum, illegitimum, sunt differentia partus, ut mox explicabitur. Abortus immaturi est fetus editio, extinctiue. Effluxus verò genitura ante perfectam conformationem exclusio. Partus facti partus natura, nunc eius differentia aperiende sunt. Partus alius naturalis est, alius non naturalis, alius legitimus, alius illegitimus. Ad naturalem partum tria requiruntur; primum, ut par sit contentio fetus & fœta: est enim & fœtus & utero communis hæc actio. Vtriusque principium motionis tribuendum sit, vterone, an ipsi puella, exponit Galenus comm. ad Aphor. 37. lib. 5. his verbis: Partus initium fetus adfert matri. Grandior enim & calidior copiosiore alimēto ac spiritu egens; manuum pedumque crebra impulsione, membranas disruptum. Vterus vero nimium grauidatus sarcinam deponere exoptans, totus contrahitur ad fetus exclusionem. Itaque ex pari fetus & fœta contentione, partus editur κατὰ φύσιν. Quod si virisque aut alterius desideretur conatus, partus erit non naturalis. Nam si puerpera totum opus relinquatur, laboriosus erit & difficilis partus: id autem contingit, dum aut debilis est, aut exolutus, aut mortuus puellus. Quod primo Ὡς ζωαίκεται, his verbis expresse Hippocrates: Ὡς τὸ δὲ μέγα αἰτίον τῆς μὴ ῥηϊδίας ἀπένεας, ἡ ὑπερὸν ἢ ἀποπληκτον ἢ, id est, maxima est hæc difficilis partus ratio, si aut mortuus, aut apoplecticus; id est, motu & sensu priuatus, exeat. Est secunda naturalis partus conditio, ut in lucem ea figura prodeat, quæ secundum naturam est. Talem autem primus descripsit Hippocrates 1. De morbis mulier. libr. De natur. puer. & De octimesitri partu, καὶ εἰς τὸ αἶμα, ἐπὶ κεφαλῇ καὶ κατὰ φύσιν ἢ. id est, fertur in caput puer, si modò secundum naturam prodeat. Cur autem figura hæc & forma exitus secundum naturam sit, rationem affert summus Dictator: βαρύτερα γὰρ εἰσιν αὐτὰ τὰ ἄνω ἐκ τῆς ὀμφαλῆς καὶ μολύβου. id est, quia puelli grauiores sunt partes superiores, ex quæ celerius voluitur. Adde, quod si in caput prodeat puellus, cum eius partes cereæ sint ac flexiles, puero foras euntes, nequeunt esse impedimento. At si in pedes prodeat, extendi possunt brachia, & ita dilatari, ut reliquo corpori aditum intercludant. Hæc Hippocratis est lib. De octimesitri partu sententia: τὸ δὲ σὺν καμψόμοις τὸ σώματος ὅτι κεφαλῇ ὁ ὑποκαλῶν

Quid effluxus
ex Hippoc.
Aristoteles.
Excusatur
Hippocrates.

Abortus est,
etiam si non
exeat fetus.
Auctoritas
Hippocratis.

Differētia
partus
tenetosa litho-
pedij.
Octimesitris,
licet vitalis,
non est abor-
tus.

Differētia
partus.
Tria ad natu-
ralem partū
requiruntur.
Prima condi-
tio.

Puelli conatus
quomodo sit
difficilis.

Secunda con-
ditio.
Figura partus
naturalis de-
scripta.

Cur figura
quæ in caput
prodeat, puer
naturalis est.

τοὺς τὸ παιδίον, ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν ἐπὶ πόδας ὁρμησῃ, τὰ ἐμφορῶματα γίνονται: flexiles corporis partes impedimento non sunt puerō in caput exeuntī, sed si in pedes prodierit, obtutamenta contingunt. *Esse autem figuram hanc quā fertur in caput puer, maximē naturalem & vitalem, confirmat Plinius lib. 7. naturalis hist. cap. 8. Antiquis, inquit, mos fuit, ut mortui pedibus primis efferrentur, quia mors vitæ contraria est. Ut ergo in lucem editur homo capite primo: ita mortuus debet pedibus primis efferri. Quicunque alia figura eduntur partus, non naturales dici debent. Sunt autem variae partus figure &c. & quoniam: sed tres precipuæ, quæ scilicet in pedes, in latus, & in du-*
Cur mortui pedibus primis efferri solent.
Varie partus figura contra naturam.
Quæ omnes Hippocrates 1. &c. & γυναικείων, & lib. De natura pueri, expressit: χαλεπὸν δ', inquit, καὶ ὡς ἐπὶ πόδας χροῖσθαι καὶ πὺλᾶναι ἢ αἰ μὴ τέρως ἀπὸ πάλον-ται, ἢ τὰ παιδία, ἢ καὶ τὰ ἀμφο. id est, periculosum est in pedes prodire. Sæpe enim eo partu aut mater extinguitur, aut puellus, aut ambo simul. Huius periculi deprecandi gratia aræ olim structæ sunt Romæ duabus Carmentis: quarum altera postuerta nominata est, prola altera, à recti peruersisque partus & potestate & nomine. Hos partus agrippas vocat vulgus, quasi ægrè partos. Sic Neronem pedibus genitum parens eius scribit Agrippina. Est tertia partus naturalis conditio, ut scilicet, velox sit facilis, & sine symptomatum vehementia. Partum legitimum appello, qui suo tempore prodiit. Illegitimum qui aut post diem, aut ante diem erumpet. Octimestris illegitimus est, quia vel nonimestrem antecurrit, vel septimestrem retardat. Hæc nimirum est partus natura. Hæc omnes illius dis-
Agrippa quæ Tertia conditio.
Quid legitimus partus, quid illegitimus.
ferentia.

Quot, & quæ sint humani partus tempora.

QVÆST. XXX.

RÆCLARE, ut omnia, Natura gentis & interpretes Aristoteles, *Incertū ē cunctis ferè animalibus constitutum esse à natura certū pariendi tēpus, & statos gestationis limites; cū autem hominī variā gestationis & partus tēpora laxiore ac liberiore lege concessa esse scriptum testatūq; reliquit.*
humani & variæ partus tempora.
 Colūba domestica singulis mensibus novos creat & educat fetus. Canis semper 4. parit mense, Equa nono, Elephas secundo anno. Solus homo varia habet puerperij spatia. Nam 7. 8. 9. 10. & 11. mense suos edit fetus. Hoc mulierculæ ubique personant, quibus tanquam peritis fidem adhibendam esse iubet Hippocrates lib. De septimestri partu. Hoc grauiſſimorum virorum Hippocratis, Aristotelis, Plutarchi, Galeni, Aphrodisæi auctoritas, hoc denique Romanorum leges suadent. Septimus mensis, primus est humani partus terminus, & ante 7. vitalis nullus existit, licet de Ægyptiis quidam, de Naxiis Poëta, de Hispanis plerique referant 6. mense vitales edi. Ultimus verò puerperij terminus est, undecimus mensis. Intermedij sunt nonus & decimus. Septimestrē partum vitalem esse docet Hippocrates lib. &c. & ἀρχὸν. παιδίον ἐπὶ ἀμύλων γόνων ἡρόμνων λόγῳ γαστήρι καὶ ᾧ, id est, puer septimestri partu natus pro ratione editus est & viuit. Est autem pro ratione editus, quia ad partium perfectionem nihil in eo desideratur. Non enim duobus sequentibus mensibus aliquid additur ad perfectionem partium, sed ad perfectionem roboris. Aristoteles 7. De nat. anim. vitales esse septimestres affirmat, ut & Aphrodisæus in Problematis. Galenus com. in lib. De septimestri partu, septimestres se multos vidisse sospites & vitales scribit. Quinetiam legibus Romanorum 7. mense vitalem edi partum propter auctoritatem summi Hippocratis sancitum est. Narrat Plinius, Sempronium & Corbulonem consulares viros 7. mense à Vestilia matre in lucem editos. Quod si Hippocratem nobis obiciat, qui lib. De septimestri partu, septimestres paucos esse, & ex illis paucis multos interire produit, propterea cunabulis è lana obuoluendos & fasciis alligandos iubet Aristot.

*Septimus mē-
ſis primus ter-
minus.*
*Undecimus
vltimus.*
*Septimestris
vitalis est.*
*Auctoritas à
Hippocrate.*

*Aristoteles.
Galenus.*
*Leges Romæ
naturæ.*
Plinius.
Obuius.

Solaris.
Septimestris
partus varia-
tas.

teles hoc tibi responsum feram, septimestres partus multiplices esse, quia septimi mensis ma-
ma est latitudo. Qui initio septimi mensis prodeunt, vitales quidem sunt, sed debilissimi &
tota prima quadragenaria laborant. De his intelligendus Hippocrates. Nam eos centesimo
octogesimo secundo die cum diei particula prodire vult. At 182. dies, principium tantum
septimi mensis constituent. Qui vero in fine septimi mensis prodeunt, decimo quippe & du-
centesimo die, validi sunt, paucique ex illis intereunt. De quibus lib. *Ἐπὶ αἰσχυρῶν*, editum
hoc protulit. Septimestres pro ratione editos esse, & vivere, quia tres decades habent hebdo-
madum; quolibet autem decas 70. est dierum. Rursum septimestris partus, aut mas est, aut
femina. Mas, quia celerius conformatur, mouetur & perficitur in utero, si 7. mense pro-
deat, vitalis erit. Femina autem cum eam proportionem, quæ ad τῶσων, motum & par-
tum requiritur, non seruet, si 7. exeat mense, vitalis quidem erit, sed non diu superstes. Hac
igitur prima lex sancitur: septimestres partus legitimos & vitales esse, hincque primum esse
humani partus terminum. Octimestris foetus editio partus quidem nomen, non abortus me-
retur, sed nec vitalis nec legitimus dici debet. *Ὁκταμῆσων*, inquit Hippocrates lib. De
principiis, *ἡνὸς μῆσων ἔδεν βροτὶ πῶποτε*, id est, octauo mense editus nullus vnquam
viuit; quod repetit libro De octimest. partu, & libello *Ἐπὶ τοῦ φῶς*, eleganter, sed enigmati-
cals. *ἔς ἔκ μῆσων 2. Μ. ἔκ ἑσὶ καὶ ἑσὶ*, id est, partus ducentorum quadraginta die-
rum (talis autem est octimestris) est & non est, quasi velis nasci quidem octauo mense fa-
tum, sed ita ut non sit, quia vitalis esse nequit. In Ægypto, ubi foetifer Nilus, & in Hispa-
nia, ob pariendi facilitatem, & calis ac soli clementiam, octimestres aliquos nasci vitales,
multi prodiderunt. Asclepiades, Naxias mulieres edere vitales partus octauo mense scribit,
sive Iunone Lucina id gratificante ob Dionysij beneuolentiam, siue quia Bacchus eo mense
in lucem prodisset, cuius nomine & Dionysiam Naxon appellarunt. Sed rara sunt hec, &
præter naturam vniuersalem, ut dicunt Philosophi. Adde, quod in numero mensium sape
decipiuntur mulieres, ita ut octauo mense videantur parere, cum pariant nono. Sicut enim
quibus secundo post conceptum mense fluunt menstrua; putant hæ non concepisse, cum tamen
conceperint. Et Aristoteles 10. De histor. animal. multos in conceptionis tempore erroris
contingere apertissimis verbis declarat. Sunt (inquit) quæ putent concipi non posse,
nisi vtrinque eodem tempore seminis iactus fiat. Hæ autem falluntur, quia corpus
bene habitum citius emitit. Ergo cum id semen valentissimum sit, non corrumpitur, sed at-
tractum seruatur ad eam mixtionem, quæ futura est. Sed & errant quæ putant non conce-
pisse, nisi siccus sit uterus, nisi totum retineatur semen; quia ex multo semine, quod tam à vi-
ro quam à muliere prodit, matrix non nisi quantum valet, deinde quantum debet trahere,
trahit. Multæ ergo iam conceperunt, quæ tamen sese concepisse non putant. Has sextum pro
7. octauum pro 9. mense numerare quid prohibet, licet falsò? Nonimestris partus omnium
maximè vitalis & legitimus est; quippe qui medium extremorum obineat, & natura ma-
ximè sit familiaris & consuetus. De decimestri multa Hippocrates lib. De natura pueri, &
De septimest. partu. Apud Homerum Odyss. λ. Neptunus sic Nympham alloquitur, *χαί-
ρα γυνὴ φιλότινι περὶ ἀπλομήδου δ' ἐνίαυτ' ἑ τέξεις ἀγλαὰ τέκνα*, anno circumacto
speciosum partum edes, nimirum decimo mense. Tot enim mensibus apud Aeolas ut & apud
priscos Romanos constabat annus, & Homerum Aeolem fuisse certum est. Vndecimestris
verò an edatur, maxima disceptatione certatur. De eo enim varia sentire videtur Hippocra-
tes lib. De natura pueri, decimum mensem terminum statuit gestationis longissimum. Et
δὲ κα μῆσιν (inquit) *γίγεται τὰυτὰ τὸ μακροτάτον*, id est, in decem mensibus
quod longissimum est, nascitur foetus. Quæ autem undecimo se gestare putant, in nu-
mero dierum & tempore conceptionis falluntur. Nam interdum à statu distenditur uterus,
& falsam conceptionis speciem refert; sape etiam suppressis menstruis intumescit, tuncque se

Octimestris
vitalis nō est.

In Ægypto
octimestres
quidem vi-
tales.

Quomodo de-
cipiuntur mu-
lieres in tem-
pore conceptionis.

Putant quæ-
dam se non
concepisse, quia
concepserunt.

Nonimestris
omnium ma-
ximè legiti-
mus.

Decimestris
vitalis.

De undeci-
mestris contro-
uersia.

Decimum ven-
tum longissi-
mus Hippoc.

Quomodo de-
cipiuntur mu-
lieres in tem-
pore concep-
tionis.

concepisse putant, & ab ea suppressionis hora diem gestationis numerant. Aristoteles (qui omnia fere quae de nat. anim. scriptis mandauit ab uno didicit Hippocrate, cum tamen ingratissimus vir eius nunquam meminerit) mulieres improbat quae undecim & duodecim menses factum se in utero gestasse dicunt. Latet, inquit, mulieres conceptus initium, si cum ante inflatus fuerit uterus, postea coierint & conceperint. Hoc enim esse principium conceptus existimant, cum non sit. Decimum ergo mensem terminum statuit Hippocrates longissimum: & Plinianus post decem menses ad legitimam hereditatem non admittit. At lib. De septimestri partu & octimestri undecimum mensem agnouit. Conciliabitur fortasse Hippocr. si dixeris, decimum mensem integrum & perfectum terminum esse gestationis longissimum; undecim autem menses completos non posse mulierem gestare. Quod si undecimo mense interdum pariat, id primis tantum continget diebus; & hoc voluit Hippocrates, dum libro De octimestri partu, mulieres quasdam undecimum mensem attingere scribit, id est, principium undecimi. Sunt qui duodecimo, 13. & decimoquarto mensibus gestari posse factum velint. Massurius auctor est L. Papyrium praetorem secundo herede lege agente bonorum possessionem contra eum dedisse, cum mater partum se 13. mensibus diceret tulisse, quoniam nullum certum parienti tempus statutum videretur. Narrat Auicenna se 14. mensium partum vidisse. Verum haec si contingant, rara esse & extra artis considerationem existimandum. Concludamus ergo primum humani partus terminum septimum esse mensem, ultimum undecimum, intermedios, nonum & decimum. Nunc qui sint septimestres, octimestres, nonimestres, decimestres partus, quot diebus constent, quo logismo gestationis menses, & dies supputandi sint videamus. Hic enim totius disputationis cardo versatur, estque labyrinthus hic diuerticulis innumerabilibus septus, a quo vix sese expedit & extricabit qui mensium, decadam, hebdomadam, & dierum Hippocraticorum naturam ignorauerit. Haec igitur quomodo se habeant, paucis accipite. Mensis apud Astrologos multiplex est; alius est solaris, alius lunaris, alius communis, mensis quippe calendarij Iuliani. Mensis solaris ut dicitur, quo sol triginta Zodiaci gradus percurrit, estque perpetuo triginta dierum. Mensis lunaris apud Galenum duplex, progressionis vnus, apparitionis alter. Progressionis mensem appellat spatium illud, quod ab vno lune coitu cum sole usque ad alterum intercedit, estque viginis nouem dierum cum dimidio. Mensis phaetonicus, seu apparitionis 27. est dierum tantum; quia tres subtrahuntur dies, quibus quasi abdita luna, lumen suum non impertiit. Mensis communis, seu mensis calendarij non pari semper numero constat. Nam Februarius mensis dierum est 28. Maius 30. Iulius 31. Haec mensium est varietas. Quis autem Hippocraticus sit mensis, non satis constat. Sunt qui lunarem mensem, eumque progressionis tantum in partus supputatione agnoscant. Potest id Hippocratis auctoritate confirmari: libro namque De septimestri partu statim initio, menses duos vnde sexaginta diebus constare scribit, & menses quinque dies centum quadraginta septem cum dimidiato die perficere. At quinque 29. centum quadraginta quinque constituunt; quibus si duos dies & dimidium addideris, 147. dies cum dimidio efficies, ut quilibet mensis sit 29. dierum cum dimidio. Galenus & in diebus criticis & in partu lunares tantum menses agnoscit, & Comm. in lib. De septimestri partu, post quartum diem supra ducentisimum vitales nullos esse factus putat. Ego contra, Hippocraticos menses solares esse, & 30. dierum ex eiusdem Hippocratis logismo conficio. libello namque De aëre & locis: Septimestris, inquit, partus tres habet denarios, seu decadas hebdomadam, in unaquaque decade septuaginta sunt dies, tres vero hebdomadam decades ex toto dies sunt decem & ducenti; Si itaque septimestris partus ducentorum est & decem dierum, erit quilibet mensis 30. dierum, quia septies 30. 210. faciunt dies. Praeterea eodem libro nouem mensibus, & 10. diebus perfectum est partum scribit. At nouis 30. ducentos & septuaginta pariunt, quibus si decem addideris, 280. dies habebis. Item libello De alimento, partum ducentorum

Ingratus in Hippocratem Aristoteles.

Conciliatio le- cium Hipp.

Decimio gestari posse, auctoritas Massuri. Auicenna 14. mense gestatum factum vidit.

Qui sunt septimestres, octimestres, nonimestres & decimestres.

Quintuplex mensis.

Triplex mensis.

Quid mensis progressionis.

Mensis apparitionis quod dierum.

Mensis communis quod dierum.

Mensem lunarem Hippocraticum esse voluit quidam.

Mensis Hippocraticus est 30. dierum & solaris.

Auctoritas vari.

Et quadraginta dierum, quem omnes octimestrem interpretantur, esse & non esse vult. Ducenti autem 40. dies octo menses solares perficiunt. Quinetiam sectio. 3. lib. 2. Epid. Quicquid in 70. mouetur, in triplicitatibus perficitur: at ter septuaginta decem & ducentos dies constituunt, qui septem sunt menses completi. Postremo supputationem mensium in gestatione per menses solares triginta dierum fieri debere, docet apertissime libro De octimestri partu. Nouilunium, inquit, dies unus est & mensis pars tricesima. Duo dies mensis decimam quintam partem efficiunt, ut tres dies decimam. Sunt ergo menses partus; meo quidem iudicio, solares potius quam lunares. Et sanè maior est ad generationem Solis, quam Luna facultas. Vnde Aristoteles 2. Physic. in Solem, stellam appellat saluarem, & ἡμυντικὸν; quod rerum omnium sit procreatrix & parens. Sol, inquit, & homo generant hominem. Quod ad decadas & septimanas Hippocratis attinet, nihil est quod remorari nos debeat. Sunt enim hæc quouis sole illustriora. Quaelibet decas septuaginta est dierum, hebdomada vero septem. Vnicus hic superest eximendus scrupulus, qui me diu multumque exercuit, cur scilicet supputatio dierum, qui septimestrem partum complent, non eadem sit apud Hippocra-

Cur varius sit
Epp. in sup-
putatione die-
rum, qui septi-
mestrem par-
tum complent.

tem. Nam libro *Ἐν ἀρχαῖς*, septimestres vult edi partus decimo & ducentesimo die. Quam sententiam sequutus est princeps Arabum Auenenna Fen. 21. lib. 1. cap. 2. De generatione embryonis. At lib. De septimestri partu, statim initio, οἱ δὲ ἐπὶ μῆλον γίνονται ἐκ τῶν ἐκατὸν ὀγδοήκοντα καὶ δύο, καὶ ὡς ἑσόντος μηνός. id est, septimestres diebus centum octoginta duobus eduntur, accedente diei particula. Quod etiam repetit lib. De octimestri partu, ubi septimestres anni dimidio & diei particula prodire vult, qui sunt dies centum octoginta duo & horæ quindecim. Interpretamur quidam ut se ab his laqueis extricarent, librum De septimestri partu non esse Hippocratis, aut saltem deprauatum esse hunc locum audacter professi sunt. Nos audacius germanum esse, & Hippocraticum hunc librum dicimus. Nam & commentarius eum illustrauit Galenus, cuius fragmenta apud nos extant, & Iureconsulti eo tempore, quo tum Roma, tum Athenæ florebant litteræ, eandem sententiam, eodem quo hodie legitur modo, in suas sanctiones transfulerunt. Diuersos itaque, non tamen contrarios, de dierum numero locos, ita interpretari libet. Septimi mensis maxima est latitudo, neque septimestris partus vno & eodem die semper nascitur. Est septimus mensis incipiens, est septimus mensis perfectus. Incipiens est centum & octoginta dierum, cum diei portuncula; perfectus decem est & ducentorum dierum. Ante centum octoginta duos dies septimestris nullus vitalis est, ut primus is sit septimi mensis terminus. Post decem & ducentos dies non amplius septimestris dici debet.

Lib. De Septi-
mestri partu
germanus est
& Hippocra-
ticus.

Interpreta-
tu Hippoc.

Extrema par-
tus septimo-
stri tempora.

Priores illi partus languidi sunt & debiles, vitales tamen. Posteriores robusti. Extrema inquit duo septimestris partus tempora, primum & ultimum duobus illis citatis locis expressit Hippocrates. Intermediorum non meminit, ut ducentorum & 4. dierum; quia ex utroque extremi natura satis dignoscuntur. Hæc mea non est, sed eiusdem Hippocratis interpretatio. Ut enim libro De octimestri partu decimestres vocantur, non solum qui menses decem integros nati sunt, sed qui dies aliquot decimi attigerunt ita septimestres dicendi sunt, qui ad sex menses plenos dies aliquot de septimo sunt consecuti. Apertius lib. *Ἐν ὄψει*, postquam septimestres, octimestres, nonimestres & decimestres partus descripsit, tandem in hæc verba erumpit: γίνονται δὲ ἐν ταῖσι καὶ πλείω, καὶ ἐλάττω, καὶ ὅλῳ καὶ χατὰ μέεζα, gignuntur in his mensibus & plures & pauciores, secundum totum & secundum partes, aut in parte mensis, aut in toto mense perfecto. & lib. De septimestri partu, quinque menses, qui inter primum & septimum intercedunt, integros quidem esse numerandos vult, sed primum & septimum etiam si deficiant, nihil interesse. Sic in dierum criticorum logismo, qui crisin præcedunt dies, integri numerandi sunt. Dies verò criticus quo crisin molitur natura, maximam habet latitudinem. Nam & in principio, & in medio, & in fine septimi,

Ita crisi dies
qui inter pri-
mum & sep-
timum inter-
cedunt inter-
grum numeran-
di sunt.

aut decimiquarti diei potest cōtingere crisis, eaque salutaris. *Menses* ergo qui partum præcedunt, integri esse debent, si primum exceperis. *Mensis* verò parvus, qui diei critici rationem habet, extrema habet duo, & intermedia tempora quamplurima, quibus omnibus si prodeat fœtus, vitalis esse potest. Ita ex his mensium & dierum paulo spīnosioribus sententiis euadendum puto.

Quæ partus sint causæ vniuersales & particulares.

QVÆSTIO XXXI.

DEMOCRITVS summus suæ ætatis Philosophus, veritatem in profundo patet demersam conqueritur. Pyrrhonij, fortuita esse omnia, nihilque certò sciri posse ubique prædicant. Præclarus Aristoteles eorum omnium, quæ Natura lege sunt, certas esse & naturales causas solis Philosophi cognitas enuntiauit. Quod ante omnem natam Philosophiam mirus Hippocrates lib. De aëribus, locis & aquis sic prodidit: εἰ δὲ ἐν αὐτοῖς φύσεως γίγνεται, nihil in natura sine natura, id est, sine causa naturali sit. Causas si quis cum Heraclito neget, is innumeros incurrens absurdorum labyrinthos, demonstrationem & scientiam omnem de rerum medio tollit. Scire enim, inquit Philosophus, est rem per causam cognoscere. Cum itaque partus actio sit naturalis, sintque tam varia eius tempora, lubet in causarum inuestigatione hic aliquantulum spatium. Enimverò partus causæ, aliæ sunt vniuersales, aliæ particulares. Vniuersales non homini modò, sed etiam omnibus animalibus communes: aliæ sunt ex parte fœtus, aliæ ex parte vteri; quia partus ex pari sit contentione fœtus & fœta. Causam ex parte fœtus eleganter expressit Hippocrates libro De natur. puelli, alimenti & vitæ spirituosius & solidius defectum. Οὐκ ὅτι ἀν αὐτῇ τὸ παιδίον ἐκτὶ δυνάμεως ἢ μήτηρ τροφῇ παρέχουσιν ἀρκέουσιν. Ζητέον ὅτι πλείω τροφῇ τῆς παρὰ φύσιν τὸ ἐμπεριον, ἀχαιζόν ἢ ἡνυσσι τὰς ἐμείνας, καὶ λυθὲν τῷ δέσμῳ χῶρεσι ὁ μὲν ἔξω, id est, cum grandior auctiorque puellus euaserit, sufficiens & idoneum alimentum exhibere non potest mater. Itaque vberius quæritans alimentum, calcitrando membranas dirumpit, & ita vinctus solutus foras prodit. Μόλα σαρξ ἀργὴ καὶ ἀδιδάπλωτος, per octo & decem annos gestatur in vtero; quia nec alitur, nec transpirat. Non ergo alimentum, nec aërem exoptat, quare nec exitum. Gignuntur sepe in muliebri vtero monstra & animalia, serpentes quippe aut talpæ, quæ, quia exanguiæ sunt, parumque habent caloris, sola transpiratione contenta, in vteri latebris per multos annos delitescunt, nec sponte unquam foras prodirent, nisi aut vteri vi, aut arte medica pellerentur. Est ergo partus omnis hæc prima in vniuersum causa, alimentis defectus. Est & alia vniuersalis causa ex parte vteri. Vterus enim, cum determinatam habeat quantitatem & magnitudinem, ultra quam extendi non potest, si eam per incrementum fœtus semel fuerit affectus, eandem nimia molè onustus; eam sarcinam deponere studet. Sic dicebat summus Hippocrates 1. Ὁ δὲ γυναικείων, ob vteri paruitatem abortus contingere; dum scilicet ita increuit fœtus, ut ab vtero amplius contineri nequeat; καὶ αὐτὰ δὲ αἰ μὴ παρὰ φύσιν φύσιν ἔσιν ἐξαμβλύνεται; id est, habet & vteri naturas peculiare & quali congeneres, quæ abortus faciunt: inter eas naturas, vteri paruitatem connumerat. Fœtus itaque alimentum quæritans, & vterus disentionem extremam non amplius ferre potens, partum faciunt. Particulares causæ ad solum & vnicum hominis partum spectant; quia solus homo incerta habet puerperij spatia & varios gestationis limites. Cuius varietatis causæ variæ sunt. Primum constat animalia bruta, statim tantum ac definitis temporibus amoris stimulis

Partus causæ vniuersales.

Causa partus vniuersalis ex parte fœtus.

Cuius causa exitum non appetit, & monstra quædam.

Causa partus vniuersalis ex parte vteri.

Fœcidioris causa abortus apud Hippocratem vteri paruitas.

Causæ particulares partus Cuius bruta certa habent tempora partus.

incitari, ut ergo certa habent coitus, ita & partus tempora. Homo autem, quia omni tempore, die & hora in amplexus venereos ruit, qualibet etiam anni tempestate suos edit fetus. Gestationis autem humani partus terminus, multiplex est & varius: Non ex parte agentis vniuersalis, id est, natura; eadem enim in homine & brutis natura est vis, idem motus, eadem perpetuo lex: sed ex diuersitate materis, quae in homine varios subit alterationes, pluresque patitur, quam in brutis mutationes. Animalia bruta eodem semper victu, & simplici viuunt: homo vero multiplici & intempestiuo. Animalia si semel conceperint, marem non amplius admittunt: mulier, quantumvis grauida, viri amplexus nunquam respuit, unde tenello setui non minima alteratio. Animalia nullis animi pathematibus agitantur, homini quam noxia sint haec, quisque in se experitur quotidie; & Plato eleganter in Charmide, cuncta ferè mala corpori ab animi affectibus contingere scribit. Sunt qui varietatis partus causam referant ad seminis genitalis naturam aliam atque aliam, ita ut aliud seruiat, aliud maturius proueniat. Addamus & nos singularem Naturae in humanae speciei conseruatione prouidentiam, quae causa est finalis. Plus enim de homine (quem naturae delicias vocat Plinius) quam de brutis sollicita, plures gestationis & partus terminos ei concessit. Sunt autem puerperij tempora septimus mensis, octauus, nonus, decimus, & undecimus. Verum cur septimus mensis & nonus vitales sint, non autem octauus. Hoc opus, ut dici solet, hic labor est. Varia sunt hac de re Pythagoraeorum, Geometrarum, Astrologorum, & Medicorum sententia, quas omnes ob rei varietatem & elegantiam hic describere placeat. Pythagorici & Arithmetici ad numeros omnia referunt. Triplicem namque in rebus ordinem statuunt, specierum figurarum, & numerorum; inter quae numeri primum sibi locum vendicant, & in Bibliis sacris omnia in numero, pondere, & mensura disposita esse scriptum legitur. Ex numeris alij sunt pares, alij impares. Pares feminas, impares viros appellant: illos imperfectos, diuiduos, & infaecundos esse volunt; hos perfectos, facundos, & indiuiduos, proptereaque principij rationem obtinere. Ex duobus enim imparibus par numerus generatur. Par vero imparem nunquam generat. Inter impares porro septenarius primas tenet, cuiusque tanta est maiestas, tanta diuinitas, ut veteres & ἑκατομῖδ' ἔχ' τεσσάρων, id est, sacrum & venerandum, appellarent. Indorum magi & sapientissimi Aegyptiorum Sacerdotes, septenarium maioris & minoris mundi numerum vocarunt. Philo Iudaei libro De mundi opificio, hanc septenario praerogatiuam tribuit, quod μόνος ἐστὶ ἡ φύσις πέντε, ἢ ἑπτά, ἢ ἑκατόν, quod solus neque gignere, neque gigni natus est. Ex aliis numeris, qui intra denarium sunt, alij gignunt, non gignuntur, ut vnitates; quidam gignuntur, non gignunt, ut octonarius, quidam & gignunt & gignuntur, ut quaternarius. Solus septenarius nec gigni nec gignere natus est. Hinc eius diuinitas & perfectio. Quicquid enim nec gignit, nec gignitur, immotum manet. Pythagorici septenarium humanae vitae vinculum, & nexum nuncuparunt; quem nodum nexumve agnoscens Tullius in somnio Scipionis, Septimus, inquit, numerus omnium rerum nodus est. Est numerus hic maximè harmonicus, & quasi fons pulcherrimi diagrammatis, quia harmonias omnes, diatessaron, diapente, diaphason, omnes item proportionem, Arithmeticam, Geometricam, harmonicam continet. Theologi septenarium numerum perfectionis vocant; quod septimo die perfecta sint omnia, unde & septimanam τελεσφόρον dicunt, Numerum quietis, quod septimo die quiescerit Deus ab operibus suis; Numerum sanctificationis, quod cum filiis Israël tanquam celebratissimum commendaret Moyses; Numerum ultionis, Numerum poenitentiae, Numerum beatitudinis: unde vulgatum illud, O ter quaterque beati. De septenarij laudibus multa Philo Iudaeus, & Linus antiquissimus poëta. Mitto quod à plurimis obseruatum est, septem esse in orbe miranda, sapientes veteres septem fuisse: eundem numerum septentriones maiores minores in caelo facere: caelum septem cinctum circulis: septem stellas

erraticas. Vrsam septem stellis constare; Pleiadum choro ex septem stellis absolutos; septem esse quæ conspiciuntur; septem vocis mutationes, septem physicos & naturales motus, septem apud Græcos vocales, septem atates, septimam auream atatem futuram, septem ostia Nili, septem metalla, septem artes liberales, septem in capite sacra Palladis arce fenestra, septem quæ vna sibi muro circumdedit arces, septem humanarum actionum causa, septem de stirpe Homeri certantes vrbes, marem septimum numero mira & occulta proprietate scrophulas persanare; fœminam septimam numero sua præsentia partum iuuare, heptaphyllon herbam venenâ resistere. Hæc omnia lubens sciensque prætereo. Fateor enim multas nugæ numerorum prætextu circumferri. Venio ad Philosophicas & Medicas demonstrationes. Commemorabile est quod obseruauerunt Philosophi & Medici, vitam nostram septenarius dispensari. O δὲ αἰὼν, inquit Hippocrates libro αἰὲ ἀρχῶν, τῷ αὐτοῦ χρόνῳ ἐστὶν αἰὼν ἕξ ἡμέρας, id est, hominis ætas septenario dierum numero constat. Nam & plerique eorum qui per dies septem nihil quicquam aut edere aut bibere volunt, his ipsis diebus moriuntur, quia & contrahitur ieiunium intestinum, & ventriculus diuturna officij vacuitate sui omnino redditur immemor. Semen quod post viri eiaculationem intra septem horarum spatium non fuerit in effusionem relapsum, hæsisse in vitam pronunciat. Septimo post conceptionem die, spermaticarum omnium partium prima apparent rudimenta, habetque (ait summus Dictator) genitura septimo die quacumque corpus habere par est. Septimestres partus ζῳοῦμοι sunt, non οὐκ ἑπταμήνιοι; septimo post partum die iactat reliquias umbilici. Post his septem incipit ad lucem visus eius moueri, post septies septem liberè, iam & pupulas & totam faciem vertit ad motus singulos. Septimo mense dentire incipit. Post his septem sedet sine casus timore, post ter septem sonus eius in verba prorumpit. Post quater septem incedit, post quingules septem incipit lac nutricis horrescere. Septimo annò dētes permutat, si que, ut scribis Hippocrates libello αἰὲ ἀρχῶν, dentium tertia generatio, à solidioribus alimentis, tunc loquendi integritas absoluitur, unde septem apud Græcos vocales. His septem annis peractis lucent pubertatis indicia; puellis enim erumpunt menstrua, turget mammae, noua lanugine insperguntur genitalia, totum corpus libidine titillatur; mares verò τε γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, id est, hircire, vocem asseriorem edere & venerè agnoscere incipiunt ob natui caloris ἐκ δαμνῆος. Post ter septenos firmam aggrediuntur aetatem. Quarto, quinto & sexto septenarius conseruantur vires, eaque ætas virilis & constans dicitur. Septimus septenarius quadratus est. Nonus climatæricus & periculossissimus indicatur; obseruatum enim in multa hominum memoria expertumque est (ut notat A. Gellius) in senioribus plerisque, hunc vitæ annum cum periculo & clade aliqua venire aut corporis morbi que grauioris, aut vitæ interitus, aut animi ægritudinis. Elegans legitur apud eundem authorem diu Augusti ad Caium nepotem de anno climatærico congratulatio. Aue (inquit) Cai ocellus iucundissimus, quæ sēper medius fidius desidero cū à me abes; sed præcipuè diebus talibus qualis est hodiernus, oculi mei requirūt meum Caium; quæ vbi cūq; hoc die fuisti spero letū & bene valentē celebrasse quantum & sexagesimū natalem meū; nam vt vides, climatætera cōmūnem seniorū omnīū tertīū & sexagesimum annū euasimus. Decimus septenarius qui septuagesimū annum cōplet, meta creditur viuendi; quod Regius ille Propheta celesti numine plenus ita cecinisse est visus. Septuaginta anni dies sunt hominis, hos vltra labor & dolor; sunt ergo septenarii omnes & dies & menses & anni (quos hebdomaticos vocant) maximè considerandi, quoniam insignes in illis mutationes contingunt: propterea monet Ficinus ille Platonius, vt qui vitam producere cupit, septimo quoque anno Astrologum & Medicum consulat; Astrologum quidem, vt vnde vitæ impendet periculum intelligat, Medicum verò, vt rectam vitæ rationem præscribens, astorum minas & vim maleficam effugiat. Aristoteles septi-

mo De historia animal. hoc quasi eximium septenario tribuit, quod singulis septenarius mutationes maxime contingunt. Galenus sanitatis praecepta tradens per septenariorum rationem, etatum facit discrimina. Merito itaque Pythagorici septenarium rerum omnium principium, Tullius rerum omnium nodum nexumve (gemina quippe vim habet vincendi) Medici verò certa experientia persuasi Regem inter decretorios dies appellant. Propterea Pythagorici & Arithmetici septimestres partus ideo vitales esse volunt, quod impari & perfectissimo numero consent. Hoc videtur etiam agnouisse Hippocrates, libro *ἁπλῶν*. Septimestres enim ideo vitales esse vult, quod iustum & plenum septimanarum numerum sint consecuti. Octimestres verò vitales non esse, quia plenas septimanarum decadas non expleverunt. Quinetiam libro De septimestri partu, foetuum conceptas abortus, & partus hisdem temporibus iudicari, quibus & morbos scriptum reliquit: At imparibus diebus ferre omnes iudicantur morbi, suntque soli septenarii verè critici. Quod si decimamensem obiciat, qui licet par sit & foemina, vitalis tamen & legitimus esse solet. Respondemus Pythagorici, denarium numerorum omnium esse perfectionem, & perfectionis numeros in se omnes continere. Hæc itaque est Pythagoreorum & Arithmeticonum de septimestri & octimestri partus causis sententia, qui omnia ad numerorum vim referenda putant. Ego cum Aristotele in Metaphysicis, numerum per se agendi vim nullam habere existimo: quantitas enim est, sed ratio numeri, quæ veluti forma quedam est temporis, omnia Nature opera concludens, mira prestat. Hanc rationem & quasi necessitatem Naturæ se aliquando explicaturum pollicetur Hippocrates ad finem libri *ἁπλῶν*. Astrologi & Genethliaci, septimestris, octimestris, & nonimestris partus causas, ad varios siderum aspectus referunt. Sui libet enim mense, quamlibet planetam præesse volunt. Primo quidem Saturnum, qui sua frigidityte & siccitate liquidum & humectum semen retineat, cogatque ad conceptionem. Secundo Iouem, qui suo tepore & vitali calore incrementum præbeat. Tertio, Martem, qui calore & siccitate membra iactare incipiat. Quarto, Solem, qui ingenti calore meatu omnes reddat ampliores. Quinto, Venerem, quæ decorem & venustatem puello conciliat. Sexto, Mercurium, qui motus organa absoluat, præpoliatque. Septimo, Lunam præesse putant, quæ spatia fibrarum vacua carne & adipe impleat, uterique osculum humiditate sua ad faciliorem partum relaxet. His planetarum muneribus exornatus puellus, si 7. mense prodeat, vitalis erit. Quod si ob imbecillitatem, ab uteri latebris exilire nequeat, accedit rursus ille maleficus Saturnus, aduersarius principiorum vite, cuius dominatu vel potius tyrânide, capivus tenetur infans. Quare si eo mense prodeat in lucem, confessim emoritur, vitali quippe calore destitutus. Adde, quod tam subitum à Luna ad Saturnum, quasi ab imo scale gradu ad supernum ascensum ferre non potest. Omnis namque subita & repentina mutatio naturæ inimica. Quod si octauum mensem effugiat puer, accedit post Saturnum beneficus Iupiter, cuius prospero & salutaris aspectu cuncta Saturni maleficia pelluntur. Itaque nono mense vitalis editur, ut & decimo & undecimo ob Martis & Solis cum vite principii cognitionem. Hæc Astrologorum est de partus causis elegans quidem, & speciosa, sed erroris plena opinio, cuius vanitatem conuellit Picus Mirandulanus libro quem edidit aduersus Astrologos. Qui enim fieri potest ut 1. & 8. mense semper præsit Saturnus, cum quolibet anni tempore, die & hora concipere possit mulier? Cur cerui octauo mense vitales semper prodeant, ut scribit Aristoteles 6. De natura animal. Plinius 7. naturalis hist. cap. 5. eos tantum septimo mense nasci putat vitales, qui aut pridie posterove plenilunii die, aut interlunio concepti sunt. Sed commentitia sunt hæc. Geometre partus causam ad conformationis & motus proportionem referunt. Duplicem enim conformationis ad motum, & triplicem motus ad partum proportionem statuunt, quam si obseruet puellus, vitalis in lucem prodibit. Sic septimestres ideo sunt vitales, quia trigesimo quinto conformantur, septuagesimo mouentur, deci-

Hippocrates
etiam septenari-
um in partu
videtur agno-
uisse.

Denarium nu-
merus perfec-
tum.

Quid sentia-
mus de nume-
ro.

Opinio Astro-
logorum de se-
ptimestri par-
tu.
Saturnus.

Jupiter.
Mars.
Sol.
Venus.
Mercurius.
Luna.

Conuellitur
Astrologorum
opinio.

Finis opinio-
nis
Geometrarum
opinio.
De proportio-
nibus.

mo & ducentesimo prodeunt. Posset hæc opinio Hippocratis auctoritate confirmari. Nam sectio. 3. lib. 2. Epid. quicquid in septuaginta mouetur, ἐν ἑβδομήκοντι τελευτᾷ, id est, in triplicitatibus perficitur. Verum sententiam hanc refellit Auicenna. Si enim sola hæc conformationis motus & partus proportio vitalis partus causa esset, octimestres non minus quam septimestres vitales ederentur, quia eandem seruant proportionem. Demus, exempli gratia, quadragesimo die conformari puellum, mouebitur is octogesimo, & ducentesimo quadragesimo die prodibit in lucem; exquisita erit in hoc partu proportio; quia bis quadraginta faciunt octoginta; ter octoginta ducentos, & quadraginta dies pariunt. At libello de ἰσχύϊ, partus ducentorum & quadraginta dierum, quem omnes octimestrem interpretantur, est & non est. Hippocratis auctoritas sententiæ huic non aduersatur. Neque enim voluit unquam Hippocrates proportionem hanc vitalis partus causam esse, sed simpliciter & absolute certam esse conformationis motus & partus proportionem enunciauit, quod nemo inficiabitur. Superest nunc ut Physicas & Medicas rationes patefaciamus. Natura licet ἀπὸ ἀδυνάτου & ἀμάρτυρα, certas habet leges, quas ipsa sibi imposuit, definitas habet, motiones, quas sine inconstantia & ordinis mutabilitate semper exequitur, nisi ab interno aut externo aliquo impediatur principio. Ut ergo perfectas crises nunquam molitur, nisi coctus & preparatus fuerit humor; ita nullam fetus exclamationem legitimam unquam aggreditur, nisi perfectus & numeris suis omnibus absolutus fuerit puellus. Et ut in cruditate, nulla crisis bona apud Hippocratem est sperabilis; ita ante perfectionem fetus, vitalis nullus & legitimus edi potest: Est enim partus apud Galenum, velut quedam crisis. At ante septimum mensem perfectus esse nequit. Nullas itaque ante septimum mensem vitalis partus editur. Septimo autem mense si validus sit, membranas disrumpet, exitum sibi parabit, eritque superstes, quia perfectus, praesertim si fuerit mas. Octauo mense licet perfectus sit, vitalis esse nequit, quia duas afflictiones sibi inuicem succedentes ferre non potest puellus. Septimo enim mense plurimum colluctatus est, nunc eundem conatum repetit, nondum relictis viribus. Hæc Hippocratis est statim initio lib. De octimestri partu, sententia: οὐδὲ δὲ ὀκτώμηνος ἡμέρας ὄντι, δις πάλιν ἐφεξῆς κακοπαθείας ὑπομύσας ἀδυνάτους εἶναι ποιεῖν φέρεται τὰ παύδια, καὶ διὰ τούτο ἐκτελεῖται τὰ ὀκτώμηνος: id est, de octimestri partu sic sentio. Non potis esse puerulum duas sibi inuicem succedentes afflictiones ferre, ideoque octimestres superstites, non manere. Ipsos namque bis affligi, iterumque cruciari contingit, dum ad mala, quæ in utero perpeSSI sunt, partus etiam dolores accedunt. Quinetiam octimestris vitalis non est, quia venit post diem partus, qui septimestris esse debebat, ante diem verò illius, qui nonimestris erat futurus. Vnde sinistri aliquid, aut fatui, aut fæta contigisse existimandum est, quod vel septimestrem partum tardauit, vel anteuerterit nonimestrem. Quò spectas sententia illa diuini Senis sect. octaua, libri sexti Epidem. Ἡ σὺν ἰδὲν ἔσω & τεταγμένον χρόνον συμβαίνει, ἐκαστος τὰ τικτόμηνος ὁρίονα γίνεσθαι, id est, quibus nihil accedit intra præscriptum pariendi tempus; quicquid omnes pepererint, erit vitale. Ceterum cur ultra decimum & undecimum mensem gestare non possit mulier, causam refert Hippocrates lib. De natura pueli, ad alimenti defectum. Deficit autem alimentum, tum quia maxima sanguinis portio ad lactis generationem refluit ad mammas; tum quia fetus dulcitantium & puro alitur sanguine, quem amplius suppeditare non potest mater. Neque verò silentio prætereundum est, quod eodem libro annotauit Hippocrates, quibusdam celerius, aliis tardius alimentum deficere. Quæ parere non consueuerunt, minus habent alimenti; quia sanguis ad locos & veterum cursum inflectere non consuevit. Quibus item menstrui & lactis minor adest copia, iis celerius deficit alimentum. Sed & obseruatione dignum est, animalia grandiora fetus suos diutius gestare, quia incrementi perfectionem tam cito non assequuntur. Sic elephas non nisi

Hippocratis auctoritas.

Conuincitur hæc opinio.

Explicatur Hippocratis auctoritas.

Philosophorum & Medicorum opinio, Naturæ leges certæ.

Ante perfectionem partum nullum vitalis partus.

Octimestris cur vitalis non sit prima ratio.

Auctoritas Hippocratis.

Auctoritas de octimestri partu.

Cur ultra 11. non gestet mulier.

Quibus deficit celerius alimentum.

Cur grandiora animalia fetus suos diutius gestant.

secundo anno parit. Columba verò domestica singulis mensibus novos creant fetus. Homo animalium omnium perfectissimum, sapientissimum, temperatissimum, reliquorum mensura moderata habuit gestationis tempora, septimum & nonum mensem, si omnia secundum naturam se habeant, nihilque intra præscriptum tempus sinistri contigerit.

An in desperato partu Cæsarea sectio tentanda sit.

QVÆSTIO XXXII.

Homini partus
maxime laboriosus.

Natura mirabilem
culum in partu.

Cur excludi
non possit puer-
lus.

Secundus uter-
us statim ex-
cludit matrem.

Vna matre
tuto etiam fo-
cari potest ute-
rus.

INTER animalia cuncta, unius hominis partum maxime difficilem & laboriosum esse prodidit Aristoteles 7. De natur. animal. tum ob vitium cius molliorem & sedentariam, tum quod homini cerebrum amplius sit, & caput insignis magnitudinis, præsertim quamdiu materno concluditur utero. Solet autem capite primo in lucem edi. Partus hic, ut refert Galenus cap. 8. lib. 1. 5. De usu partium, omnem superat Natura admirationem: Vteri enim osculum, quod toto graviditatis tempore ita connixerat, ut ne pupilla quidem, id est, cuspidem aciem admitteret, in ipso exitu ita dehiscit, ut per id exeat fetus. Verum multi sæpe obuersantur obices, qui naturalem hunc instantis per uteri osculum & cervicem aditum intercludunt, eiusmodi sunt puelli crassities & magnitudo, osculi interioris & cervicis naturalis angustia, distortio, inflammatio, tumor contra naturam, caruncula, cicatrix & vitiosa ossium pubis conformatio. Sæpe enim in parte interna ossis pubis processus adest styloides fetus iter sub ad os paranti, aditum occludens. Tunc partus sperabilis esse nequit, quare aut moritur infans, aut mater, aut uterque simul. In hac rerum omnium desperatione quid molienti sit? si extinguitur sit mater, vivat autem adhuc infantulus, statim nullaq; interposita mora, secundus est matris uterus. Qui verò ita procedunt, cæsares & cæfiones, à caso matris utero appellantur, unde Cæsarium nomen deductum. Hoc pacto Scipionem Africanum priorem, Juliumque Cæsarem, & Manlium natos esse scribit Plinius libro 7. Naturalis hist. cap. 9. Quod si superstes adhuc sit mater, puellus autem nulla arte prodire possit, eadem sectio administrari potest. Nam musculorum epigastrij & peritonæi vulnera lethalia non esse docet quotidianus veritas euentus, & veterum Medicorum suader auctoritas. Iubet Hippocrates sect. 3. lib. 6. Epid. ἰδὲ ἐποϊσνταις τῶσσαν τὰ μὲν, id est, hydropicos statim secare. At sectio hæc cum vulnere epigastrij & peritonæi sit. Uteri verò vulnera lethalia non esse docet Paulus ex Ægina Medicus: ὅλη γὰρ, inquit, ἡ μήτρα πολλὰς αἰσῶνταις ἀφαιρῆναι, καὶ δυνάτωρ ἐν τῷ τοῖς μὴ θύει, id est, constat tota plerunque ablata matrice, nec mortem inde subsequi. De sectione hac cæsarea librum edidit elegantissimum Franciscus Rosseius, Regis Medicus doctissimus, quem & historiis & rationibus ita illustravit, ut hæc repetere hominis esset otio abutentis.

An in partu ossa pubis & ilium diuellantur.

QVÆSTIO XXXIII.

Admirandum
naturæ con-
stitui in partu.



ADMIRANDA quidem sunt naturæ in embryi formatione, vita & nutritione opera: sed extremus eiusdem in fetus exclusione conatus omnem admirationis captum excedit. Quod enim post seminis apprehensionem primūque conceptum ita exquisitè connixerat os vterini, ut ne specilli quidem cuspidem admitteret; nunc fatu exitum sibi, inuersione, calcitracione & membranarum rptione parante, ita laxatur, ut patentissimo ostio hifcat. Cum autem nihil sine medio moliaturnatura, inter-

nam oris superficiem postremis gestationis mensibus lento quodam humore velut mûdo oblin-
nit, ut crassius molliusque redditum os, distendi citra lacerationem facilius possit. Cum ve-
rò uterus in ampla ea coxarum capacitate contineatur, & anteriore parte ossibus pubis, po-
steriore osse sacro & coccyge, utrinque verò ilium ossibus obuallatur; quorum alia per sy-
narthrosin, id est, compactam & immobilem articulationem, alia per symphyisin synchon-
drosin quippe committuntur; an horum ossium fiat in partu diuulso dubitatione non caret.
Existimant docti quidam & ilium & pubis ossa diuelli distrahique. Potest hæc opinio &
grauissimorum virorum autoritatibus, & rationibus à veri specie nō abhorrentibus con-
firmari. Hippocrates ad finem libri De natura pueri, ita scriptum reliquit: *πυνέουσι μὲν*
καὶ τὸ σῶμα, μάλα δὲ τὴν ὀσφὺν τὴν καὶ τὰ ισχία. διίσταται γὰρ σφίαν τὰ
ισχία, id est, in ipso partu vniuersum dolet corpus, maximè verò lumbi & coxē-
dices; nam distrahuntur & diuellantur ipsarum coxendices. Auicenna libro tertio
sen. 21. tractatu primo capite secundo. Quando (ait) separatur fœtus, aperitur uterus
apertione tali cuius similem efficere non valet in alia horā, & necessarium est vt
separantur quædam iuncturæ & sustententur adiutorij Dei excelsi præparante
vel disponente ad illud, deinde reuertente eas ad continuatiōem naturalem; &
est operatio illa validissima ex naturæ operibus. Zoar Rabbi Simeonis Bën in pri-
mum caput Exodi. Haud faciliè quicquam aliud magis mirandum in rerum natu-
rareperies, quàm distractionem illam ossium pubis, quæ fit in parturientibus
magis naturæ præsidio, seu potius prouidentia Dei, cui natura ipsa ministrat. Ete-
nim nulla fieri posse quantumuis validissima vi & nixu sicut nec in cornibus
ceruorum, quæ quotannis decidunt & denuò renascuntur. Severinus Pincus in
opere suo Physiologico & Anatomico, in ea est sententia, quam aliquot firmat rationibus.
Ante septimum mensem (ait) uterus & cum eo fœtus semper ascendit, post septimum men-
sem descendit fœtus exitum sibi parans: Tunc temporis pudenda grauidarum, humore mu-
coso madent, ut dilatentur & relaxentur partes; hoc etiam humore pubis cartilagine
sensim inebriantur, ut fiant in partu laxiores. Præterea, cartilagine ferè omnes ætatis
progressu siccæscunt euadunt ossæ, ut in mento cernere est; at quæ ossa pubis connectit car-
tilago, ad extremum senium usque cartilaginea manet, nec vnquam euadit ossæ, quia in
partu laxari, distendi & amplificari debuerat. Sed & virgines annos sexdecim aut decem
& octo natas, si postquam conceperunt intuearis, videbis distendi ilia, hypogastrium am-
plificari, nates latiores euadere, maximèquè instante partu: Ergo partes illæ dilatantur.
Deinde virgines seniores difficilius pariunt quàm iuuenes, quia nimis resiccatæ sunt carti-
lagines minùsque laxantur. Postremò, quæ nunquam conceperunt tenuiores habent car-
tilagine, quæ verò sæpius pepererunt, cartilagine habent crassiores illæque ampliora. Ergo
ossa pubis ab inuicem & ossa ilium à sacro distrahantur in partu. Profert ad huius
sententiæ confirmationem historiam cuiusdam mulieris nuper enixæ laqueoque suspensæ,
in qua ossa pubis ita erant distracta ut coxarum altera attolleretur, altera deprimeretur.
Ego ut ingenuè dicam quod sentio ilium & pubis ossa in partu dearticulati posse non puto;
ita enim vniuntur ut nullo impetu diuelli possint. Quod si diuulsionem simul passa fuerint,
quo medio copulabuntur? quo glutino vniuntur? noua enim fieri synchondrosis non potest.
Si aliquantulum debiscere velis, cum Hippocrate, non repugnabo. Sed ossis sacri extremum
cartilagineum, coccygem vocant, totum retrahi, & ferui impetu exeunti ita cedere ut am-
plius relinquatur spatium, existimo. Pinei autem rationes ita ordine dissoluendæ sunt.
Fertur quidem postremis gestationis mensibus ad os vteri internum lentus humor illud
obliniens, aut ex vterinis vasis, aut ex humoribus exudantibus, aut ex reliquiis fœtus; sed
humor ille ad ossa pubis & interiectas cartilagine non fertur, nec ad ilium ossa, quia vte-

Ossa diuelli in
partu ducuntur.Aulicæ
rei.

Pinei opinio.

Ratiō prima.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Hæc ratio.

Opinio nostra,
non diuelli os-
sa pubis.Rationes Pinci
soluuntur.
Prima.

450 Liber octauus De form. foetus, vita & partu.


Secunda.

Tertia.

Quarta.

rus ossa pubis immediatè non tangit, sed inter uterum & ossa adest vesica, inter duas peritonei tunicas latitans, & peritoneo omni ex parte velut sacco conclusa. Quòd pubis ossa connebens cartilago nunquam fiat ossea, sed semper cartilaginea maneat, ut in partu laxari possit, lenissima est ratio: nam & in viris eadem cartilago nunquam fit ossea. In iunioribus si conceperint distenduntur ilia, totiusque ventris capacitas amplior redditur, quia tunc temporis crescunt omnia, & calor qui prius humoris copia obruebatur incipit emicare. Seniores difficilius pariunt quam iuvenes, non quia sicciores sunt cartilagineae, sed quia uterum siccior. Quae enim concipere & gestare consueverunt, humentiores habent uteros, vasa insigniora, capacitates omnes ampliores, itaq; partus faciliior. Historia vniuersae fides nihil nos mouet, vidimus namque multas in ipso enixu extinctas, in quibus nihil tale apparuit, & grauidas in ipso partu, de coccygis & ossis sacri frequentius quam de ossis pubis dolore conqueri obseruauimus.

FINIS LIBRI OCTAVI.



LIBER NONVS.

IN QVO PARTES VITALES.

PVLVS QVIPPE ET RESPIRATIONIS

ORGANA DESCRIBVNTVR; MVLTAE QVE INTER

MEDICOS VALDE CONTROVERSA ENODANTVR.

HISTORIA ANATOMICA.

Singularum thoracis partium brevis descriptio.

CAPVT PRIMVM.



REGIONIS infimæ partes omnes nutritioni & præcreationi dicatas, libris duobus accuratè satis perultraſe videor. Nunc Anatomici ordinis ratio ſuo quaſi iure poſtulare videtur, vt mediæ ſeu vitalis regionis διαγεγερω hoc libro ſubiiciamus, idque eò alacrius quò hæc priore illa nobilior & præſtantiôr eſt. Vt autem Coſmographi totius orbis ambitum, ſingulas regiones, inſulas, promontoria, portus, planities, conualles, exigua tabella concludunt: ita & nos regionis huius magnitudinem, ſtructuram, ſitum, figuram, & partes omnes externas;

internas, continentes, contentas hoc vno capitulo complectemur, ſingula poſt hac ſuo quæque loco paulò accuratiùs explicaturi. Tota hæc regio θωραξ appellatur, aut θώραξ, id eſt, ſalio; cor enim in ea contentum perenni agitur motu: aut τὸ τῆς ψυχῆς, quòd mentem, diuinam animi partem, concludat: hos Stoicos fuiſſe apparet, qui in corde collocarunt τὸ ἡγεμονικόν; ab aliis θωραξ dicitur, quòd omnia quaſi impetu quodam moueat; Galeno τιθεῖται. Hippocraſi libello De arte, Ariſtotelis libro De mundo, & Ruſſo, Thorax totius corporis truncum, quem ὄλμων vocant, denotat, dum hepat in thorace ſitum ſcribitur. Nos id tantùm quòd à iugulis ad xiphoidè cartilaginem & diaphragma extenditur, thoracis nomine complectimur; adeò vt ſuperiore parte dauiculis, inferiore diaphragmate; anteriore, ſterno; poſtteriore, vertebris doſi, dextra & ſiniſtra duòdecim coſtis, tanquam finibus circunſcribatur hæc regio. Figuram obtinuit omnium pulcherrimam, capaciſſimam, validiſſimam; rotundam quippe, ſed oblongiorem, nec exquiſitè globoſam antica & poſtica parte latioreſ quam in cæteris animalibus; quæ doſum habent & pectus carinatum, vt amplior pulmoni & cordi relinqueretur capacitas; aëre enim & ſpiritu copioſiſſimo indigebat homo. Thoracis extima ſuperficies, quam vaſculum viſcera continens

Quid Thorax. Grecis.

Quid Hipp. & Ariſtoteles Thorac.

Figura.

Struttura.

ſitum.

& imam regionem medium, vt natiuum calorem & viuificū nectar, cuius vber-

Partium omnium thoracis enumeratio.

rimum fontem in se continet, in singulas corporis partes pariter & qualiterque diffunderet. Merito igitur & structuræ & situs ratione, venter hic medius appellari potest, licet Hippocrates Aphorismo 38. sect. 7. *τὸν αἶνον κοιλίαν*, id est, ventrem superiorem vocet, dum fluxiones in ventrem superiorem fieri vult. Thoracis partes aliæ sunt continentæ, aliæ contentæ. Continentium in quædam communæ, quædam propriæ. Communes quinque sunt, cuticula, cutis, adeps, panniculus nervosus & membrana communis musculorum omnium, de quibus libro sexto.

Partes continentium propria.

Propriæ huius regionis particulæ variæ sunt, quas omnes facilioris doctrinæ gratiâ in tres ordines distinguemus. Nam aliæ sunt molles & carneæ, omnium primæ extimæque; aliæ ossæ & cartilagineæ, quæ medium occupant locum, aliæ membranosæ. Carnosæ partes, sunt musculi complures in thorace siti, siue ab eo oriantur, siue in eum inserantur. Eiusmodi sunt respiratoriij ferè omnes musculi, scapularum quamplurimi, & brachium mouentes quidam. Ad hoc carnosum genus miammas refertur placet, quia consuevit interdum Hippocrates

Carnosæ partes thoracis quæ sunt.

glandes carnosæ corpora appellare. Ossæ autem thoracis partes, aut sunt antice, aut posticæ, aut laterales. Anterior pars græcis propriè *σῆθος* dicitur, Latinis *pectus*, licet nomen huius acceptio varia sit apud Hippocrarè. Vsurpatur enim τῷ *σῆθός*, nomen aliàs *κυρίως*, id est, propriè; inter dū *συνεκδοχικῶς*, nonnunquā *μετανομιχῶς*. Propriè *σῆθος*, thoracis anteriorem partem significat. Sic Aphorismo 24. libri 3. *πόνος σῆθός*, dolores pectoris. Synecdochicῶς vsurpatur *σῆθος* pro media tantum pectoris parte, quam *στέρον* vocant, aut pro eius extrema particu-

Ossæ partes.

la, quæ cartilago est xyploides. Metonymicῶς vsurpatur *σῆθος* pro orificio superiore ventriculi, quod sub ea cartilagine continetur. Sic in Coacis prænotionibus *σῆθος δὴξιν καὶ πικρότητα*, sterni morsum & amarorem dixit, id est, oris ventriculi, vt idem sit eo loco *δὴξιν* *ὡς* *σῆθος*, quod *καρδιόγμος*. Sit ergo anterior Thoracis pars *σῆθος* propriè, aliis *στέρον* διὰ τὸ στερόν, quasi solidum dicas, Latinis sternum, quod in medio costarum sternatur, in quod costæ copulantur,

Pectoris multiplex acceptio apud Hipp.

quibusdam pectus. Eius latera *πλευραὶ* dicuntur, & *ὡς* *στερνα*, seu costæ. Posterior pars *ὠστών* dicitur, *ὠσθραχῆλιον μετὰ φρενον*, Latinis *dorsum* & *tergū*. Huius latera *ὠμοπλάται καὶ πτερύγια*, scapula, scoptula operie, scapilium & alæ vocantur.

Lateralia pectoris.

Quarum omnium descriptio ex osteologia repetenda est. Terrius supereft continentium particularum ordo, qui membranarum est: in eum numerum membranam, quæ costis subtenitur, pleuram dictam, adscribo, necnon *διαφράσματος*, id est, *interserpientes*, quas vno nomine *mediastinum* vulgus appellat. Hæc continentium omnium, & communium & propriarum thoracis partium breuis est delineatio. Contetarum verò perexiguus est numerus. Nihil enim in hac regione præter vitalia organa, cor scilicet, pulmones, venam cauam ascendentem, arteriam magnam, venam arteriosam, arteriâ venosam, asperam arteriam, œsophagum & neruum sextæ coniugationis reperias. Hæc omnes & continentes & contentas thoracis partes ordine Anatomico sigillatim describere aggredior.

Dorsum.

Membranosæ partes thoracis.

Contentæ partium.

Contentæ partium.

Contentæ partium.

Contentæ partium.



ARTIVM thoracis propriarum primæ omnium sese offerunt mammæ. Græcis *μαστοί* & *μαστοί* dicuntur, *ὑπὸ τῆς* *μαστός* quæ *ζήτησιν* notet, aut à *μαστόω* quod est quæro, quia infâres in illis quarant lac: *τρίθαι* etiâ, *τρίθαι*, *τρίθαι* vocantur; hinc & *τρίθαι* nutrices dictæ, quæ māmam infantibus præbent fugendam. Latini *mammæ* vocant, māmillas diminuta voce, &

vbera, quæ Græcè *ὑθάρα*. Mammarum in fœminis & maribus non eadem est ratio, structura & vsus. In maribus namque imperfectæ sunt ex cute scilicet tantum, adipe & papillis conflatæ ad robur contentarum partium, ad ornatum & titillationem, ne gloriaretur mulier se mammæ habere, quas natura viris nō concessisset. Glandulas verò, quibus vis inest *γαλακτοποικτικῇ*, id est, *lactis generandi*, nullas habent, propterea verum lac non conficiunt. Fœminarum mammarum maiore artificio constructæ sunt. Nam præter adipem glandosa adfunt corpora vasorum myriadibus intertexta, quibus solis facultas lactis procreatrix insita est, ut testibus vis *αἰματοποικτικῇ*. Glandosum illud corpus non vnicum & continuum est, ut in plerisque animalibus, sed multiplex; est tamen ad papillæ centrum glans vna cæteris maior, cui alix parvæ & amygdalis à cortice liberatis similes subiiciuntur. Hæ in virginibus duræ & parvæ sunt, semiglobuli figuram referentes, in gravidis & lactentibus magis tument, in senibus flaccescunt. Ad mammas venæ & arteriæ feruntur quamplurimæ. Venæ insigniores externæ ab axillari ramo emergunt, exiliores & internæ à subclauio. Per vasa hæc mira est veteri & mammarum sympathia, unde fit ut contrectatæ libidinem excitent. Sunt autem venarum & arteriarum anfractus varij ad exquisitam sanguinis elaborationem. Nervus verò maximè conspicui è costali prodeunt, hinc exquisitus mammarum sensus & titillatio. Sitæ sunt mamme in anteriore thoracis parte, incubantque musculis brachij pectoralibus dictis, tum ad visceris nobilissimi robur, tum quia copiosissimus eò per thoracica vasa influit sanguis: tum, quod regio illa maximè æstuans & calidissima ad lactis generationem plurimum conferebat. Itaque & mammarum cordi vsum præstant, dum ipsum ab extrinsecus occurrentibus iniuriis tutantur, & cor mammis parem refert gratiam, dum earum actionem, lactis quippe generationem, suo calore promouet. Adferre aliam huius mammarum situs causam Plutarchus libello De amore prolis, ut possit mater simul filium alere & amplecti ac osculari. Reliquis animalibus non in pectore, sed in ventre sunt sitæ; tum quia pectus habent angustius & carinatum; tum quia quatuor incedunt pedibus, & idè inferior regio catellis alendis aptior est: mulier autem & pectus habet latum & recta incedit, itaque cum puerulus progredi nequeat, eum manibus gestat. Mulieribus geminæ tantum sunt mamme, quia geminos tantum fortis ex Naturæ præscripto eis licet edere. Quæ animalia plures edunt fœrus, plures etiam mammæ habent. Vsus mammarum in fœminis multiplex est. Primus ad lactis generationem, puellique editi nutritum; propterea refluit ab utero ad mammæ sanguis mira providentia, & māmaram substantia spongiarum instar rarissima est, copiosique humoris capax. Alter vsus est, ad viscerum contentorum robur. Tertius, ad ornatum & viri delicias. Quartum agnovit Hippocrates libello Deglandulis, ut excrementitium humorem excipiant, *ὑποσφαινοῦσι δὲ τὴν πλεονεξίαν τῶν αἰμάτων*, & vniuersi corpo-

*Mammæ
mamæ.*

*Mammæ
vbera.*

*Mammæ
mulierum
structura.*

*Situs
mammarum
cur in
pectore.*

*Geminæ.
Cur geminæ
vbi varij.*

Primus.

*Secundus.
Tertius.
Quartus.*

Papilla quid.

ris sordes absorbent. Quod si (inquit Hippocrates) aut aliquis morbus, aut alius euentus mulieribus mammas demat, vox ipsarum redditur asperior, sputatitices euadunt, & capitis dolore vexantur. Mammarum extrema *θηλαὶ* dicuntur, seu *papilla* aut *papula*. Earum substantia fungosa est, balani instar. Color rubet in virginibus, prominētque frage instar, liuet in lactantibus, nigricat in senibus. Ex papillæ colore, vteri affectus dignosci posse putat Hippocrates, sectione quinta libri sexti Epidem. *ἢν τὸν μαζῶν αἱ θηλαὶ, καὶ τὸ ἐρυθρὸν χλωρὸν ᾖ, νεσίδες τὸ ἄγος*, id est, si mammarum papilla & quod in iis rubet, palleascit, morbosum est vas. Nominem autem *ἄγος* vterū intelligit: est enim *ἄγος* Græcis conceptaculum. Papillarum vsus est, vt cū puellus totam mammillam exiguo ore capere nō possit, hunc canaliculum ore apprehendat, indeque lac fugat. Papillam ambiens circulus & nigellus ambitus *areola* dicitur, Græcis *φάς*: Mammarum primum incrementum *καμάδες*, id est, *fabæ* dicitur, vnde *καμάζω* catullio, & puellarum mammarum fororiare, puerorum verò fratrare dicuntur, quod velut geminæ sorores & fratres simul nascantur & crescant. Mammarum & vteri mirabilis est societas, vt libro septimo in historia vteri & Controuersis nostris demonstrauimus.

Societas.

CONTROVERSIAE ANATOMICÆ.

De mammarum actione, & vsu.

QVÆST. I.

Quæstio.

Mammae glandulae sunt.

Salutis.

Duo genera glandularum.

Testes glandulae sunt corpora, non glandulae.

Excrementitius humor excipere secundum naturam vsus.



MAMMIS insitam esse vim γαλακτοποιητικὴν, id est, lactis generandi, omnibus, ut opinor, est exploratū. Hoc vnum queri potest, quomodo mamma, quas glandes esse norunt omnes, actionem eam officialem qua alteratione & coctione perficitur, edant, cū glandulæ actionem omnem denegat Galenus, isque vsū tantum tribuat. Esse autem ex numero glandularum mammas, earum substantia, & vsus manifeste indicant. Substantia rara est, friabilis & σπογγώδης. Vsum vero eandem conferre mammae voluit Hippocrates, quem & reliquæ glandes præstant: ita enim libello *περὶ αἰθέρων*. Α γὰρ δὲ ἐχυσιν τοῖσιν ἐμπαροσθεν ὁμοία, ἀποσείχυνσι τὴν πλεονεξίαν τῶν ἄλλων σώματος. id est, similes sunt mammarum & prædictarum glandularum opportunitates, vniuersi enim corporis redundantiam auferunt. Nos ad questionis huius dissolutionem, glandularum duo statuimus genera, scilicet ex Galeni doctrina cap. 2. libri 16. De vsu partium. Sunt glandulae quaedam stabilien- dis tantum fulciendisque vasis, aut humorum supernacui excipiendis, aut rigandis partibus dicata. Sunt aliae, quæ ad succos animali viles generandos à natura sunt comparatae. Illæ nec venas, nec arterias, nec nervos obtinuerunt: hæ vasa habent conspicua, sensusque exquisitissimo pollent. Illæ verè & propriè glandes dicuntur. Hæ glandosa corpora rectius appellantur. Sic testes & renes glandosa dicuntur corpora à Galeno, & Hippocrati libello *περὶ αἰθέρων*, cerebrum ratione substantia glandosum dicitur. Illæ vsum tantum conferunt: hæ, & actione & vsu, ex quarum cūsum & numero mammas esse volumus. Quod autē mammae excrementitium humorem excipere dixit Hippocrates, hunc primariū & præcipuum mammarum vsū esse non volumus, sed secundariū: abutitur enim sepe Natura vnica & eadem parte ad varios vsus. Sic cerebrum cucurbitule instar trahit sorbēque expirationes partium inferiorum: cū tamen alius sit, isque diuiniore cerebri vsus. Sic intestini ad vniuersi corporis expurgationem sepe abutitur Natura, vnde *ἐμφέροντα χωρία* dicitur; cū tamen in eum vsū primò & persè constructa non sint. Habent ergo mammae

actionem propriam & usum. Actio lactis est generatio, quæ moderata & equabili coctione perficitur. Vsus vero alius est primarius, alius secundarius. Primarium usum voluit esse Galenus ad lactis generationem: Aristoteles autem ad cordis visceris nobilissimi tutelam; ductus, ut opinor, hac ratione, quod viri mammas habeant, & lac non generent. Ego cum Galeno glandosa illa corpora adipe circumfusa & vasorum myriadibus intertexta primò, & per se ad lactis generationem constructa esse puto, hæc autem in maribus, ut in feminis non reperiuntur. Sitas verò esse in pectore mammas existimo, ad viscerum potius contentorum robur, quàm ad lactis generationem. Nam in plerisque animalibus alibi quàm in pectore lac generant. Ita ergo Aristotelem cum Galeno conciliabis, si dixeris, mammas ad lactis generationem primariò constructas esse, secundariò ad cordis robur. Si tum autem in pectore obtinuisse ad cordis tutelam primariò, secundariò ad lactis generationem.

Quæ usum sit
primarius
mammarum.

Conciliatur
Aristoteles
& Galenus
de usu mammarum.

An ante conceptionem generari lac queat.

QVÆSTIO II.

DUBITATVM est olim, & hodie inter plebeios disceptatur, an ante conceptionem & viri amplexum lac generari possit. Dubitandi occasionem præbuerunt dissentientes Hippocratis & Aristotelis loci. Hippocrates 1. *Ἐξ ἡμῶν*, mole signa inquirens, hoc unum inter præcipua mola *τεχμήνια* tradit, quod ἐν τοῖσι τῆς τοῖσι γάλακτι ἐγγύθι, quod in mammis lac nullum generetur. Ergo lactis generatio certissimum erit Hippocrati vera conceptionis signum. Id confirmat Aristoteles libris De historia animalium, dum scribit nulli animalium lac fieri antequam virum ferat. Hinc vulgares Logici conclusiones suas hauserunt: Lac habet, ergo peperit, aut saltem cum viro rem habuit. Auctoritati ad stipulatur ratio. Si enim nihil temere usquam molitur natura, sed omnia propter finem, quid ante embryi perfectione lacte est opus, cum ad solius infantuli nutricatum lac generetur? Contrarium tamen videtur voluisse Hippocrat. Aphorism. sect. 1. Si mulier, inquit, quæ neque gravida est, neque concepit, lac habet, ei menstrua defecerunt. Et Aristoteles lib. De hist. anim. lac in viris generari posse affirmat. Quod & Albertus, & Avicenna testantur. Scribit Hieronymus Cardanus libris De subtilitate, se hominem vidisse annos natum 34. ex cuius mammis tantum lactis profluebat, ut infantem ferè alere posset. Narrant qui novum orbem lustrarunt, viros penè omnes maximam lactis copiam habere. Si itaque viri lac generant, multò magis virgines & mulieres quæ non conceperunt. Earum enim mamme rariores sunt amplioresque, & his copiosissimus sanguis superfluit. Favet huic opinioni ratio. Vbi enim materialis lactis causa præsens est, adestque efficiētis robur, quid lactis generationem impedit? At virginibus grandioribus in thoracis venis, quæ mamas irrigant, sanguinis adest copia; nec non glandularum sanguinem alterantium & excoquentium robur: nam post decimum quartum ætatis annum, οἱ μὲν τοῖς ἀπορῶν, inquit Hippocr. καὶ αἱ θηλαὶ ὀργῶσι, attolluntur mame & papillæ turgent, dicunturq; tum puellæ καὶ μελῶν, id est, frattare. Poterit ergo in illis aliquando lac generari, maximè verò si supprimantur menses ut scripsit Hippocrates. Nos dissentientes hos Hippocrati locos ex eodem Hippocrate conciliabimus. Duplex apud Hippocratem est lactis generatio, duplexque lactis natura. Alterum enim lac verum est, & laudabile; alterum non verum, nec exquisitè coctum. Illud alteratione maxima & vera mammarum coctione, & que officiali non privata perficitur. Hoc ex reliquiis alimentis proprij mammarum: illud exquisitè album est, dulce, moderatè crassum, & alendo in-

Lac non gignit
ante concep-
tionem, Hippoc.
& Aristot.

Possit lac gene-
rari ante con-
ceptionem.
Auctoritat.
Historia.

Ratio.

Conciliatur.

Duplex lactis
differentia ex
Hippoc.

fanti accommodatum. Hoc album quidem est, quia colorem & ideam refert partu à qua manet, sed nec chymum, nec dulcedinem, nec vires alimenti obtinet. Itaque colore sanis suo, non viribus, nec forma specifica lactis nomen meretur: tenue namque est & dilutissimum, ad alendum omnino ineptum. Illud per expressionem fit & refluxum sanguinis ab utero ad mammas, nec non per tractionem: Hoc per solam proprii alimenti tractionem. Illud non nisi post veram conceptionem generari potest, quia nullus foret illius usus. Hoc in puellis gradioribus, sanguinisque & viris copiosissimo succo referis generari nihil prohibet. Duplicem hinc generationis modum colligo ex Hippocratis libro De natura pueri, & libello, ἀδὲ δ' ἐν ὄν. Mulieribus, inquit, rara est mammarum natura, & alimentum quod ad se trahunt, in lac immutant; hic primus est generationis modus. Alterum describit eodem loco. Ab utero accedit ad mammas lac, quod post partum infanti cessurum est in alimentum: hoc autem exprimit, ac sursum mittit omentum, ab ipso fœtu iam grandiore coarctatum. Exprimatur ergo & refluit gravidis mira natura providentia ab utero ad mammas sanguis simul atque moveri cœperit obryon. Edito autem fœtu, non amplius fit expressio, sed affluit sponte ad mammas sanguis ob consuetudinem motus, quod huius verbi indicavit Hippoc. lib. De natura pueri. Καὶ ὁκόταν τέχνη ἀρχῆς κινήσιος ἰσχυρομένης, χαρπεία τὸ γάλα ἐς τὸς μῆνες τέττονος τοῦ ἡνδάλειν: id est, ubi peperit mulier, principio motus iam facto, lac fertur ad mammas si lactauerit, ut earatione feratur post partum ad mammas sanguis, quia consueverat eò cursum inspicere & moveri dum gestaret mulier. Neque verò eò tantum sponte affluit, sed trahitur etiam à mammis copiosior sanguis ipsam peculiaris earum nutritio postulat. Tractionis causse variae sunt, infans suetus, vasorum amplitudo, motus & exercitatio mammarum, tandemque vacui fuga: exhausta enim à puelli sucçu mammarū venæ, undiqueque sanguinem trahunt. Concludamus ergo lac verum, & exquisitè coctum ante conceptionem generari non posse, crudū verò & dilutissimū ex reliquiis alimenti proprii confectum, interdum posse.

Quomodo feratur ad mamas lac, & cur.

De lactis generatione solvuntur Problemata.

QUESTIO III.

Prima lactis generatio.



Quæstio, cur tertio quartove mense lac generari incipiat.

Responsio.

Explicatio.

De prima lactis generatione exiit solenne summi Dilectoris dictum, libro De natura pueri: ὁκόταν δὲ κινήτῃ τὸ ἐμὲρρον, τότε δὴ θησικαὶ ναι καὶ τὸ γάλα τῇ μητρὶ ἐλθὲν, id est, simul atque moveri cœperit infans, sui tum notum lac exhibet matri. Ad cuius sententiæ explanationem duo sunt agenda Problemata. Primum, cur eò tempore lac generari incipias. Alterum, cur non eodem alimento in utero, & extra uterum alatur infantulus. Prioris dissolutio difficilis explicatus habet. Cum enim lac nutritionis solius gratia fit comparatum, eoque non nutriatur in utero puer, sed extra uterum, cur ante septimum mensem generatur lac cum illius nullus sit usus? aut, cur primis post conceptum diebus mensibusve non fit ille ab utero ad mammas reflexus, ut tertio quartove mensibus? Respondet Hippocrates libro iam citato fœtum tertio quartove mense gradior em, vasa sanguinis copia tumentia, comprimere; ex compressione fieri expressionem ad superiores partes. Vera quidem hæc ratio est, sed obscurissima: eam itaque in perspicuam lucem proferamus. Primis mensibus natura maximam sanguinis copiam impendit, primum ad parenchymatum & carnosarum omnium partium, ut musculorum generationem; deinde ad earum nutritionem, & accretionem, ut vix velle supersint reliquæ: ac cum moveri incipit fœtus, quia perfecta est partium omnium conformatio, nutritionis tantum studet natura: nutritio hæc per exiguam alimenti copiam postulat, quia exiguis fit partium

exbat, his, redundat ergo in utero venis sanguis: hæc fetus iam grandioris & calcitrare incipiens mole ac moru compressæ, sanguinem exprimunt in superiores partes, & in mammæ potius quam alias partes, tum ob viarum commoditatem, & εὐποροῦσθαι, tum ob uteri & mammarum societatem, tum denique mira providentia, quæ causâ est finalis, ut paulatim assuescat natura sanguinem eo transferre ad lactis generationem, quod fetus mox edendi alimentum sit conveniens. Sic mulieribus ad uterum potius quam ad naves aut hæmorrhoides viâ affectat sanguis, ratione finis, generationis quippe & nutritus pueri. Addamus & nos aliam huius refluxus, qui ab utero ad mammæ sit, causam, ut scilicet infansulo præbeatur occasio exitum querendi. Si enim totus sanguis in uteri vasis asseruaretur, nec portio eius ad mammæ resflueret, nunquam sibi pararet exitum puer, quia alimentum futuri fouendo nutriendoque sufficiens semper præsto esset: hæc namque unica est parus causâ apud Hippocratem, alimenti defectus. Debit itaque tertio & quarto mense paulatim ad mammæ sanguinem transferre natura, ut eo assuescat sanguinem ducere ad editi fetus nutritum, & ut grandioris ætatis suo defraudet genio, atque ita ad exitum sollicitetur. Sunt qui velint ad mammæ resfluere sanguinem, postquam moveri cœperit puer, ut sit ibi velut comestus quidam puellum famelicus est, id est, ut per medias eo sanguine dealbato alii possit. Hoc voluit Hippocrates lib. De natura pueri, καὶ τὸ πάλαιον, inquit, ἀπὸ αὐτῆς ἀπὸ τοῦ στήθους ὀλίγον: id est, & eo lacte fruitur aliquantulum puellus. Quod Hippocratis dictum ego ita interpretor, lacte alii puellum, id est, sanguine in venis mammarum contento, qui proxima est lactis materia, vel, si ante diem partus valde sit famelicus, posse lac album à mammis ad vasa resfluere, rursusque ob facultatem venarum αἵμα τὸ πρὸντι χυλῷ, quæ otiosa nunquam est, excoqui, & in sanguinem verti. Quod autem à mammis ad vasa resfluere possit lac, & iterum in sanguinem alterari, experimur quotidie nutrites & puerperæ. Erat secundum problema, cur non eodem alimento in utero & extra uterum alatur puer, aliter enim in utero purissimo sanguine, extra uterum lacte dulcissimo. Respondet Dinus, sanguinem lacte calidiorem, si triplicem coctionem subiret, ineptum penitus ad nutritionem futurum, quia amaresceret nimio calore; lac verò temperamento frigidius facilius excoqui, nec triplici ea coctione amarescere. Sed vide an inhumanum esset & ferinum sanguiuoros esse infantes; an dicendum id eo sanguine alendum non esse editum infantulum, ne ea suctione facile venarum oscula aperirentur, & ita sanguis natura thesaurus efflueret. Quod verò afferunt quidam triplicem coctionem nobis iam editis perficiendam esse, non posse autem ex sanguine hausto chylosim fieri, propterea non sanguine, sed lacte nutriendos infantes, falsum est, & erroris plenum. Quicquid enim in ventriculum ingeritur, si modò assimilari possit, in substantiam cremori persimile commutatur, & multum suillum ac caprillum sanguinem hauriunt, cuius feculentæ excrementa per intestina & alium deturbantur. At feces chyloscos sunt tantum. Reliqua quæ ad lactis generationem spectant, quia omnibus nota & peruulgata sunt, lubens prætereo.

Cur ad mammas potius resfluat sanguis. Vterusque pertinetas. Finalis causa.

Alia causa.

Lacte nutriti puellum in utero quomodo melius debeat.

Quæstio, cur non alatur extra uterum sanguine puer ut in utero.

Responsum Dini.

Aliud responsum.

HISTORIA ANATOMICA.

De musculis thoracis.

CAPVT III.



LN thotace musculi sunt complures ex partium continentium numero. Eorum alij thoracem mouent, propriiq; dicuntur thoracis musculi: alij in thorace quidem siti sunt; sed alijs partibus, vt brachio & scapulis inferuunt. Sic in anteriore thoracis parte pectoralis adest, qui brachium, & serratus minor, qui scapulam antrorsum mouet. In posteriore verò *Trapezium*, omnium primus, extimusque, scapulâ sursum & retrorsum, rhomboides retrorsum, latissimi portio deorsum mouent. Hi omnes externi sunt, & musculis respiratorijs superstrati. Prius ergo secandi sunt, & obiter demonstrandi: eorum historiam, vt & musculorum omnium respirationi dicatorum, descriptimus libro quinto; eam igitur inde repetat studiosus lector.

De diaphragmate.

CAPVT IIIL

Diffinitio organorum nomenclatura.

*Quid diaphragma.
Nomen.
Cur epine veteribus.
Cur epine Hippocrati.*



RESPIRATIONIS organa mouentia à Galeno ita distingui solent, vt alia sint liberæ, alia coactæ & violentæ. Liberam respirationem appello, quæ placido spirandi vsu penè est ἀδολος; violentam verò, in qua valida est inspiratio, & aspectabilis thoracis totius distentio contractiōque. Illa solius diaphragmatis editur motu: hæc musculorum omnium iam descriptorum sexaginta quatuor opera ac ministerio perficitur. Est igitur diaphragma princeps ac primarium liberæ respirationis instrumentum. Hoc veteres Philosophi & Poëtæ φρένες vocarunt, ὡς μετέχουσαι τι τῆ φρονή, id est, quasi prudentiæ sit particeps; aut, quod mentis domicilium sit: φρήν enim mens dicitur. Hippocrates φρένες quidem vbique appellauit, non quòd sapere aut ad sapientiam quicquam conferre existimaret, sed ob miram eius cum cerebro sympathiam, & quòd eo inflammato repentinum statim & continuū consequatur delirium, quod respiratione frequentî & parua, voce acuta & hypochondriacorum intro sursum reuulsione à vera phrenitide distinguitur. Primus Plato, vt docet Galenus cap. 3. libri quinti De locis affectis, musculum hunc διάφραγμα appellauit, διὰ τὸ διαφρατίζειν, quod est secernere. Ego διάφραγμα in scriptis Hippocratis non reperi, sed διαφραξίν. libello περὶ παρθερίων: Οὐκ ὅταν ἐν τῷ σώματι εἴη ἐξόδου μὴ εἶναι ἀνεσομαιψίον, τότε αἷμα πλέον ἐπὶ τῇ διαφραξί τε σπλῆνι καὶ αὐξήσει τὸ σάμαλος τῆν καὶ αἷμα ἐν τῷ αἵμα ἐκείνῃ, ἀναίσσει τὸ πλῆθος ἐς τὴν καρδίαν, καὶ ἐς τὴν διαφραξίν. id est, cum uteri osculum apertum non fuerit, sanguis autem copiosior influxerit, propter cibos & corporis incrementum, tunc effluxum non habens, præ copia resistit ad cor, & ad se transfuersum. διάφραξιν ergo nominauit Hippocrates, quæ dictio idem sonat quod διάφραγμα: Aristoteles διάζωμα, ὑπόζωμα καὶ ἀεζωμα vocat. Latini cinctum vertunt, cingulumve; Mactobius, disseptum, Celsus, septum transfuersum; septum quidem, quòd velut interiectus paries ventrem medium ab inferiore, & vitalia organa à naturalibus ditimat: transfuersum verò, ratione situs. Nam ab anteriore thotacis parte ad posteriorem vsque protenditur, & ideò διάτασαν vocauit Hippocrates in Coacis prænoctionibus, à collocatione & situ, vt ab offi-

*Cur diaphragma
Hippocrates
φρένες
appellauit.
Aristoteles
nomen.
Latini
nomen.*

*Hippocrates
quomodo vocat.*

cio, ἢ διὰ ζωαντικόν, διαπνῶν τῆς κοιλίης, *respiratorium ventris*. Quidam ob cordis viciniam, quod ei scilicet prætendatur, præcordia dixerunt. Huius musculi figura rotunda est, pisces quem vulgo *Rhaiam* vocamus, exquisitè referens. *Figura.* Situm obtinet transversum & obliquum: nam à pectoris ossè per notharum costarum extrema ad lumborum regionem fertur. Situs hic, tum ad liberam respirationem est commodissimus (quia laboriosum nimis foret, perpetuò costas movere) tum ad regionis utriusque diremptum: tum denique ad sæcum expressiorem, & naturalem intestinorum motum peristalticum dictum iuvandum. Vniuersum diaphragmatis corpus duobus constat circulis, vno membranæ, altero carnoso; duabus venis, totidem arteriis, & duobus utrinque nervis; duabus item tegitur tunicis, & duobus foraminibus est peruium, ut totus hic musculus in structura sua sit διχότομος, & actionem etiam duplicem edat, inspirationem quippe ac expirationem. Circulorum prior nervosus est, in medio, tanquam centro, situs, à quo fibræ quamplurimæ ad circumferentiam excurrunt. Hic musculi principium, & caput statuunt omnes, ego contrà, finem & caudam esse volo. Alter circulus omnino est carneus, priorem vndique ambiens, anteriore sui parte sterno & nothis costis alligatur; posteriore, supremis lumborum vertebra duorum tendinum inreiectione annectitur. *Diaphragmatis caput.* Membranæ duæ sunt diaphragma inuestientes: superiore enim parte pleura, inferiore peritoneo tegitur. Venæ à trunco ascendentes cavæ exortæ duæ sunt, phrenicæ dictæ. Totidem arteriæ venas has comitantur; nervi utrinque duo à spinali medulla, quarta scilicet quintæque vertebra ad circulum nervæum chordarum instar feruntur. *Circuli duo.* Postremò foramina adfunt duo, quorum vnum stomacho viam præbet, alterum venæ cavæ ad cor ascendenti. Tertium addidere recentiores, quod ateriæ descendenti inferuiat. Sed postremum hoc non admittimus. Descendit enim aorta vertebratum corporibus adhærēs, & arteriam magnam vnà cum vertebra amplectitur diaphragma. Diaphragmatis vsus varius est, planèque dissimilis Platoni, Aristoteli, Plinio & Medicis. Plato vnicum huius musculi vsum agnoscit, ut ita scibilem animam à concupiscibili, quasi intergerrinus paries secernat, propterea διαφραγματος nomen imposuit. Aristoteles, septum hoc inter cor & alimenti officinam interiectionem putat, ne tetrus nidoribus, qui è culina expirant, cor principum facultatum sedes conturbaretur. Plinius huic acceptam refert subtilitatem mentis, & in eo præcipuam hilaritatis sedem locat, quod nullatè maximè intelligitur; ob hoc in præliis gladiatorum que spectaculis, morrem cum risu traiecta præcordia attulerunt. Medici præstantiores huius septi vsus agnoscunt. Primus est, ut libetæ respirationi inferuiat inspirando expirandoque, tenditur in expiratione, laxatur in inspiratione. id in extincto animali facilè deprehendes; contactum enim perpetuò apparet diaphragma; at vira cessat expiratione. Secundus vsus est, ut hypochondria ventilet, maximè verò hepar, quod superiore & conuexa sui parte arterias nullas habet. Hoc primis omnium agnouit Hippocrat. ἢ διὰ ζωαντικόν, dum diaphragma appellat διαπνῶν τῆς κατω κοιλίης, *respiratorium ventris inferioris*. Postremum vsum voluit esse Galenus, ad sæcum per inferiora excretionem. Nisi enim hic musculus superiore parte, tanquam manibus intestina premeret, æquè per superiora ac per inferiora derurbarentur fæces. *Membrana dua.* *Vene dua.* *Arteria.* *Nervi.* *Foramina dua.* *Vsum.* *Platonis vsus.* *Aristotelis.* *Medicorum vsus.* *Primus.* *Secundus.* *Tertius vsus.*

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

De phrenitide diaphragmatis, demonstratio Anatomica.

QVÆSTIO III.



ON fuit ante Platonis tempora in vſu diaphragmatis nomen. Solebant veteres Medici ſepium hoc φρένες appellare, non quòd participi ſit prudentia aut quòd ad ſapientiam quicquam conferat: eos enim qui id credunt, irridet auctor libri De morbo ſacro, ſive Hippocrates fuerit, ſive alius, his verbis. Αἱ δὲ φρένες ἀλλως ὀνομαζέχουσιν τὴν τῶν χεκτημένων, καὶ τῶν νόμων δέοντι, ἐδὲ τῶν φύσει, οὐδὲ οὐδὰ ἔγωγε τίνα δύναμιν ἔχουσιν αἱ φρένες, ὥς φρονέειν τε καὶ νοεῖν. id eſt, Præcordiis fortuitum nomen, & pet conſuetudinem impoſitum eſt, non ex rei natura, neque enim quam vim habeant præcordia, vt ſapiant & intrelligant, ego vique noui. Idem voluit Ariſtoteles 3. De partibus animal. οὐ μετέχειν μὲν τῷ φρονεῖν, ἀλλ' ἐγγυὺς εἶναι τῷ μετεχόντων καὶ ἐπιδήλον ποιεῖν τὴν μεταβολὴν τῆς διανείας. Non ergo φρένες vocauit Hipp. quòd ſapiant: ſed quòd muſculo hoc inflammatione obſeſſo, ſtatim ſubſequatur phrenitis; delirium quippe continuum cum febre acuta & vigiliis coniunctum. Multarum partium inflammationes, vt hepatis, ventriculi, pulmonum, delirium quidem pariunt, ſed fugax eſt eiufmodi delirium: ſola hæc diaphragmatis inflammatione delirium parit συνεχές, id eſt, cōtinuum, quod veram phrenitidem ab inflammatione cerebri & membranarum eius concitatam mentitur, nec niſi à peritis dignoſci poteſt. Eam eleganter deſcripſit Hippocrates libro 3. Περὶ νύſων, Φρενιτιδὲς δὲ γίνονται καὶ ἔξ ἐτέρων νύſων: πᾶσιν ἔχουσιν δὲ τὰς αὐτὰς, τὰς φρένας ἀλλέγουσιν, ὥς μὴ ἰδοῦναι ἀνὰ λόγον, id eſt, Phrenitides etiam ex aliis morbis naſcuntur: atque hæc quidem ægros pari contingit, de dolore quetuntur diaphragmatis, ita vt ſe contingi non ſinant. Galenus cap. 3. libri 5. De locis affectis, de ea phrenitide multa ſcriptis mandauit. Nobis ſingula hic tranſcribere non placet: ſigna tantum quibus vtraque phrenitis interſtingui queat, & horum omnium demonſtrationes Anatomicas, hic patefacere inſtituimus. Diftinguitur vtraque phrenitis, reſpiratione, voce & hypocondriorum contractione. Primum quidem phrenitidis idiopathica, quæ ab inflammatione meningum contingit, reſpiratio magna eſt: & ex longis intervallis, id eſt, rara, πνεῦμα μέγα καὶ διαπνεῖα, in Prognof. Prorrhethico & Coacis: At in phrenitide diaphragmatis, reſpiratio parua eſt & frequens: parua quidem, ob inflammationem & affectum organi reſpiratori, vnde ſit vt in omnem dimenſionem amplificari non poſſit thorax, nec liberè colligi ad inſpirandum exſpirandumque, vt in ſuperiore phrenitide, in qua organorum reſpirationi dicaturum libertas eſt: frequens verò eſt urgente neceſſitate & febrili incendio, vnde ſit vt paruitas frequentia compenſetur. Secundò dignoſcitur vtraque phrenitis voce. Nam in phrenitide idiopathica vox grauis eſt, vociferantur ægroti, calcitrant, mordent obuios quoſque: contrà, in ſympathica diaphragmatis phrenitide, φωνὴ ὀξεῖα, id eſt, vox acuta eſt: quia primum liberæ reſpirationis organum affectum eſt, ſurſumque ab inflammatione contractum, vnde anguſtior redditur thorax: magnitudo enim & grauitas vocis conſtitutionem ſequitur organi. Poſtremum & maxime proprium ſympathica huius phrenitidis ſignum tradidit Hippocrates Aphoriſ. 55. Coacarum prognof. ὡς χονδρία τυτέοιςιν εἶναι εἰρηναία, id eſt, hypocondria intro ſurſum his reuulſa apparent; cuius demonſtratio tota ex Anatomie petenda eſt. Diaphragma ſuperiore parte tegitur pleura, inferiore peritoneo, quod

Cui veteres
diaphragma
φρένας
appellauerunt.

Phrenitis dia-
phragmatis.

Quomodo di-
gnoſcatur v-
træque phre-
nitidis.
Primum ſi-
gnum.

Secundum ſi-
gnum.

Tertium.

Demonſtra-
tio Anato-
mica.

quod naturalia omnia organa & partes in ventre inferiore contentas instar sacci complectitur singulisque propriam largitur tunicam. Inflammatum ergo diaphragma sursum contrahitur, secumque peritonæum adducti, cum peritonæo verrabuntur hypochondria, hepar, lien, ventriculus, visceraque omnia: hinc hypochondriorum intro sursum reuulsio. Sunt itaque tria hæc phrenitidis quæ ab inflammatione diaphragmatis contingit propria & æmuleta, respiratio parua & frequens, vox acuta, & hypochondriorum intro sursum reuulsio. Cur autem diaphragmate inflammatione obsessa phrenitis excitetur, ratio inquirenda. Volunt quidam inflammato diaphragmate cerebrum statim inflammatione obsideri; cum enim inflammatione septi respiratione impediatur, calor augetur in thorace & corde, sanguis attenuatur & bile scit sursumque in cerebrum rapitur, unde erysipelas. Sed ridicula hæc. Nam accensis pulmonibus delirium fieret perpetuum, quia & difficilis redditur spiratio, & bilioso, id est, tenuissimo sanguine alitur pulmo; deinde si fieret erysipelas in cerebro, vera esset phrenitis non sympathica. Alij causam phrenitidis referunt ad analogiam quæ est inter substantiam septi & cerebri: sed cum spinalis medulla sit magis analogæ cerebro & ea inflammatione obfessa non semper delirium consequatur perpetuum, sit ut alia inquirenda sit causa. Nos duplicem causam concurrere existimamus, connexionem scilicet & societatem miram viriusque partiu, acin perpetuum diaphragmatis motum. Societas per nervos insignes sit, qui & calorem & spiritum vaporosum cerebro communicant: continuus verò & validus septi motus fumidos vapores impetu ad cerebrum pellit, & velut manu flabelli instar trahit. Si enim solam nervorum sympathiam admittis, cur inflammato ore ventriculi quod insignes accipit nervus stomachicos phrenitis eadem non contingit?

Cura diaphragmatis inflammatione phrenitis.

HISTORIA ANATOMICA.

De pleura & mediastino.

CAPVT V.



QUOD est in ima regione peritonæum, id in media & vitali est membrana hæc, quæ Græcis *ὠμαλὴ*, aut *πλευρὰ* dicitur, quod costis omnibus subtendatur, vulgus succingentem vocat: ut enim peritonæum organis omnibus naturalibus circumtenditur, unde nomen illi *ὠμαλὴ* & *πλευρὰ* est impositum: ita membrana hæc partes omnes in thorace contentas succingit amplectiturque. Huius figura & magnitudo eadem est quæ thoracis. Substantia non differt à peritonæo; tenuis enim est, sed firmissima, & roboris acta plurimum. Eius extima superficies inæqualis & aspera apparet; interna læuior, & velut aqueo humore oblita. Venas habet ab azygo & intercostali, quas totidem artetie comitantur. Sparguntur per eam quoque nervorum plures furculi, quos sexta coniugatio & spinales nervi suppeditant. Non est simplex hæc membrana, ut voluerunt veteres, sed omni ex parte manifestè duplex, crassior tamen circa dorsum apparet, ubi vertebrarum ligamenti anneditur. Huius usum hunc agnovit Galenus, ut qua parte costis subtenditur, pulmonibus propugnaculi vicem gerat, ne dum in inspiratione distenduntur costarum cartilaginumque offendantur duritie. Qua verò spatia costarum media, *μεσσηνέια* dicta succingit, musculorum & valorum gratia sit comparata; musculis quidem tunicam largiendo, vasa autem, quæ per costarum spatia excurrunt, stabilien do fulciendoque. Est alter membranæ usus, ut contenta omnia inuestiat colligatque.

Figura. Magnitudo. Substantia.

Vene. Arteria. Nervi. Duplex est.

Vfus. Primum.

Secundus. Tertius.

*Mediastinum
quid.*

*Pul.
Primarius.*

Secundarius.

ne pulmo dum mouetur, costarum spatiis sese insinuet. Membrana hæc vbi ad mediam ferè thoracis partem peruenit, hinc inde duplicatur, & à spina ad sternum fertur, dextram thoracis partem à sinistra dirimens. Græci has membranas *διαφραγματος*, id est, *intersepientes* dicunt; Latini, *mediastinum*, cuius longitudo à iugulis ad diaphragma vsque extenditur, altitudo à pectoris osse ad vertebrarum corpora. Hic cauitatem maximè insignem membranis fibris obitam cernere liceat, quam voci efformandæ conferre putant. Huius intetsepti vsus alius est primarius, alius secundarius. Primarius, tum ad viscerum suspensionem, ne in latera & posteriorem partem collabantur, tum ad vasa firmanda fulciendaque. Secundarius, ne vna parte læsa, altera in illius contagionem trahatur.

Partium in thorace contentarum brevis enumeratio.

CAPVT VI.

*Quomodo cordi
thoracice
omnes partes
sunt adiectæ.*



QUADMODVM in regione ima naturalia continentur organa coctioni & procreationi dicata: ita in medio ventre vitalia respirationi ac pulsui ministrantia concluduntur. Cor ptimus est respirationis & pulsus auctor, cui tanquam regi, reliquæ omnes partes in thorace contentæ inferuiunt. Pulmo spiritus *εργασίας* inspiratum aërem cordi præparat, eiusque æstuantem calorem motu suo quasi flabello ventilat. Aspera arteria aërem deducit reficiendo, temperando, expurgandoque cordi accommodatum. Venæ cauæ truncus paternissimo ore sanguinem in dextrum cordis sinum, tanquam cisternam effundit, ad vitalis spiritus generationem. Arteria magna spiritum à sinistro sinu accipit, quem pertammodo velut tubos in vniuersum corpus distribuit. Ita cordi famulantur omnia in thorace contenta: cordis ergo historia dignitatis & doctrinæ ordine præmittenda esset: sed quia sectionis ordinem hic sequimur, prius describenda & demonstranda sunt vasa quàm viscera: non enim demonstrari potest cor, nisi eius sinus & vasa quatuor aperiantur, quibus sectis totus effluit sanguis, vt venarum artiarumque riuos & diremptus cernere amplius nequeas.

Venæ cauæ ascendentes distributio.

CAP. VII.

*Quatuor ve-
næ à trunco.
Phrenica.*

Coronaria.

Azygos.

*Azygos du-
plex & c.*



VENÆ CAUÆ ex gibbis hepatis emergens, diaphragma permeans, prægrandi stipite, quem *ascendentem truncum* vulgus vocat, ad iugulum vsque extollitur. Ab hoc trunco quatuor emanant riuuli. Phrenicus, coronalis, azygos & intercostalis. Phrenicus per vniuersum diaphragmatis corpus excurrit, & ad cordis inuolucrum ramos spargit, necnon ad membranas *διαφραγματος*. Coronarius, seu *coronarius* dictus, vniuersam cordis basim instar coronæ cingit, sæpius simplex, raiò geminus visitur, & per totam cordis substantiam hinc inde ramos diffundit ad visceris nobilissimi nutritionem. Azygos omnis coniugij expertus, quod in dextro tantum latere reperiatur, octo furculis fruticatur, qui in sinistram partem non secus quàm in dextram feruntur, octoquoque inferiores costas & earum spatia alunt, œsophago interea exiles, sed numerosos ramulos distribuendo. Huius solitariae venæ duplicem obseruarunt recentiores Anatomici communionem: prior est cum thoracis venis, quæ ab axillari prodeunt, vnde fit vt in pleu-

ritide, eiusdem lateris sectio mirè conferat: Alter est tum adiposa & emulgenre per ramulum exiguum, vnde puris in thorace collecti expurgationem per vrinas fieri voluit Fallopius. Quas autem in azygou ramis somniauit membranulas, velut ostiola, sanguinis refluxum impediencia, Amatus Lusitanus, nobis, nec cuiquam adhuc vidisse contigit, propterea meræ sunt nugæ. Postremus ramus *intercostalis* dicitur, quòd tria aut quatuor superiorum costarum spatia nutriat. Hunc sæpius deficere obseruauimus: sed fungitur tunc illius munere azygos ramumque ad superiores costas mittit. Postquam quatuor hos venæ causæ ascendentis truncus diffudit surculos, totus in duos insignes ramos finditur, qui à situ & natura partis *subclauij* appellantur, quòd infra clauas & iugulum sint. Horum ramorum pars intra thoracis cauitatem recòdita est, pars altera è thorace exiliens ad axillas fertur, & *axillaris* dicitur. Ab illa quinque oriuntur venæ, *mammaria*, *thymica*, *capsularis*, *cervicalis* & *muscula*. Mammaria per anteriorem sterni partem fertur, ramulos thoracis musculis & mammis exiguos spargens; maiore verò sui portione ad anteriorem recti musculi partem emergit, surculis aliquot suis rotidem epigastriæ ascendentis riuulis paulo supra vmbilicum occurrens. Thymica, per totum glandosum corpus, quòd *Thymum* vocant, distribuitur, necnon per intersepientes membranas. Capsularis à paucis deprehensa, per cordis inuolutum fertur, occurrítq; phrenicis ascendentibus, vt eadem vasa penitus videantur. Cervicalis per foramina apophyseon transuersarum cervicis emicat in cerebrum, ramulis obiter in vicinos musculos dimissis. Postrema omnium est muscula, quæ ante musculum scalenum nata, in rachytas tum cervicis, tum summi thoracis fertur. Altera rami subclauij pars, vbi cauitatem thoracis egreditur, & ad axillas peruenit, *axillaris* dicitur. Ab hoc axillari ramo tres oriuntur venæ, thoracica, basilica & cephalica. Thoracica gemina est vtrinque. Easum vna in mamas & anteriores thoracis musculos, vt pectoralem & ferratum minorem, altera in posticos distribuitur. Harum venarum tres rami, interdum quatuor, cum tribus aut quatuor venæ azygos ramis coeunt: quæ obseruatio noua est, & pulcherrima. De basilica & cephalica, quæ peculiare sunt brachij venæ, in artuum historia differemus. Atque hæc est omnis rami subclauij distributio.

De arteria magna ascendente.

CAP. VIII.



ARTERIA è sinistro cordis sinu profliens, statim arterias duas in cordis basim & ambitum reflectit, quas *coronarias* dicunt; mox tota bipartitò finditur, quasi in duos prægrandes stipites dirempta; alter deorsum secundum lumborum vertebrae contorqueatur: alter sursum ad iugulum effertur, vbi in duos insignes ramos diuiditur, *subclauios* dictos. A subclauio dextro quinque emergunt arteriæ, *intercostalis* superior; quæ ad superiores costas fertur. Mammaria, quæ ad anteriorem sterni partem. Cervicalis, per foramina apophyseon transuersarum cervicis emicat in cerebrum. Muscula in cervicis musculos spargitur. Carotis, *ἀναρπυξὴ καὶ ἀποπληκτικὴ* (sic dicta, quòd caron & apoplexiam excitet si interceptiatur, denegato aditu vitali spiritui qui animali materiam subministrat) per latera arteriæ alperè cum interna iugulari ascendit. Similis est subclauie sinistrae distributio, nisi quòd carotidem non emittit. Exquisitionem arteriarum & venarum descriptionem inuenies libro quarto.

Nomen.

Lib. de corde.

Figura.

Magnitudo.

Aqua pericardij visus.

Ortus.

Situs.

Substantia.

Vena.

Vasa.



OR viscus nobilissimum membrana obuoluitur, quam Græci *περικαρδιον χιτὼνα* dicunt, Latini *cordis inuolucrum, capsam, casulam, arculam*, Hippocrates, *χουλεὸν* vocat, id est, *vaginam*. Aristoteles *ὕμβρα πμελωδὴ καὶ παχὺν*. Huius figura turbinata est, sicut & cordis, ex basi enim latiore in mucrone acutum sensim definit. Membrana hæc immediatè cordi non adhærescit, sed tantum ab eo distat, quantum eius motus postulat. Ne quid autem vacuum esset, Natura in hoc spatium humorem sero & vrinæ persimilem coniecit, ne cor ob perennes motus æstu incandesceret, tum vt in eo velut innatans cor minus graue esset amanti. Oritur hæc tunica à vasorum quatuor, nempe venæ cavae, venæ arteriosæ, arteriæ magnæ, & arteriæ venosæ membranis. Situm eundem quem cor obtinet. Eius enim basis thoracis medium exquisitè occupat, mucro autem in sinistrum latus magis inclinat, & in anteriora ita protenditur, vt sterni attingat cartilagine: quin etiam diaphragmatis neruo circulo validè alligatur. Substantia tota est membranæ, dura crassaque, inter ossium & pulmonis substantiam media. Est pericardium totum sibi continuum, præterquam in basi, vt vasis egredientibus viam præbeat. Venas habet communes à phrenicis, & peculiarem à ramo subclauio, quam *capsularem* vocant. Nervos accipit exiles admodum à recurrente sinistro. Pericardij vnicum vsum agnoscimus, vt cor ab externis tueatur iniuriis, veluti propugnaculum quoddam ac vallum ipsi circumseptum.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

De aqua pericardij, an in viuente animali reperiatur, & vnde eius generatio.

QVÆST. V.

An aqua hæc in viuente reperiatur.

Opinio Feiga præparatur.

Alia opinio nulla.

In omni viuente reperiatur humore hunc.

Auctoritas Hippocratis.



DISSECTO hominis & animalium ferè omnium caduere, aquam sero aut vrinæ persimilem in cordis inuolucro cõtineri, nemo est Anatomie sacris quantumuis leuiter initiatus, qui sepe non obseruauit. Sed an in viuentibus hæc aqua reperiatur, dubitari solet. Sum qui extincto tantum animali generari humorem hunc velint, quod tam temporis exoluti cordis calore vapores in aquam densentur. Doctissimus Feiga commentariis suis in *s. De locis affectis, causam generationis aquarum in animali demortuo, refert ad cordis & vicinarum partium calorem, qui pericardii nomine pingue colliquit, & in aquam vertit; purum autem intelligit, vt opinor, elementarem, qui ab anima amplius non regitur. Verum non agnosco tam validum extincto recens animali calorem, qui adipem liquare sit potens, cum ne ab igne quidem nostro nisi diuturna adhibita mora liquari possit cordis, & circumstantium membranarum adeps. Existimant alij generari quidem in viuentibus humorem hunc aqueum, sed in ægris tantum & melancholicis, qui sero abundant, & cordis *παλμὸς* sepe infestatur, vnde humorẽ hunc *passivon* ὕδωρ vocat Hippocrates. Nos in viuentibus omnibus & ægris & sanis humorem hunc colligi in his parcius, in illis copiosius, existimamus. Confirmabitur opinio nostra auctoritate, aucto *ἡ* & rationibus. Auctoritas adest summi Hippocratis libello *περὶ καρδίας καὶ ὅρων*, inquit, *ἐν αὐτῇς ὕγρον σμιμνεν ὁποῖον οὐκ ἐστὶν, ὥστε δόξαις ἐν χύσας τὸν καρδίας ἀνασπένδει*; id est, Adest in ipsa tunica humor modicus, velut vrina, vt*

videatur cor in vesica diuersari. Idem voluit Galenus libris De usu partium, hoc oculis demonstratio conuincit. Si enim vena secueris animalia, humoris modicum in pericardio reperies; & in sacris Scripturis dum miles lancea Christi Saluatoris nostri latus aperuit, exiuit illic sanguis & aqua. Nec deest suus seroso huic humori usus, qui causa est finalis, ut eo semper maderet cor, ne forte ardore assiduo ob perennes motus torreretur. γεγεννται (ait summus Dictator libello De corde) δὲ τούτου ἐνεκα ὅπως τὰ μεταξὺ ρωσκοιδύως ἐν φυλακῇ; id est, fit autem humoris huius generatio, ut sanum cor in custodia florescat. Sit hoc igitur ratum, generari in viuētibz & sanis & aegris humorem hunc refrigerandi & humectandi cordis gratia. Vnde autem illius fiat generatio, nunc inquirendum. Volunt quidam ex vaporibus cordis membranarum frigore densatis generari, non secus ac vapores ex precordiis estuantibus ad cerebrum delati densantur. Alij ex sero & vasorum quatuor tunicis exudente, plurimum namque feri in arteriis & venis continetur. Alij portionem potus per latera asperae arteriae in pulmones, & ab his in pericardij cavitatem deerrare putant, quod voluit Hippocrates libello citato: τὸ τὸ ὕγρον διυρέει ἢ καρδία πίνουσα ἀναλαμβάνουμένη καὶ ἀναλίσκουσα, λαμβύσα δὲ πνεύμονος τὸ ποτόν; id est, hunc humorem cor emingit bibendo ipsum, assumens & absumens, pulmonis nimirum potum lambens. Ego illis omnibus assentior, & posse humorem hunc & vaporibus densatis & vasorum sero exudente, & & potus portiuacula in thoracem illabente, generari existimo. Verum an potus in pulmonem ferri possit, disputabitur ex professo in pulmonum historia.

Sensur.

Finalis causa.

Vnde illius humoris generatio, Opusculum varia.

HISTORIA ANATOMICA.

De corde.

CAPVT X.



ANIMA hominis per se indiuidua & simplex, quā φύσιν ἀφωέα, id est, naturam inaspectabilem vocat Hippocrates, licet tota sit in toto, & tota in qualibet corporis particula; facultatum tamen varietate multiplex dicitur, & organorum dissimili structura in his quā in illis partibus magis lucet. Facultatum harum differentia in vniuersum tres sunt; naturalis, vitalis & animalis, quatum gubernaculis totius corporis natura integritasque tenetur & cohaeret. His singulis propriam sedē, in qua functionum opera manifestē emicant, assignarunt Medici. Animalem quidem, quę sensus & motus principium est, in editissimo loco; cerebro quippe caluaria vndique circumsepto locarunt. Naturalem, quę auētrice, altrice & procreatrice continetur, in hepate αἱματώσεως officina. Vitalem verò quę impulsu & respiratione viget, in corde, tanquam atce & domicilio omnium tutissimo posuerunt. Est igitur cor Platoni sedes τῆς θυμικῆς, quod ἀνδρῶν ψυχῶν vocat. Medicis facultatis vitalis domicilium, ἀρχὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ζωῆς, vitę principium, fons caloris, & viuifici nectaris, arteriarum ῥιζώμα, & scaturigo, pulsus & respirationis primus auctor; quo vigente, vigent omnia; languente, languescunt; intereunte, intereunt. Hic artificiosus ille Zenonis ignis continetur. Hic diuinus & cælestis ille calor regitur, quē Prometheus ē cælo futatum fingunt, ut hominem vita donaret. Scilicet in hoc viscere, quasi lares esse focumque oportuit, quo natiuus singularum partium calor conservaretur, & fugax cuiusq; partis viuacitas eius influxu (propterea σὺν ῥ' οὐν Theophrastus dixit) recrearetur. Minor sanē est huius visceris quā cerebri dignitas, quic-

I. De dicta.

Tres animae facultates secundum duos usus.

Cordis dignitas & usus.

*Cor diu neces-
situr.*
4. de laevis aff.

*Nomen cor-
dis.*

Figura

Situs.

*Basis exquisi-
te in medio,
et cor.*

*Mucro cor in
anteriorem et
sinistram laevis.*

Quantitas.

quid fremāt Peripatetici; sed necessitas multo maior statuitur. Solum enim hoc viscus diu vitijis non inaceratur, nec vitæ supplicia trahit grauiora, & semellexum, mortem affert præsentaneam. Numquam mors, inquit Galenus, nisi ad immodicas cordis intemperies; & Aristoteli 4. De generatione animalium, corde carens nullum vnquam animal visum est, licet renibus, vesica, liene careant multa. Huius mirabilem structuram describere iam aggredior. Cor Græci καρδιά καὶ καρδίαν dixere, ἀπὸ τῆ καρδαίνεσθαι, quod est *vibrare*, αἰκνίντος γάρ: perenni enim cietur motu cor. Chrysippus καρδίας vocat, quasi καρδίας, quod principatum denotat. Vereres Græci per Antonomasiā ἀσπασσινδα appellauerunt, & Sophocles timidum hominem vocat ἀσπασσινον. Cor figuræ est σφαιροειδὸς; & nuci pinæ non admodum dissimilis. Ex basi enim ampliore in turbinatum mucronem sensim definit. Basis, κατὰλὴ, dicitur caput cordis, mucro autem πύρην. Hippocrates libello De corde, ἑρμῆον vocat, fortasse legendum, ἑρμῆον, quod ferrum est in ima hastilis parte affixum, aut ἑρμῆον, quod est extremum, & cauda. Figuram hanc obtinuit non ob igneam vim, ut aniliter quidam philosophantur: ita enim debuisset mucro sursum vergere, sed quia pyramidalis figura oblonga est & aliquantulum sphaerica. Longitudo ad tractum cōfert, rotunditas ad amplitudinem & robur: at vtrumque in corde necessarium erat. Adde, quod ea figura κορονδία, fibræ cordis perpetuò motæ, principium habent immobile, cui innituntur, mucronem scilicet, mixto quod grauius fuisset cor, nec tam faciliè distendi contrahique potuisset, nisi in mucronem turbinatum defineret. Accedit tamen figura hæc proximè ad sphaericam omnium capacissimam, ut in maximis dilatationibus sphaericum appareat cor. Cordis extrema superficies à basi ad conum læuis & polita apparet, aliquid tamen inæqualitatis inducunt venæ & arteriæ coronalis ramuli sanguine tumentes, nec non adipis copia. Situm est cor in medio thorace, ut vitalem spiritum & viuificum necet, salutaris stellæ instat, in omnia extrema peræquè diffundat: medium autem hic crassiore Minerua quàm Mathematici æstimamus. Nam si exquisitè loquicæat, sola cordis basis medium thoracis occupat. Cum enim thorax anteriore parte sterno, posteriore vertebris dorfi; superiore, clauibus, inferiore diaphragmate; dextra & sinistra duodecim costis, tanquam finibus circumscribatur: basis tantum à sterno distat, quantum à vertebrarum corporibus, tantumque à iugulo remouetur, quantum à diaphragmate. Denique à dextris & sinistris costis pariter abscedit. Medium porro hunc situm occupauit: quia nobilior hæc pars vasorum quatuor exortui & implantationi præfecta, tutiorem & digniorem locum postulabat. Reliquum cordis corpus turbinato mucrone sensim in anteriora, & sinistram latum infra læuam papillam exporrigitur, vbi conspicua pulsatio tangentibus nobis deprehenditur. In anteriora quidem, tum ut eo situ calidior reddatur pars in quam fit motus: at mouetur antrorsum animal, tum ne cordis basis, cuiusque sinus in violentis motibus ossium duritiæ læderentur; in sinistram vero potius, quàm in dextrum latum eminet; tum ratione ascendentis cauæ, quæ tota in dextris est, tum ratione hepatis in dextra locati. Debit autem in alterutrum latum inclinare cor, non rectè ferri, ne diaphragmati primario respirationis organo & perenni motu agitato, esset impedimento. Quantitas cordis exigua est, ad faciliorem systoles ac diastoles motum; & quia principiorum moles exigua, vis maxima. Hæc non eadem in omnibus animalibus, sed quæcunque timida sunt, grandius his cor datum est. Exiguus enim calor in magno exolescit conceptacu-

lo. Sic leporces, cerui, pantheræ, mustelæ, asini, cor maximum habent: est tamen, si Aristoteli credimus, cor homini quàm cæteris animalibus grandius. Quæ verò de cordis magnitudine & incremento tradunt Ægyptij, commentitia sunt. Cor in actiuis qualitatibus calidum est, & viscerum omnium calidissimū: in passiuis cuncte humidius, sed reliquis visceribus siccior. Organum hoc nobilissimum ex pluribus similibus constat particulis. Tota itaque eius structura ex carne, adipe, venis, arteriis, nervis, & tunica propria constituitur. Caro cordis dura est, densa & solida, vnde Hippocrates cor musculum appellauit fortissimum *καταρσεν* *καὶ τῶν νεύρων, ἀλλὰ πλεονεχίει σαρκὸς*, id est, non nerno tendineus, sed densitate carnis. Duritiem hanc & robur carnis exigebat vis illa feruens innati caloris, spirituum in corde contentorum tenuitas, & perpetua necessarij motus agitatio; vt eadem sit cordis ad contentum spiritum, quæ fornacis ad ignem ratio: solet autem fornax ex lapidea materia construi. Sed in mucrone quàm in basi solidior apparet caro, quod ibi fibrarum omnes concursus desinant, & ne in violentis motibus pectoris os contingens, à quo non longè abest, facile læderetur, atque ita sui motus concentum, & perennitatem vitare cogèretur. Caro hæc triplici villorum genere intexta est. Rectos primum habet à basi ad mucronis extremum productos; tum obliquos, qui secundum cordis longitudinem obliquè procedunt, tandemque transuersos orbicularim cor, eiusque ventriculos ambientes; hi omnes ita implicantur, vt vix arte vlla eos diuellas & illaceros separes. Rectorum opera trahit cor in sua diastole sanguinem per venam cauam in dextrum, & aëtem per arteriam venosam in sinistrum sinum. Obliquorum ministerio gaudet fruitutque attractis. Transuersis verò cor vndiquaque arctantibus, fit sanguinis per venam arteriosam in pulmones, vitalis spiritus in aortam, & fumidotum vaporum in artetiam venosam expulsio. Hic perpetuum & naturalem cordis motum non minus mirari liceat, quàm Euripi illius in Eubœa septies interdiu noctuq; refluxum. Perenni enim eo motu perpetua fit spirituum generatio, nihilque in animali perfecto est ferax, nisi vis illa præpotens cordis fecunditatem largiatur. In diastole cortugantur extrema & mucro ad basim rapitur, tuncque breuius quidem euadit cor, sed eius latera ita amplificantur vt quasi sphæricum appareat. In systole longius quidem, sed angustius euadit cor. Hæc est igitur cordis caro, maximam eius partem constituens, cuius ratione carnosum viscus, cor dicitur. Ad sunt præterea venæ cor nutriendes, arteriæ innatum calorem fouentes & nervi. Venam Anatomici *σφαγδαίαν* vocant, id est, coronariam, quod totam cordis basim eorone instar, cingat: ramulos hinc inde spargit, sed eos in sinistrum latus insigniores & numerosiores, quod ea pars densior & solidior copiosiore sanguine indigeat: vena hæc sæpius est simplex, raro gemina. Habet etiam cor arterias coronarias sæpius duas, per totam eius basim excurrentes. Nervos accipit à sexta coniugatione, exiles admodum. Quid enim illa netuorum cohorte, quam subornat Fallopius, opus habet, cum eius motus animalis non sit, sed naturalis? Totum hoc corpus peculiari tunica tegitur, quæ ipsius substantiam firmiter conseruat. Postremo, adipe copioso tota ferè cordis superficies oblinitur, ne ob perennes motus incendio conflagret & fatiscat, vt singularem Naturæ prouidentiam hic admirari liceat, quæ contra proprias leges in regione feruidissima adipem generat.

Temperamentum.

Compositio ejus substantia.

Caro cordis dura, & citra.

Villi.

Morus cordis mirabilis.

Vena cordis.

Arteria. Nervus.

Adipem.

Sinus dñs
cordis.

Dexter.



Sinister.

Septum me-
dium.

Auricula.

Vſus auricu-
larum.
Primus.

Secundus.

Tertius.

O R licet in animalibus omnibus vnicum sit, in duas tamen partes dextram & sinistram dirimi solet. Has Hippocrates libello *ἁπλῆς καρδίας γαστέρας* vocat, Galenus *καίλιος*, Iulius Pollux *κόλπες*, Latini *ventres: sinus, specus, thalamus, diribitoria* dicunt. Dexter sinus sanguineus appellatus, & *φλεβοειδής* seu venosus, quod sanguinem in se contineat, solius ferè pulmonis gratia constructus videtur, & quæ pulmonem non habet animalia, dextro etiam carent sinu. Nam cum læuis esset & rara pulmonum substantia, tenuissimo ad sui nutritionem sanguine indigebat, hunc itaque in dextro cordis specu attenuari oportuit. Dexter hic sinus, ad coni extrema non peruenit & pariete cinctus est tenuiore, quàm læuis. Haurit è venæ cauæ patentissimo ostio per diastolen crassum sanguinem, quem in foueis suis excoquit, attenuatque; attenuati sanguinis portio per septum medium in sinistrum sinum exudat, pars altera per venam arteriosam ad pulmonum substantiam fertur. Sinister ventriculus arteriosus, & æreus dictus, quod ærem trahat & vitalem spiritum in se contineat, ad coni fines usque pertingit, & pariete triplo quàm dexter crassiore obuallatur, ne æreus & spumans sanguis obtenuitatem vanesceret, & vt sanguinis in dextro sinu contenti crassities grauitatēque compensaretur, atque ita cor esset *ισόρροπον*, id est, in equilibrio. Vnde fit, vt, quanquam vinculum nullum sit, quod vicinis partibus cor alliget, nusquam tamen inclinet & propendat. Vtriusque ventriculi superficies inerna, etsi perquam inæqualis est, multisque quasi foueis in carnē substantiam insculptis obsita, ea tamen inæqualitas in sinistro ventriculo longè est maior, ad ærem & spiritum continendum & coquendum, ne facilè diffiparetur & exspiraret, quod primus omnium obseruauit Hippocrates libello De corde, his verbis. *Ambo quidem sinus interiore parte sunt asperi ac velut aliquantulum crosi, sed sinister magis quàm dexter.* Vtrumque sinum, interiectus quidam paries discludit, vulgus *septum medium* dicit, ne contenta misceantur; hoc crassum quidè primo intuenti apparet, sed paulò accuratiùs inspectanti, tam multis foraminibus est peruium, vt à dextro in sinistrum specum facilis sit aditus, quicquid contra Galenum clamitent neoterici. Ad vtrumque ventriculi latus emicant appendices membranosæ: Hippocrates corpora vocat *μαλθακὰ καὶ σπνεγνῆδρα*, id est, *mollia & cauernosa*, quæ non ab vſu aut actione, sed à similitudine auriculæ dicuntur. Earum dextra venæ cauæ ostio præiacet, sinistra in arteriæ venosæ officio est sita, illa amplior est, quia crassioris sanguinis est conceptaculum; hæc minor, quia ærem continet. Vtriusque superficies exterior læuis est, & dum oppletur, gibba; dum concidit, rugosa, interior verò inæqualis est, & foueis ac fibrosis amplexibus scatet. Auricularum vſus varij sunt & mirabiles. Primus, vt sinu velut prompſuaria quædam sanguinis, & æris, derepentè irruentium, ne in subita contractione per oppressionem suffocetur, & rebus foris intro confestim occurrentibus frangatur cor. Alter vſus est, ne vena caua & arteria venosa in violentis motibus disrumpantur: magna enim cordi vis est trahendi & sanguinem & ærem. Si itaque maiores adhibeat conatus in tractione, vrgente refrigerationis & restorationis necessitate, periclitarentur vasa, nisi auriculæ adessent tanquam foueæ. Tertium agnoui Hippocrates libello De corde, vt folium instar, cor refrigerent.

frigerent. Sunt qui velint in auriculis præparari sanguinem, aëremque vitalis spir- *Quartus.*
 itus materiam. Non est harum auticularum & cordis idem motus : cor enim
 quia distenditur impletur, at aures quia implentur dilatantur ; quod tacitè indi-
 cavit Hippocrates libello De corde, his verbis. *Cor tota sua natura agitur, aures*
verò privatim tum intumescunt, tum concidunt. In cordis basi quatuor apparent in- *Quatuor vasa*
 signia vasa, totidemque eorum orificia, duo in dextro sinu, totidem in sinistro : *cordis.*
 In dextro quidem duæ venæ, vena caua, & vena arteriosa. In sinistro duæ artetie,
 arteria magna & artetia venosa. Vena caua diaphragma permeans in dextrum *Vena caua,*
 sinum hincit ostio patentissimo, sanguinemque ad pulmonum nutritionem &
 vitalis spiritus generationem copiosissimum in eum refundit : excoctus in illis
 foueis sanguis per aliud vas, venam quippe arteriosam egreditur, & in totam
 pulmonum substantiam distribuitur. Vena hæc à structura *arteriosa* dicitur: tu-
 nicam enim habet densam & crassam; ab officio vena, quia sanguinem venatum
 modo deferat. Arteria venosa in sinistro sinu conspicua, per totum pulmonis cor- *Arteria ven-*
 pus numerosa ramorum serie spatgitur, aërem in pulmonibus præparatum de- *osa*
 fert in sinistrum sinum, fumidos vapores expellit, & vitalis spiritus portionem in
 pulmones diffundit. Arteria dicitur, ab officio, quia aërem spiritumque continet.
 Venosa à structura, quia tenuem habet tunicam, instar venatum. Quartum su- *Arteria ma-*
 perest vas, *aortam* dicunt & *arteriam magnam*, ab amplitudine; hæc vitale spiritum *gna.*
 in sinistro cordis specu ex sanguinis aërisque permissione elaboratum, excipit,
 & per ramos insignes, tãquam tubos & aquæ ductus, quoquoersum distribuit.
Αὐται, inquit summus Dictarot, *πηγαὶ φύσιος ἀνθρώπου, καὶ οἱ ποταμοὶ ἐν* *Libr. de corde.*
ταύτῃ ἀνὰ τὸ σῶμα τοῖσιν ἀρδεταὶ τὸ σκνός; id est, *hi sunt fontes humane nature,*
hæc flumina quibus totum corpus irrigatur. Cur autem venam arteriosam & artetiam
 pulmonum venosam construxerit Natura, hæc mihi videtur ratio, quòd pulmo
 per se motus expers sit, & ad thoracis motum distendatur; debuit ergo illius arte-
 ria mollis & levis effingi, vt inspirantibus nobis celerrimè aërem hauriat, & ex-
 spirantibus fumidos vapores expellat. Venam autem decuit esse crassissimam &
 arteriosam, ne tenuissimus sanguis in ea contentus ad visceris leuissimi, rarissimi
 & spongiosi nutticationem vanelceret. Vena hæc insignis est magnitudinis, non ad
 vitalis spiritus præparationem ; sed vt quantum ob tunice crassitudinem iustæ
 pulmonum nutritioni defrahebatur, tantum vasis amplitudine compensaretur.
 Sunt igitur quatuor hæc cordis vasa: vena caua, vena arteriosa ; artetia magna &
 arteria venosa. Singulis vasorum orificiis, quæ in cor subeunt, membranz quæ- *Valvula cor-*
 dam adnascuntur, quas siue portas, siue valvulas, siue ostiola voces, nihil interest; *dis vndecim.*
 Hippocrates *ὕμνες* appellat, Herophilus nervosa corpuscula, Galenus membra-
 narum epiphyfes. Has in eum vsum comparauit Natura, ne quod intromissum
 fuerit in cor, per eadem refluat vasa; aut, quod aliquando è corde effusum fuerit,
 in idipsum remeare possit, alioqui ittirus foret cordis motus. Sunt autè valvulæ
 numero vndecim; tres quidem singulis trium vasorum orificiis, duæ autem dun-
 taxat arteriæ venosæ adnascuntur. Ex quibus aliæ foris intrò spectant, id est, foris *Valvularum*
 apertæ sunt, intus clausæ, quæ scilicet materiam introducunt in cor : aliæ intus fo- *duo genera.*
 ras spectant, id est, intus apertæ sunt, foris clausæ, quæ scilicet è corde materiam
 effundunt. Vtutarumque figura dissimilis est. Illæ enim fibris innumeris veluti la- *Foris intra.*
 certosis & carneis præditæ sunt, ad imam cordis cuspidem pertinentes; formam-
 que effingunt triangulari cuspidi non dissimilem, propterea *τριγλωχίνας*, id
 est, *trifurcas* & *tricuspidales* Græci dixerunt. Hic fortè deceptus Aristoteles, cor

Intus foras.

neruorum principium statuit, fibras, pro nervis accipiens. Hæ verò semicirculæ & Lunæ falcatæ imaginem referunt, Græci *σινμοειδῆς* vocantur, totæque in vasis caudice consistunt. In orificio venæ cavæ tres adfunt valvæ, foris apertæ, intus clausæ, quæ sanguinem in dextrum cordis sinum intromittunt; sed ne in cavam denuò refluat, prohibent; tricuspides sunt. In venæ arteriosæ orificio, totidem sunt intus apertæ, & foris clausæ, quæ ex eunti sanguini patent quidem, sed eidem remeanti occluduntur, semicirculares sunt. Arteriæ venosæ orificio commissæ sunt tantum duæ foris enatæ & intus clausæ: quia non exquisitè decuit intercludi hoc vas, ut fuliginosis extremis pateret aditus. Tricuspides sunt. Arteriæ magnæ ostio tres adnascuntur membranulæ semilunares, intus quidem apertæ, ut vitali spiritui exitum præbeant, sed foris clausæ, ne in sinistrum cordis sinum idem spiritus remeet. In cordis diastole valvæ omnes extenduntur, qua distentione tricuspides multas velut rimas efficiunt: semilunares verò valvorum suorum extrema claudunt. In systole contrahuntur omnes membranulæ, tuncque tricuspides eas rimas claudunt, quas dilatatæ efficiebant; semilunares verò corrugatæ, fissuras committunt, per quas liberè egreditur sanguis. Hæc mitifica sunt Naturæ in structura cordis arcanæ nunc controuersa enodemus.

*Quomodo
aperiuntur
& claudun-
tur valvule
in cordis mo-
tu.*

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An cor vitalis facultatis sit sedes, & ad quam animæ facultatem referenda sit.

QVÆSTIO VI.



NIMIAM nobilem *ἐντελέχεια* tribus instructam facultatibus, humani corporis æconomiam dispensare, omnibus, ut opinor, est exploratum. Facultates hæ Platoni diuino atque Theologo hominum mores informare cupienti, tres sunt, irascibilis, concupiscibilis & rationalis. Aristoteli naturæ genio, animatorum omnium, plantarum, brutorum & hominis species inuestiganti, vegetans, sentiens, intelligens. Galeno verò & Medicis omnibus in unius hominis contemplationem incumbenibus, hæ statuuntur, naturalis, vitalis & animalis, quas locis sedibusque disclusas esse volunt, & ibi facultatis statuunt domicilium, ubi eisdem opera magis emicant. At vitæ principia in corde, nativi caloris uberrimo fonte, magis lucent, quam in ceteris partibus. In eo itaque vitalem facultatem tanquam in arce collocant.

*Quid sit vita-
lis facultas.*

Vitalem porro facultatem appellant eam, quæ vitales gignit spiritus, & quoquoque sensum diffundit; spiritalem malunt quidam nominum aucupes eam vocare. Gignentur spiritus hi solius pulsus & respirationis opera, ad eò ut duo hæc vitali famulentur in seruianque. Vitalis hæc facultas non omnium animatorum est propria: viuunt enim sine hac stirpes & animalia *ἔντομα* exanguiaque; quia crassiores frigidioresque eorum spiritus exiguum sui patiuntur iacturam: sed in perfectis & calidissimis animalibus lares esse focumque oportui, unde nativi caloris & spirituum iugis esset scaturigo. Est ergo peculiaris quedam in nobis facultas spirituum vitalium procreatrix, per quam vita conservatur ipsa, tamen vita non est.

*Dari vitalem
demonstratur.*

Dari hanc facultatem colligunt Medici primum ex necessitate, deinde ex organorum structura. Necessitas ex eo indicatur, quod cum fugax sit animantis cuiusque viuacitas, & perpetua fiat nativi caloris dissipatio, nisi viuifica quedam res continenter suppleret, nisi noui cuiusdam nectaris appulsu, recrearentur spiritus, non diu suo statu contineretur calidissimum animal. Est verò viuificum illud nectar vitalis spiritus, quem cor propria vi & suo perenni motu ex aëre sanguinèque simul iniectis, continuo gignit. Quinetiam partium diuersi generis structura vitalem hanc facultatem spirituum procreatricem necessariò admitter-

dum indicat. Quorsum enim in corde specus duo, nisi ad spirituum generationem? Quorsum multiplices arteriarum riuus per uniuersum corpus expansi? cur pulmonem aeris conceptaculum & velut ἐρυστήριον cordi apposuit Natura? Admittatur ergo vitalis facultas; & ea nobilissima virtuti celesti non valde dissimilis. Ut enim celestis illa vis inferiorum dicitur conservatrix, & singulas eorum actiones promouet: ita vitalis facultas, insitum cuiusque partis calorem foveat, & sopitam eius vim suscitet. Cælum in inferiora per lumen & motum agit. Cor perenni suo motu & spiritu aethereo quasi lumine singulas partes illustrat. Celestis ille calor varios pro subiecti varietate promittit effectus: vitalis iste spiritus viventis functiones omnes, licet diuersas perficit. Tandem ut motus & lumen in superioribus instrumenta sunt intelligentiarum & cæli; intelligentiarum quidem, tanquam primi mouentis immobili; calorom autem, tanquam primi mouentis moti: ita vitalis spiritus & cordis pulsatio instrumenta sunt animæ & cordis; anima tanquam mouentis non moti; cordis tanquam mouentis moti ab anima. Ceterum ad quam animæ facultatem vitalis hæc referenda sit, maxime disceptatur. Peripatetici tres animæ facultates statuunt, sentientem, intelligentem, vegetantem. Ad sentientem referri non potest: est enim sentiens facultas, ut docet Philosophus, perpetuo cum cognitione & apprehensione obiecti: at vitalis sine cognitione est: sentiens facultas, per somnum feriat & cessat; vitalis in somno vegetior. Mouentem animalem nemo dixerit: motus namque animalis perpetuo sequitur appetitum, & voluntarius est: cordis verò & arteriarum motus non est in nostra potestate, ut nobis pareat: facultas mouens non agit necessario sed libere: vis hæc pulsatilis necessario agit, & sola urgente necessitate augetur: fatigatur illa tandem, & intermittit: hæc viuente animali nunquam cessat. Superest ergo ut ad vegetantem referatur. Hoc multi non admittunt; quia vegetans in plantis est: hæc autem facultas in diæ vegetans circa alimentum versatur, & sola definitur nutritione, hæc autem vitalis, circa spirituum generationem: quia denique in atrophia non alitur pars, viuit tamen per huius facultatis influxum. Nos cum Aristotele vitalem à vegetante non distinguimus, sed duplicem eum doctis viris in vegetabili facultate operationem agnoscimus: prior est, in solidum alimentum ad spermaticarum & carnosarum partium restaurationem, posterior in circumstantem aërem & sanguinis vaporem, ut exhausti spiritus reficiantur: in plantis itaque & imperfectis animalibus, quorum partes aqueæ sunt, & terrea, circa liquidum & solidum tantum alimentum versatur vegetans; in perfectis verò & calidissimis animalibus, qui spiritibus abundant, triplex alimentum versat, immutatque solidum, humidum spirituosum eadem facultas: & quia aërea continuo dissipantur, perenni etiam cordis motu & spirituum generatione est opus. Referatur itaque vitalis ad vegetantem & nutricem. Galenus tamen vitalem à naturali distinxit, quod videatur aliquid peculiare habere, præter communem nutritionem, quæ assimilatione perficitur, cum tamen reuera non distinguantur. Est enim spirituum generatio coctionis quædam species, & spiritu vitali, tanquam alimento, reficitur substantia partis aërea, ut potu liquida, & cibo solida. Vtrum autem vitalis & pulsifica distinguantur, querunt quidam. Ego pulsificam vitali inservire & famulari existimo, distinguique functionibus & latitudine subiecti. Pulsificæ munus est pulsare; vitalis verò spiritus procreare: vitalis vires suas in omne corpus exercet. At pulsant tantum arteriæ & cor; vitalem tamen & pulsificam confundunt Medici, quod vita non nisi per pulsum dignosci queat. Dum verò Galenus 3. De locis affectis, & libr. De placitis Hippocrat. & Platon. cor irascibile, & hepar concupiscibile facultatis sedē assignat, per concupiscibilem non intelligit appetentiam, quæ feratur cum apprehensione in obiectum, sed appetitum naturalem ad alimentum, qui licet singulis partibus insitus est; iecori tamen, hæmatoseos officina præcipue tribuitur. Irascibile autem dum in corde locat, non existimat melle peculiarem quandam animæ vim, sed quia copiosior cordis calor, ad iram procliuiores nos reddit.

Conferatur vitalem cum celesti vi.

Ad quam facultatem vitalem sit referenda. Non ad sentientem eius. Non ad mouentem.

Referitur ad vegetantem, & quomodo.

Duplex vegetabilis operatio.

Cur Galenus vitalem à naturali distinxerit.

An vitalis à pulsifica distinguatur.

Explicatur Galeni de irascibili & concupiscibili.

Motus cordis
causa obfus-
cissima.

Motus cordis
duplex.

Aristoteles
opini de mo-
tu cordis.

Conuoluitur
Aristoteles.

Opini Au-
er-
rois de cordis
motu.

Conuoluitur
Auerroes.

MOVERI cor viscus nobilissimum nemo unquam, nisi amens et mente captus negabit. Viuente enim animali si manam ad leuam papillam admoueas, perpetuum cordis motum deprehendes. Sed per omnes illius motus natura et causa tot tantisque difficultatibus involuta est implicata, ut soli Deo et Natura cognita existimari doctissimus Fracastorius. Ego motus huius naturam non minus admiratione dignam puto, quam Euripi angusti in Euboea freti septies inter diu nocturne stato tempore restia; cuius causam dum in Chalcide exsulare Aristoteles, cum reddere non potuisset, merore contabuit, et mortuus fertur. Nos quid de motu cordis sentiamus, paucis aperiemus. Cordis motus apud Galenum duplex est, naturalis unus, deprauatus alter. Naturalis 6. De placit. proprie pulsus dicitur, deprauatus vero *παλμος*, seu palpitatio. Ille manat à facultate, hic à causa morbifica. Illum actionem cordis, hunc passionem et affectum vocat. De naturali et proprio motu, qui diastole, systole et quiete gemina perficitur, hic disputatio instituitur, non de palmo, cuius causas obscurissimas perscrutari libet. Aristoteles motus cordis unam agnoscit causam, calorem scilicet: quia verò durante vita semper fertur humidum ad cor semperque accenditur, fit ut perpetuo dilatetur, deinde concidat. Libello De respiratione, tria docet cordi accidere, salium, pulsus, et respirationem; pulsus à sanguinis ebullitione fieri vult, qui effervescentis maiorem locum occupat, sinus implet, et distendit. Fraque distendi cor à calido, deprimi autem et contrahi frigidi aeris impulsu vult Aristoteles. Id aequali-
lustrat exemplo. Tumes aqua effervescentis et ampliore occupat locum; insufflato autem frigidiore aere, decumescit. Sic iuuenum quam senum, dormientium quam vigilantium, sanorum quam agrotantium, pulsus vegetiores validioresque sunt, quia vehementior calor, maiorque sanguinis feror. Hec Philosophus; que multis probabilia et veri specie quadam adumbrata visa sunt, praesertim Turisano; sed nobis medica statera singula metuentibus erroris plena. Errat in eo Philosophus, quod velit distendi cor, quia impletur; Medici contra, impleri cor censet, quia dilatatur. In deprauato quidem motu, ut palmo, distenditur, quia aut aqua, aut aere impletur, sed in proprio et naturali motu diu ingenita vi dilatatur, sanguinem et spiritum haurit, atque ita impletur: sic fabrorum folles dum dilatantur, impletur aere; vitres verò dum implentur, dilatantur, ut sequenti Exercitatione fusius demonstrabitur. Galenum in eadem sententia fuisse, id est, à calido distendi cor, volunt quidam. Nam 1. De semine. Cor, inquit, velut flamma assidue mouetur. sexto De placitis, cap. 4. Sanguis qui è sinistro manat ventriculo spirituosus est et calidior, ut etiam conceptacula eius pulsare conspiciantur. et eodem libro cap. 6. Valde calidum est cor, iecur non ita calidum: si enim feruida illius caliditatis esset principium hepatis, pulsu carentes venas non haberet. Verum hec omnia calorem impellentem tantum esse causam non precipuam et primariam conficiunt, ut dicebat Aristoteles. Ut enim decipiuntur qui putant nutritionem fieri à solo calore, sicut sine co fieri non possit: ita errant qui à ferore solo motum hunc fieri volunt, licet sine co non fiat. Erasistratus, Heraclides, Erithreus voluerunt motum cordis ab animali simul et vitali facultate fieri. Auerroes cordis motum ab appetente et sentienti anima manare existimat. Cor scribit machinam esse, et organum quo appetitus ad motum utatur. Cum enim in omni voluntario motu, ut docet Aristoteles 3. De anima, et Galenus libris De motu muscul. necessarium sit ut altera pars quiescat, altera moueatur, et in organo motus aliquid sit conuexum quod moueatur, aliquid concuum, cui pars mota inimitatur, cor illud organum esse contendit, et voluntario motu cieri vult. Sed misere allucinatus est Auerroes. Motus namque voluntarium et sedare dum sit, et excitare quiescentem possumus cap. 5. libri 2.

De motu musculi: tardiozem & velociorem, rariozem & frequentiozem motum facit. *Obiectu.*
 & αἰπέτος: at cordis motus in nostra potestate non est, ut nobis pareat. Quinetiam qui à
 sentiente anima concitatur motus nunquam est sine apprehensione & cognitione: talis
 autem non est cordis motus. Dices pro Auerroe, Galenum pulsus appellare interdum actio- *Solutio.*
 nem liberam: erit igitur arbitraria. Sed vide quid libertatis nomine audiat Galenus. Libe-
 ram actionem vocat pulsus, quæ suo impetu ducitur, non arbitrio nostro, quæ sponte sua per-
 fitur, non nostra. Sunt qui cor à natura sola moueri putent, quod hæc secundum Philosophos, *Opinio seria.*
 ἀρχὴν ᾧ τῆς κινήσεως, id est, principium motus, in iis, quæ moventur. Alij distensionem cor- *Quarta opi-*
 dis ab anima fieri volunt, contractionem verò à sola natura, concidentibus scilicet suo pon- *nio.*
 dere & depressis parietibus cordis. Nam inclinatione ponderis grauiæ concidunt, eriguntur
 à causa meliore sic in tremore facultas brachium attollit, grauitas deprimat. Sed non est tre- *Consuetudo.*
 mulus cordis motus, nec contractionem parit grauitas cordis: sit enim per contractionem, fu-
 midorum vaporum in venosam arteriam, & vitalis spiritus in aortam exclusio. Ergo in
 contractione robur, non imbecillitas. Ita de causa huius motus varij varia sent philosopha- *Opinio nostra.*
 ti. Nos quid sentiamus audacter profitebimur. Sunt autem stabilienda prius & iacienda
 nobis hæc fundamenta. Motus apud Galenum triplex, violentus, animalis & naturalis.
 Violentus nullus est perpetuus, sique opponitur qui secundum naturam est. Animalis omnis *Quid violentus*
 voluntarius est. Eum autem describit eleganter Galenus cap. 5. lib. 2. De motu muscul. Si *motus.*
 quæ fiunt, sedare potes cum vis, & quæ non sunt, facere, motus is voluntarius dicendus: Si *Quid anima-*
 præterea celerius aut tardius, crebrius aut rarius ea facere potes, actionis hæc voluntati ser- *lis.*
 uunt. Naturalis motus multiplex est, ut naturale multis modis dici potest. Est naturalis *Quid natu-*
 motus simplex, qui à sola natura & forma elementari perficitur: eo motu grauiæ deprimun- *ralis.*
 tur, leuiæ in sublime attolluntur. Secundò, naturalis dicitur motus à Galeno, quicumque vio- *Naturalis*
 lento opponitur: sic musculorum motus licet voluntarij, interdum naturales dicuntur, si κα- *quæ modis*
 τὰ φύσιν se habeant. Tertiò, naturalis dicitur motus, quicumque animalis, id est, volunt- *dicatur.*
 arius non est. Sic capite 5. lib. 2. De motu muscul. cordis & arteriarum motum non vult esse
 animæ, id est, voluntatis opera, sed naturæ: & cap. nono libri 7. De usu partium, cordis mo-
 tum vult à natura esse, thoracis ab anima. Sic dum Galenus duo tantum statuit facultatum
 genera, naturalem & animalem; naturalem intelligit eam omnem quæ voluntaria non est,
 & ea ratione vitalem sub naturali comprehendit. His ita constitutis, dico motum cordis na-
 turalem esse tertiâ acceptione, id est, nec à voluntate pendere, nec à natura simpliciter, sed à
 facultate animæ vitali, quæ naturalis est. Non à voluntate, quia hunc motum nec cohibere,
 nec excitare possumus pro voluntatis imperio. Non à natura simpliciter: nihil enim mouet in
 corpore animato, nisi anima, alioqui plures essent formæ, & plura prima: quod vera & soli-
 da Philosophia non patitur. Anima ipsi animali natura est, quæ ad unionem cum corpore
 seruandam mouet cor, coquit in ventriculo, recogit in iecore, perficit in venis. Est ergo
 naturalis cordis motus, id est, à naturali facultate animæ, quæ voluntaria non est. Esse autem
 naturalem hunc motum, causse omnes demonstrant. Tres sunt pulsus continentis causse, effi-
 ciens, finalis, instrumentaria: at naturales omnes sunt. Efficiens facultas est vitalis, quæ tota
 in spirituum generationem incumbit: generat autem spiritus eo perenni motu: nam in dia-
 stole sanguinem & ærem trahit, in systole & spiritus & spirituum excrementa pellit. Finalis
 causa (quam siue usam siue necessitatem voces, nihil interest) triplex est, nutritio spirituo-
 se substantiæ, quæ in sinistro cordis sinu stabulatur, temperatio eiusdē, (periculum enim erat
 ne cor ob perennes motus accenderetur, nisi ære velui flabello ventilaretur) & fumidorum
 vaporū expurgatio. Instrumenta huius motus naturalia sunt, non animalia: animalia organa
 vocat Galenus musculos & nervos; cor musculus non est, nisi κατὰ ἀξίον, densitate
 & colore carnis. Nervi nulli ad cordis sinus feruntur. Est quidem exilis admodum in peri-

cardio & basi cordis nervulus à sexta coniugatione, quæ recurrentem parit exortus, sedes ad motum non indiget cor. Intercepto enim hoc nervulo, aut saltem eius principio, quod ad latera aspera arteriæ visitur, nihilominus mouentur cor & arteria, ut sepe in canibus sumus experti. Cum itaque cordis motus causæ omnes sint naturales, naturalem esse hunc

Contenditur
naturalem non
esse motum,
§. actio 1.
Solutio.

2. Obiectio.
Solutio.

Tertia.

Solutio.

Obiectio.

Solutio.

Anima vi-
ta vere pro-
fit.

Motum cor-
dis manere à
facultate.

motum, & à facultate vitali, quæ voluntaria non est, manare concludimus. Vt autem conclusionis huius veritas clarius elucescat, diluenda sunt quædam, quæ rudiorum animos remorari possent. Naturalis (aiunt quidam) omnis motus continuus est: at motus cordis quæte gemina intercisus est. Admittamus naturalem, si unicus sit & simplex; continuum esse, sed ubi duo sunt motus, hi quæ contrarij, intermedia quiete est opus. Obiciunt secundo, naturalem nullum motum compositum esse, cordis autem motum esse compositum. Dic motionem cordis non esse compositum, sed duos esse cordis motus, non unum, quia ex duobus contrariis motibus, non potest unus motus confici, neque ex motibus fit motus, ut ex lineis figura. Tertiò id nobis obtrudunt. Quicquid à natura mouetur, propter finem mouetur; quem si semel adeptum fuerit quiescit, Aristoteli 7. Metaphys. sic aqua calefacta; ut & forma propria refrigeratur, & ab eadem formâ nunquam incalcescit. Si cor naturaliter mouetur, ergo dilatetur, aut contrahatur: dilatatum cur constringetur, aut contractum cur dilatabitur? Responde, verum id esse in motu purè naturali. At motus cordis ab anima est, à vipsulsi- ca, quæ naturalem habet cognitionem vsus sui, & secundum varios appetitus variè cor mouet. Dum enim contristum est cor, appetit dilatari, ut frigidum aërem hauriat: dum distentum est, appetit constringi, ad expulsiōem fuliginum, ita diuersis motibus urgente vsu, mouet perpetuo cor vitalis facultas: in quo distinguitur motus iste cordis ab alijs naturalibus animæ motibus, uteri quippe & ventriculi. Harum enim partium motus non sunt perpetui, quia obiectum non adest perpetuum, non urget necessitas: finalis causa semper præsto non est, cor diuò obiectum sese offert continuum. Indiget cor perpetua nutritione, temperatione, expurgatione. Postremo, naturalem non esse cordis motum contendunt, quod fiat ad opposita: At oppositi motus à sola facultate animali eduntur; sic brachium sursum, & deorsum à sola voluntate mouetur. Sanè unicus quidem & simplex motus est in inanimatis, sed animatis omnibus etiam plantis conuenit motus ad opposita, quinimo nunquam animæ conuenit vnus motus, quin ei statim non insit contrarius: ut in nutrice facultate, attractio alimentii ab anima est; expulsio ab eadem. Anima sanè adeò diuina res est, ut non solum multa faciat præter aliarum formarum leges, verum etiam contrariorum auctior esse queat. Mouet enim sursum, deorsum & præter elementorum naturam omnem dextrorsum, sinistrorsum & circulariter. Terræ motus unicus est, anima multiplex: quia terræ forma vna, simplex, simpliciter est anima simplex, multiplex, multipliciter simplex, essentia, multiplex potestate, multipliciter obiectorum cognitione à quibus eliciuntur actiones. Sit hoc igitur ratum, motum cordis naturalem esse, & à vitali facultate manare propter finem. Manare à facultate & vi quadam anima duo hæc demonstrant; primum, quod in diastole determinatus sanguis & aër trahuntur per eadem perpetuò & definita vasa: in systole fuliginosus aër & spiritus per certa vasa trahuntur: deinde quia cordis caro omni villorum genere texta est. Si itaque alibi contrahunt, trahunt, relaxant, aut hinc erunt superflui, aut eandem præstabit vsu. Dixi, propter finem; quia facultas hæc neque agit & cupit, ut animalis, neque pro ratione potentie agentis ad passum, sed ratione necessitatis tantum. Ventriculus nulla urgente fame tantum coquet alimentum, quantum ingeres, & quantum poterit. At cor non nisi urgente necessitate mouetur, pulsus nunc celeriores, nunc tardiores, prout augeatur vel minuitur vsus, efficiens.

Quomodo moueatur cor, & an in sua systole aut diastole
percutiat pectus. QVÆST. VIII.



ACTENVS motus cordis causam obscurissimam videor patefuisse: nunc motus illius modum & rationem, quam docuit me aut o-
la, explicare aggredior. Cordis duo sunt motus, diastole & systole, Motus cordis
duo.
quos intermedia quies excipit, eaque gemina, altera quæ distentionem,
altera quæ contractionem sequitur. Non enim immediate succedunt si-
bi duo motus contrarij, sed quicquid mouetur, in puncto reflexionis ne-

cessario quiescit, quod Aristoteles hac ratione demonstrat. Omne mobile in eo puncto necessa-
rio quiescit, quo vititur pro principio & pro fine, & ad quod ita accedit, ut ab eodem dis-
cedat: Atqui omne quod mouetur motu reflexo, vititur puncto reflexionis pro duobus, prin-
cipio inquam & fine, idemque necessario ad illud punctum reflexionis accedit & ab eodem
abscedit: omne igitur quod reflexitur, in puncto reflexionis quiescit. In diastole trahit cor
sanguinem per vene caue ostium in dextrum sinum & aerem per arteriam venosam in
sinistrum. In systole, pellit cor vitalem spiritum in aortam & fumidos vapores cum spiri-
tus portiuncula in arteriam venosam. In diastole corrugantur & contrahuntur cordis ex-
trema, basi quippe ad mucronem & mucro ad basim rapitur. Itaque breuius quidem quo
ad longitudinem euadit cor, sed eius latera omnia ita amplificantur, ut figura hac ad spheri-
cam omnium capacissimam accedat proximè. In systole cor à distenduntur cordis extrema,
sed latera subsident & quasi flaccescunt, tuncque longius quidem, sed angustius euadit cor.

Quies necessa-
rio motus con-
trariis excipit.

Quid agat cor
in diastole.

In systole
quid agat cor.

Vterque motus villorum editur opera. Rectius enim a basi ad mucronem productis sese con-
trahentibus sit dilatatio; transuersis verò seu circularibus latera omnia arclantibus con-
tractio: obliqui ad retentionem & quietem geminam sunt comparati. In diastole, value
omnes extenduntur, qua distentione tricuspidēs multas velut rimas efficiunt, semilunares
autem vasorum suorum extrema claudunt. In systole contrahuntur omnes membranule,
tuncque tricuspidēs eas rimas claudunt, quas dilatata efficiebant; semilunares verò corruga-
te fissuras committunt, per quas liberè egreditur sanguis. Distentio cordis tempore prior
est constrictione: primum enim trahitur aer quàm eius fuligo excludatur: quinetiam ex
Aristotelis doctrina oportet primam esse inspirationem, quia vita cessat expiratione. An
autem inspirationis maior sit quàm expirationis necessitas, querunt quidam. Nos in sanis
parem esse viriusque necessitatem volumus; in febricitantibus praesertim, qui putrida febre
laborant, maiorem expirationis: propterea morientium systole & exspiratio maior est in-
spiratione; quia natura magis est diligens ad exclusionem noxij, quàm ad tractionem viti-
lis. Aer qui inspiratur cordi est consociatus fuligo quæ extruditur natura molesta est. Cate-
rùm cum ad laeuam inclinet cordis mucro, & si mamma sinistrae manum admoucas, per-
sentitur ibi cordis motus, hoc unum superest inquirendum, an in sua contractione percu-
tiant pectus, an contra in distentione. Galenus hac in re non satis sibi constare videtur. Nam
libello quodam De pulsibus percussit pectus a mucrone cordis dum contrahitur putat. Sunt
autem hac illius verba. Contingit autem ita, quandoquidem ex pulmone attraxe-
rit spiritum repletum vndique ipsum ad latera incedere & multum spiritum a
pectore auferre: quando verò rursus euacuatum fuerit cor, & in naturalem fi-
guram recurrerit, tunc profilit pectori & percussione facit, & ita concidēs pul-
sum perfacit. Auctoritati fauere videtur ratio hac. Dum distenditur cor, breuius euadit,
dum contrahitur, longius fit; Ergo dum distenditur recedit à pectore, dum contrahitur, ac-
cedit ad pectus, illudque percussit. Dicunt ferè omnes Anatomici, cordis carnem in mucrone
solidiorem esse quàm in basi, ne in violentis motibus pectoris os contingens, à quo non longè

Distentio vtrius-
que contractio-
nis prior est.
Inspirationis
tunc maior
quàm expira-
tionis neces-
sitas.

An cor in sua
dilatatione
percussit pec-
tus, an in co-
tractione.
Percussit pec-
tus in systole.

Ratio 1.

Ratio 2.

Contraria opi-
nia, percussio pec-
tus in diastole.

Ratio prima.

Obiectio.

Secunda ratio.

Authentici-
tes Galeni.

abest facile laderetur, atque ita sui motus concentum & perennitatem vitare cogeretur; mucrone ergo percutitur pectus. Hæc aliquando probabilior mihi visa est opinio, sed paulò accuratius singula evolvens, & Francisci Rosselli Hispani Barcinonensis Medici doctissimi & in re Anatomica peritissimi eleganti & docta quam ad me scripsit epistola admonitus, mutavi consilium, & in diastole potius quam in systole percuti pectus nunc constanter assevero. Rationum momenta hæc sunt. Si manus altera pectori, altera carpo admoveatur eodem tempore, utrobique similis ictus percipietur. Hoc & Galenus annotavit terio de presagitione ex pulsibus, cap. 3. & nos in viventibus animalibus sæpe sumus experti. At certissimum est ictum arteriarum in fine dilatationis fieri, non enim contractionis finis sentitur. Ergo ictus ille cordis finis erit dilatationis, non constrictionis. Dicent adversarii dissensientis arteriis contrahi cor, & contracto corde dilatari arterias; si ergo admota manu aut carpo, aut temporibus ictus arteria percipitur, & altera manu pectori admota idem ictus percipitur, necesse est tunc contrahi cor, cum distenduntur arterie. Sed huius opinionis levitas sequenti Exercitatione demonstrabitur. Eodem enim tempore & eodem motu distenduntur cor & arterie. Preterea, si contractum cor suo mucrone pectus percuteret, non perciperetur ictus circa sinistram mammam, sed paulò infra; cordis enim mucro ad eam usque partem pectoris pertingit, in quam septum transversum inseritur. Pulsus ergo pectus non mucrone, sed sinistro ventriculo distento, qui arteriarum principium est: dum enim mucro ad basim rapitur in diastole, amplius redditur cor, & ita pectus percussus versus mammillam sinistram; dum verò contrahitur, cor longius euadit angustiusque: & ita à pectore recedit. Hæc est Galeni sententia septimo De Anatomicis administrationibus. Confert (ait) in animalibus cor denudare; primò ut quomodo pulset conspiciamus, & nū quando attollitur thoracem feriat pectoris ossis regionem accedens. 6. De versu partium, cap. 2. Existimant quidam cor non in medio exquisitè situm esse, sed magis ad lævam inclinare, decepti eo quia ad sinistram mammam sentitur sinistri ventriculi pulsus, qui illic situs est omniumque arteriarum est origo. Videtur ergo Galenus indicare, cor in sua distensione pectus percutere, non in constrictione, id est, dum dilatatur cor, ferire pectus, sinistro illius ventriculo latè explicatio. Reliqua quæ ad cordis motum spectant sequenti Quaestione explicabuntur.

Aqua vi moueantur arteriæ.

QVÆST. IX.



Primus
Hippocrates
pulsus autem
est.

Itaque quæ-
res quibus
doceatur Hip-
poc. pulsus
non ignorare.

ARTERIAS à sinistro cordis sinu derivari, eique continuas esse cum Medicis statuunt Peripatetici. Earum autem continuum & perennem motum nemo inficiabitur, si aut carpo aut temporibus manum admoveat. Hunc motum primus omnium Hippocrates σφυγμόν, id est, pulsum appellavit, ut scribit Galenus 1. De differ. pulsuum, & licet ante σφυγμῶν non excoluerit, nec descripsit summus Dictator, eam tamè penitus non ignoravit, ut clamitant inniorum quamplurimi. Nam 1. πῶς ζωακίαν σφυγμῶν describit puerperarum, quibus à partu puerperia non respondent. σφυγμοί, inquit, ῥαγεῖ, ῥαγεῖ ὄρεσι, ὄρεσι, ὁμοτε αἰεθμοί, ὁμοτε λιπόντες, id est, pulsus molles sunt aliquando celeres, qui attolluntur nonnunquam deficiunt. Et 2. libro: σφυγμοί πῶς γὰρ ψαίροντες, id est, pulsus leuiter manum ferientes. libro 4. Epidem. ἐν τοῖσι ὄρεσι τοῖσι τὸν πυρετὸν οἱ σφυγμοὶ πικρότατοι καὶ μέγιστοι, id est, in acutissimis febribus pulsus sunt celerissimi & maximi. Eadem sectione: σφυγμοὶ ποικίλοι καὶ νοθεῖ, pulsus tremuli & tardi. In Coacis prænotionibus lethargicorum pulsus ita describit: οἱ λεθαργικοί πῶς γὰρ μετὰ σφυγμοῖσι νοθεῖσι, id est, lethargici mani- bus con-

bus contremiscunt cum pulsu effero & languido. libello De alimento, De humoribus, & 2. De morbis pulsus, morbi & sanitatis signa dicuntur. lib. 4. Epidem. Zoilo σφύρμιος ποικίλος καὶ ῥαβδός, pulsus tremuli, tardi, septimo Epidem. in Pythodori Θεοδωρίου uxoris historia meminit pulsus velut cuiusdam magni signi. Sape etiam nomine spiritus pulsum indicauit, ut eodem libro in historia filij Eali. Spiritus, ait, ad manum malus, non densus, neque magnus. Et in historia Theodori, erat ad manus frigidus corpus arteriarum. Pulsus ergo qui ad motu manu percipitur non ignorauit Hippocrates, & primus arteriarum motum pulsum appellauit. Huius motus eadem est que & cordis motus ratio: constat enim diastole, systole & quiete gemina. In diastole trahunt & implentur arterie, in systole expellunt. Contrarios hos motus gemina excipit quies: non enim sibi succedunt immediatè contrarij duo motus natura naturaliter agent. Dixi, naturaliter; quia irritata natura ab obiecto violento, aut à causa externa, nihil prohibet sine quiete aut saltem insensibili moueri arterias, ut in pulsu dicuto & vibrante. Sic lapis vi sursum proiectus, si corruentem turrim inueniat, sine quiete descendere creditur, licet contrarium velit Aristoteles. Pulsationis huius duplex est usus, maior & minor; maior, ut conseruetur natus calor tum cordis, tum aliarum partium. Nam per contractionem quicquid humidum est exprimendo elidunt arterie, quo fit ut calor insiti suffocatio inbibetur; per dilatationem, externum aërem in corpus trahunt, ut hinc caloris dissolutio probibeatur. Minor usus est ut in cerebro generetur animalis spiritus; fertur enim per pulsum vitalis spiritus in plexus choroideos. Eosdem ergo præstati usus, pulsus & respiratio: sed quod respiratio præstat cordi; id pulsus arteriarum reliquis partibus, que vi minori calore indigent quam cor, ita tardius leduntur: priuatum namque cor respiratione, statim extinguitur animal, at si pulsus destituatur pars, non statim emoriitur. Huius arteriarum motus natura obscurissima est, que vi illustrior reddatur multa inquirenda sunt. Primum à quo moueantur arterie, an à seipsis; an ab alio. Voluit Praxagoras arterias sponte sua pulsare & perinde vi cor vim habere σφύρμιον ἴσταιν, non aliunde influentem; sed Galenica obseruatione cum manifestè conuelli. Si, inquit, arteria tranuersim secetur, pars cordi continua pulsabit tantum, quæ verò à corde seiungitur pulsu priuabitur. Fuit Erasistrati opinio, moueri arterias non vi propria, sed ab impulsu cordis; impulsus autem intelligit, non facultatis, sed materie solius. Aristoteles moueri arterias putat ob sanguinis contenti ferriorem; quem sequitur Turisanus hac ratione ductus, quod tenuissimi spiritus impetum faciant, quod vena cordi continua idè non moueantur, quia vitalem spiritum & feruidissimam sanguinem non continent. Idem voluit Athenæus. Sed neq; calor, neq; spiritus, neque sanguis feruidissimus proxima est & immediata perennis huius motus causa. Calor enim vel est corporeus vel incorporeus. Si corporeus, arterie quò magis cordi erunt proxime, eò citius dilatantur. Si nuda tantum est qualitas, propinqua prius quam remota calefaciet. Calor namque non est ex numero earum formarum quæ momento diffundi possunt, vi lumen, sed ei opponitur frigus, quod prius à subiecto expelli debet, quam ipse recipiatur. At momento vi illa σφύρμιον fertur in omnes arterias: non ergo à calore solo: nec à sanguine spumoso; quia ubi copiosior calidiôrque sanguis ibi frequentior & vehementior pulsus. Arteriarum ergo insignium pulsus frequentiores essent quam arteriolarum: sed eodem motu moueri arterias omnes & maximas & exiliores, nisi quid impediatur, experientia docet. Non itaque à contento sanguine mouentur. Quinetiam si obsruatur aut intercipiatur vinculo arteria, pars infra ligaturam spiritu & tenuissimo sanguine turgens, non pulsabit, quia intercipitur facultatis cum corde continuitas. Sed etsi in arteriam immittatur fistula & comprimat arteria, non pulsabit, etiamsi humore & spiritu sit plena. Si item vinciat arteria, subito cessabit pulsus, soluta verò statim redibit; calor verò & humor non possunt à corde momen-

Pulsationis
usus duplex.

Pulsus & re-
spiratio in idè
usus.

A quo moueantur ar-
terie.
Praxagora
opinus de mo-
tu arteriarum.

Erasistrati
opinio.

Aristotelis.

Athenæi.
Censellurus.

Rati L.

Secunda.

Tertia.

Quarta.
Quinta.

Sexta.

tò in extremas arterias meare. Accedit quod si à contento sanguine pulsarent arterie, in anni pulsus magnitudine adesset vehementia. At Galenus libro De usu pulsuum, & 4. De causis pulsuum, scribit dari pulsus paruum sed vehementem, dari magnum sed languidum, quæ varietas à calore non potest fieri. Asclepiades in arteriarum motu facultatem aliquam agnoscit, sed cùm motus hic distentione & contractione perficiatur, distentionem à sola facultate fieri vult; contractionem verò à natura, id est, à predominante elemento, & à pondere, quoniam animali demortuo concidunt arteriæ. Sic vires si implantur à quodam, distenduntur, concidunt verò ex sese, & corpora omnia rotunda ac cana cùm dilatantur à facultate aliqua, dimissa postmodum suarum partium gravitate, constringuntur; contrà, quæ contracta sunt ab aliqua facultate, cùm dimittuntur, dilatantur. Ergo si arteriæ dilatantur à facultate, sua gravitate constringuntur & contrà, propterea non indigent facultate ad utramque.

Herophilus opin.

Herophilus contrà vult contractionem fieri à facultate, dilatationem autè putat reditum esse arteriæ in naturalem situm: Quia, ait, arteriæ cadauerum cùm à nulla anime facultate dilatari possint, etiamsi in aquam calidam proiectæ fuerint & eam caloris gradum receperint quem in viventibus habebant, non concidunt, sed semper dilatata manent. Sed errant ambo & Asclepiades & Herophilus. Si enim uterque motus diastoles quippe & systoles non esset facultatis opus, sed à sola arteriæ constitutione fieret, semper eandem magnitudinem seruaret arteria eandemque illius vehementia: at modo maior modo minor fit pulsus, prout valide sunt, aut debiles vires, interdum systole, diastole maior est, & contrà, prout augetur diastoles aut systoles usus. Sunt qui à cerebro arteriarum motum manare contèdunt, unica Galeni autoritate nixi. Cùm (inquit 2. de causis pulsuum) in aliquo incipit fieri pulsus conuulsiuus, confestim cotripit ipsum conuulsio.

Aliorum opin.

Quod indicare videtur eandem esse originem huius facultatis, atq; illius ad quam pertinet conuulsio. Sed eiusdem Galeni observatio huius sententiæ vanitatem conuellit. Si enim cerebrum comprimatur peribit motus & sensus, arteriæ autem pulsabunt. Si nervus secetur, aut intercipiatur qui à cerebro ad cor fertur, obmutescet tantum animal, non cessabit arteriarum motus. Cùm itaque nec vi propria pulsant arteriæ, nec à forma elementari, nec à calore solo, nec à spiritu & sanguine spumante, necesse est ut à facultate cordis pulsatili moueantur. Si enim ab alio quàm à facultate mouerentur, violentus esset, non continuus earum motus, nullàque in diastole fieret aëris attractio, quia efferuescens sanguis locum omnem occuparet. Hæc autem vis & facultas pulsatilis momentò fertur, non per cana, sed per tunicas arteriarum. Momentò ferri id indicat, quod omnes arteriæ simul & semel eodem motu agitantur quo cor. Obiiciet Gal. ni autoritatem primo De differentiis pulsuum, & secundo De præcognitione ex pulsibus, ubi de eis loquens qui corde sunt calido & arteriis frigidi, in quibus partes arteriæ cordi propinquiores dilatantur prius, deinde remotiores, cogitur asserere facultatem pulsificam per arterias paulatim & tardè moveri. Respondebo influere momentò, nisi quid impediat. Impeditur autem vel suo, vel organorum vitio: suo, dum debilis est calor; organorum, dum arteriæ frigide sunt, molles aut obstructæ. Influxit itaque momentò non per cana, sed per tunicas. Experientiam profert Galenus, libro Quod sanguis in arteriis contineatur, cap. ultimo. Si calamus in arteriam mittatur, etiamsi totus canalis obtineretur, non minus pulsabit arteria: at si filo aut laqueo premantur tunica, cessabit illico pulsus. Obiiciet fortasse quispiam, non moveri arterias vi à corde manante, sed à spiritu; quia prius mouentur arteriæ quàm cor; in fœtu enim prius pulsant arteriæ quàm cor, ut Quæstione 27. libri octauo confestim. Sed facilis & expedita responsio est; moveri scilicet arterias vi à corde matris manante, quia continuæ sunt fœtus & matris arteriæ.

Opinia nostra, moueri à facultate cordis pulsatili.

Facilis facultas momentò fertur. Obiecta.

Solutio.

Pulsatilis facultas per tunicas fertur non per cana arteriarum.

An dilatato corde dilatentur arteriæ; aut contrà, dilatato corde
constringantur arteriæ. QVÆST. X.



BSCURIOR nunc & scopulosior exurgit difficultas; An eodem motu moueantur arteriæ & cor. Ad cuius explicationem illud in primis pro rato statuendum, impleri arterias dum dilatantur, vacuari verò dum constringuntur, trahere dum dilatantur, expellere dum coarctantur. Ratio in promptu est. Eo enim motu trahunt vasa quo fiunt ad recipiendum paratissima; sed vasa quo sunt ampliora, eo plus capiunt, amplitudinem verò comparant dilatatione. Ergo dum dilatantur arteriæ, trahunt & implentur.

Ar. eodem modo mouetur arteria, & cor. Arteria implentur dum dilatantur.

ut audiendus non sit Archigenes qui in systole impleri arterias & trahere, in diastole vacuari & excludere voluit; hac ratione ductus, quod labiis angustatis & contractis naribus fiat inspiratio. Vtrum verò hæc arteriarum diastole cum cordis dilatatione simul & semel fiat, valde est controuersum. Primus Erasistratus contrarium cordis & arteriarum motum esse voluit, dilatato quippè corde constringi arterias; coarctato corde distendi arterias putat, quem sequuti sunt neoterici, Fernellius, Colubus, Cardanus, Scaliger. Potest hæc opinio auctoritatibus & rationibus confirmari. Scribit Galenus c. 1. lib. De pulsibus ad tyrones facultatem vitalem mouere diuersis motibus, eodem tempore diuersa mobilia, quod de cordis & arteriarum diuerso motu intelligi debet. Auicenna fen prima, primi, cap. 4. doctrina 6. vitalem facultatem simul constringere & dilatare affirmat. Rationes sunt: In diastole trahit cor sanguinem per venam cauiam in dextrum sinum, & aërem per arteriam venosam in sinistrum; Ergo tunc temporis impletur cor & deplentur vasa: contrà, in systole expellit cor vitalem spiritum in arterias. Ergo tum temporis vacuatur cor & implentur arteriæ. At dum implentur arteriæ, distenduntur; dum verò deplentur, concidunt. Distento igitur corde, contrahuntur arteriæ, & eodem contracto dilatantur. Præterea, eadem esse debet arteriarum & cordis, quæ cordis & auricularum ratio: sed certissimum est quod docet Auerroës, & videtur, diuersum esse cordis & auricularum motum; dum enim attollitur cor, subsident auriculæ, dum contrahitur cor, distenduntur & implentur auriculæ. Diuerso igitur motu agitantur cor & arteriæ. Tertiò, ut tractiones & expulsionones fiunt in aliis partibus; ita verisimile est in corde fieri: at dum pellit chylum ventriculus, trahunt mesenterij vene: Ergo dum pellit cor sanguinem & vitalem spiritum, trahunt arteriæ; ita motus contrarij sunt. Quariò, dum dilatatur cor, breuius redditur, arteriæque sibi continuas trahit ad sese, ideoque eas angustiores reddit; dum verò contrahitur cor, dilatantur arteriæ & longiores euadunt. Postremò, si manus altera pectori, altera carpo admoueat, similis ictus eodem tempore percipietur: at percussio pectoris fit à contractione cordis; dum enim contrahitur, accedit ad pectus, illudque percutit; dum distenditur, breuius fit & recedit à pectore, arteria autem percussio à dilatatione fit: Ergo diuerso motu mouentur cor & arteriæ. Nos contrà, eodem motu moueri cor & arterias cum Galeno lib. De usu pulsuum, 3. De presagit. ex pulsib. 6. De usu part. existimamus; experientiâ ipsâ primum edocti, mox rationibus validissimis persuasi. Experientiâ profert Galenus, quam in seipso quisque experiri poterit. Si manus vna pectori, altera carpo admoueat, sentietur utrobique similis ictus; & in viuorum animalium sectionibus similem nos cordis & arteriarum motum sæpe obseruauimus. Experientiæ fauent rationes hæc. Mouentur arteriæ, ut iam docuimus, non ab impulsu sanguinis, non à feruore, sed à facultate, eaque non propria, sed à corde manante: contrahuntur ergo à facultate cordis contrahente, & distenduntur ab eadem vi distendente: at si diuersis motibus mouerentur, sequeretur vni dilatantem à corde manare eodem momento, quo cor constringitur, quod bonus non admittet Philosophus. Præterea, ille motus idem est qui eandem habet & efficientem & finalem.

Coniunctur Archigenes.

Diuersum esse cordis & arteriarum motum. Auctoritas.

Ratiõ 1.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Opinio Aristot.

Experientia.

Ratiõ 1.

Secunda.

Tertia.

causam. Sed eadem est vis pulsatilis cordis & arteriarum, idem finis, nutritio quippe, temperatio & expurgatio. Tercio idem est motus totius & partis, & mota parte continui, moventur totum: at arteria cordis sunt continuæ. Ergo si à corde moventur, ut certissimum est, simul

Quarta.

& semel eodem agitantur motu. Quinetiam nisi simul arteriæ cum corde distenderentur, simulque contraherentur, non refrigeraretur cor in sua diastole; quia contractis arteriis, fieret fuliginis in sinistram sinum exclusio; itaque mutuo secum pugnarent cor & arteriæ, & frustra moverentur; adde, quod sequeretur in systole cor trahere ab arteriis distensum aërem.

Quinta.

Nam interdum sublato respirationis usu, ut in hystericis, cor à pulmonibus & arteriis renosa aërem non haurit; quia tunc aër nullus per os & nares inspiratur: micat tamen cor & pulsant arteriæ. Mouetur cor ad generationem vitalis spiritus, non fit generatio hæc sue aëris permissione: aërem ergo trahit ab arteriis non contractis; quia tunc fit expulsio fuliginum, sed distensis: at si dum distenduntur arteria, contrahitur cor; trahet ab arteriis distentis contractum cor, atque ita contrarii erunt motus cordis. Præterea facultas hæc incorporata est momento sese communicans. Quare quo tempore incipit dilatare cor, distendit omnes arterias, & contra. Postremo pulsus qui sunt in ira, tristitia, & pathemata satù indicant eodem motu moveri cor & arterias: nam si cum dilatur cor, contraherentur arteriæ, pulsus in ira parui essent, in tristitia magni, quia in ira cor parum contrahitur; ergo parum dilatari deberent arteria. Contra in tristitia, valde dilatari deberent, quia cor valde contrahitur, quod falsum est. Stemus igitur in doctrina Galeni, & distendi omnes arterias simul cum corde astruamus. Decepit viros doctos, qui contrariam tuentur sententiam, vasorum cordis structura, & motus cordis ratio obscurissima. Nam cum in cordis basi quatuor sint insignia vasa, vena cava, vena arteriosa, arteria venosa & aorta, existimarunt cor in sua diastole à quatuor vasis aliquid trahere, & in systole aliquid in ea quatuor pellere. Itaque in diastole cordis vacuari omnia, ut impleatur cor, & in systole cordis impleri omnia, quia depletur cor.

Sexta.

Præterea motus cordis & arteriarum efficientem causam videntur ignorasse, dum distendi volunt arterias & cor, quia aëre aut sanguine implentur: non enim dilatantur arteriæ, quia implentur; sed quia dilatantur, implentur. Sola vis & facultas pulsatilis à corde manans, arterias distendit, non sanguis contentus. Sunt enim siue distendantur siue contrahantur, perpetuo sanguine plene. Quod si quia implentur dilatari putes, non poterunt eodem momento distendi omnes; quomodo enim corporeus ille sanguis à corde ad pedis arterias momento ferri poterit? Proferam ad huius rei illustrationem exemplum perelegans. Folles fabrorum quia dilatantur, implentur aëre, & thorax quia distenditur à facultate animali, statim impletur.

Septima.

utres verò, saccus, crumena & quod pueri sepe ludentes faciunt suilla vesica, quia aut oleo, aut vino aut aëre implentur, distenduntur. Ex quatuor vasibus cordis sola arteria, quia distenduntur, implentur; reliqua tria dum implentur, distenduntur; dum vacuantur, concidunt: quia sola arteriæ motum habent systoles ac diastoles à facultate cordis, reliqua vasa immobilia sunt. Atque hæc ratio est cur contracto corde distendatur auricula sinistra. Quia auricula est velut promptuarium quoddam aëris & sanguinis derepentè irruentium, à qua dum trahit aut sanguinem, aut spiritum cor, necesse est, eam detumescere. His ita constitutis facile est obiectis in contrariam partem satisfacere. Auctoritates Galeni & Avicennæ sententia nostra non aduersantur; cor enim & arterias diuersa appellant mobilia, quæ eodem tempore diuersis motibus agitantur, dilatantur quippe & coarctantur simul & semel, ab eadem facultate vitali. Hoc autem à Galeno & Avicenna dictum puto contra veteres, qui distinctionem à sola facultate, contractionem à forma elementari & pondere fieri asserébant. Rationes ita diluendæ sunt. Non quia implentur arteria distenduntur, sed quia dilatantur implentur: non concidunt omnino arteriæ cum constringuntur, sed sua etiam caua retinent; & maior est materia copia quæ ab eis effluit quàm quàm ipsis recipitur: non ergo ab influxu materiae à corde

Conclusio.
Error recentiorum.

Non quia implentur, dilatantur arteriæ, sed quia dilatantur, implentur.

Exemplum
facillime.

Cur contracto corde distendatur auricula sinistra.
Obiecta in contrariam partem satisfacere.

Ratio prima diluatur.

egredientis dilatantur arterie. Secunda ratio nullius momenti est. Non enim cordis & auricularum eadem est ratio, nam auricula nihil expellunt, arteria plus eo tempore expellunt quā recipiant. Præterea auricula quia implentur dilatantur; cor verò & arteria quia dilatantur implentur. Hoc tacitè indicavit Hippocrates libello De corde. Cor, inquit, tota sua natura agitur, id est, facultate propria; aures verò priuatim tum intumescunt, tum concidunt, id est, prout aëre vel sanguine implentur, aut vacuantur. Tertiæ rationi ita satis fit, in cæteris partibus tractricem & expultricem insitas esse, in arteriis dilatationem & contractionem influere. Quarta leuam tantum contractionem, quæ in longum sit non in latum, indicat. Postrema experientie aduersatur, docuimus enim Quæstione octaua percuti pectus in dilatatione, ventriculo scilicet sinistro latè explicato.

Secunda.

Auricularis
& cordis motus dissimilis.
Tertia.Quarta.
Quarta.

De vitalis spiritus generatione, & per quas vias à dextro in sinistruum sinum feratur sanguis: QVÆST. XI.



ORDIS & arteriarum perpetuum esse, & similem omnino motum docuimus, motus causas obscurissimas patefecimus. Nunc, cum motum illum ad vitalis spiritus generationem à Natura institutum esse constet, postulat instituti nostri ratio, ut de vitalis spiritus generatione pauca quedam, eaque non trita, & peruulgata, sed è penitioribus & secretioribus Naturæ mysteriis eruta differamus. Dari in perfectis animalibus vitalem spiritum nemo adhuc, quod legerim, negauit. Hoc voluit primus omnium Hippocrates libello De corde, & αὐτὸ ἀρχαῖον: hoc mille in locis scriptum testatumque reliquit Galenus: hoc sentit princeps Arabum Auicenna: hoc denique vniuersa Græcorum & Arabum familia personat. Et ex neotericis licet quamplurimi naturalem & animalè expungant, vitalem tamen admittere omnes coacti fuere. Est ergo vitalis quidam spiritus, qui in sinistro cordis specu, tanquam officina & ἐργαστήριον primùm stabulatur, hinc per arterias tanquam tubos & aquæ ductus in vniuersum corpus excurret. Spiritus hic innatum singulæ partium calorem fouet, sopitum suscitât, delitescentem promit, exhaustum resarcit. Spiritus hic dum lumine suo fulget, & toto corporis theatro, pandit sese, cuncta perfundit gaudio, & partes omnes roseo suffundit colore; contra eodem retracto, intercepto, extincto, horrescunt omnia, liuent, intereunt. Tam mirabiles sunt & penè caelestes calidi huius & spiritus vires, ut diuinus Senex rudiorum captui sese accommodans (ut sæpe solet docente Galeno) animam appellauit libello De corde, id est, primarium animæ instrumentum. Γνωμὴν γὰρ (inquit) ἢ τοῦ ἀνθρώπου πνεύματος ἐν τῇ αὐτῇ κοιλίᾳ. Τρέφεται δὲ οὕτως σιτίοισιν, οὕτως ποτίοισιν ὡς τῆς γυναικὸς, ἀλλὰ κατὰ τὴν καὶ φωτωθεῖσαν πνευματικὴν γέγονεν ἢ ἐκ τῆς διαχέσιμος τοῦ αἵματος: hoc est, anima hominis in sinistro sinu est sita: alitur autem nec cibis nec potibus à ventre inferiore, sed purissima & illustri substantia, ex sanguinis discretionē: per animam itaque spiritum vitalem intelligit, qui purissimò & attenuato sanguine alitur, id est, reficitur. Vitalis huius spiritus diuini penè sunt usus & in corde & extra cor. In corde, ut præcipuum sit functionum cordis organum, & ut irascibilem vim conferuet. Extra cor usus duplex: alter, ut influentis à corde caloris subiectum sit; alter, ut sit animalis spiritus materia. Vitalis hic spiritus duplicem habet materiam, æream scilicet & sanguineam: sit enim, ut scribit Galenus 7. De placitu Hippocr. & Plat. ex aëre & sanguine simul mixtis. Ex aëre fieri docuit Hippocr. in Epidem. Qualis aër (inquit) tales & spiritus. Tempestas ὁμιχλώδης καὶ νεφελώδης spiritus gignit nubilosos & caliginosos: propterea Aphor. 3. sect. 3. νότοι βαρυκοοί, ἀχλωδέες, νωδποί, austri auditui graues, caliginosi, exoluentes. Aërea hac substantia sola, vitalem in corpore calorem con-

Dari videtur spiritum.

Spiritus vitalis vocat.

Hippocrates spiritum hunc animam vocat.

Duplex vitæ spiritus materia, ær & sanguis.

tinere non potest. Necessaria est itaque tenuissimi sanguinis permistio, qui aeris impetum cohibeat. Vtraque materia priusquam ad sinistram cordis sinum feratur preparatione indiget. Aer per os & nares inspiratus, in pulmonum vasis & tota eius substantia molli, rari ac spongiosa preparatur, & familiarem innato spiritui qualitatem longiuscula mora recipit; preparatus aer in pulmone, per arteriam venosam fertur in sinistram sinum. Hac aeris est preparatio, hi ductus, per quos in sinistram specum fertur. De sanguinis vero preparatione quo loco fiat, & per quas vias in sinistram cordis sinum deriuetur, maxima contentione certatur inter Anatomicos. Legi ego, & evolui multorum tum veterum tum recentiorum scripta, tandem quatuor hac de re omnino inter se dissentientes opiniones inuenio. Prima, eaq; antiquissima, Galeni est. Putat Galenus sanguinem per venam cavaam, quae patensissimo ostio hincit & adaperitur cordi, ferri in dextrum sinum tanquam cisternam, in ea coqui, attenuari, subigi, mox eius portionem per venam arteriosam ad pulmonum nutritionem distribuere, alteram per septum medium, quod velut interiectus paries utrumque sinum discludit, ferri in sinistram specum, ibi cum aere mistum vi cordis insita, eiusque innato spiritu & ingente caloris incendio, haud secus atque in fornace vitalis spiritus formam induere. Hanc Galeni opinionem, quae omnium est verissima, damnavit plerique ex iunioribus. Non enim fieri posse putant, ut iam brevi temporis spatio ea sanguinis copia, quae ad vitalis spiritus generationem requiritur, à dextro ventriculo in sinistram per septum medium excurrere queat, cum nulli appareant sensiles & aspectabiles ductus septumque ipsum crassissimum sit. Quinetiam non posse à dextro in sinistram sinum per septum ferri sanguinem sibi persuadent, quia irritus foret cordis labor: cur enim à sinistro in dextrum idem sanguis non remeabit, cum eadem pateat via, iidem sint ductus & ostiola nulla impediant? Sed leniora sunt haec, quam ut tanti viri auctoritatem labefactare queant. Sciebat Galenus non defuturos qui puerilia haec obiectarent. Quamobrem cap. 15. libri 3. De facult. natural. mentem suam eleganti & delibata oratione ita aperuit. Ex dextro sinu trahitur quod tenuissimum est per foramina septi, quarum extremos fines vix cernere licet, tum, quia in demortuis concidunt omnia: ferri autem per eos ductus sanguinem, hinc pater, quod Natura nihil temere unquam & frustra molitur: at foveae sunt in septo, & profundius quamplurimi, qui in angustum sensum terminantur: vult ergo Galenus foveas has in angusta foramina definire, per quae ἀποὸς ἔσθι magna copia sanguis feratur. Cur autem à sinistro sinu per eodem ductus non remeet in dextrum sanguis, causam refero ad peculiarem vim cordis; trahit sinister sinus eum sanguinem & retinet insita proprietate, coque aliquantulum frustur, tandem in aorta tubos pellit. Sic quia venarum tunicis excurrit sanguis, aut per earum oscula in partis substantiam effusus est, non remeant in venas: quia retinetur & in partis substantiam facescit. Huius opinionis veritas etiam si naturae suae lumine sit clarissima, aliorum tamen sententiis propositis & scissillimè excussis, clarius elucescet. Fuit secunda Columbi opinio, sanguinem in dextro quidem sinu attenuari, & preparari, sed per alios ductus, quam per foramina septi (quae pernegat ipse) in sinistram ferri ventriculum. Est autem patens illi canalis vena arteriosa, quae totum sanguinem à dextro specu ad pulmones deferat, sanguinis illius portionem unam in pulmonum substantiam ad peculiarem nutritum distribuens, alteram in arteriam venosam, & ab ea in sinistram cordis sinum cum aere refundens. Suum hoc dogma duabus firmat rationibus. Vena, inquit, arteriosa amplior est, insigniorque quam pulmonibus nutriendis necessum sit: Est ergo verisimile non alendo tantum pulmone sed deferendo etiam sanguini ad vitalis spiritus generationem dicatum esse hoc vas. Est & altera ratio eiusmodi, in arteria venosa sanguis tenuissimus & arteriosus adest perpetuo: Hunc sanguinem non à sinistro sinu accipit, impediunt enim tricuspidales membranulae, ergo à vena pulmonis. Sunt haec sane probabilia & veritatis pallio velata: nusquam tamen pro veris admittenda. Nam quod asserit, pulmonum

Aeris preparatio.

De sanguinis preparatione contraria est.

Prima opinio Galeni.

Recentiori Galeni arguunt.

Defenditur Galenus.

Cur sanguis non remeet à sinistro ad dextrum sinum.

Secunda opinio Columbi est.

Ratio 1. Columbi.

Secunda ratio.

Refutatio Columbi.

venam insigniorem esse quam requiritur exiguum pulmonis corpus, planè insciamur. Rara enim est, laxa & spongiosa pulmonum substantia, ergo maximè dissipabilis: perenni & continuo agitatur motu, & ob cordis viciniam facile incandescit, unde triplicis alimenti ingens exhaustus: at par esse debet affluxus & effluxus ratio. Non potest copiosus sanguis conferim affluere, nisi per patèntissimum vas: Debit ergo pulmonum vas amplissimū efformari. Quintam, ut scribit Galenus cap. 10. lib. 6. De usu partium, venam hanc insignem construxit Natura, ut quantum propter illius crassitudinem iustæ pulmonum nutritioni detrahebatur, tantum venæ magnitudine compensaretur. Secundæ rationi ita satisfaciendum puto; sanguinem qui in arteria venosa reperitur portionem esse vitalis spiritus, & arteriosi sanguinis, quem cor in pulmonum substantiam effundit. Cum enim vita omnis à corde sit & vitali spiritu, nulli autem ab aorta rini ad pulmones deriuentur, verisimile est, imò necessarium, per arteriam venosam ferri ad pulmones vitalem spiritum: nec est quod trifulcas nobis opponant membranulas; duæ enim tantum in vasis huius orificio appositæ sunt, quia non exquisitè de- cuit intercludi hoc vas. Obiiciunt fortasse motus contrarios, & spirituum cum fumidis va- poribus permissionem, sed parum mirabili Naturæ providentiæ tribuit, & quid singularum partium diversi appetitus & tractus possint ignorant. Fit per venas mesenterij chyli & san- guinis simul & semel distributio; lac è mammis totum venæ cavae truncum pervadens, sanguine nullo adulteratum, per vrinæ expurgatur; & ut proxima Quæstione agitabitur, empyricorum pus per sinistrum cordis sinum & arterias in renes & vesicam expurgatur, non tamen illius colluie inquinatur vitalis spiritus; si omnia xatὰ φύσιν se habeant. Abeat igitur cum suo commento Columbus. Tertia opinio est Ioannis Botalli Regij Medici, qui ductum omnibus incognitum à dextra in sinistram auriculam pervium se inuenisse gloriatur. Per hunc ferri præparatum in dextro sinu sanguinem in sinistram putat. Hunc in vitulis & iunioribus animalibus satis conspicuum esse dicit; in homine verò & pro- uectioribus animalibus non ita patère. Hæc Botalli opinio rationibus nullis stabilita, satis seipsam destruit. Nam si meatum hunc in eum usum comparauit Natura, ut sanguinem à dextro in sinistram sinum refundat, adierit in animali perfectò omni vitæ tempore, & in dies crescente animali auctoque cordis calore, augebitur: at non vult Botallus in bobus & grandioribus animalibus esse conspicuum hunc ductum. Præterea meatus hic in orificio est venæ cavae, quomodo igitur à dextro sinu refluet ad venam attenuatus sanguis, cum tres ad- sint valvæ foris apertæ, intus clausæ, quæ sanguinem in dextrum ventriculum intromittunt, sed ne in cavam de novo refluat, prohibent. Ignoravit bonus ille vir sui foraminis usum, quem primus omnium Galenus cap. 6. lib. 15. De usu partium accuratè descripsit: vidi ego hunc ductum sæpissime, cum alio canali arterioso: sed sæturi tantum inserui, quia dissimilis est fœtus vitæ nutritioque: propterea fœtu in lucem edito, foramen omnino intercluditur; ca- nalis verò ita resiccatur, ut aliquando extitisse neget. Horum ductuum historiam octavo libro descripsimus: eam igitur inde repetat studiosus lector. Postrema opinio de sanguinis præparatione est Ulmi Pictaviensis Medici, qui De liene libellum edidit elegantissimum. Vult sanguinem arteriosum in liene præcoqui, attenuari; preparari, deinde in aortæ truncum, & ab eo in sinistram cordis sinum asportari, ubi magno naturæ mysterio cum aëre in pulmonibus præparato misceatur. Placuit sanè (ut ingenuè fateor) Ulmi opinio ob rei novitatem, & maximam eius in arguendo ac differendo subtilitatem. Sed quoniam ad noui dogmatis confirmationē falsis innititur principiis, quæ omnem Anatomicae artis splen- dorem obscurant, lubet præcipua eius capita minutatim excutere. Primum non putat è dex- tro cordis ventriculo per septum medium ferri posse sanguinem in sinistram, quia si non suf- ficebat in tenello fœtu hæc via, cuius laxiora sunt vasa, rariius tenuiusque septum, & in quo minor sit spirituum dissipatio, neque etiam in homine grandiore sufficeret: At non suffi-

Primæ ratio
improbatur.

Secundæ ra-
tioni satisfit.

Obiiciunt.

Responsio.

Tertia opinio
Botalli.

Botalli error
insignis.

Postrema opi-
nio Ulmi.

Concluditur
Planus.

Prima refuta-
tio.

cit in fœtu via hæc, sed aliam molita est Natura, arterias nempe duas, quæ ab umbilico in crurales eiusdem arterias producuntur. Ergo & in homine grandiore alij ductus patentiores sunt necessarij. Subtilissimum, mehercule, sed falsum & erroris plenum argumentum. Non enim in fœtu exudat sanguis à dextro in sinistrum sinum; quia in cordis sinibus nulla fit vitalis spiritus generatio, trahit per umbilicales arterias maternum spiritum fœtus, quem in omnes aortae riuos diffundit, non alitur pulmo tenuissimo sanguine, sed crasso per venam cauam delato, propterea à caua ad arteriam venosam foramen est peritum, & ab aorta ad venâ arteriosam canalis est conspicuus, cuius interiectu vasa cordis in fœtu videntur. Falsa igitur est Vlmi hypothesis; quia in fœtu nulla est spirituum officina, nec vene caue ostium sanguinem in dextrum sinum effundit, cum, ut scribit Galenus cap. 6. libr. 15. De respiratione, pulmo in fœtu ruber sit, crassus, immobilis, sanguineque alatur crasso. Facient ad huius rei illustrationem quæ libro octauo De fœtus vita & nutritione, ex Galeno annotauimus.

Secunda refutatio.

Secundo membranas in ostio arteriæ maioris stas (malè trifurcas vocat: sunt enim vene caua & arteriæ venosæ tantum valvæ trifurcæ, reliquæ verò semicirculares) non vult in eum usum constructas, ut sanguinem ab aorta in cor introire prohibeant: quia dum in utero esset fœtus, non impediebant quo minus arteriosus sanguis in sinistrum cordis sinum introiret. Eodem revolueris Vlme: nihil enim per quatuor orificia cordis in fœtus ventriculos insiliit: non sanguis per venam cauam; quid enim eius attenuatione est opus; cum pulmo in fœtu sanguine nutriatur crasso? Non aer per arteriam venosam; neque enim respirat in utero fœtus: non arteriosus sanguis per aortam; irritus enim foret hic labor, cum in eandem aortam, momento extruderetur. Adde, quòd canali eo arterioso ab aorta ad venam arteriosam prodeunti, tibi,

Tertium erro.

ut video, & Anatomicis ferè omnibus incognito, opus non fuisset. Tertio, dum Botallus asseritur, & peculiarem quandam illius foraminis usum comminiscitur Vlms, in idem latu volutabrum sese deuoluit, eademque qua Botallus redargutione dignus est. In Columbo conuellendo subtilissimus est. Tandem ingeniosissimam opinionem profert, quam tot nixibus patituribat. In liene scilicet, preparari arteriosum sanguinem, quod lien totus ex venis & arteriis inexplicabiliter sit contextus, preparatum ab arteriis exsugij, & in arteriæ maioris truncum, indeque in sinistrum cordis ventriculum ferri. Verum ne id fiat, multa prohibent. Primum in aortæ ostio tres adsunt membranulæ foris clausæ, quæ arterioso sanguini aditum intercludunt. Hoc docet aucto. Vicia, & summus Dictator libello *Dei xapôstas* apertissimè verbis id prodidit. Negabit Vlms hunc valvularum usum, sed tamè frustra à Natura conditas esse insiciabitur. Si itaque non omnino ingredienti aut egredienti sanguini aditum intercludunt: saltem ut ipse etiam fateri cogitur, sanguinis æbipōus & confertim inflatissimæ impetum frangent sistētiq. Hoc si verum est, non poterit à liene per arteriam magnam tota vitalis spiritus materia in sinistrum ferri sinum, quia cita & præcepta esse debet spirituum generatio, confertim ergo & impetu affluere debet illius materia, hunc impetum sistunt membranulæ. Quintiam in structura cordis singulare est hoc Natura artificium, ut per unum vas trahat, per aliud expellat. Trahit per venam cauam sanguinem, expellit eundem per venam arteriosam, trahit per arteriam venosam aërem, quem sanguini permiscet, expellit vitalem spiritum in aortam. Quod si per aortam materiam spiritus traheret, & spiritum eodem ferè momento in aortam compelleret, fieret horum succorum permistio, essentque in arteria perpetuò duo motus contrarij, sanguinis à liene ad cor ascendentis, & arteriosi sanguinis à corde in lienem descendentis. Quod ut in criticis excretionibus & egregijs naturæ copatibus interdum fieri posse admittimus: ita perpetuum esse negamus. At perpetua sit spirituum generatio. Obiciet nobis Vlms, venosam arteriam, quæ & aërem ducit ad cor, & vapores fumidos cum sanguinis portiuncula extrudit in pulmones, sed non eadem est aëris & sanguinis ratio. Potest ob tenuitatem aëris & sanguinem & tunicas peruadere, quod san-

Non posse fieri
vitalis spiritus
preparatum in liene.

Rationes.

Prima.

Secunda.

Obiectio.

Responsio.

guis non præstat. Præterea, si in liene præparatur arteriosus sanguis, non in dextro cordis sinu, ut voluit Galenus, cur patentissimo ostio adaperitur cordi vena caua? an ad solam pulmonum nutritionem? minimè quidem: est enim, ut scribit Galenus cap. 15. lib. 3. De facult. nat. vena caue orificium venæ arteriosæ ostio multò amplius: an ad cordis nutritionem? minimè gentium: habet enim peculiarem venam coronariam dictam, qua alitur. Ergo, ut in cordis thalamum sanguinem ad spirituum generationem effundat. Postremò, lienè vitæ spirituum præparationi dicatum non esse, hinc colligo, quòd lien obstructionibus maximè sit opportunus, non ratione vasorum, quæ amplissima sunt; non ratione parenchymatis, quòd rarum est & spongiosum; ergo ratione contenti humoris faculenti: at quomodo facis expurgationi & sanguinis præparationi inferuiet? Sed de lienis usu contra Vlmum libro sexto disputauimus. Concludamus itaque in dextro cordis sinu præparari sanguinem, & per septi foveas ac foramina in sinistrum specum ferri.

An per sinistrum cordis ventriculū & arteriās, empyicorum pus expurgari queat: & quomodo per vrinas, aluum, & abcessus expurgetur.

QVÆSTIO XII.



VÆSTIO hæc multorum ingenia quàm diutissimè torfit. Eam tamen pro ingenioli viribus hic excutere placet. Empyicos appello cum Hippocrate quibus rupta lateris aut pulmonum vomica, effunditur pus in thoracis spatium, ibique stabulatur & fluctuat, ut eius illuue pulmo ferè totus madefcat. Purulenta hæc materia ex summi præceptoris doctrina

quatuor modis expurgari potest, per ἀνακτάρατον, per ἀεὶς ῥοίαν, per διαῖς ῥοίαν, & per inferiorum partium abcessus. Ἄνακτάρατις, expurgatio est per superiora, quæ motu proprio & valida contentione thoracis excutientis quòd noxium est, perficitur. Expurgatio hæc puris per os, naturæ familiaris est & omnium maximè expetenda; sit enim διαῖς τὸν συμφορῶν χάριον, per loca lege naturæ còmoda, & facultatū omnium validam vim ac robur indiscat. Hæc propria est empyicorum, pleuriticorū & peripneumonicorū crisi: huic prima debetur laus. Verùm si eam moliri non queat natura, aut ob puris crassitatem, quòd thoraci sese concutienti morem non gerit, aut propter musculorum imbecillitatem, sagax & prouida Natura aliud sibi parat iter, alias inuenit vias, per quas sese expediat, & morbo, & causâ morbifica. Itaque sepe per vrinas, nonnunquam per abcessus, raro per alui profluium purulentam illuuiem expurgat. Quòd per vrinas profundatur empyicorum pus, & docet quotidiana experientia, & grauissimorum virorum auctoritatibus confirmari potest. Extat apud Hippocrat. sectione 2. libri 1. Epidem. locus perelegans: πολλοὶ δὲ ἀεὶς ῥοίαν μετὰ πόνῳ χολαῖδες, ὕδατῶδες, πυαῖδες, εἰσματοῖδες, στεργυλαῖδες, & νεφετῖκῶν, ἀλλὰ τῷ τοιοῦτον ἀντ' ἄλλων ἄλλα, id est, multi vrinas profundebant cum dolore, biliofas, aqueas, puruléntas, abradentes, stranguurias, quæ tamen non erant nephriticæ (id est, vitio renum & vesicæ non contingebant) sed his alia pro aliis. Et eadem sectione multorum empyicorum spes in angusto erat, quibus maxima spes salutis affulsit, dum repente in stranguriam conuersio facta est. Galenus in Commentario annotauit vitia vniuersi corporis aquæ per vrinas, ac per aluum expurgari. Sectione 3. libri 3. Epidem. in constitutione pestilenti, τὸν (inquit Hippoc.) ἀεὶς πλεῦμονα πᾶντων διαῖς ὅσις καὶ ὡ, id est, omnium quæ circa pulmonem erant, in inferiora erat decubitus. Galen. c. 4. lib. 6 De locis affect. hanc puris per vrinas expurgationem confirmat. Negant (inquit) quidā, abcessu in pulmone orto, pus expurgari posse per renes. nos verò pulmonis vomica per vrinas expurgari vidimus sæpè. Quintiā còment. ad Aph.

Tertiā,

Quartā,

Quid sit empyica.

Quatuor modis expurgatur empyicum pus.

Quid anacatharsis.

Expurgari per vrinas pus.

Auctoritates Hippoc. & Galeni.

Galen. auctoritas.

75. sect. 4. (qui sic habet, si quis sanguinem aut pus meiat, tenum aut vesicę vicium significatur.) Non (inquit) puris mētio absolutē & perpetuū signum est ulcers renam; saepe enim expurgatur pus vitio partium superiorum, sed si quis meiat, id est, meietur factum non faciat: hoc idem voluerunt Avicenna, Paulus & Mesues. Expurgati igitur purulentam illuuiem in thorace contentam per vr̄ing profluuium satis patet. Tertiū expurgatur pus per diarrhęam, id est, alui profluuium: exiat illud summi Hippocratis in Coacis: τριτον ε̄ μπουσις τὸν πνευμονα κατὰ κοιλίην πῶν ὑποχορεῖν θανάτιον: empyricis à pulmone pus duci per aluum, lethale. Galenus 6. De locis affect. nihil mirum (inquit) ex partibus diaphragmate superioribus pus in ventrem defluere. Quartiū per abscessus superiorum aut inferiorum partium expurgatur empyricorum pus. Quibus, inquit Hippocrates in Proreth. ex peripneumonia sub auribus vel inferius partibus nascuntur abscessus, ibique suppurant, hi defunguntur morbo: & in Coacis, qui ad erunt descendunt abscessus in peripneumonicis, viles omnes sunt. Tot modis apud Hippocratem expurgari solent pus in thorace contentum, per os, renes, intestina & abscessus. Prior omnium maximę expectenda, postmodum ea quę per vr̄inas fit expurgatio, nihil enim negotij facessit naturali æconomiā, dolore tantum & stranguria fugaci molesta est. At quę per aluum & finissima fit puris vacuatio pessima, ventriculi enim & intestinorum facultatem labefaciat, dysenteriam parit ferē insanabilem; nec minus exitiosa est ea empyricorum per aluum excretio, quā pblegmones hypochondriacę quę pus effundit intro. Quę verō per abscessus fit expurgatio salutaris est, si in inferiores partes decumbat. Nam & procul assurgit à morbo, & aelius tñs ἀεὶ σολῆς. Debet autem legitimus abscessus nec esse ἢ μὲρ ᾧ ὀσος, nec ἀνὰ πῶ ὀσος. Addit Aretæus 1. De morbis chronicis, mulieribus interdum per vterum expurgari pulmonum & thoracis pus. Exposui modos omnes expurgationis materie in thoracis cavitate contentę, sed per quos ductus, per quas vias id molitur natura, patefacere, maioris fortasse erit operę & altioris contemplationis. Anacatharsim per asperas fieri arterias certissimum est. Distento enim thorace, inflatus pulmo spongia instar effusum pus sugit; contractio autem thorace concidens pulmo cum fuligine purulentam materiam in asperas arterias tradit, à quibus per continuitatem ad os fertur, atque ita tussiendo excernitur. Quibus verō ductibus ad renes & vesicam feratur pus, valde est controversum. Voluit Erasistratus per dextrum cordis sinum & venam cavam pus in renes defluere. Ex fugi primū à pulmone carne rava & spongiosa pus, tum à vena arteriosa, quę nutriendo pulmonei dicata est, duci in sinistram sinum, ab eo in caua truncum, indeque per emulgentes in renes, uretters & vesicam. Sed non probatur hæc Erasistrati opinio: nihil enim per venam arteriosam in dextrum cordis ventriculum insluit, ob membranulas foris clausas, nihilque per venam cavam ē corde egreditur, ob iricussides valvas intus clausas Mesues cap. De pleuritide, expurgationem hanc puris per venas fieri putat. Post abscessus, inquit, thoracici eruptiōnem sanies per pulmonem quibusdam cum tussi excreatur, & quibus in pectoris cauitatem distillat: his vel per venam chylin in partem hepatis concavam defluit, & inde per intestinorum venas cum alui excrementis educitur: si verō de pectore ad partem hepatis connexam deferatur, inde per venas emulgentes ad renes ac vesicam erumpere potest. Fallespius breviorē huius expurgationis ductum se inuenisse gloriatur: ramulum quippe describit, qui ab æzgo per costas excurrrens & diaphragma permeans, cum adiposa & renali coit. Hanc puris per venas excretionem non omnino inficio, rarum tamen & insuetum iter esse credo, quia nec hiant venarum oscula in thoracis cauitatem, nec motu ullo agitantur vena quo pus fugere queant, exudare autem pus crassum viscidumque per venarum tunicas difficillimum. Sunt qui oculos expurgationis huius somnient, & fingant nobis metatus, qui in viuētibz omnia peruia, estque intus forisque spirabile totum corpus εὐπνοὺς καὶ ἀκρωτοὺς τὸ σῶμα. Hoc sanē li-

Expurgatur
pus per dia-
rrhęam.

Expurgatio
puris per abs-
cessus.

Expurgatio
per vterum.

Per quas vias
expurgatio
puris fit.

Fit expurga-
tio per tri-
nam.
Opinio Eras-
trati conuul-
sion.

Mesues opinio.

Fallespij opi-
nio.

Opinio quo-
rundam.

benter admittimus. Scimus enim ex summi Hip. doctrina 2. Epid. & Aphor. 55. sectio. 7. naturam moliri abscessus per ossis; hydropicorum aquas refluere in aluum, eadēque ferri per urinae ductus, urinam per renum carnes transcolari, semen per testium substantiam, articulorum tumores pituitosos, aliās in aluum, aliās in os lenta salina derivari ab illitu hydrargyri. Hec, inquam, omnia admittimus. Sed cur insensiles expurgationis empyicorum per urinas meatus querimus, cum patentes habeamus & maxime affectabiles? At verò quinam illi sunt? Audiamus Galenum cap. 4. lib. 6. De locis affectis, eos indicantem. Hac questio, inquit, Erasistrati sectatores non parum urget; quippe qui putant solum spiritum in arteriis cōtineri. Nobis verò nihil difficultatis affert, utpote intelligentibus quod levis arteria pulmonis, quantum puris ex rupta vomica suscipit, id in sinistrum cordis sinum deferre potest, quod inde per arteriam magnam in renes fluit. Vult itaque sugi à pulmonum substantia pius, ferri-que in arteriam venosam, ab hac in sinistrum cordis ventriculum permeare, ab eo in aorte truncum & emulgentes; & ante Galeni tempora, Diocles eam puris per arterias expurgationem agnouerat: καὶ τὰ, inquit, ἐν τῷ ὅρει ἐμπερὶν ἡ ἀνάγκη, ὅτε σὺν τῇ ἡγνυμένῃ αἷς τῷ θανάτῳ, καὶ κύβιν φέρουσιν ἀπὸ τῆς αἰσ, ταύτῃ ἀποκρίνεται οὗ τοῖς οὐροῖς. Hic operæ pretium est audire exclamantes contra Galenum neotericos. Quis fieri potest, aiunt, ut purulenta hæc illuvies per sinistrum cordis sinum vitalis spiritus ἐργασθῇ εἰς αὐτὴν officinam, nec non per arterias eiusdem spiritus conceptacula salutis & integris egri rebus, expurgari queat? Annon ea permistione inquinabuntur purissimi spiritus? Si enim malignus quidam vapor aut venenata aura per os, arterias, venas, aut alios cecos ductus expirant ad cor. Statim Syncope aut liposymia corripimur: cur ergo fortidum pus eadem non præstabit? Non solet sagax & prouida Natura excretiones suas moliri, nisi per loca cōferentia. At quis cor & arterias loca conferentia appellabit? Hæc & similia proferunt, qui ductus à Galeno assignatos non admittunt. Sed non vident aliud esse fieri quidpiam κερτὶν ἰατρῶς, aliud συμμάτωμα τῶν ἰατρῶς; aliud nature vi & contensione valida, aliud vi & contumacia morbi, aliud à facultate, aliud ab affectu, aliud denique valida, aliud debili existente facultate. Puris hæc per sinistrum sinum transfusio si sit critica, si vires consent, sit sine egri incommodo; retinet enim & conservat spiritus natura, noxiæque tantum excludit. At si vires sint debiles, moritur in ipsa expurgatione eger, & eo dissecto totus sinister cordis sinus purulentus apparet; quod rudioribus plerumque imponit, qui cordis abscessum fuisse clamitant. Hanc puris per sinistrum cordis sinum, & arterias expurgationem fieri posse, præter Galeni auctoritatem & demonstrationem Anatomicam historiis duabus confirmabo. Primam narrat Hollerius, commentariis suis doctissimis in Coacas Hippocratis præmotiones, & in sue Præcox scholiis elegantissimis, cap. De ardore uring. Mulieri, inquit, cuidam intolerabili cruciatu vrina purulenta profluebat. Mortua post quartum mensem, & dissecta; duo calculi in corde cum multis abscessibus parvis inuenti sunt, renibus integris, & viis omnibus vrinæ dicatis. Expurgabatur itaque purulenta illuvies per aortam. Alterius historie testis ego sum oculatus. Honestissimus quidā civis Mospeliensis per triennium melancholia laborauerat hypochondriaca, eaque sguissima, quæ tandem acuta febre superueniente, hominem è viuis sustulit. Priusquam tamen vita fungeretur, per mensem integrum bis in die leni & fugaci animi deliquio corripiebatur, cum modico vrina ardore, & incredibili meiendi desiderio. Profusa autem prærubra, tenui, & fetida vrina, statim ad se redibat. Dissecto cadavere, totam ferè thoracis cavitatem tenui prærubro, & fetidissimo humore oppletam inuenimus, nec non cordis sinistrum sinum eodem humore plenum. Quod non sine admiratione contemplatus, venit mihi in mentem ilicò contextus Galeni citatus, & magistris Chirurgis ac Medicina studiosis quamplurimis astantibus, causam tam frequentis liposymie & fugacis strangurie, ad virulentæ materiae per sinistrum sinum & arterias

Veri ductus
expurgationis
à Galeno pa-
refulti.

Jasproubentur
Galeni vna à
recentioribus,

Defectitur
Galenu.

Historia cle-
gantes pro
Galeni defen-
sione.

Prima.

Secunda.

transfusionem, referendam esse existimaui. Quam meam opinionem omnes communi applausu approbarunt; quia humoris in thorace contenti & urinarum quas in lithomyia profan-debat, idem erat color, eadem substantia, nec dissimilis fœtor. Hic iam video Galeni sententiam satis illustrasse: nunc tempestuum est ut ad alia sermonem transferamus.

De cordis temperamento.

QVÆST. XIII.



E cordis temperamento certant Medici. Sunt qui in actiuis qualitatibus frigidum statuunt, alij calidum: in passiuis quibusdam asseritur siccum, aliis humidum. Nos priusquam rationum, quæ in utramque partem afferri possunt momenta, expromamus, quot modis calidum, frigidum, humidum, siccumque dici possit primum aperiemus: ita enim sublata diffinitionum homonymia, facilius erit propositæ questionis explicatio. Apud Galenum 1. De temperam. calidum, frigidum, humidum, siccum, tribus modis dicitur. Primum simpliciter & absolute: sic prima & simplicissima corpora, uniuersi quippe elementa ἀπλῶς talia dicuntur; & apud Hippocratem, Aristotelem, Galenum, calidi frigidi, humidi, siccique nomine sola simplicissima corpora designantur. Secundo, calidum & frigidum dicitur quid ratione vincentis, & prædominantis in mixtione elementi: sic ossa frigida & sicca dicuntur, Galeno libello. περὶ ὀστέων, quia dominatur in illis elementum terreum. Tertiò, calidum dicitur aut frigidum quippiam περὶ τῆς, id est, comparatè. Fit autem collatio hæc ad medium aliquod, quod velut norma & regula est Polycreti, à quo quæcumque recedunt, talia dicuntur, calida puta aut frigida. Medium illud duplex est; generis vnum, speciei alterum. Medium generis inter animalia est homo: est enim animalium omnium temperatissimum: inter corporis partes medium generis est cutis. Temperata si quidem est, & medium extremorum obtinet; unde tactus iudex & æstimatrix censetur. Medium speciei in qualibet parte spectandum est. Datur enim in cordis aut cerebri speciei cor temperatum, datur in eadem specie cor calidius aut frigidius. Galenus c. 28. Artis parue, dum signa cordis calidi aut frigidi inquirat, cordis temperiem confert, non ad medium generis, cutem scilicet, nec ad alias partes, ita enim nullum cor unquam frigidum; sed ad medium suæ speciei, id est, cor Socratis temperatum, ad cor Platonis, aut Aristotelis; quorum illud frigidius esse potest temperato, hoc calidius. Explicat mentem suam Galenus eodem loco. Cor namque frigidissimum natura sua cerebro calidissimo calidius esse vult, dummodò intemperies sana sit & in latitudine sanitatis consistat. Poterit enim per morbum contingere, ut cerebrum aliquo corde interdum calidius sit. Sic iam iam morituris, & frigidum expirantibus frigidus erit cor, cerebro erysipellate aut inflammatione obfesso, quale in phreniticis cernitur. Hic verò dum queritur, an calidum sit vel frigidum cor, non ad medium speciei fit collatio, sed aut ad generis medium, id est, cutem, ad quam singularum partium temperies confert Galenus 1. De temperam. aut ad vincentis qualitatis naturam. Sed hæc fortasse παραπύρως. Veniamus ad institutam disputationem. Auerroes cor per se & naturā suā frigidum esse contendit, quia maiore sui portione constet frigidis partibus, fibris innumeris, vasīs quatuor insignibus, vena cava, arteria magna, vena arteriosa, & arteria venosa, quæ partes spermaticæ exangues sunt & frigide: Calidum autem esse per accidens ob sanguinis arteriosi & spiritus vitalis calidissimi contentorum copiam, nec non ob perennem & perpetuum motum. Qui Auerrois opinionem sectati sunt, eam his rationibus stabiliunt. Quod cordis caro densa sit, solida & grauis, sanguineque alatur frigido, crasso, melancholico. Quod ad cordis basim, quæ nobilior eius est pars, copiosissimus adnascatur adeps, cuius efficiens causa apud Galenum est frigus. Quod denique cor sanguinis conceptaculum sit, unde cap. ultimo libr. 1. De temperam. visum

Calidi, frigidi, humidi, siccique, triplex acceptio.
Prima.
Secunda.

Tertia.

Medium duplex.
Medium generis.
Medium speciei.

Auerroes cor frigidum statuit.

Rationes.

Ratio 1.

Secunda.

Tertia.

sanguineum dicitur: at sanguis naturā suā frigidus est, Hippocrates libello *ἡ ἐκ κατὰ φύσιν*: statim enim à venis exiliens concrevisit. Nos contrā, calidissimum esse cor, auctoritatibus rationibus & experientiā demonstrabimus. Adest summi Hippocratis auctoritas libello *ἡ ἐκ ἀρχῶν*. Calidum, inquit, plurimum in corde inest, utpote quod membrorum omnium sit calidissimum. Galenus cap. ult. lib. 1. De temperam. Sanguis, ait, à corde suum accipit calorem; quippe id viscus natura omnium est calidissimum. Idem docet cap. 3. lib. 2. De temper. Auctoritas ratione confirmatur. Est cor *ἡ ἐκ ἀρχῶν* & θερμὸν, fons caloris & viuisi i nectaris, sanguinem gignit arteriosum, venosum attenuat, præparatque pulmōni, vitales spiritus omnium calidissimos conficit. Denique lares esse & focum in hoc viscere oportuit, quo natius singularum partium calor recrearetur. His omnibus assentitur experientia: si enim, ut scribit Galenus libello De fætus formatione, & 1. De semine, in recens dissecti cordis ventriculos digitum immittas, tam ingentem eius calorem percipies, ut vras. Secundo De temperam. & lib. De usu puls. scribit, non esse similem calorem, qui cordi naturalis est, ei qui cæteris partibus inest, cum id feruere semper sit opus, ut quod seipsum & alia tum moueat, tum calefaciat. Obiectis in contrariam partem nunc satisfaciamus. Fibras in corde esse, & quatuor insignia vasa non negamus, sed hæc cordis substantiam non complent. Caro præcipua est cordis pars, per quam viscus hoc carnosum dicitur Aristoteli & Galeno. Est autem caro hæc calidissima; quia ex sanguine calidissimo caloris vi densatō gignitur. Hoc docuit Hippocrates libello *ἡ ἐκ ἀρχῶν*: apertissimis verbis: *ἡ ἐκ ἀρχῶν* & θερμὸν & ὑπερβαρὺν, κρῆας ἐξ ἡυετο σκληρόν: id est, à calido calefactum cor, caro euasit dura. Densitas porro & soliditas carnis, caloris coquentis & humidum exhaurientis est opus, ut laxitas & mollities frigoris. Sic marium solidiores carnes, quam fæminarum. Quæ de adipis generatione obiciunt, 6. nostri operis libro fusè sunt explicata: Non in sinibus, nec circa cordis carnes adnascitur adeps, sed circa mēbranae rānsū partes minus calidas. Generationis huius finalis causa hic reliquas omnes superai, ne cor ardore assiduo torreretur. Postremò, cor viscus sanguineū dicunt: sanguinē autē naturā frigidū esse. Respondet Galenus c. 8. lib. 6. De plac. Hippoc. & lib. De form. fætus, sanguinē duplicē esse, venosum & arteriosum; illum minus calidum, hunc calidissimū esse: cor autem arteriosi non venosi officinam vocat. Statuatur itaque cor in ætuis qualitativis non modò calidum, sed viscerum omnium calidissimum. Priusquam verò hinc diuellamur, scrutemur paucis, an detur quid in viuente animali corde calidius. Si enim cor officina est caloris, & ab eo vitalis gignitur spiritus, nihil corde videbitur calidius. At Hippocrates *ἡ ἐκ ἀρχῶν*, spiritum omnium quæ in corpore continentur, vult esse calidissimum. Quod voluit etiam Auicenna & Auerroes 2. Collect. cap. 2. & 3. Respondent quidam, spiritus partes non esse, cor autem viscerum omnium dici calidissimum. Alij spiritus corde calidiores agnoscunt, quia tenuiores; statim enim expanduntur, vnde impetum facientes dicuntur Hippocrati lib. 6. Epidem. Auctior itaque est in spiritibus caloris gradus; sed calor in corde acrior est & impensius calefacit ob subiecti densitatem. Sic ignis in stipulis palea & flamma parum urit, licet summum caloris gradum adeptus fuerit; facile enim manum traducas sine offensione, ferrum verò accēsum & candens, licet eum caloris gradum non obtineat, quem flamma, impensius tamen urit. Ita de cordis & spirituum calore statuunt. Quæ vera quidem sunt, sed hoc vnum dubitatione non caret, cum spiritus à corde gignantur, & propter cor calidi sint, à quò gradum illum maiorem & intensiorem caloris sibi compararunt. Est enim ex Philosophi doctrina agens omnē perpetuò validius & præstantius passio; & propter quod vnumquodque tale, & illud magis tale. Respondemus, si agens sit simile, esse perpetuò suo effectū validius. Quod si agens sit dissimulare, non obstat effectum intensiorem esse toto agente, non erit tamen intensior parte agentis dissimilari intensissima, à qua prodit

Calidum esse cor.
Auctoritas Hippocratis.

Rat.

Experientia.

Responsio ad contraria.

Ad spiritum corde calidius.
Responsio.

Vnde accipit eum calidius gradum spiritum.

Responsio.

effectus. Cor agens est dissimulare: triplici constat substantia, spiritus, humida & solida: à parte cordis calidissima & spiritus gignuntur spiritus, qui toto quidem corde calidiores sunt, sed non ea parte quæ gignit spiritus. Dari autem partem in mixto altera calidior, & toto mixto calidior, illustrat Galenus exëplo lactis. Toti enim lac frigidus est aut saltemperatum; eius verò pars pinguis & butyrosa toto lactis corpore calidior est. Sic totum cor calidum quidem natura est, sed spiritus eius pars toto corde calidior est, & ab ea caloris gradus obtinet spiritus insensibilissimus. Obiicit hic fortasse argutius quidam spiritus calidissimos non esse, quia temperati sunt. Bene, inquit Galenus còment. ad Aph. 1.4. & 15. sect. 1. temperata est caloris nativi essentia: at calor nativus nihil aliud est, quàm humidum primigenium in situ spiritu & calore undique persusum. Dic temperatum esse calorem nativum, si ad fibrilem & extraneum conferatur, qui mordax est & sua acrimonia tactum feriens, vel temperatum dici ad iustitiam. Sed hæc de actibus qualitatibus dicta sunt satis. De passivis non minor controuersia est. Auicenna cor siccum esse vult libro De temp. Galenus cap. 3. & 12. libri 2. De temperam. necnon 3. De alimentorum facult. cor siccum astruit, eius carnem duram & solidam affirmans. Est autem hoc perpetua veritatis axioma; Quicquid durum in vivente, tangenti sentitur, id etiam siccum esse; quia nulla pars concretione autensione dura generatur. Auerroes contrà, totam cordis substantiam humidam esse contendit, quod visa in calido & humido consistat, cor autem vite principium sit, & humidum officina. Galenus cap. ultimo libri 1. De temperam. viscus hoc sanguinem vocat: si sanguineum, ergo humidum: & eodem capite; Cor, inquit, paulo minus quàm cutis est durum; itaque humidius cute. Proculdubio si partium singularum temperaments ad medium generum, id est, cutem referenda sunt, ut docuimus ex Galeno, & eadem sensu tactus æstimanda, cor humidum dici debet; est enim humidius cute, quia mollius. Dum verò cordis carnem duram & solidam scribit Galenus 2. De temperam. non confert concuti, sed reliquis viscerum, ut lienis, renum, pulmonum, & hepatis carnis. Hoc eius verba indicant quæ sic habent: Cordis caro, lienis & renum carne tanto est siccior, quanto durior.

De cordis nutritione, an venoso alatur sanguine, an tenuissimo in suis ventriculis contento.

QVÆST. XIII.

Cor venoso, si sanguine.

Retinetur. Coronaria cordis vena.

ab ipso.

Subterfugium querendum.

Amicellatur.



CORDIS carnem venoso & crasso ali sanguine scribit Galenus libro De resupartium, & 7. De Anatomicis administrat. Cuius sententia veritatem his rationibus stabilendam putamus. Theorema est catholicum, Similia similibus conservari & refici. Dura est, crassa & solida cordis caro: sanguine igitur sibi simili & crasso reficienda. Præterea vena adeo insignis, & separata vocant Græci, nos coronariam, quod totam cordis basim inflexat coronæ cingat, ab hac ramuli per uniuersam cordis substantiam sparguntur. At nihil frustra & temere unquam molitur providens Natura, nutriendo ergo cordi venam hæc designavit. Accedat ad hæc ocularis demonstratio, quæ ratione nulla conuinci & labefactari potest. Quis non videt venæ coronariæ ramulos sinistra cordis parte insigniores & copiosiores quàm dextra, quia crassior illa parte densiorque caro copiosiore ad sui nutritionem sanguine indigebat? Hæc cum aduerterent quidam, & harum rationum vim effugere non possent, voluerunt externam tantum cordis superficiem sanguine ali crasso per coronariæ ramulos delato; internam verò sanguine tenuissimo in ventriculis contento refici; quia angustior illis exiliorque videtur hæc vena, quàm vi sufficiat alendo toti cordi visceri calidissimo perpetuis motibus agitato; tum, quod vasa illa extimam tantum perperit superficiem, & ad sinus nullo modo penetret. Sed non video quam vasis angustiam describant nobis: est

enim satis insignis coronariæ mouetur quidem perpetuo cor, sed multa ne incandescat, resic-
cetur & exhauriatur eius humidum, prohibent. Externa parte adipe oblinitur copiosissimo,
& aqueo humore circumdatur, ut sanum in custodia florescat; in suis sinubus humidum
adeft copiosissimum, quo etsi non alatur, rigatur tamen. Dicunt coronariæ ramulos per inte-
riora non disseminari. Neque etiam per interiorem musculorum & ossium substantiâ spar-
gantur vasa: σάρκεις ἔλατοι, inquit Hippocrates, trabunt carnes alimentum à proximo
vase. Si neotericos cum Galeno velis conciliare, dic nutriti fortasse interiora cordis, san-
guine in ventriculis contento, sed nondum attenuato: cur enim interiora tenuissimo, exteriora
crasso alentur sanguine, cum eadem sit carnis natura?

Cancellatim

De cordis substantia & carne.

QVÆST. XV.



E cordis substantia duo inquirenda. Primum qualis sit, postremo, cur fi-
brosa. Carneam esse cordis substantiam docet sensus: rubra namque est,
& ut scribit Hippocrates libello *De καρδίᾳ*, colore puniceo ex cali-
dissima sanguinis portione genita. Verum cum caro triplex sit, viscerum;
musculorum, & peculiaris cuiusque partis, eaque omnis simplex cap. 6. li-
bri 1. De naturalibus faculi. qualis sit cordis caro dubitatur. Musculo-
sam esse multa suadent. Primum, diuini Senis auctoritas libello *De corde. καρδίᾳ μὲν ὅντι
κάρτα ἰσχυρόν*: cor musculus est fortissimus. Deinde mouetur cor motu locali, dilata-
tur, constringitur: hæc autem facultas carni viscerum ut hepatis, lienis & renum non conce-
ditur, sed soli musculo. Adde, quod simplex est viscerum caro & tota similis: cordis caro
simplex non est, Galeno 2. De temper. c. 3. Villis enim & fibris tota intertexta est, qualis est
musculorum caro. Erit ergo musculoſa cordis caro. Contrariâ tuctur sententiâ Galenus 6. De
usu part. & 7. De Anatomic. administ. Errant, inquit, qui cor musculum statuunt. Mus-
culi namque simplices obtinent fibras, cormultiplices. Musculi unicum habent & simpli-
cem motum: flectunt enim vel extendunt, attollunt aut deprimunt: cor varios eosque contra-
rios edit motus. Hæc sanè validissima est ratio, quam tamen labefactare conantur quidam.
Quod musculi sint complures, in quibus varia fibrarum apparent genera; quod musculi qui-
dam diuersos & contrarios edant motus: proferunt pectoralem & trapeſium; quorum ille
variis intertextus fibris, brachium sursum, deorsum, & antroſum mouet; hic scapulam sur-
sum, deorsum & retroſum trahit: non ergo fibrarum diuerſitas & motus varietas cordis
carnem à musculi natura excludet. Plùs ita pro Galeno responſum velim: trapeſium
& pectoralem diuersos edere motus, non eadem musculi parte, sed diuerſis; quia diuerſa ha-
bent principia: oritur enim trapeſius ab occipite & vertebris dorsi, illa parte sursum; hæc ve-
rò deorsum mouet: pectoralis etiam exortus sunt varij, oritur à iugulo & ſterno propè toto.
Itaque qua parte attollunt hi musculi, eadem non deprimunt: at eadem parte distenditur cor,
& eadem comprimitur: diuerſa ergo est motus cordis & musculorum ratio. Diffimilis etiam
fibrarum textura; nam trapeſij & pectoralis fibra licet multiplices ſint, diſtinctæ tamen ap-
parent; cordis fibra ita confuſa & intertextæ ſunt, ut nulla arte ſecernere queas. Trapeſij &
pectoralis villi in diuerſis ſunt musculi partibus: at in eadem quantumuis minima cordis par-
ticula, tria villorum apparent genera. Differre etiam musculoſam carnem à cordis carne: do-
cet Galenus 7. De Anatomicis administ. cap. 8. hac ratione, quod guſtantibus diuerſus
ſit ſapor. Auicenna duabus rationibus cor musculum non eſſe probat. Earum prima eſt eiuf-
modi: Musculorum omnes motus aliquando ceſſant, & orta deſatigatione, intermittunt. At
cordis motus perpetuus eſt, & vigilantibus & dormientibus. Verum non ſatis valida mihi
videtur hæc ratio. Diaphragma enim musculus eſt fortiffimus, quem perenni motu agitari ob-

An cordis
caro musculuſ
ſit.Eſſe docetur.
Auctoritas.
Ratio prima.
Secunda.Contrarij opi-
nio eſtq; vera.
Ratio prima.Impugnatur
Galenus ratio.Deſendant.
Galenus.

Secunda ratio.

Auicenna
rationes duas.Præ impu-
gnatur.

respirationis necessitatem norunt omnes. Validior est altera Arabis demonstratio. Cor muscululus non est, quia voluntario motu non mouetur: illius siquidem motum nec retardare cum volumus, nec quiescentem excitare, nec tardiorum aut velociorem, rariorem aut frequentiorum facere possumus, ut diaphragmatis & reliquorum musculorum. Concludamus itaque cum Galeno cap. 6. libr. 1. De natural. facultat. cordis carnem musculosam non esse, sed aut sanguinis affusionem, quam Erasistratus παρ' ἐχρυσμα appellauit, aut peculiarem aliquam carnem. Dum Hippocrates cor musculum vocat, κατὰ γένει καὶ κατὰ ἀνάλογίαν loquitur, quia rubra & fibrosa intuenti apparet cordis, ut musculorum, caro: sic singulorum saepe conuulsionem vocat per similitudinem motus. Cor autem voluntarij motus organum esse nō vult, nec verū musculum. Sunt enim hæc Hippocratis verba, κατὰ ἴνους ἔστι καὶ τὰ ἰσχυρὰ ἔ τ' ἑνὲρ, ἀλλὰ πρὶν καὶ τὸ σπᾶρξος; id est, cor muscululus est non netuo tendinēve, sed densitate carnis. Excludit itaque nervos & tendines à cordis carne, & ea ratione propriè musculū esse negat, quia non datur musculus sine nervo, aut nervorum fibræ. Obiciebant, moveri cor locali motu, & idè musculosam illius carnem statuendam, sed non quicquid locali cietur motu, voluntarium est, & à muscula mouetur. Vterus, exempli gratia, clauditur ad conceptionem, dilatur ad incrementum fœtus, cōgitur ad excludionem sine musculo. Intestina motum habent localem peristalticum dictum, quem tamen voluntarium esse nemo dixerit. Postremò, viscerum carnem simplicem esse, non fibrosam; cor autem multiplici villorum genere textum non secus ac musculorum carnes opponebant. Respondemus: cordis carnem licet fibrosa sit, simplicem esse, quia fibræ eiusdem sunt naturæ cum reliqua cordis substantia, ut ventriculi, uteri, & intestinorum villi. Musculorum autem fibræ dissimilem habent disparilēque ab eorum carne naturam, nervorum quippe & tendinum sunt particule. Galenus secundo de Temper. in corde ait fibræ quidē sunt ut in musculis, sed non idem est fibrarum genus. Nam quæ in musculis habentur, nervorum & ligamentorum sunt particule; fibrarum autem cordis propria est species ut tunicarum ventriculi, uteri, venarū, arteriarum. Sunt tamen villi cordis ceteris validiores durioresque, quia cum nullum sit instrumentum cuius tanta sit ad actiones consistentia & robur, consentaneum fuit cordis substantiam ad robur simul & patiendi difficultatem comparare. Statuatur ergo cordis substantia carneæ, eaque non musculosa, sed ex genere parenchymatum. Erat alterum disputationis caput, cur præter reliquorum parenchymatum naturam caro hæc tam multiplices fibras obtinuerit? Respondet Galenus, villos cordis tractionis, retentionis & expulsiōis gratia comparatos esse: rectorum namque opera trahit in diastole, obliquorum ministerio retinet, transversis verò & circularibus cor arctantibus contenta expellit. Hunc villorū usum sophista quidam non admittunt quia tractio, retentio & expulsio similes sunt actiones: at similis actio à sola temperie inchoatur, ab eadem perficitur; & à qualibet partis particula integra & perfecta editur. Sic ossa alimentum trahunt, coquunt, expellunt citra villorū opem, ut & pulmo, lien, hepar. Vulgaris responsio est, actionum simularum quædam esse propriæ, alias communes & officiales: sic uteri officialis actio conceptio est, ventriculi chylosis, cordis spirituum generatio, peculiare verò earum partium actio propria est nutritio, & assimilatio. Actiones propriæ solius nativi caloris opera & à sola temperie perficiuntur, nec fibræ indigent: officiales verò, quæ motu perficiuntur locali, non nisi villorum ministerio eduntur. Obicies hematosin officialem esse actionem: at nulla fibræ in hepate. Dico hematosin solâ alteratione perfici non motu locali, quia nec diffunditur, nec contrahitur hepar ut cor, uterus, ventriculus, intestina. Respondent alij, alterationem paucissimi alimenti per breve spatium, sine villis fieri posse solius temperamēti vi, per longum verò spatium minimè: sic facultas sensifica per breve intervallū sine nervis defertur, per longam distantia non defertur. Trahi autem perperuò, & ex distantissimis partibus cor, non aërem modo, sed sanguinem crassum.

DE numero ventriculorum cordis certant Peripatetici & Medici. Aristoteles 3. De partibus animal. κοιλίας, inquit, δὲ ἔχουσιν αἱ μὲν τῶν μεγάλων ζώων τρεῖς, αἱ δὲ τῶν ἐλασσόνων δύο. id est, ventriculos habent animalia quidem magna tres, parua verò duos. In homine itaque tres statuit sinus, dextrum, sinistrum & medium. In eum Aristotelis errorem incidit Plinius II. naturalis historia; Sinuoso, inquit, specu core est, & in magnis animalibus triplici, in nullo non gemino. Galenus De numero sinuum cordis ita sentit: Αἱ δὲ τῆς καρδίας κοιλίας δύο μὲν οἷς πνεύμων ὄντι, μία δὲ οἷς ἔκ τῶν. id est, quæ animalia pulmones habent, duos habent sinus: quæ verò pulmone carent, unicum tantum; ut dexter sinus pulmonis solius gratiâ constructus videatur. Refellitur Aristotelis opinio ratione & sensu; non enim multitudinem sinuum facit animalis magnitudo & paruitas, nec organorum formam immutat magnitudo & paruitas, sed sola actionum diuersitas. Sensus verò in homine, equis, elephanto duos tantum indicat sinus, unico septo discretos. Decepit summum Philosophum in Anatome non satis exercitatum pars dextri sinus ad laeum inclinans; quæ alium ventrem mentitur. Galeni opinio suspecta quibusdam visa est. Si namque pulmonis solius gratiâ constructus est dexter sinus, nec alium illius vsum agnoscis, cur præparari in eo sanguinem ad vitalis spiritus generationem voluit? Maior enim sanguinis copia ad spirituum generationem quam ad pulmonum nutritionem, requiritur. Respondemus pro Galeno, animalia quæ pulmone carēt, frigida esse exanguiaque; proindeque spiritu illo vitali attenuato non egere, sed sanguine crassissimo; sunt autē frigida & exanguia quæ pulmone carent, quia non respirant, sed transpirant tantum. Quia igitur quæcumque pulmones habent, vitali spiritu attenuato indigent, & quadam eiusdem spiritus præparatione, rectē dixit Galenus dextrum sinum pulmonis gratiâ constructum esse. Ceterum de ventriculorum temperie dissentient Aristoteles & Galenus; ille dextrum, hic sinistrum calidiorē esse vult. Nos Galeno potius assentimur, quia sinister sinus spirituosus est & æreus, dexter venosus: at spiritus sanguine calidior.

De numero ventriculorum cordis Aristoteles opinio.

Galenii opinio.

Refellitur Aristoteles.

Galenus reprehenditur a quibusdam.

Defensio Galeni.

De temperamento sinuum.

Vter sinuum præstantior sit, dexterne an sinister.

QVÆSTIO XVII.

DE vtriusque sinus præstantia non levis est controuersia. Sunt qui dextrum sinistro nobiliorem contendunt. Proferunt Aristotelis auctoritatem 3. De partibus animal. Quamvis, inquit, anterior pars posteriori, dextra sinistra præcellit, tanto vena caua in anteriore & dextra parte sita, præstantior est arteria magna: at vena caua in dextro est cordis sinu, aorta in sinistro: erit itaque dexter sinus sinistro nobilior. Auicenna lib. 3. De animalibus, dextram cordis partem sinistra nobiliorem esse vult. Rationibus id confirmari potest. Cordis præstantiā id inter cetera luculenter demonstrat, quod postremum omnium moriem opperat: ea igitur pars cordis nobilior statuenda, in qua postremò desinit vita, & cessat motus: talis autem est dextra; nam si animalia secueris viua, dextrum sinus posterius pulsare animaduertes. Præterea strangulato aut præfocato animali totus ferè sanguis in venis reperitur, arteriæ verò, etiam teste Hippocrate libello ἐκ καρδίας, desolata & vacuæ apparent, quod denotat sanguinem & spiritum ad nobiliorem partem, tanquam arcem ac domicilium tutissimum, recurrere.

Dexter nobilior esse dicitur.

Auctoritas.

Ratio 1.

Contraria
quæ
dixerimus.

Rationes.

Prima.

Secunda.

Tertia.
Quarta.
Soluentur
contraria ra-
tiones.

Cor spiritus
sinus ventricu-
lus non occu-
pauit dextrum
sinum.
Ad primam.

Cor dexter
sinus & au-
ricula cordis
posterius mo-
ueri videntur.

Nos cum Hippocrate, Galeno & Medicis ferè omnibus sinistram speciem dextro præstan-
torem esse volumus. Hippocrates libello De corde, animam hominis, id est, ut ego interpre-
tor, calorem natium, primarium anime instrumentum in eo locat. γνῶμεν γὰρ, ait, ὅτι
ἀνθρώπου πέντε μέρη ἐν τῇ λαύῃ κοιλίῃ. Galenus libris De vsu partium, & De placitis
Hippocrat. & Platonis hunc sinum vitalis spiritus ἐργαστήριον vocat: hoc indicat car-
nis crassities: sinister enim sinus pariete triplo quàm dexter crassiore obuallatur, ne contenti
in eo spiritus ob tenuitatem vanescerent. Quando igitur spiritus sanguine est nobilior, tanto
sinister ventriculus spirituosus dextro sanguineo præstat. Quinetiam dexter sinus solius
pulmonis gratiâ constructus dicitur; sinister verò communem toti corpori vsum præstat,
vim namque pulsatilem arteriis communicat, unde singularum partium calor reficitur,
conseruatur, viget. Accedit, quòd dexter sinistro famulatur, sanguinem præparando. Postre-
mò celeritorem vult sequi mortem Galenus ad vulnus sinistri, quàm dextri. Quæ à Peripa-
teticis in aduersam partem proposita sunt rationes, facillimè dissoluentur. Dextra sinister
præstantiora esse admittimus ratione situs: hic autem non situs, sed officij & actionis digni-
tatem inquirimus, alioqui umbilicus, quia medium exquisitum & mathematicum totius
corporis occupat, corde esset præstantior. Non potuit porro arteriosus & spirituosus hic si-
nus dextrum latus occupare; quia vena caua ex gibbis hepatis emergens, in dextro latere si-
ta erat, at necesse erat venam cauam in dextrum ventrem sanguinem refundere ad vitalis
spiritus præparationem & pulmonum nutritionem. Quem defectum sinus ut Natura com-
pensaret sinistram ventriculum paulò elatior fecit. Quod autem dextrum sinum poste-
rius pulsare aiunt, idè què nobiliorem esse, interpretatione eget. Primum cessat motus in si-
nistro, aut saltem conspicuus non est, ob carnis crassitiem & densitatem: facilius enim leue
aliquod membrum agitat facultas, quàm graue: sic iamiam morituri oculos, linguam &
labia mouent, grauioribus artus iactare nequeunt. Quòd si præstantiam sinum ex eo collige-
re velis, quòd postremus hic moueatur, auricula cordis reliquo corde nobiliores erunt, quia
posterius mouentur. At nemo, ut opinor, sanæ mentis auriculas corde præstantiores dixe-
rit: posterius autem moueri videntur, quia leuioribus & mollioribus. Addamus ad huius rei il-
lustrationem elegantem Veiga similitudinem, commentariis suis doctissimis in Galeni De
locis affectis. Quemadmodum si quis supra pauimentum moueatur, pendula omnia in pa-
riete agitabantur, cum pauimentum vnà cum parietibus quiescere videatur, nec tamen pen-
dencia ex pariete immoto pariete agitantur: Ita motus sinistri sinus ob crassitiem & graui-
tatem, oculorum ferè aciem & obitum effugit, impendentibus & auribus & dextro ven-
triculo ob tenuitatem & leuitatem. Sunt qui dicant ex eo quòd sinister ventriculus primum
moueri desinat, eius præstantiam indicari: cum enim nobilior esset dextro, non potuit diu
malum perferre. Quod tandem obrudunt, strangulatis & suffocatis sanguinem copiosissi-
mum in venis reperiri, paucissimum in arteriis, expedita responsio est; spiritus sanguinèq;
arteriosum ob tenuitatem facillè vanescere, venosum autem sanguinem crassorem non tam
citò dissipari, propterea in demortuis arterias vacuas, venas plenas apparere.

An cor abscessum, solutionem continui & grauioribus morbos
perferre queat. Q V A S T. XVIII.

Cor minus af-
fectum tolerat.

Cor grauius af-
fectum non pati.



Omnibus atque iisdem morborum telis expositum esse, quibus & vni-
uersum corpus, experientia ipsa fidem facit. Nam & frequenter intempe-
ricum patitur, præsertim calidam, & organicis morbis sæpe infestatur.
Solutionem verò fert, sed rarius nec longo tempore. Contraria tamen
hic sese offerunt grauissimorum virorum sententiæ, quæ paucis explicanda.

Hippocrates libro De morbis, nullum oboriri in corde morbum testatur: ἢ καρδίαν σπέν-
 κει πυκνὴν ὄντα, ὥστε μὴ νοσῆεν τὰς τῆς ἐκμάδος, καὶ διὰ τούτου νόσημα ἐν τῇ καρ-
 δίᾳ ὅδ' ἐν γίγνεται: cor ita solidum & densum est, ut ab humore non ægrotet: pro-
 pterea nullus morbus in corde oboritur. *Aristoteles 3. De partibus animal.* cor nul-
 lum gravem affectum pati instar aliorum viscerum scribit, quia est vite principium. *Aphrodisi.*
Aphrodisi. discus in corde nullum morbum consilere putat, quoniam ante mors rapit, quam morbus
 pateat. *Galenus 1. De locis affectis, cap. 5.* impossibile esse ait, ut cor abscessum patiat. *Galen.*
Paulus ex Ægina Medicus, cordis affectus immaturam & precipitem mortem precipita-
 re vult. Solum hoc viscus, inquit *Plinius*, vitis non maceratur, nec vite supplicia trahit
 graviora, lesumque mortem affert presentaneam. Tanta huius visceris dignitas est, tanta
 necessitas, ut interire non possit animal, quin cor ab agendi munere cesset, cap. 17. lib. 4. De
 simpl. medic. facult. Hæc tamen experientia aduersari testantur historia multorum. Nar-
 rat *Galenus 2. De placitis*, victimam auulso corde ambulasse, quod ego sepe expertus sum.
Contraria opinio.
Et 7. De Anatomicis administrat. profert exemplum *Marulli Mimographi filij*, qui de-
 nudato omnino corde vixit, cap. 1. lib. 4. De locis affect. Si, inquit, non ad ventrem usque
 pervingat vulnus, sed in cordis substantia tantum consistat, ex ita affectis aliqui non solum
 ea die, qua vulnerati fuerunt, sed sequenti nocte vivere poterunt. Scribit *Beniuennius* se in
 corde abscessus multos vidisse. Memorat *Hollerius cap. De ardore urinae*, mulieri cui-
 dam inuentos duos calculos in cordis sinibus cum abscessibus multis. *Matthias Cornax*
Maximiliani Imperatoris Medicus, scribit dissecto bibliopola corpore, inuentum fuisse
 cor eius plus dimidia sui parte putredine plane absumptum. *Thomas à Veiga comment. in*
quartum De locis affect. scribit inuentum fuisse ceruum infixam gerentem cordi antiquam
 ex venatione sagittam. Conciliabuntur hæc, si dixeris cor omnes affectus pati quidem, sed
 non diu, nec longo tempore, vel omnibus morborum generibus infestari, sed non gravioribus.
 Exempli gratia, cor intemperiem quidem patitur omnem, sed ab immodica statim extingui-
 tur animal. Semper (inquit *Galenus 5. De locis affectis*) mors sequitur ad immodicas cor-
 dis intemperies. Dum scribit *Galenus* cor abscessus non pati, de abscessu intelligit qui sit ex
 phlegmonis permutatone, prius enim moritur animal, quam inflammatio ad suppuratio-
 nem peruenierit. Abscessus autem qui in corde reperti sunt à *Beniuennio*, *Hollerio* & *Mat-*
thia Cornace pituitosi erant. Vel dic, rara non esse artis: aut cum *Auerroes* sepe in morbis
 ut in natura monstra contingere. Quod auulso corde ambulet animal, & clameret, verum
 quidem id est, sed beneficio cordis id fit, spirituum quippe à corde in uniuersum corpus diffu-
 sorum, quibus exhaustis cum non amplius suppetat comeatus, statim animal extinguitur.
 Dum hæc perlegerem, noua & fortè inaudita repentini interitus causa occurrit nobis in au-
 la Regia. Generosus eques *Guichardinus Magni Ducis Florentie apud Regem Legatus*,
 cum satis bene valeret & cum Magnatibus quibusdam obambulans, non serio sed fami-
 liariter colloqueretur, subito respiratione, pulsu & vita priuatus cecidit. Veniunt ad Re-
 gem multi, alij omnino extinctum referunt, alij apoplecticum aut epilepticum quid inesse rati,
 de vita non omnino desperant. Iubet statim Rex ut videam quid factu opus sit, accurro,
 hominem plane extinctum inuenio; tunc multis adstantibus non sine admiratione causam
 precipitis illius casus, non in cerebro, ut dicebant multi, sed in corde esse affirmavi. Dissec-
 tum suis postridie cadaver, & inuentum cor prodigij instar in eam molem excreuisse ut
 thoracem ferè totum contineret. Apertis autem ventriculis maxima statim erupit sanguinis
 copia ad libras penè tres quatuorve, & causæ quidem venæ ostium disruptum omnesque illæ
 membranule tricuspidales laceratæ; arteriæ autem magnæ os ita patens apparuit, ut brachij
 æquaret amplitudinem. Laxatis itaque ostioli omnibus velut habentis, tanta in utrumque
 sinum effusio sanguinis facta est, ut prohibita cordis distensione contractioneq; subditi ex-

Vena cava
disrupta.

tinēus fuerit. Hæc immatura & præcipitis illius mortis causa est, in qua hoc vñ mirari licet, quòd nulla præcedente causa externa, ictu, casu, vociferatione, ira, in signe illud vas disrupum fuerit.

HISTORIA ANATOMICA.

De pulmonibus.

CAP. XII.



*Respiratio
organum quod
& quæ.*

*Nomina pul-
monis.*

Situs.

Figura.

Lobi.

*Nomina &
versus vñ
bitum pul-
monis.*

OR primus est quidem respirationis author, quia calor, qui flammæ instar in sinistro sinu exardescit, refrigerandi, expurgandi & nutriendi gratiâ in perfectis & calidissimis animalibus instituitur respiratio; sed solum hoc, suo & arteniarum motu copiosissimum aërem haurire non poterat; construenda ergo peculiaria respirationis organa, eaque in thorace aut iuxta thoracem locanda. Hæc porro trium sunt omnino generum. Alia sunt mouentia, alia deducantia, alia excipientia. Mouentia sunt musculi sexaginta quinque thoracem distendentes & contrahentes, non enim sine motu thoracis ducitur aër vaporque fumidus excluditur. Deducantia aërem sunt larynx & aspera arteria; excipientia sunt pulmones. Musculorum descriptionem habes libro quinto accuratè expressam. Hic pulmonum arteriæ asperæ & laryngis historiam describere placet. Est igitur pulmo organum spirabile & vocale, spiritus ἐπυσχέου: haustum enim aërem excipit, conficit, præparatque cordi: πνεύματι Græci dicunt πνέειν, quod est respirare, aut πνέειν πνεύματος. Philosophi cordis flabellum & ventilabrum vocant; Auicenna cordis culcitram, Hippocrates libro De internis affectibus, & 3. De morbis, ψαράειον, id est, tenerum & molle, Plato, εἰμα μαλακόν. Situs est pulmo in vtraque thoracis amplitudine, inter costas & alteram intersepientium membranarum: distat autem aliquantulum ab ore, ne aëris appulso statim refrigeraretur atque ita senesceret animal. Implet totam thoracis cavitatem, ut nihil in ea vacuum sit, dum distenditur thorax; dum verò coarctatur, non ita ut in demortuis, flaccescit & collabatur. Liber omnino est à connexu, ut liberius moveri possit, suspenditur tamén vasorum & arteniarum interiectu, ne dilabatur. Figuram pulmonum restudini similem esse vult Hippocrates libro De corporum refectione; nos variam & multiplicem pro ratione corporum, quibus accumbit, figuram agnoscimus. Nam ubi cavitatum sedes sunt concauæ, ibi gibbosus, ubi verò extuberantes, ibi cauus apparet. Eius tamen dextra pars cum sinistra iuncta bubuli, cetui aut alius bisulci animalis pedis figuram refert. Ad hanc pulmonis figuram spectant etiam illius lobi, quos idè formauit Deus, ne cum dorsum flectimus, comprimeretur, disrumperetur, facili- ceret eiuldem caro, idè antica parte sectiones illæ magis apparent quàm postica. Volunt multi ad facilitatem dilationem lobos constructos, alij ut maioraëris quantitas recipiatur, alij ad διασπείρειν, ne vna parte læsa reliquæ afficiantur. Sed nunquid integra pars & continua celerius inflabitur? Nunquid tantum aëris excipiet & continebit pulmo si sit continuus? Quoniam verò hi lobi alarum more dilantur, explicantur & colliguntur, per metaphoram alæ dicuntur; fibræ vocant quidam, πinnas, summitates: & Hippocrates 2. De morbis ἀσπρῆς, non ἀσπρῆς, ut legit vulgus. Plures in brutis quàm in homine sunt lobi, quia prona terram spectant; figuram autem solus homo celsam obtinuit: sic brutorum he-

par in lobos diuifum eft, homini foli continuum. Pulmonis quantitas maxima ^{Quantitas maxima} eft, vt plurimum aëris contineat, quæ pluribus cordis pulfationibus fufficere queat: cogimur enim sæpe in longa oratione; quæ vnico aëris haufu perficitur, non infpirare, vt & in cantu & vociferatione. Quinetiam vt foetidos ac putres odores fugiamus, & dum natamus aut aquis immergimur, fpiritum cohibemus: nifi itaque ampliffimus efferet pulmo, non fufficeret cordi refrigerando, nutriendo, expurgando; & cogeretur animal nobiles illas ac neceffarias actiones, loquutionem, cantum, merfionem sub aquis interrumpere breuiffimis fpatijs. Pulmo in actiuis qualitatibus calidus eft, in paffiuis humidus. Mouetur, nõ à corde; quia perpetuus non eft illius motus; nec à cerebro, quia non eft voluntarius; nec vi propria, fed à thorace ad vacui fugam. Senfum habet per exiguũ ad ^{Temperamentum. Mufculi.} *δυσωδία*, ^{Senfus.} *δυσωδία*, ^{Structura.} *δυσωδία*, ne ex affiduis moribus diu noctuque liberaret. Pulmo difformis pars, carne conftat fibi propria & triplici vaforum genere: quæ omnia tunica prærenui obducuntur. Caro propriam & maiorem pulmonum fubftantiam complet, vnde carnofum vifcus & *παρέρχυμα* dicitur. Caro hæc levis eft, rara, fpongiæ fimilis, & velut ex fpumofa fanguine concreta. Levis quidem, vt facile collabi attollique poffit, atque ita thoracis motibus promptiffimè obfequatur. Rara & fpongiola, vt follis inftar, aëre infpirato citò & affatim repleatur, fumidòque vaporì paritet viam muniat ad efflandum & expirandum. Color carnis in foetu ruber, quia immobilis pulmo nec aëre plenus; nobis verò in lucem editis fubftauis, ob perennem motum & fpiritus contenti copiam. Triplici vaforum genere caro hæc fufinetur, & cohæret, vena arteriola, arteria venofa & afpera arteria. Vena arteriola à dextro cordis finu enata, in vniuerfam pulmonum fubftantiam riuos diffundit, fanguinẽque tenuiffimum ad eorum nutritionem defert. Arteria venofa in omnes pulmonis partes fparfa, trunco vnico in finiftrum cordis finum intruditur; aërem in pulmonibus præparatum excipit, fumidos vapores trudit & arteriofi fanguinis portionem à finiftro finu excipit. Afpera arteria à faucibus in pulmonem vniuerfum decurrit, aërique deducendo & vaporibus fumidis excludendis dicata eft. Tria hæc vafa vndecũque ad extremam vfque pulmonum fuperficiem eo ordine digeruntur, vt afpera arteria in medio fit, vena arteriola in pofteriori parte, arteria in anteriore. Coeunt autem arteriæ venofæ ofcula cum ofculis afperæ arteriæ eo artificio, vt aëri & vaporibus fumidis liber quidem pateat ingreffus exitusque, non autem fanguini & cæteris humoribus nifi impetu, vt per tuffim; propterea diffecto cadauere arteria afpera cruenta nunquam appareret. Cæterum vafa hæc infigniora conftructa funt quàm pulmonum moles poftulabat, propter motus continuitatem & perennem fubftantiæ effluxum. Tota hæc pulmonum fubftantia tunica obducitur prærenui, ne grauior reddatur pulmo, tum vt per eam pus permeare facile poffit, & quali fuctum peruadere. Hanc tunicam parui attingunt neruuli, à fexta coniugatione exorti; nulli autem in pulmonum fubftantiam diffeinantur. Maxima eft pulmonum & cordis cõnexio, ob viciniam & communionem vaforum: alligantur enim cordi per vafa duo, dorfo per afperam arteriam. Pulmonum vfus varij funt, ii que mirabiles. Plato pulmonem conftructum vult, vt ab eo cor iræ ardore exæftuans temperetur. Cũ, inquit, Dij cognofcerent cor terum terribilium obiectu trepidaturum, & ira fapius flagratum, æftus illius temperandi gratiã pulmonem cordi adhibuerunt, mollem & exanguem primũ, deinde carnes extrinsecus fiftilis fpongiæ inftar diftinctum, vt fpiritu potũque haufto, cordis ardorem eiuſmodi refpira-

Medicorum
vsum.
Primum.
Secundum.

Tertium.
Quartum.

Quintum.

tionem tepefaciat. Veteres tumorem & animi fastum in pulmone collocarunt, unde Græcis μέγας πνεύμων, & prouerbum *De pulmone reuellere*, id est, stultam & arrogantem opinionem animo eximere. Medici pulmonem in subsidium pulsationis cordis creatum volunt; externus enim aer in pulmones, ceu in thecam, reconditur, ut inde paulatim in cor deducatur. Quinetiam refrigerandi cordis gratia constructum putant. Cor namque viscus calidissimum ob continuos & perennes motus æstu incandesceret, nisi pulmonum adminiculo, quasi flabello quodam, ventilaretur. Est tertius pulmonum vsus ad vocem edendam, & quæ animalia pulmone carent, vocem non edunt. Quartus est, ut sit pulmo velut sustentaculum quoddam cordis, ne parte anteriore ad os pectoris, posteriore ad spinam allidatur, dum animal terrore corripitur, aut ira commouetur. Quintus, ad aeris præparationem: non enim extraneus aer impurus, & derепente intruens, fieri poterat interioris spiritus conueniens pabulum; hunc itaque paulatim alterari, & familiarem innato spiritui qualitatē longiuscula mora recipere necesse erat. Agnouit Columbus alium vsum; sanguinis quippe & vitalium spirituum præparationem, contra quem in Controuersis nostris disputatum est.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

De respirationis natura; quid sit & quorū sint eius causæ.

QUESTIO XIX.



Caloris
motus duplex.

Frigidi
spiratus
necessaria.

Cuius
aer
ad
spiraculum
committitur
quædam
aqua.

Quid
respira-
tio.
Quid
perspi-
ratio.

PRÆCLARA est diuini Senis libro *De natura pueri*, sententia, ὡς τὸ θερμὸν τῶ ψυχρῷ πέφικται, & μετ' ἐξου. Calidum omne frigidum moderato nutritur, fouetur, cōseruatur. Hanc summi Hippocratis sententiam exponit & illustrat eleganter Galenus lib. *De vsu respirationis*. Quemadmodum, inquit, flamma angusto conclaui coarctata & aëre non ventilata marcescit: ita natiuus noster calor frigidi defectione languet, contabescit, & tandem extinguitur. Calor enim noster flammæ instar continenter mouetur in utramque partem, sursum, deorsum, intus & extra. Sursum & extra, quia leuis; ignea quippe & aërea est natura; deorsum & intus ratione pabuli. Vterque motus si impediatur aut marcescit, aut extinguitur calor; marcescit indigentia pabuli, quia deorsum & intus non potest moueri; extinguitur & strangulatur, quia sursum & foras moueri non potest, nec refrigerari. Est ergo ad natium caloris tutelam necessaria frigidi spiratio. Frigidi illud aer est, aut aqua; aer in sanguine & perfectis animalibus commodior est, quia cum rarus sit & fungosus, pulmo, cōsertim & subito dum distenditur thorax, impleri debet, ne detur vacuum; fertur autem momentō aer, non aqua. Sed & calidissimum cor celeri eget refrigeratione; aer ob tenuitatem facillimè cuncta spiracula permeat, quod aqua præstare non potest: aer omni ex parte ambit & circumdat nos; aqua non semper præsto est; non enim in aquis degimus: aer pulmones implens eos ad motum leuiore reddit; aqua pulmones implens eorum motum impedit; aer ut citò inspiratur, ita & facile expiratur; aquam haurimus quidem celerrimè, sed eam expirare non ita licet. Spiratur ergo commodius aer quàm aqua. Spiratio hæc aeris Græcis πνοή aut πνοία duplex statuitur: alia, insensilis est, alia conspicua & assectabilis. Illam Hippocrates & Galenus propriè διαπνοὴν vocant, Latini perspirationem & transpirationem; hanc vero ἀναπνοὴν, id est, respirationem. Διαπνοή per ocella sic cū spiracula, unde ἀδύλος dicitur. Αναπνοή per sensiles & conspicuos ductus, os quippe & nari.

Hoc didici ex Galeno comment. in librum De salubri dieta : Ο νομῶν, inquit, ἀναπνέων τὴν διὰ τοῦ σώματος ἔξω τε καὶ εἰς τὴν φρενὶν τὴν πνεύματος διαπνέων δὲ τὴν διὰ τοῦ σώματος ὁμοίως γιγνομένην. id est, Respirationem voco, cum spiritus per os intro & extra fertur, per spirationem cum per rotum corpus aer trahitur & expiratur. Quorum animalium languidus est & debilis calor, transpiratione sola contenta viuunt: sic ἐντομα exangnia, insectilia transpirant tantum: sic ferus in viro transpirat tantum, non respirat: & hystericarum mulierum quamplurime exoluto natino cordis calore à venenata corrupti seminis aura, viuunt ad tempus, sola transpiratione contentæ. At quorum animalium calor ingenti velut flamma exardescit, non potest sola transpiratione & articularum pulsu temperari: maiore itaque adminiculo, quasi flabello, indiget; id autem sola respiratione cōparatur. Respiratio igitur hac, ἀναπνοή proprie dicitur. Hippocrates sæpissime πνεύμα appellat in Prognost. Coacis, Aphorismis, Epid. πνεύμα, inquit, πυκνὸν καὶ σμικρὸν ἐόν, φλεγμονὴν καὶ πόνον ἐν τοῖσι χελεοῖσι τοποῖσι σημαίνει: Respiratio frequens & parua inflammationem & dolorem partium principū denotat. Sect. 2. lib. 6. Epid. πνεύματα σμικρὰ, πυκνὰ, μεγάλα, ἀραιὰ, dicuntur spiritus parui, frequentes, magni, rari, id est, respirations. Respirationis huius naturam hic placet inquirere. Respiratio sicut & pulsus, duplici motu constat: fit enim thoracis distentione, & eiusdem contractione: itaque respirationis due erunt partes, inspiratio & expiratio. Inspiratio est aeris introductio, expiratio aeris extreductio; inspiratio diastoles, expiratio systoles rationem habet. Vtrumque motum gemina excipit quies: prior inspirationem, altera expirationem. Desiniatur ergo respiratio, actio partim animalis, partim naturalis, qua per os ducitur aer ad pulmones distento thorace, & vapor fumidus excluditur eodem contracto, ad natiui caloris conseruationem & spiritus animalis generationem. Desinitio hac respirationis causas omnes continētes eleganter exprimit, efficientem quippe, finalem & instrumentariam. Efficiens respirationis causa partim est anima, partim natura. Natura, id est naturalis illa facultas animæ, spirituum procreatrix, que in corde maximè viget, (vitalem vocant Medici) principium est motus; propter cor enim primario instituitur respiratio. Anima, id est voluntaria illa facultas actionis necessitate stimulata, thoracis musculos mouet; unde distentio cōtractioque, inspiratio & expiratio. Mixta igitur est actio, non secus ac urina & fecum excretio, ut rectè cum Nemesio dicere possim τὸ ψυχικὸν καὶ φυσικὸν, id est, animæ opus cū nature munere coniunctū esse. Per animam, animalem & voluntariā actionem intelligo. Volūtatem autem duplicem statuit subtilissimus Scaliger: alteram κατὰ προαίρεσιν, id est, ab electione, que vigilantibus nobis lucet, & in solis rationem habentibus reperitur, σοφία δὲ dicitur; alteram κατὰ ὄρεσιν, id est, ab instinctu, que dormiētib; nobis & in brutis apparet. Requirit autem hanc animæ facultatem, id inter cetera testatur, quod læso cerebro, respiratio lædatur. Sic phreniticorum respiratio magna est & ex longis intervallis Hippocrati in Prognostico. Finalis respirationis causa multiplex statuitur. Asclepiades respirationem institutam esse putat ad animæ generationem: Nicarchus & Praxagoras ad animæ robur: Philiston & Diocles ad solam ventilationem: Erasistratus ad vacui fugam, ut aere impleantur arterie, solum enim aerem voluit in arteriis contineri. Aristoteles libro de respiratione non vult inspirari aerem ad nutritionem, quia non expiraretur inspiratus; at ita copiosus exit ut ingressus est: adde quod aer simplex est. Spiritus verò quid mixtum; deinde non ex aere fit spiritus, sed ex alimento per venas affluente, ut ignis non fit ex aere, sed ex rebus combustibilibus: vult ergo Aristoteles respirationem non nutritionem aliquam igni præstare, sed refrigerationem tantum. Nos cum Hippocrate & Galeno duplicem respirationis usum agnoscimus, primarium & secundarium. Primarius & maior usus est natiui caloris, qui velut flamma in corde exardescit, conseruatio. Secundarius & mi-

Respiratio
Hipp. sæpe ap-
pellat πνεύμα.

Respirationis
due partes.
Inspiratio.

Respiratio
naturalis.

Respiratio
efficientis causa
partim anima
partim natura.

Voluntas du-
plex.

Respiratio
causa finalis
multiplex.

Respirationis
usum duplex.
Primarius cō-
seruatio natu-
ri caloris.

nor spiritus utriusque vitalis & animalis generatio nutritioque. Conservatio nativi caloris fit refrigeratione & diffilatione seu expurgatione. Refrigeratio necessaria fuit; quia periculum erat ne cor ob perennes motus incendio conflagraret, nisi aere tãquam flabello quodam ventilaretur. Calor noster nativus blandus, suavis & viviscus in extraneum degeneraret,

Respiratio duplici ratione cor refrigerat.

Expurgatio calorem conservat.

Obiectio.

Solutio.

Respiratio visus generatio spirituum.

Obiectio.

Solutio.

Organa respiratio trium generum.

In quibus conveniunt respiratio & pulsus.

In quibus dissident pulsus & respiratio.

An pulsus quibus respiratio minus sit magis necessarius.

Responsio.

& tandem febrilis evaderet, nisi refrigeraretur. At respiratio, ut docet Galenus cap. 2. libri octavi De usu partium, duplici ratione cor refrigerat; in inspiratione quidem, qualitate frigida suppeditata; in expiratione verò eo quod feruet effuso. Conservatur etiam calor expurgatione & diffilatione fuliginis. Nisi enim continenter expurgaretur calor, nisi vapor fumidus liberum haberet exitum, suffocaretur per oppressionem cor, ut apparet in his qui strangulantur, tenduntur enim eorum vena, intumescit facies, oculi prominent. Namque ut flamma à crasso multoque fumo extinguitur, ita cor à vaporibus fumidis strangulatur. Obicit hic fortasse aliquis, respirationem non institutam esse ad refrigerationem, quia moribundi & frigidum expirantes, inspirant; at nullus aut certe languidus eorum calor. Respondeo, inspirare ut expiraret; adeest necessitas expirationis, ob copiam fuliginum, non inspirationis; propterea validior morientium exspiratio, quàm inspiratio. Est itaque primus hic respirationis usus conservatio caloris cordis, quæ fit refrigeratione & expurgatione. Alter usus est nutritio & generatio animalis & vitalis spiritus: fit enim uterque ex aere & sanguine simul mixtis: aerens est noster calor; Ergo aere sibi simili & consociali reficiendus. Hoc docuit Hippocrates libello De alimento. Α πρῆ τρῶν πνεύματος ῥίπες, στόμα, πνεύμων, καὶ ἡ ἀλλὰ διασπῶν, id est, principium alimenti spiritus, nares, os, pulmo & reliqua respiratio. Obicit Aristoteles non necessariam esse aeris substantiam, sed qualitatem solam, quod confirmari potest Galeni auctoritate lib. De utilitate respirationis. Tantum, inquit, exit de aere inspirato quantum in inspiratione attrahitur. Sed respondemus totum aerem non expelli, nec eundem qui inspiratur; pellitur enim vapor fumidus qui ex permissione fit sanguinis & aeris; deinde qui excluditur aer, crassior est inspirato. Ita de finali causa statendum censeo. Instrumenta respirationi dicata trium sunt omnino generum. Alia sunt deductentia materiam respirationis, larynx quippe & aspera arteria; alia excipientia, ut pulmones; alia moventia, ut muscoli 65. quorum alij liberae, alij violente & coarctæ respirationi suam dicarunt operam. Ex quibus cuilibet obitum apertumque fit, respirationem & pulsus in multis consentire, in plerisque dissidere. Conveniunt in hoc, quod ambo eidem inferunt facultati, id est, vitali; solius enim cordis gratiâ utraque actio instituitur. Præterea eadem est utriusque finalis causa, eadem necessitas triplex. Tertio conveniunt in ratione motus, constant enim ambo diastole, systole & quiete gemina. In hoc verò dissident, quod pulsus, naturalis est motus, sique continuus, non interruptus & extra omnem voluntatis potestatem, respiratio libera est, & plerumque pro arbitrio cessat. Efficiens pulsus causa sola est natura, respirationis anima cum natura pulsus organa sunt cor & arteriæ; respirationis muscoli; pulsus à corde fit; respiratio non à corde, sed propter cor: denique quinquies pulsus cor intervallo unius respirationis. Ne quid verò ad perfectam respirationis naturam desiderari possit, duo breviter inquirenda sunt, an pulsus quam respirationis maior sit necessitas; tum, an pulsus respiratione nobilior. Scribit Galenus initio libri De usu pulsuum, respirationem tantò magis esse pulsui necessariam, quantò cordis calor magis est ad vitam necessarius, quàm reliquarum partium calor: & 4. De locis affect. cap. 8. scribit fieri non posse ut animal respiratione privatum vivat. Contrà, vivunt hysterice sine respiratione; fatus in utero non respirat; apoplectici quidam non respirant; sine pulsu autem & motu cordis constare vitam non potest. Dico pulsus alium esse cordis, alium arteriarum: pulsus cordis magis ad vitam est necessarius, quàm respiratio; sed peculiaris arteriarum pulsatio respiratione minus est necessaria: si enim vinciantur aut intercipientur arteriæ, non interibit animal, respiratione autem pri-

natum subito extinguetur. Pulsus porro respiratione nobilior est; tum quia organum pulsus nobilior, cor scilicet; tum, quia finis prestantior iis quæ diriguntur ad finem; at respiratione ad conservationem pulsus instituitur: adde quod spiritus aëre est prestantior.

Pulsus respiratione nobilior.

An respiratione animalis sit, vel naturalis actio.

QUESTIO XX.



Respirationis causa efficiente maxima disceptatione certatur inter Philosophos & Medicos. Alij enim à natura sola; alij ab anima tantum utrumque motum & distentionis & contractionis fieri putant: illi respirationem iniussam, hi voluntariam esse actionem contendunt. Non est utraque opinio suis destituta patrocinis. Aristoteles naturalem omnino esse & inuitam existimat, quem secuti sunt Auerroes, Turisani, alij.

Respirationem naturalem esse docetur.

que ex Græcorum, Arabum, & Latiorum familia quamplurimi. Hanc eorum sententiam rationibus satis validis & veri specie adumbratis confirmare placet. Actio omnis voluntaria ab electione est & cum apprehensione obiecti: at dormientium electio nulla est, voluntas nulla. Præterea certissimum est per somnum animales omnes facultates otari: at respiramus dormientes ut vigilantes, estque tam in somnis, quam in vigiliis æquabilis & sui similis respiratio: non ergo actio est animæ, quia nulla animalis actio æquæ in somnis ac vigiliis perfecta est. Sed & carosis exoluntur facultates omnes animales: caron namque definit Galenus animalitatis priuationem; sed in caro seruatur respirandi libertas.

Actio i.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Septima.

Octava.

Nona.

Decima.

Undecima.

Duodecima.

Decima tertia.

Apoplectici nihil ex voluntate agere possunt: est enim apoplexia resolutio vniuersi corporis, id est, cerebri & totius nervosi generis; vis ergo omnis à cerebro influens extincta est, ut siue vras, siue pungas nihil sentiant; ablato sensu impossibile est remanere motum voluntarium: at respirant Apoplectici; aliunde ergo quam à cerebro respiratio. In Epilepsia conuelliuntur vniuersum corpus cum sensuum & mentis priuatione, remanet tamen spirandi quedam libertas. Quinetiam si respiratio voluntaria esset, fatigaretur tandem ut cætera omnes animales actiones; at respirando non fatigatur animal, quin potius si liberè spiritum non ducat, fatigatur: ergo naturæ opus est non animæ. Accedit quod si respiratio esset voluntaria, cogitaremus aliquando an respirandum esset vel non; at respiratio in deliberationem nunquam cadit. Deinde voluntarium & perpetuum contraria sunt: at respiratio perpetua est, & à vita in animali perfectio inseparabilis: cor enim, ut scribit Galenus libro De fetus formatione, ubi respiratione fuerit priuatum, moueri definit. Adde quod si idè voluntaria esset respiratio, quia celeriorè tardiorèque eam facere possumus, eadem ratione cordis & arteriarum motus voluntarius esset; possumus enim pro voluntatis imperio pulsus nunc rariore, nunc densiore, nunc celeriores, nunc tardiores facere, nam si irascamur, aut exerceamus nos, augebitur pulsus: si spiritum cohibeamus, minuitur. Potest etiam afferri hæc ratio non inelegans. Animales actiones, pro voluntatis imperio cohibere possumus. At dum ira exæstuat cor, dum inflammatione tentatur, dum causo & acuta febre infestatur, ita frequens est respiratio, ut ei imperare non liceat. Asthmatici, pleuritici, ortopnoici coguntur velint, nolint, ita respirare: non itaque voluntaria est. Præterea respiratio vitali facultati inseruit: solius enim nutritionis, refrigerationis & expurgationis gratia comparata est, & in solius pulsationis subsidium instituta, vnde cor Galeno princeps respirationis organum dicitur; at vitalis facultas voluntaria non est, sed purè naturalis. Sed & eadem videtur esse pulsus & respirationis efficiens causa, quia augeatur minuiturque respiratio ut & pulsus, non pro arbitrio voluntatis, sed pro usu aucto vel imminuto. Sic febricitantium & currentium respiratio maior est frequentiorque etiam inuitis nobis; aucto nimirum cordis æstu. Postremo; Galenus tertio De locis affectis, disputans aduersus Archigenem, cere-

brum facultatum animalium sedem esse, non cor hac ratione docet, quòd lesa imaginatione, memoria & principibus facultatibus, cerebro non cordi remedia admoventur. Ita liberum sit nobis argumentari. Lesa respiratione, non cerebro, sed thoraci & cordi remedia adhibentur. Erat itaque respiratio cordis, non cerebri actio. His omnibus Galeni auctoritas adiciatur. Scribit Galenus secundo De Anatomic. administrat. & libello De his que in medicatrina fiunt, respirationem actionem esse naturalem, & commentario ad Asporisim. 23. sectionis tertie, neminem posse cohibere spiritum asserit; & libro De usu respirationis, Moderata, inquit, respiratio contingit per arterias toti id est, omnibus partibus, præterquàm cordi & cerebro, quia cordi accidit per pulmones, cerebro per naves: ergo videtur naturalis. His itaque rationibus suaderi potest, respirationem non ab anima fieri, sed à natura id est à corde, & propter cor. Qui contra sententiam hanc iuraverunt, respirationem omnino voluntariam esse volunt, his, ut opinor, persuasuror rationibus. Illa actio voluntaria est, docet Galeno secundo De motu musculorum, quam & sedare possumus dum volumus, & cum nondum facta est, facere: at talis est respiratio, cohibere enim spiritum possumus cum volumus, eum nunc rariorem, nunc frequentiozem, nunc tardiozem, nunc velociorem efficere. Extat ad huius rei cõfirmationem commemorabiles historie multorum qui perimaciter & voluntarie cohibito spiritu mortem sibi consciverunt. Seruus ille barbarus, ut scribit Galenus secundo De motu musculorum, quim vehementi ira concitatus mortē sibi consciscere decreuisset, prostratus humi respirationeq; cohibita longo quidem tempore immobilis mansit, postea vero paulum volutatus animam efflauit. C. Licinius Macer vir prætorius repetundarum reus dum sententie dicerentur, apud Menianum descendit, & sudario quod forte in manibus habebat, ore & faucibus coarctatis, incluso spiritu, penam morte præcurrit. Coma Maximi latronum ducis frater, cum de viribus & conatibus fugiunturum interrogaretur sumptio tempore ad se colligendum caput operuit, innixusque genibus compresso spiritu inter ipsas custodum manus inque conspectu summi imperij exoptata securitate acquieuit. Hac Valerius libro nono. Cato minor qui Vticensis dictus est, cum sub tractum à filio gladium reposceret, eumque negarent famuli, ne dare vererentur hortatus est; non enim se id facere ad consciscendum sibi mortem, sed ad tuendum se, quando si mori vellet, non defuturus sibi mortis vias alias, ut vel caput ad parietem alideret, vel spiritum interclusum ad tempus non multum comprimendo extingueretur. Scribit Hippocrates sect. tertia libri secundi Epidem. ἐν τῇ ἐκ τῶν οὐρανῶν χάσματι μακρὸν πνοὴν, medellam continuarum oscitationum prolixam esse spirationem. Singultus etiam apud eandem cohibitione spiritus sanatur, cuius rei elegans extat apud Platonem in Symposio exemplum. Aristophanes singultiendo frangebatur; quocirca ad Eryximachum Medicum conuersus: O Eryximache, inquit, tua nunc interest aut singultum reprimere, aut pro me loqui. Tunc Eryximachus: Equidem vicem tuam sumens pro te dicam, tu verò pro me postquam singultus abierit; interim dum ipse loquor si vis aliquandiu spiritum cohibere, singultus cessabit. Liberum ergo est nobis spiritum cohibere, propterea libera est actio qua inspiramus & expiramus. Præterea respiratio animalibus fit instrumentis, discenditur enim thorax & contrahitur musculorum intercostalium, diaphragmatis & nervorum opera; animalis itaque est actio. Postremo leso cerebro & principibus facultatibus, leditur respiratio ille lesis corde & pulmonibus. Sic in phrenitide respiratio magna est & rara, quis egrotat mens, facultas in vitio est. Directas, ut opinor, hinc inde acies videtis. Nos vitæque partem cum summo suo iure tueri non possumus: si quid tamen de eo demittere aliquantulum veraque velit opinio, eas cõsiliare non erit difficile; quod in hunc quidem modum tentabimus. Actionum alie sunt purè & simpliciter naturales, ut coctio, distributio alimenti, nutritio: alie omnino animales & voluntarie, ut loquutio, progres-

Auctoritas Galeni.

Respirationem omnino voluntariam esse. Ratio 1.

Historiamul-torum qui co-hibito spiritu extincti sunt, voluntate ele-na imperante.

Auctoritas Hippocratis. Oscitationum medella.

Singultus me-della.

Secunda.

Tertia.

Cõsiliatio quinquies.

fio; alia mista, id est, partim naturales, partim animales, ut οὐρανός, urina & fecum deiectionis. De his actionibus recte pronunciat Nemesius, ut iam dictum est, τὸ ψυχικὸν τὰς φυσικὰς, id est, anime opus cum natura munere coniunctum esse. Errant, inquit Galenus cap. 4. lib. 6. De locis affectis, qui urina & fecum deiectionem totam ab electione pendere putant, ut etiam qui hoc opus omnino naturale admittunt, viriusque sanè particeps est utraque actio. At cap. 6. lib. 2. De motu musculorum, parem vult & eandem esse respirationis & urine ac fecum excretionis rationem. Est igitur respiratio actio mista, partim naturalis, partim voluntaria. Naturalis, ratione causse finalis & necessitatis. Animalis, ratione organorum, musculorum scilicet thoracem distendentium & contrahentium. Strangulati non respirant, quia nequeunt animaliter, interceptis laqueo nervis & musculis. Histerica quedam mulieres non respirant, quia nequeunt naturaliter, nullus enim respirationis est usus, nulla urget necessitas, instrumenta libera sunt. Sunt qui motus voluntarios ita distinguant, ut alij sint prorsus & absolute liberi, quos quoties & quantum volumus impellimus nulla ad id urgente necessitate, alij liberi quidem, sed à quibusdam corporis affectibus lacessiti, eiusmodi respiratione esse volūt. Sed malim ego respiratione mista actionem dicere; motus enim qui à musculis perficitur omnino est voluntarius, sed impellens causa omnino naturalis; sic urine excretio pure naturalis est, retentio pure animalis. Debit autem aliquo modo voluntaria esse respiratio, quia vile est aliquando cohibere spiritum, aliquando impellere. Si quid attentius auscultandum, si per loca fatentia transeundum, si in aquam mergi oporteat, utilissimum est cohibere spiritum; contra si ignis excitandus, si quid inflandum, concitata respiratio commodissima est. Errant igitur qui respirationem actionem omnino naturalem esse volunt. Errant etiam qui omnino voluntariam esse tuentur, quia non omnia respirationis organa animalia sunt; pulmo enim organum est naturale, respirationis gratia institutum: Rationibus autem singulis satisfacere non erit difficile. Dormientes, aiunt, respirant; at dormientium electio nulla. Respondemus, voluntatem duplicem esse; alteram ab electione; alteram ab instinctu; hæc in dormientibus est & brutis. Per somnum non feriantur omnino animales facultates, remissio tantum est, ait Galenus, non intermissio facultatum; nam & musculi tonicum habent motum, qui in omnibus partibus, sed precipue in sphincteribus ani & vesicæ conspicuus est. Et ambulamus loquimurque interdum dormientes; quis autem actiones eas etiamsi ab electione non sint naturales dixerit? Carotici, epileptici, apoplectici respirant, quia exigua adhuc vis in nervis & musculis latet, quæ ab urgente necessitate excitatur; remanent adhuc in musculis nervisque vestigia quedam animalitatis. Nam si fortissima sit apoplexia, ut scribit Galenus 5. De locis affectis, superno duntaxat principio vitiatò, subito extinguitur homo, quia privati musculi mouendi facultate, quæ à cerebro influit, thoracem attollere nequeunt. Etenim nisi adspirandi functionem ambo principia simul iuncta concurrerent, potuisset aliquis vivere, privati interdum superno principio. Non fatigatur respiratio ut relique voluntariae actiones, quia illius usus perpetuus & necessarius est. Quid si dicam dum placida est, non fatigari animal, dum autem coacta est, fatigari? Non in omni actione voluntaria, deliberatione & consilio est opus. Oculos sæpe nunc in hanc, nunc in illam partem vertimus, animo alius in rebus occupato. Neque verò animale & perpetuum contraria esse admittimus. Quæ autem de cordis & arteriarum motu, quem nunc celeriores, nunc tardiores facit voluntas, afferuntur, lenissima sunt. Nam mutari quidem pulsus volumus, sed non immediate, quia augeri primum debet aut minui calor cordis; at respirationem momento & ut lubet tardiores & frequentiores facit voluntas, non immutato usu, non auxilio, nec diminuto cordis calore. Decima ratio, undecima & duodecima non omnino esse voluntariam respirationem concludunt, quod nos etiam affirmamus. Non tamen naturale omni-

Actiones alie naturales, alie animales, alia mista.

Respiratio mista est actio.

Respiratio cum voluntaria esse debuit.

Hi qui naturalem motum actionem esse volunt fati-
 sci.
 Ratio 1.
 Secunda.

Tertia, quarta, quinta.

Sexta.
 Septima.

Octava.
 Nona.

Decima, undecima, duodecima.

Decima cer-
tia.Interpretatio
locorum Gale-
ni.Rariisbus or-
gum qui res-
piratioem con-
tinent voluntari-
um esse vo-
luntati.

no esse conficiunt. Eadem est (fateor) & pulsus & respirationis necessitas, eadem causa finalis, nutritio, temperatio, expurgatio, sed diuersa organa sunt motus. Leta respiratione, negamus semper cordi & thoraci ad mouenda esse remedia; nam lasso communi neruorum principio, affecta spinali medulla & ceruicis nervis, thoraci adhibere remedia inutile erit. Authoritates Galeni interpretatione egent. Non putat cohiberi posse omnino spiritum uiuente animali, vincitur enim à motu naturali, motus voluntarius; dum respirationem per arterias toti corpori contingere scribit: per respirationem intelligit motum, non modò voluntarium, qui fit à musculus, sed etiam naturalem, qui fit ab arteriis; de quo Hippocrates sect. 6. libri 6. Epidem. dum ait, Inspirans & expirans esse totum corpus. Prioris ergo secta rationibus satisfactum puto. Posterioris, quæ voluntariam omnino actionem esse contendit respirationem, rationes sic placet eludere. Illa quidem absolute & simpliciter voluntaria dici debet quæ & sedari potest arbitrio nostro si fiat, & excitari si non fiat: at talis non est respiratio; si enim omnino cohibeatur spiritus, ut historia multorum testantur, extinguitur omnino animal; itaque excitari amplius non poterit respiratio. Atque ut uno verbo dicam, esse in respiratione aliquid voluntarium tres illæ rationes conficiunt, sed nihil à natura esse non probant. Nos missam esse actionem concludimus, & ad respirandi functionem ambo principia simul iuncta cerebrum & cor, animale & naturalem facultatem concurrere cum Galeno existimamus.

De motu & usu arteriæ venosæ.

QVÆST. XXI.



IRIA pulmonum sunt vasa, arteria aspera, vena arteriosa & arteria venosa; de quorum motu certant Anatomici. Sunt qui omnia hæc ad motum pulmonis moueri velint, alij ad motum cordis. Galenus septimo De usu part. capite nono scribit dilatato pulmone, solas arterias asperas dilatari. Si (inquit) mortuo animali per laryngem in sufflaueris, implebis asperas arterias & pulmonem distendi videbis, cum interim arteria læues ac vena molem sibi ipsis retineant equabilem. Non ergo ad motum pulmonis mouentur vena arteriosa & arteria venosa. Neque etiam eodem motu mouetur quo & cor & arteria. Non enim quia distenduntur implentur, sed quia implentur dilatantur, quia vacuantur concidunt, ut utraque cordis auricula. Nam cor in sua dilatatione trahit aërem ab arteria venosa; in systole pellit in eandem vapores fumidos, vacuatur ergo in tractione cordis, & impletur in contractione, ut moueatur quidem ad motum cordis, sed non eodem motu, nec eadem vi qua agitantur arteria. Dices, arteriam venosam cordis esse continuam & à sinistro cordis ventriculo, in quo vis illa pulsatilis insita est, ortum ducere, non secus ac magnam arteriam. Sed si primum eius ortum attente inspexeris, videbis à dextro potius sinu oriri & vena causa esse propaginem cuius structuram retinere, tunicam enim habet simplicem, non crassissimam arteriarum instar. De usu autem arteria huius venosa quid sentiamus paucis aperiemus. Duplicem tantum agnoscunt Anatomici huius vasis usum, aërem scilicet in pulmonibus preparatum deferre in sinistram cordis sinum, & fumidos vapores spirituum recrementa exportare. Addo ego tertium; vitalis quippe spiritus & arteriosi sanguinis portunculam deferre ad pulmonem vitam; vita enim omnis à spiritu est vitali sanguineque arterioso, qui in sinistro sinu elaborationem perfectam consequitur. Hoc voluisse videtur Galenus libro sexto De usu partium, his verbis. Quod venæ propter crassitudinem suam ac densitatem alimenti minus ipsi tribuere possunt, hoc omne arteriæ compensant, tenuem, sincerum & vaporosum sanguinem abundè ipsi dispergentes. Et capite octauo libri septimi, Arteriæ, inquit, læues pulmonis tenuem, purum & vapo-

Arteria ve-
nosa ad
pulmonem mo-
tiu mouetur.Arteria ve-
nosa non eodem
motu agita-
tur qui arte-
ria.

Obiectum.

Solutio.

Arteria ve-
nosa duplicem
usum agnos-
cunt Anato-
mici.Arteria ve-
nosa tertium
usum, arterio-
sum sangui-
nem deferre ad
pulmonem.
Confirmatur.

rosū sanguinem continent, nam si sanguinis penitus essent inanes, cur non rectā ad cor asperē arteriæ pertinerent? posset enim arteria, aspera aërem ducere ad cor, & fumidos vapores educere. Columbus putat sanguinem hunc tenuissimum, qui in arteria venosa reperitur, non esse portionem vitalis spiritus, nec ferri à sinistro sinu, sed à dextro per venam arteriosam ad spiritus vitalis præparationem. Sed errat, nam si ē vena arteriosa in arteriam venosam ferri debuisset sanguis ad vitalis spiritus præparationem, oportuisset venas ita esse arteriarum comites, ut per anastomosis simul copulate unirentur, ut sanguis ē vena arteriosa in arteriam venosam subiret; at non sese tangunt hæc vasa, sed eo ordine undecunque ad extremam usque pulmonum superficiem digeruntur, ut aspera arteria in medio sit, vena arteriosa in posteriori parte, arteria venosa in anteriore.

Columbi opinio nana de usu arteria venosæ inutiliter.

De temperamento pulmonum.

QUEST. XXII.

De pulmonum temperamento lis est inter Medicos. Sunt qui in actius qualitatibus frigidum statuunt. Primum quia tota fere illius compositio ex partibus spermaticis, arteria cartilaginea, vena arteriosa & arteria venosa coagmentatur. Deinde refrigerandi cordis gratiā constructus est, unde à Philosophis cordis stabellum & ventilabrum dicitur. Tertiō frigidus facile corripitur affectibus, ut obstructionibus, asthma, dyspnœa, tuberculis. Quarto pituitosis & frigidis scatet humoribus, & quæ per tussim excernuntur, pituitosa fere sunt omnia; pituita autem omnis à frigido temperamento. Postremō summi Hippocratis auctoritas id suadet, libello enim *περὶ καρδίας* hæc profert: *ὁ δὲ πνεύμων πυρὴ ψυχρὸς, αὐτὰρ καὶ ψυχρόμενος τῇ ἐκσπνοῇ*: id est, pulmo naturā suā frigidus est, & inspiratione etiam refrigeratur. Sed & libro *De alimento*: *πνεύμων*, inquit, *ἐν τῷ τῷ σώματι ἵσχυον ἔχει, τὰ δ' ἄλλα πάντα τ' αὐτῷ*. hoc est, pulmo contrarium corpori alimentum trahit, reliquæ omnes partes simile alliciunt. Si contrarium trahit alimentum pulmo, frigidus sit necesse est: nam sanguinem calidissimum in dextro cordis sinu attenuatum trahit, eoque alitur. Galenus libello *De Anatome viutorum*, album esse pulmonem vult, ob aquæ & frigidi prædominium, & sedem aquæ appellat. Nos contrā, calidum esse pulmonem contendimus, siue substantiam spectes visceris, siue nutritionis rationem, siue usum. Substantia carnea est, eaque lenis, mollis, spongiosa, quam velut spumam sanguinis vocat Galenus. Alitur sanguine aëreo, spirituofo, in dextro cordis sinu elaborato, ut solius pulmonis gratiā dexter ventriculus constructus videatur. Adde, quod non decuerat membrum, quod indefinenter & primo occurſu aërem frigidum erat excepturum, frigidum formari. Postremō præparatur in pulmonum substantia aër, & familiarem vitali spiritui calidissimo qualitatem longiuscula mora recipit. Est itaque calidus pulmo. Contrarie rationes ordine ita dissolvendæ sunt. Constat pulmo spermaticis vasibus, sed propriam pulmonis substantiam caro constituit, eaque rarissima. Quod refrigeret cor, id nō temperie sua præstat, sed quia aërem excipit continetque extraneum, qui corde frigidior est, quantumvis æstuans, & calidus hauriatur: sic æstate media & fervidissimo, calo frigidus est aër cordi, licet naturā suā & actu calidus sit. Frigidus (fateor) corripitur affectibus pulmo, ut obstructionibus ratione vasorum, quæ variè implicita faciliè obstruuntur: caro verò phlegmone & calidis affectibus sæpe infestatur. Pituita quæ copiosissima tussiendo excernitur, non à nativa pulmonum temperie generatur, sed quia à cerebro, quod frigidus est receptaculum, decumbit continenter in pulmones humor. *κατὰ τὸ πρῶτον* enim frequentes, inquit Hippocrat. *Aph. 38. sect. 7. ἐστὶν αὖ τοῦ κοιλίου* in ventrem superiorem, id est, thoracem: quia etiam ab inferioribus partibus, ventriculo quippe & hypochondriis, suscitantur vapores quam-

Frigidum esse pulmonem voluit quoddam. & auct. Prima. Secunda. Tertia.

Quarta.

Auctoritas Hippoc.

Calidus pulmo demonstratur. Rationes.

Solventur rationes.

Ad primam. Ad secundam.

Ad tertiam.

Ad quartam.

Explicatur
Hippocrata.

Pulmo contrarium trahit
alimentum.

Ratio I.

Secunda.
Tertia.

Humidus
pulmo ducitur

Auctoritas
Rati.

Anicenna
opinio.

Anicenna.

Dilectum
contraria ra-
tiones.

plurimi, quos pulmo perpetuo motu permiscet humori, unde albedo. Dum Hippocrates lib. lo De corde, pulmonem frigidum astruit, confert pulmonum temperiem ad cordis temperamentum: & sanè pulmo cordi frigidus est, ut aer astius. Libello De alimento, dum pulmonem contrarium corpori alimentum trahere scribit, de aëre inspirato loquitur, non de sanguine, atque ita calidum pulmonem affirmat, est enim contraria aëris & sanguinis motio, cum aer, qui spiritus est, alimentum per corporis ambitum in pulmones & cor trahatur; sanguis vero ab hepate velut ex penu interiore in extremos corporis artus. Galenus hanc alimenti contrarietatem refert ad pulmonis constitutionem & vasorum in eo formam. Nam reliquæ partes sanguine crasso aluntur, pulmo solus tenuissimo in dextro cordis sinu elaborato. Reliquæ partes venam habent simplici tunica constantem & arteriam crassissimam. Solus pulmo venam habuit crassissimam & arteriam tenuissimam. Contraria ergo sunt pulmonis & reliquarum partium vasa, dissimile etiam alimentum. Galeni liber De Anatome viutorum, germanus non est, sed falsio adscriptus. Statuatur ergo in actiuis qualitatibus calidus pulmo. De passivis eadem est controuersia. Quod sicus sit, ita demonstratur. Excauatus est intus pulmo, nec concidunt unquam eius foramina, quod duritiem & siccitatem testatur: præterea bilioso alitur sanguine teste Galeno 4. De usu partium: at biliosus sanguis sicus est. Tertiò, pulmo, apud Hippocratem focus est sitis; duplicem enim statuit sitis focum; alterum in ventriculo, alterum in pulmonibus: de quibus extat solenne illud edictum in Epidemii, sitim sedant & arcant, frigidam aquam bibere, frigidam auram ducere. At sitis appetitus est frigidi & humidi. Galenus contrà, quem nos tanquam ducem sectamur, pulmonem humidum esse vult, capite 3. lib. 2. De temper. Ipsum, inquit, cerebri pulmonisque proprium corpus humiditate proximum est adipi: & cap. ultimo lib. 1. De tēperam. minus humida quā adepi, est pulmonum caro. Auctoritas ratione confirmatur, ut durities siccitatem, ita mollities humiditatem testatur: at mollis est pulmonum substantia & laxa; quod indicat tactus, & Galeni auctoritas 4. De usu part. Caro, inquit, lienis quamuis mollis & laxa sit, à pulmonis tamen carne magno intervallo relinquitur, mollissima enim ea est, laxissima & leuissima. Anicenna Fen prima 1. doct. 4. c. de complex. membrorum, pulmonem mollem non esse vult naturā suā, sed ex euentu, quod perpetuo humore à cerebro decumbente inebrietur & madesat, propterea non mollem, sed madentem mauult appellare. Verum si ex madefactione tantum pulmo mollis esset, exhausto & exsiccato humido rigante, tandem aliquando durus euaderet: at durus nunquam euadit, nisi igne torreatur. Est igitur non ex euentu modo, sed etiam naturā suā humidus pulmo, & tanto hepate humidior, quanto mollior. Quæ de siccitate obiciunt aduersarij, leuissima sunt. Nam & cerebrum suos habet sinus, qui etiam in grauissimis motibus, ut sternutamento & epilepsia, non concidunt: ut ergo in ventriculorum extremis durius est cerebrum, unde eam partem callosum corpus vocant Anatomici, ita durior aliquantulum est pulmo qua parte vasa amplectitur. Bilioso sanguine pulmonem alii dixit aliquando Galenus, sed per biliosum tenuissimum intelligit in dextro cordis sinu elaboratam, quem sicum esse nemo dixerit, sed humidissimum; humido quippe aëreo redundantem. Quod autem flauus sit ille sanguis, non bilis, sed spiritus permissionem arguit. Focus est sitis pulmo si incanduerit: quia & cordis & vicinarum partium humidum omne exhaurit; sed si nato quò sit se habeat, sitim non excitat.

MOVERI pulmonem locali motu & inspiratione amplificari, ex-
 spiratione vero collabi & satisfacere qui negauerit, poenâ sensus dignus esto.
 Sed motus illius ratio efficiensque causa inter Medicos & Peripateti-
 cos controuersa est. Aristoteles 3. De partibus animal. cap. 6. pulmo-
 nem motus sui principium à corde accipere putat. Calor enim cordis
 auctus pulmones vi sua attollit, hinc aer ingreditur ne detur vacuum;
 aeris frigidi appulsu calor exastuans residet ut frigida affusa aqua fervor subsidet: ut ergo
 diffuso calore dilatabatur pulmo; ita residente calore contrahitur, unde aeris fit expressio.
 Auerroes cum Aristotele cor respirationis quidem auctorem agnoscit, sed pulmonem pro-
 pria vi moueri contendit, non autem thoracis motum sequi, quia daretur aliquis motus vio-
 lentus perpetuus. Esse autem mirabilem thoracis & pulmonum consensum vult, idcirco al-
 terum sine altero moueri non posse, & quiescente altero, alterum quoque quiescere, neutrum
 tamen alteri principium & causam motionis tribuere. Nos cum Galeno & Medicis om-
 nibus pulmonem nec propria & insita vi moueri volumus, ubi enim fibre & filamentorum
 robur, nec à facultate ea cordis pulsatili, qua agitantur arterie: intermittit enim aliquando
 pulmonum motus, & nunc rarior, nunc frequentior est, nunc tardior, nunc velocior pro vo-
 luntatis arbitrio, nec à facultate animali, quia muscoli nulli ad sunt, sed moueri existimamus
 pulmonem accidentario motu, quia thoracis motum sequitur ad vacui fugam. Distincto enim
 thorace impletur aere pulmo & amplificatur; contracto eodem, depletur & concidit. Hanc
 suam opinionem hac ratione fulcit Galenus, quod nullam inuenire liceat dispositionem, in
 qua thorace immobili manente moueatur pulmo. Sed & experientia id confirmatur. Nam
 si aperiat thorax ut aer ingredi per vulnus possit, immobilis erit pulmo, ut pote qui ad dila-
 tationem thoracis consequi nequeat subingrediente aere in spatium inane. Integro enim tho-
 race necesse est eo distento, pulmonem quoque dilatari ne detur vacuum. Quod verò obiicit
 Auerroes violentum nullum motum dari perpetuum: fore autem violentum pulmonis mo-
 tum si thoracis motum sequeretur, absurdissimum est. Non enim violentum est quicquid ad
 alterius motum mouetur; nam ea ratione ossa violento motu mouerentur: eo autem perpetuo
 motu non fatigatur pulmo, quia ferè insensilis est.

Aristoteles
 opinatur de motu
 pulmonis.

Auerroes
 opinatur.

Pulmonis mo-
 tum accidentari-
 um est.

Confirmatur.

An tussis motus sit pulmonum & thoracis naturalis, an animalis.

QVÆSTIO XXIII.

PSSIM partium ferè omnium thoracis, ut pleuræ, mediastini, pulmo-
 nis & vasorum eius affectu contingere quotidianâ experientiâ clarum
 fit. Nam in pleuritide, peripneumonia, asthma & phthoe tussis continua,
 eaque molesta infestare solet. Sed ad quam facultatem actio illa sit referen-
 da, ambigitur. Animalem esse & voluntariam suaderi potest; quia tussis
 nihil aliud est quam efflatio validissima: efflatio autem musculorum omnium thoracem con-
 trahentium opera perficitur. Sed & Galenus 2. De symptomatum causis, de sternutamento,
 tussi & vomitione verba faciens, vomitum naturalis facultatis symptoma esse vult, iussim
 verò animalis. Alij contra naturalem esse motum contendunt; quia tussis motus est concus-
 sionis, fitque solo natura conatu studentis excutere quod molestum est: at motus omnes concus-
 sionis sui naturales sunt. Partes enim omnes, ut sunt à natura naturaliter constitutæ, suos quæque
 habent. Ex his, id est, concussionibus, quando concutiuntur, ad exclusionem rei noxiæ. Ta-
 lis est concussio cerebri in sternutamento, ventriculi in singultu, vesicæ in exclusionem calculi,

An tussis
 actus sit ani-
 malis.

Animalis esse
 docetur.

Naturalis esse
 confirmatur.

Conciliatio.

An tussis
naturalis sit
affectus, an
præter natu-
ram.Conciliatio le-
ctionum Galeni.

totius habitus & panniculi nervosi in vigore, thoracis in tussi. Quinetiam inuiti plerumque
tussimus, nec liberum semper est nobis tussim cohibere. Viroque conciliabis, si dixeris tussim,
ut & respirationem, mixtam esse actionem ex animali & naturali. Motus animalis est,
quia musculorum opera perficitur: causa autem impellens & mouens, naturalis est; non enim
sit tussis sine expultricis conatu. Virum verò tussis naturalis sit affectus, an præter naturam,
queri solet. Galenus 2. De Symptomati. causis, sternutamentum, tussim, singultum, oscitatio-
nem opera vult esse natura: & 5. De locis affectis, tussim, sternutamentum, singultum,
naturales affectus vocat. Contrarium tamen sentire videtur libro De tremore & palpitatio-
ne, ubi deprauatorum motuum quatuor statuit genera, concussuum, conuulsuum, tre-
mulum & palpitantem. Inter concussuos tussim, singultum, & sternutamentum numerat;
at deprauatus omnis motus præter naturam est. Conciliabitur Galenus, si dixeris tussim ra-
tione facultatis naturalem esse affectum: illius enim motus principium est natura, id est, fa-
cultas expultrix: ratione autem causa morbifica, præter naturam. Ita sæpe docet Galenus
motus omnes concussuos fieri partim à facultate, partim à causa morbifica, sed illius cause
naturam esse potentem.

An potus in pulmones feratur.

QVÆST. XXV.



VENTRICVLVM cibi potionisque receptaculum esse, toties ab
Hippocrate, Galeno & Medicis omnibus est decantatum, ut qui id
non credat, committat piaculum. Ridiculum est igitur querere an alie
sint via solidioribus cibis, alie liquidioribus alimentis dicate, vnicui
enim & idem canalus est, per quem cibi & potus in ventriculum inge-
runtur, œsophagum vocant. Sed an portio quædam potus per asperam

Ferri in pul-
mones potum.Auctoritas
Hippoc.Galenus
auctoritas.Relinquit.
Primo.

arteriam in pulmones aliquando feratur, perquirere non est extra Medicam & Philosophi-
cam contemplationem. Primus Hippocrates dubitandi occasionem multis præbuit: tunc
enim potum in pulmonem ferri affirmat, nunc pernegat. Nos questionem hanc in vtram-
que partem primum agitabimus; deinde ex Galeni decreto dissentientes Hippocratis
locos conciliabimus. Hippocrates libello *Ἐν τῷ χυμῷ*, ferri in pulmones portionem
quandam potus, aperitissimis verbis docet, quæ hic transcribere placuit. Homo, inquit, ma-
ximam partem in ventrem bibit: gula enim sine stomachus, velut infundibulum, potus co-
piam & quæcunque volumus excipit. Bibit autem & in guttur ac arteriam, minus verò
& quantum latere possit per rimam illapsus; operculum enim exaltum epiglottid, ne per-
miserit quidem aliquid amplioris potus penetrare. Signum autem huius rei hoc est, si quis
aquam ceruleo colore tinctam sitienti valde bibendam dederit, præsertim sui (hoc enim pe-
cus nec curiosum est, nec munditie deditum) deinde dum adhuc bibit, nouacula eius laryn-
gem secuerit, colore eo infectum guttur reperiet. Nequaquam igitur fides nostra suspecta
esse debet de potu, quod homini in guttur & pulmonem feratur. Eodem libello pericardij
aquam ex potu per asperam arteriam in pulmones deerrante generari scribit. Galenus 2.
De simpl. medic. facult. potus portionem per asperam arteriam in pulmones ferri non ut-
gat: & libris Methodi, inbet ad vlcus, quod asperam arteriam infestat, curationem, ut
supinus quam diutissime medicamenta in ore teneat, & omnes qui illic sunt musculos re-
mittat: ita enim sensim aliquid in arteriam insuet: cum enim, inquit, sanus est homo potio-
nis aliquid in pulmones deerrat. Cauendum tamen est, tam in aduersa quam secunda va-
letudine, ne copiosius in laryngem insuat, quia tussim excitaret; quod ante Galenum docue-
rat Hippocrates libro citato. Potest hæc opinio rationibus stabiliri, ex ipsa Anatomie &
quotidianis observationibus petitis. Epiglottis, quam laryngis operculum vocant Anatomi

mici

inici, semper hiat, ut aëri & vaporibus humidis aditum præbeat, neque unquam deprimi-
tur aditumque intercludit, nisi alimenti pondere deprimatur (nam quos aperienda & clau-
denda epiglottidi musculos somniant quidam in homine non agnoscimus) cur ergo si solo
pondere deprimatur epiglottis, exiguus vini, aquæ aut liquidioris alimenti hauritus lingu-
lam non grauius per rimas & latera laryngis in pulmonum bronchia non insluet, & ab
his aut in pericardium, aut in cor, aut in arterias? Præterea in arteriis, ut docuimus libro 6.
plus feri quàm in venis continetur: portio ergo liquidioris alimenti per pulmones in cor &
arterias derivatur, & ab iis per emulgentes in renes: non enim video cur emulgentes arterie
tam insignes constructæ sint, nisi expurgationi etiã inferuiant. Accedat ad hæc, quod in tho-
racis & pulmonis affectibus solent Medici omnes eclegmata, Symplos, tabellas præscribere,
quæ per arteriã asperã ad pulmones feruntur & sputũ pronocant. Obseruauimus sepe tho-
race vulnerato incredibile feri & puris copiã per vulnus effluxisse: solius pulmonis hoc excre-
mentũ esse nequit, quia tanta non est eiusdẽ moles. Verisimile est itaque aliquã potius portionẽ
in pulmonẽ insluere. Hoc veteres ferẽ omnes Philosophi voluerunt, unico excepto Aristotele:
dũ veteres dico, Platonem intelligo, Philistone, Locrum, Diocippũ Hippocraticum, Plu-
archum. Quod si in florentissima Græcorum Poëtarum ciuitate diuertere lubeat, multa ad
huius sententiã illustrationem colligemus. Extat Alcei distichon inter Anacreontis Odiã.

Τὸ γὰρ πνεύμονας οἶνω τὸ δ' ἄσπερον ᾄτετέ Μεταί

Α' δ' ἄε χαλεπὸν, πάντα δὲ δι' αὐτὸ καύματος.

Id est, irriga pulmones vino; nam caniculæ astrum exoritur; hora difficilis qua
cuncta sitiunt præ ardoris estu. Erasstheneis idem sentit;

Καὶ βαδὺν ἀκερότα πνεύμονα τεργόμενος.

Homerus de Cyclope eadem loquitur; & ut narrat Eupolis, πνεύ οὐ Πρωταγόρας
ἐκέλευεν, ἵνα πῶς ἔκινος πλεῦμον ἐκλυέον φέροι, id est, potare Protagoras iu-
tebat, ut ante aduentum caniculæ pulmonem madidum haberet. Contrariam
tamen videtur tueri sententiã Hippocrates libro 4. De morbis, quo loco multis rationi-
bus, usque validissimis, eos conuellit; qui potum in pulmones ferri assueuerant. Rationes

Contraria opi-
nio ex Hippoc.

Hippocraticæ hæc sunt: Pulmo canus est & omni ex parte fistulosus, organum spirabile &
vocale. Si itaque potus in pulmonem inslueret, expletus pulmo nec spiritum continere, nec
vocem edere posset. Hoc experimur quotidie in asthma & pulmonum obstructionibus:
grauior enim reditus pulmo thoraci mouenti non obsequitur: hinc dyspnœa, orthopnœa &
ἀπνοια, sapissime. Præterea, si potus in pulmonem ferretur, solidiores cibi in ventriculum

Ratio 1.

ingesti redderentur sicci, nec facili coquerentur. Tertio, medicamenta purgantia nec super-

Secunda.

nè nec infernè deicerentur: at solent cathartica omnia per vomitum & deiectiones alui

Tertia.

purgare. Quarto, purgantia pulmonem roderent, quia acris sunt; pulmo enim rarus est &

Quarta.

molli, & leui de causa à pituita decubitu ulceratur. Postremo, si in asperam arteriam &

Quinta.

pulmones descenderet potus, tussim excitaret; quia si tantillum pituita in laryngem decum-

bat, statim molesta oboritur tussis: hæc & alia per multa in medium profert Hippocrates,

quæ priori sententiã aduersari omnino videntur. Nos utramque opinionem facile concilia-

Conciliatur
utraque opi-
nio ex Galeno.

bimus, si quæ à Galeno sunt prodita libro 3. De placitis Hippocratis & Platonis, hic pro

coronide subtexamus. Si, inquit, potum omnem in pulmonem ferri existimat Plato, merito

accusandus est; quippe qui apertissimam rem ignoret: si verò portionem aliquam potus per

asperam arteriam in pulmonem decurrere arbitratur, probabile quidpiam dicit. Hippocra-

tis autem argumenta soluit Galenus eodem loco, adhibita hac distinctione: Si multa potio

ἀγέσως, id est, cõfertim in pulmones insuat, ut spirationis vias occupet, tussim excitabit,

vocem intercipient & difficilẽ spirationem pariet: quod si sensim per latera arteriæ asperg in

pulmonẽ feratur, nec tussim, nec ullum irritationis sensum excitabit. Hæc Hippocratis est

διαφορα. libello enim *ἡ δὲ καρδία*, portionem tantum potus ferri putati at lib. De mor-
bis eos refellit, qui uniuersum potum in pulmones influere contendebant. Quod si solidioris
alimenti tantillum in asperam arteriam feratur, periculum imminet suffocationis. Sic
Anacreon Poëta acino uine passe suffocatus, & Fabius Senator potu in lactis haustu pilo
strangulatus fertur. Scribit Alexander Benedictus matronam Brixensem filio pitulam
assumere nolenti digito in arteriam compulisse, tuncque protinus exanimatum.

HISTORIA ANATOMICA.

De collo & eius partibus.

CAP. XIII.

Collum thoraci
gratiâ con-
structum.

OLLUM thoracis & pulmonum gratiâ constructum esse id inter cetera testatur, quod quæ animalia pulmone carent, ut pisces, quæ item articulatam vocem non edunt, ea collum non habuere. Eius itaque historiam ad thoracem potius & vitalia organa, quàm ad caput referre placuit. Collum Græci *ἀνθρώπου τράχηλον* dixere; Latini collum à colendo, quia hæc parsthor-
quibus & monilibus ornatur. Eius partes aliæ sunt externæ, aliæ internæ. Externæ, vel anticæ sunt, vel posticæ, vel laterales. Anterior pars *λαιμός* & *δειρή*, dicitur, guttur, gula, iugulus. Huius suprema pars *βρόγχος*, quibusdam vulgò morfus & pomum Adami appellatur. Inferna *ὕπερις* Polluci dicitur; cuius pars anterior quæ iuxta clauiculas cum pectore iungitur, *κατακλεις καὶ παρασφραγίς*, quod circa iugulum sit, vocatur: cauum verò quod inter utranque clauiculâ est *σφαῖν*, iugulum, quia locus hic cædi est obnoxius. Posterior colli pars *ἀγχὴν* ceruix propriè superiorem habet & inferiorem partem. Superior occipiti proxima Rusto *τένον*, Latinis tendo dicitur, quia in capitis motu tenditur, *λόφος* etiam & *λοφία*: cauum verò inter primam & secundam vertebra *ἐπισφραγίς* à cæde, quod ea parte ceruice fracta homo intereat, fouea etiam Latinis dicitur. Inferior pars quæ dorso committitur *ἐπώμις* etiam vocatur. Laterales colli partes sub auribus exortæ *παρωτίδες* dictæ sunt: quæ verò à parotidibus ad asperam arteriam latera tendunt *τέθηρα*, id est cornua vocantur: Gibbæ partes laterales & carnosæ vertebra annatæ *παραλοφία*. Atque hæc externarum partium sunt nomina. Internæ verò quæ cute & adipe reguntur, aliæ sunt anticæ, aliæ posticæ. Anticæ variæ sunt, aspera arteria, larynx & eius muscoli, iugulares venæ, carotides arteriæ, neruus sextæ coniugationis cum recurrente, œsophagus & muscoli quidam capitis & colli. Posticæ colli partes sunt, muscoli caput & collum extendentes, scapularum quidem muscoli ut trapezius & leuatores, septem vertebrae, medulla spinalis & vasa quamplurima.

Colli partes
externæ.Anterior colli
pars.Colli pars po-
sterior.Laterales par-
tes.Colli partes
internæ.

De aspera arteria.

CAP. XIII.

Arteria aspe-
ra.

SPERA arteria præcipua est colli pars; eius enim gratiâ collum constructum viderur. Hanc *βρόγχον* appellat vulgus *σιωπεδογική*; licet *βρόγχια* dicantur interdum Hippocrati cartilaginosa corpora, per quæ odorem cum aëre trahit cerebrum, ut libello *ἡ δὲ ἀρχὴν*. *βρόγχος* etiam dicitur *παρὰ τὸ ἐρέχυσθαι ἐν τῇ στήθει καὶ πίνειν*, quod inter edendum & bibendum humore quodam iriga-

primæ.

tur. *Ἀρτηρίων* sæpe vocat Hippocrates simpliciter, vt *z. Epid. ἡ ἀρτηρία μόλις ἀναπνέουσι ὑποστέλλει ῥεγγῶδες.* id est, *vix respiranti arteria sibilum quendam edebat.* Nos cum Galeno & Anatomicis omnibus arteriam hanc ob asperitatem & duritiem *τεγγῶδες*, id est, asperam nuncupabimus. Lactantius *spiritalē fistulam* dicit. Hæc igitur fistulæ ac tubi instar, aërem in pulmones deducit, fumidōsque vapores ab eodem pulmone excipit, vnde organum spirabile ac vocale dicitur. Tota eius structura ex cartilaginibus, membranis, venulis, arteriis ac nervis constituitur. Cartilagines annuli figuram exprimunt, sed circulum integrum non perficiunt, vnde *σγμοειδές* dicuntur: in quo singularem Naturæ providentiam liceat admirari. Cartilago namque ad vocem edendam aptissimum est instrumentum, quia mediam inter durum & molle naturam obtinet: molliora præ imbecillitate aërem ipsum remissius percutiunt, duriora faciliè ipsum eluunt. Itaque ratione vocis totam arteriam cartilagineam esse decebat; sed quia ad inspirationem expirationemque nunc contrahi, nunc dilatari oportuerat, nunc longiorem, nunc breviorē fieri, totum arteriæ corpus cartilagineum constructum non est, sed interiectæ sunt inter annulos membranæ, in brutis quidem omnino exangues, in hominē (quod nemo adhuc observavit) musculosæ, vt videantur cartilaginū spatia opplere muscoli perexigui, sese in modū X. intersecantes, non secus ac intercostales. Cur autem cartilagines hæc anteriore tantum parte sitæ sint, non autem circumferentiam perficiant, quæ parte oesophagum tangunt, rationem affert Galenus triplicem: prima, ne ab arteriæ duritiæ deretur oesophagus mollior: secunda, vt arteria hæc anteriore parte irruentibus extrinsecus iniuriis minus foret obnoxia: tertia ad ciborum deglutitionem. Dura enim sæpe, aspera & intrita deuoramus, quæ transglutire non possemus, nisi arteria oesophago cederet; non cederet autem si tota esset cartilaginea. Obiicies laryngis corpus totum esse cartilagineum, oesophago tamen non esse impedimento. Sed vide quàm sit dispar ratio. Nam in deglutitione deorsum trahitur oesophagus, larynx verò sursum recurrit, itaque earum partium situs mutatur, vt oesophagi quidem initium ad asperam sit arteriā, larynx verò sursum ad fauces recurrat. Sunt poro semicirculares tantum superiore parte ad iugulum vsque: nam vbi oesophagum non tangunt & ad pulmonem feruntur, circulum absoluunt, quia oportuit in pulmonibus semper arteriam patere ad aëris tractionem expulsionemque. Sunt etiam aliquando quadratæ. Arteriam hanc duæ inuestiunt tunice, quarum altera interior est, oesophago, linguæ, palato & ori communis; altera exterior; hæc mollior tenuiorque est; illa crassior, ne ab humoris à cerebro defluentis acrimonia læderetur. Siccitatem obtinuit moderatā, vt vox esset magis sonora, humidior namque rauca, siccior, vt in febribus & senibus, clangorē efficit vocem. Vasa ad sunt exilia, totam arteriam rigantia. Hæc arteriæ asperæ est structura, per quam animalia inspirant & expirant, vocem edunt & efflant. Hæc vbi ad iugulum peruenit, biuio distracta in pulmonem numerosa ramorum serie spargitur inter venam arteriosam & arteriam venosam media, vt ab illa sanguinē trahat, & in hanc aërem transmittat, ab eaq; fumidos vapores excipiat. Obseruauimus aliquando in asperæ arteriæ riuis exiguas glandulas, tum ad sustentationem, tum ad humectationem.

Structura.

Cur cartilaginea.

Observatio prima.

Cur cartilagines circumferentiam non perficiant, ratio triplex.

Tunica dua.

Vasa.

Distributio eius.

Larynx ex
quibus compo-
nitur.

Larynx carti-
lagineus.

Quatuor la-
ryngis carti-
lagines.
Scutiformis.

Annularis.

Arytænoides.

Error Colum-
bi.

Larynx, id
est, quatuordecim
cartilagineus.

Communes
musculi quatuor
sunt.

Error Ana-
tomorum de
duobus mus-
culis.

Proprij mus-
culi decem sunt.



ARTERIE asperæ caput operculumve larynx dicitur. Corpus est cartilagineum, variis musculis ad vocis modulationem, nervis etiam, venis arteriisque miro artificio fabrefactum. Cartilagineum quidem confectum est, tum quia organum est spirandi, (debet itaque ingredienti & egredienti aëri semper patere) tum quia vocis est instrumentum; at quod sonat læue, id est, politum & solidum esse oportet, quia vox aëris est percussio; non frangitur autem aër, nisi ad solidum, durum & læue. Tribus constat cartilaginibus aut potius (si verum amamus) quatuor, quæ ita connectuntur, ut earum operâ dilari & constringi, claudi & aperiri facile possit. Primam larissimam & maximam *θυρεοειδῆ* vocant, id est, *scutalem* & *scutiformem*, quod referat scutum quadrarum; anticam etiam dicunt, quod anteriori tantum parre sit sita. Foris est gibba, intus caua; hæc gemina interdum est, præsertim mulieribus, quibus non ita ut viris antrosum prominat. Secunda veteribus innominata, recentioribus *κεκροειδῆς*, id est, *annularis* dicitur, quod similis sit Turcarum annulo, quem dextro imponunt pollici dum sagittas iaculantur. Hæc ima & antica parte angustior, posteriore lator est, annuli palam referens; basis est reliquarum, & cum tota sit circularis, apertam seruat fistulam impeditque ne in laryngis motibus reliquæ, quæ sunt semicirculares comprimantur. Tertiam *ἀρυτæνοειδῆ* vocant, quod vasis figuram referat, quo abludis manibus aquam effundimus, aut vasculi oleacei os imiturus; id enim denotat *ἀρύταινα*; postica etiam dici potest, quod posteriore parte sit sita. Eius partes membranarum & vinculorum operâ connectuntur, & simul iunctæ eam efformant rimam, quæ voci modulandæ accommodata est, & propriè *γλωττις* dicitur. Hæc vocem acutam & grauem præcipuè facit, adiuta tamen epiglottide arytænoidem magis minuscule claudente. Errat porro Columbus dum cartilagineas has in ossium adscribit numerum; nam licet in senibus quibusdam appareant ossæ, reliquo vitæ tempore sunt cartilagineæ; hæc cartilagineum est descriptio, ex quibus duæ tantum mouentur ad vocis modulationem; sola annularis seu innominata manet immobilis. Motui huic dicati sunt quamplures musculi, nos quatuordecim tantum agnoscimus, quorum alij sunt communes, alij proprij; communes appello qui ab alijs partibus quàm à larynge oriuntur; proprios verò qui à larynge orti, in eandem inferuntur. Horum operâ dilatur, constringitur, clauditur, aperitur larynx. Horum porro motuum ratio sic se habet. Communes musculi quatuor tantum sunt. Priores duo bronchij dicitur, quia per latera arteriæ asperæ feruntur. Oriuntur à superiore & interiore sterni parte & per arteriæ bronchia ascendentes, in partem inferiorem eius cartilaginis quæ scutum refert inferuntur; hi laryngem deorsum trahunt & dum infernas tyroidis partes constringunt, supernas dilatant. Duo alij superioribus oppositi à lateribus ossis hyoidei enati fibris rectis in infernam tyroides partem inferuntur, eam sursum trahunt, & dum supernas laryngis partes constringunt infernas amplificant. Addunt ferè omnes qui de re Anatomica scripserunt communes alios duos, quos ab œsophago nasci putant, & in latera tyroides inferi; sed ego œsophagi potius quàm laryngis musculos esse credo, eosque deglutitionis inferuire, quia œsophagum omni ex parte cingunt & amplexantur. Proprij laryngis musculi decem sunt exigui admodum omnes, quinque vtrique parte. Primus ab anteriore cartilaginis

innominatę patte ortus, obliquę & fibris obliquis ad anticam & infernam tyroïdem fertur; quam dum constringit superiorem laryngis parrem dilatat. Alter lator & longior à posteriore cartilaginis annularis patte ortus, recta ascendens, in arytenoidem desinit, & glottida aperire creditur. Tertius ab antica & interna innominata obliquę in arytenoidem fertur, posticas glottidis partes dilatat & anticas constringit. Quartus ab interiore tyroïde obliquę in arytenoidem inferitur, contrariam tertio actionem edens. Postremus omnium minimus, à media arytenoide in latera arytenoides inferitur & aperit fistulam. In hos musculos recurrentis nervi ramuli quamplures disseminantur. Quia in re singulare Naturę artificium mirari debemus; quia enim ferè omnes laryngis muscoli aut ab infernis partibus, aut à media basi tyroïdes oriebantur; nervus autem, aut in caput, aut in ventrem inferendus erat, non ad finem; oportuit nervos ab infernis partibus venire; non à spinali medulla, quia nervorum ab ea prodeuntium exitus obliquus est; ergo à cerebro, quos ideo reflecti oportuit instar ductarij funis qui per trochlearum orbiculos traicitur, ut sicciore essent & validiores. Sparguntur etiam venarum & arteriarum quamplures rivi à iugularibus & carotidibus. Ad latera autem laryngis glandulę adfunt, quę humore suo subditas illas pattes irrigant.

Recurrentis
nervi ramuli

Cor recurrentis
nervi.

Vasa.

Laryngis glandulę.

De epiglottide & glottide.

CAPVT XVI.



SUPERIORAM laryngis partem occludit corpus cartilagineum, quod Gręci *ἐπιγλωττίδα*, Hippocrates *καλὴ πτερύξ* vocat, Latini *laryngis operculum*, *opertorium canne pulmonis*, *minorem linguam* Plinius vocat ut & Celsus, Gaza *ligulam*, quia linguę formam refert. Licet verius epiglottis dicatur, quia laryngis rimę incumbit, quam *γλωττίδα* Galenus appellat. Est enim *γλωττίδα* rimula ex duobus arytenoides processibus efformata, ligulę similis, quę ex arundinũ laminis inuicę cõpactis ribiis accommodari videmus; hæc ad vocis modulationem mirum in modum confert, & Galenõ præcipuum creditur vocis instrumentum. Inter ligulam & epiglottida sinus apparent membranosi à veteribus non descripti, qui aëris sunt conceptacula: epiglottis ergo glottidi incumbens, hederę folium exprimit, ex lata & ampliore basi in mucronem non valde acutum sensim desinens. Basis in superiore & interiore tyroïdes cartilaginis regione visitur; mucro ad palatum vergit. Cartilagineum porro debuit esse hoc operculum, non osseum nec membraneum, ut celerrimè deprimi, dum cibi & potus in ventriculum illabuntur, & statim erigi ad aëris inspirationem possit; mollia, ut carnosæ & membranosæ faciliè quidem concidunt, sed semel depressa difficilè attolluntur; ossæ semper erecta manent; cartilago vtrumque præstat commodè. Sunt huius cartilaginis usus duo; alter ut laryngem operiat, ne in epulando cibi & potus in arteriam & pulmones ferantur; alter ut aërem à pulmonibus vi & impetu pulsū percutiat ad vocis modulationem. Cartilago hæc inspirantibus nobis & expirantibus semper hiat, neque vñquam spontè deprimitur, ut voluerunt quidam, sed solo alimenti pondere; non tamen ita exquisitè obferatur in deglutione, quin portiuncula quædã potus per rimam in arteriam asperam decreret.

Epiglottidis
sinus.

Glottis quid.

Glottidis usus.

Sinus inter
glottidem &
epiglottidem.

Epiglottidis
descriptio.

Epiglottis cum
cartilaginea.

Epiglottidis
usus duplex.

œsophagi
anatomia.



Situs.

Figura.

œsophagi
compositio.

Membrana
duæ propriae.

Tertia com-
munitas.
Vena.
Nervi.
Glandulae.

œsophagi
musculi duo.

De gluti-
onis actio mixta ex
naturalis &
animalis.
Connectio.

ΜΕΙΣΟΦΑΓΟΣ Græcis, Latinis *gula*, Arabibus *meri*, Lactan-
tio *cibaria fistula*: *στόμαχος* interdum, stomachus dici confue-
uit. Sic Tullius secundo De natura Deor. stomachum ad lin-
guæ radices hærentem facit; & Celsus eum faucibus subesse
cibumque recipere scribit. Est ergo œsophagus velut syringa
& ductus à faucibus ad ventriculum pertingens, quò cibi &
potus primum agitatione & motibus linguæ depulsi & quasi detrusi, in ventri-
culum illabuntur. Fertur œsophagus recta deorsum, arteriæ asperæ subtenus ad
quintam vsque thoracis vertebra, ubi paululum ad dextram inclinat, ut aortæ
cedat, mox arteriæ superstratus obliquè ad læuam vergit, ratione hepatis, ibi dia-
phragma permeans ad ventriculi os definit. Huius figura rotunda est, oblonga &
fatis capax, instar intestini cuiusdam prærubri. Rotunda quidem, ad robur & ca-
pacitatem; oblonga, quia distabant fauces à ventriculo. Capax, ne indigesta ali-
menta in eo diutius morarentur & respirationem impedirent. Tota eius com-
positio ex membranis duabus propriis, venis, arteriis & nervis constituitur. Mem-
branarum, altera externa est, altera interna; externa tota ferè est carnea villisq;
constat circularibus & transuersis, quorum ope & alimenta trudit in ventricu-
lum & è ventriculo noxia pellit per vomitum. Has autem contrarias actiones
edit eadem membrana eorundem villorum ministerio diuersa ratione; nam si
villorum circularium contractionem ab ore ordiatur membrana; deglutitioni
seruiet. Si à ventriculi orificio, vomitui; interna membrana crassior & netuosior
linguæ, ori & palato communis, rectas habet fibras, per quas alimentum trahit.
Has duas extrinsecus obducit tertia membrana à ligamenti vertebrarum pro-
nata. Venas habet œsophagus complures à caua, & ramulos quosdam à corò-
naria ventriculi, necnon arterias ab aortæ descendente riuus. Nervos accipit à sex-
ta coniugatione insignes, stomachicos dictos. Glandulæ etiam in medio ip-
sius ductu puluinaris instar appositæ sunt; tum ne faciliè in alterutrum latus vol-
uatur, tum ut stomachum ad siccioris esculenti, velut per lubrica transitum ex-
peditiorem perenni rore perfundant. Musculos habet duos, qui à lateribus carti-
laginis scutiformis orti, in mediam illius partem linea alba discretam, inseruntur.
Hi œsophagum omnino amplexantur Et deglutitioni inserviunt; ut degluti-
tio actio sit mixta ex naturali & animali. Non enim oportebat primum cibi in-
gressum & postremum excrementorum exitum esse perpetuum, sed ex anima-
lis arbitrio pendentem. Connectitur œsophagus ori & ventriculo, per corpo-
ris continuitatem, arteriæ asperæ, dorso & vicinis partibus, fibrarum, membra-
narum & vasorum interiectu. Atque hæ sunt omnes colli anteriores particule.
Posterioribus sunt septem vertebrae & musculi caput collumque extendentes
vertebras in osteologia libro secundo; musculos libro quinto descripsimus.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

De deglutitione an sit animalis vel naturalis actio; & cur solida plerumque deglutimus, liquida verò non ita facile.


QVÆSTIO XXVI.

DEGLUTITIONEM, œsophagi seu gula actionem esse omnibus exploratū est. Sed an ab anima fiat, an à natura certatur. *De gluti-
nema natura
fieri.
Rasmeus.* A natura fieri volunt quidam, quòd nulli muscoli ab Anatomicis describuntur œsophagum amplexantes; quòd villi circulares & transversæ *Rasmeus.* externam œsophagi tunicam cingant, quorum ope & alimenta trudit in ventriculum, & è ventriculo noxia pellit per vomitum: quòd denique in vehementi fame sursum feratur ventriculus & cibum ab ore rapiat, ut scribit Galenus tercio De facultatibus naturalibus, adèd ut trahente ventriculo & contractis superne deorsum circularibus gulæ villis fiat deglutitio. Alij animalcem omnino actionem esse volunt, quia deuoramus cibos cum volumus, & si la datur imaginatio, aut animalis facultas appetens, vix deglutire possumus. Sic rei ingeratæ ut pilularum & catharticonum difficilis est deglutitio, licet organa libera sint. Nos mistam esse actionem credimus ex animali & naturali. Naturalis quidem est, quia expulsiōe fit; & attractione, quæ nutriti famulantur; expulsio à villis fit circularibus, qui externam œsophagi tunicam amplexantur, quorum ministerio contrarias editi actiones. Nam si villorum circularium contractionem ab ore ordiatur membrana, deglutitioni seruiet, si à ventriculi orificio inferne sursum, vomitui. Est ergo in deglutitione quid naturale; est etiam quid animale. Nam quia *De gluti-
nema
actio.
Quomodo
naturalis
est.* homo animal erat politicum, ad contemplationem & actionem natum; non oportebat primum cibi ingressum & postremum excrementorum exitum esse perpetuum, ut in plantis, sed ex eius arbitrio pendentem. Ut ergo ad finem recti intestini musculos apposuit natura viam intercludentes, ne inuoluntaria fieret fecum excretio: ita in ore & faucibus musculos deglutitioni dicatos locauit, qui à Fallopio eleganter describuntur, & eorum meminere at Aui-cenna. Oesophagi autem musculos nemo adhuc descripsit. Ego ex illis sex communibus, qui laryngem mouere dicuntur, duos posteriores œsophago non laryngi inferuire puto. Nec cum Anatomicis censeo à œsophago oriri & in latera thyroidis inseri, sed potius à lateribus thyroidis ortum ducere & œsophagum omnino amplecti, ac in mediam illius partem linea alba discretam inseri. Quia verò in hanc de natura deglutitionis mentionem incidimus, hoc vnum perquisitione dignum est, cur liquida plerumque deuoramus non ita facile ut solida. Obseruauimus enim in multis, solida licet corpulentiora facilius deglutiri, liquida autem & potu-lenta in nares repelli. Varias ego huius symptomatis causas agnosco, erosionem scilicet epiglottidis, paralyin seu resolutionem musculorum hyoidis, tumorem & inflammationē glandularum quæ & in faucibus & in œsophago sunt, carunculas molles & fungosas quæ in interiore œsophagi parte sæpe adnascuntur. Primum si erosa sit epiglottidis portuuncula, solidi quidem alimenti pondere facile deprimetur, atque ita illis in œsophagum patebit aditus, sed liquida per rimam in asperam arteriā, quæ tota ob solutam epiglottidis continuitatem occludi non potest, decurrant & fumidi vaporis sursum viam affectantis occurso impulsu, in nares repellentur. Si hyoidis & laryngis musculi, resolutionem, aut conuulsionem patiantur, solida facilius quàm liquida deuorabuntur; quia solida præ pondere & gravitate vim aliquam musculis inferunt, liquida non item. Sunt ad latera faucium & œsophagi glandula *Epiglottidis
erossio.
Resolutio
muscularum.
Glandula
faucium.*

quædam eas partes humore quodam velut rore perfundentes ne siccescant. Hæ si copiosiore humido madeant, aut inflammatione obsideantur, liquidis alimentis viam intercludent, quia potulenta glandulas inebriantia eorum molem augebunt, solida verò & sicca alimenta glandularum substantiam arctantia & comprimentia cauum aliquod efformabunt. Solet aliquando ab ulcere malè curato relinqui caruncula in interiore faucium & œsophagi regione, quæ fungi naturam imitatur, ut ego in duobus observavi. Inflatur assumptis potulentis caruncula totusq; obstruitur ductus, itaque innaves potus repellitur. Solida carunculam comprimunt nec hærent in viâ.

FINIS LIBRI NONI.





LIBER DECIMVS.

IN QVO ANIMALIA ORGANA;

CEREBRVM QVIPPE ET QVÆ AB EO

ORIVNTVR, DESCRIBVNTVR.

HISTORIA ANATOMICA.

De capitis figura, situ & magnitudine.

CAPVT PRIMVM.



HACTENVS regiones duas naturalem & vitalem, animali tanquam principi famulantes, lustrauimus: postulat nunc sectionis ordo, vt sacram Palladis arcem ingrediamur, & Regiam domum suo instructam satellitio, sensuum quippe αἰσθητικῶν describamus. Regionem hanc κεφαλῶν, κάρων, καὶ κάρηνων Græci appellarunt: κεφαλῶν, ὡς τὸ κάρφειον, quod est, *inarescere*, dictam putat Appiani interpres; quia inaruerit pars ea, vt quæ ossea plurimum sit. Apollodorus verbi etymon rimatur, ἀκαλύπτω, quod est *operio, tego*; quoniam sit cerebri tegumentum. Alij, quòd ibi καίται τὰ φῶς, id est, *sedent lumina*. Hómero, καὶ δεικνύει dicitur, aliis κάρων, κόρη, ἀκέρω, *tondeo*; Lycophroni κόγκος καὶ κρανίον, παρὰ τὸ κραίνειν, *ab imperando*. Latini caput vocant, quòd sensus ab eo initium capiant. Est autem capitis apud Medicos acceptio duplex, pressior & angustior altera; altera fusior ampliòrque. Pressiore significato describitur eleganter caput à Celso ex Hippocratis libello περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ ὁρμημάτων, domicilium ac propugnaculum cerebri, cuius caluaria duplici osse contexta, diploë intertexta, catunculis venulisque obsita, desuper circumfusa est pericranio, cute capillata velato, subter verò adiacet duræ meningi. Hac significatione veteres ἀγγεῖον τῷ ἐγκεφάλῳ, id est, *cerebri vasculum* appellarunt. Ampliore autem & vulgari significato capitis nomine totum id designatur, quod prima colli vertebra & vertice circumscribitur. Huius vulgaris capitis figuram, situm, magnitudinem, structuram, motum & singulas partes describere iam aggredior. Orbiculi figura tornatum est caput, primum ad capacitatem, vt cerebri vastissimam molem contineat, omnium namque figuratum ἰσοπεδικέω; *circularis*, est capacissima. Secundò, ἀκέρω, vt nocuentis minus occurrat, nec tā facile ictus excipiat; omnium enim figurarum hæc validissima est, quippe quæ nihil habeat asperitatis, nihil offensionis, nihil inclusum angulis; continua scilicet est, & vnili-neæ, neque designatum habet punctum, quod sit principium dissolutionis. Tertiò, ad faciliorem motum, vt in omnem partem celerius circumagi possit. Voluit Platonici rotundum fuisse caput, quia animæ domicilium est; anima autem ex cælo rotundo infusa est nobis, adde quòd nobilissimo membro figura debetur omnium nobilissima. Figura hæc licet rotunda sit, non tamen exquisitè & ad

*Capitis nomi-
na.*

*Capitis du-
plex acceptio.
Angustior.*

Amplior.

Figura.

*Cur rotundum
caput.*

Cur ad latera
compressa
ut utrinque
protuberans.

Figura capitis
non naturalis.

Quid φειρ
caput.

Magnitudo
capitis.

Magnitudo ca-
put laudatur.

Situs.

Cur in edi-
tissimo loco.

vnguem globosa est, sed quadamtenus oblonga verticibus geminis extuines-
cens, & ad latera compressa cernitur: oblonga quidem, vt cerebrum & cerebel-
lum contineret; protuberans anteriore parte ob apophyseis mammillares, odo-
ratus organa; posteriore, ob spinalis medullæ exortum. Comprimitur autem ad
latera, sed magis anteriora versus, tum quia processus dorsalis multò crassior est
quàm neruorum facies; tum quia in ea figura constituitur sinus, in quem aer ex
antere parte accedens impingit: tum, quia non sunt ossa temporum impedi-
mento oculis maiore circulo conspiciendis, id est, in alterutrum latus, tum de-
nique vt posterior pars stet velut in æquilibrio supra dorsum, cum antèrior pars
ob maxillæ superioris ossa sit grauior. Figutam autem capitis hanc naturalem
intelligo: nam quæ non naturalis est, aut rotunda est exquisitè, aut acuminata.
Rotundum caput *τρογύλον* vocant, quòd nec in fronte, nec in occipite *αερό-
λω*, id est, *proiecturam* habet: acutum verò turbinatum, quale fuit apud Ho-
merum Thersitis caput, *φοξόν* dicitur, vel vt placet Athenæo, *φαοξόν*, quod in-
tuentibus acutum appareat, qualia erant pocula quædam ficticia apud Argiuos,
quæ *φοξείχαιλα* vocabantur. Eustathius *φοξόν*, quasi *φλοξόν* dicere mauit, à
voce *φλόξ*, quæ flammam significat, flamma autem in acutum vergit. Magnitu-
do capitis non omni animali eadem est; sed homini quàm cæteris animalibus
multò maior, quia cerebri moles amplior. Paruū caput semper in vitio est; quia
& formatricis imbecillitatem, & spermatice materię inopiam arguit. Vnde
Physiognomi paruū caput præceps & temerarium ingenium arguere afir-
mant, ob spirituum paucitatem, qui angusto coërciti conclauis incalescunt sine
modo, nec liberè exspatiantur. Magnum verò caput, si cætera cōsentiant, id est,
equalis ossium omnium sit proportio, semper laudatur. De quo exstat illud Hip-
pocratis 6. Epidem. Ex capitis magnitudine ossium naturam æstimato, nō quòd
oriantur ossa à capite, sed quia ossa omnia proportionè ossibus, quibus articulan-
tur, respondent scilicet brachij ossa humero, coxendicis sacro, sacrum vertebri-
bus, vertebrae spinali medullæ, medulla cerebro, cerebrum caluariæ. At dixit Aristote-
les in Problem. hominem animal esse prudentissimum, quia paruū & breue
caput habet. Sed per paruū externam, ossium & carnis tenuitatem intelligit
nō internam cavitatem. Situs est caput in editissimo loco, quia ex Platonico-
rum doctrina intelligentem animę facultatem, tanquam reginam & principem,
in sublime attolli oportuerat, vt irascibilis & concupiscibilis tanquam famulæ,
illi subseruirent, eiusque gubernaculo regerentur. Galenus non propter oculos
caput constructum putat, vt ei imponit Auerroes (soli enim cerebri gratiā cō-
ditum est) sed propter oculos supremum locum, occupasse caput scribit. Nam
cum oculi sint velut exploratores interdum nocturne nobis excubantes, editissi-
mum postulant locum. Quia autem visus neruum requirit mollissimum, &
breuissimum, ne longo itinere gracile membrum & molle periclitaretur, opor-
tuit cerebrum neruorum principium iuxta oculos locari. Neque verò oculistan-
tium, sed etiam reliquis sensibus maximum vsum præstat hic capitis situs, olfactus
enim ascendentem vaporem melius excipit, vox ex alto melius exauditur.



TO T A hæc superior regio, quæ à prima colli vertebra ad verticem vsque extenditur, in duas partes diuidi solet, in capillatam scilicet & capillis priuatam. Quæ pars capillatio tegitur *τριχωτόν* Aristoteli, Latinis *caluaria* dicitur. Quæ pars pilis orbata est *πρόσωπον*, *πρόσωψις* appellatur nomine à re ipsa accepto, quia *πρόσωθεν ὁπώσῃ*, solus enim homo prospicit anteuersus, vocemque anreuersus mittit. Larini *faciem* & *vultum* vocat. Partis capillatæ circumferentia *περιδρομή* & *σεφάλη*, id est, *corona* dicitur. Partes habet anticam, posticam, mediam & laterales. Anterior pars *ἐρέγμα*, à *πὸ τῆ ἐρέχειν*, ab irrigando vocatur, est enim humidissima & mollissima; ab alijsincipit, quasi summum caput. Posterior *ἰνὸν* dicitur, διὰ τὰ ἰνώδες καὶ νευρώδες εἶναι, quod fibrosa sit & nervosa: multi enim ad occiput feruntur tendines, neruorum etiam exortus ferè omnis est ab occipitio; Hippocrati *κοτὶς* vocatur. Media *κορυφή*, *μεσόκρανον*, *ἐλγυμός*, Latinis *vertex* dicitur, quia ibi capilli in gyrum veruntur. Laterales partes *κόρταφοι*, *κόρσαι*, *κόρ' ρ' αι*, Latinis *tempora* appellantur, quia canitie ætatis annos prædunt. Rursum caluariæ partes, aliæ sunt continentes, aliæ contentæ. Continentium quædam communes, quædam propriæ. Communes sunt pili, cutis, panniculus carnosus: propriæ, pericranium, ossa cranij & meninges duæ, dura & tenuis. Contentæ sunt cerebrum, cerebellum & qui ab his oriuntur nerui. Harum parium historiam hoc libro describere institui.

Capitis diuisio.

Capillatæ partium nomina.

Caluariæ partes continentel & contentæ.

De partibus continentibus communibus, ac primùm de pilis.

CAPVT III.



PN caluariæ historia primi omnium sese offerunt capilli, quos in numerum partium communium continentium ascribo, quia in plerisque corporis partibus reperiuntur. Sunt enim, ut scribit Aristoteles tertio de historia animalium, vel *συγγενεὶς* καὶ id est, *congeniti*, ut capitis, superciliorum & palpebrarum; vel *ὕστερογενεὶς*, id est, *postgeniti*, ut pubis, alarum & menti. Pili Græcist *ρίχες* dicuntur, οἷον *τρίχες*, ὅτι *τρίζονται*, quod demeti soleant & sectioni obnoxij sint. Persio *cirri* vocantur à *καίρω*, id est, *incido*. Eorum tota congeries *κόμη*, *coma*, *λάχνη*; vitis à frequenti cæsiōne, *cæsaries*; fœminis ab ornatu & curiosiore cultu *coma*, à *κομῶ* quod est *curo*. Separatio à vertice ad frontem prorensa Aristoteli *λύσωμα* & *λύσωσις*, Latinis *discrimen* & *equamentum* vocatur. Cumulus in fronte *πρόκοτλα*, cumulus occipiti familiaris Ruffo *χαῖτα*, Latinis *inba*, *crines*. Primus eorum exortus in temporibus à Ruffo *ἰνυλός*, à Latinis *lanugo*. Qui iuxta aures demittuntur *παρωτίδες* cincinni dicti sunt, præsertim si conferti sint: Radices enascentium pilorum *ἰόνθους* quidam dixerunt. De pilorum natura & generationis modo plura hic adnotare non est huius loci; hæcantū in rudiorum gratiam obiter dicere placet. Ad pilorum exortum quatuor causarum genera concurrere, materialem, efficientem, formalem & finalem. Materia pilorum duplex est, ex qua, & in qua. Materia ex qua generantur pili, excrementum est tertiæ coctionis; fuliginosus quippe vapor rariora cutis spi-

Pilorum diuisio.

Pilorum nomina.

Coma quid.

Materia pilorum duplex.

racula permeans. Materia in qua cutis est modetate sicca & rara. Vt enim in palustri & vliginoso loco nihil generatur; nec item in squalidiore solo, ita in humidiore & sicciore cuti pilos erumpere non datur. Raritas autem cutis quàm sit necessaria, expressit eleganter Hippocrates, libro De natura pueri: *φύονται μὲν γὰρ μέγιστα καὶ πλείστα, ὅτε τὸ σῶμα τὸς ἰσχυροῦς αἰματώτατον*. id est, *et plurimum et maxime nascuntur pili, quâ corporis parte cutis rarissima est; & ubi posterius rarefcit cutis, ibi posterius nascuntur pili: vt in mento & pube.* Efficiens pilorum causa calor est modetatus, qui fuliginosos vapores in cutis spicacula pellit, & ita siccat, vt pili naturam formamque induant. Forma pilorum per accidentia quædam, colorem quippe, figuram & similes qualitates designari solet. Color humori prædominanti similis est: omne enim excrementum humoris sui ideam refert; sic bilioforum, flauis; pituitosorum, albis; melancholicorum, nigri apparent capilli: crispitudo autem, rectitudo ac obliquitas pilorum, & cutis sicciore humidiorisque, & caloris debilioris aut valentioris, & materie calidioris frigidiorisque dispositionem sequuntur; de quibus multa Galenus 20. De temperament. Finalis pilorum causa triplex est, subiectarum partium tutela, ornatus, & fuliginosorum excrementorum expurgatio.

Efficiens causa.

Forma.

Colores.

Finis triplex.

De cuticula, cute & panniculo carnofo capitis.

CAPVT III.

N harum partium descriptione nihil est peculiare, nisi quod cuticula hæc crassior est, cutis verò non ita exquisitè sensu pollet, vt in thorace & imo ventre; quia in cæteris partibus membranæ hæret neruosa, hæc verò musculosa; vnde fit vt in capite moueatur cutis *περὶ τὴν κεφαλὴν*, id est, *sponte nostra*, cum alibi planè firmissima. Sed & adipe etiam distribuitur, nisi circa occiput, tum quia exigua vasa per eam feruntur, tum ne motui esset impedimento.

De partibus continentibus propriis, ac primum de pericranio.

CAPVT V.

Quid pericranium.

ARTEs continentes propriæ, sunt pericranium & meninges duæ. Pericranium membrana est, densa & solida; quæ, quoniam cranii os extrinsecus tegit, peculiari nomine *περικρανιον*, communiori *κεφαλαίον* dicitur: non enim hæc duas membranas diuersas statuo, pericranium scilicet & periostium, vt plerique solent. Decepit eos fortasse pericranij crassities, quæ hæc necessaria fuit ad ossis nobilissimi tutelam. Nasci dicitur pericranium à crassa meninge, quæ villis compluribus cranij futuris adhærescens, indeque foras elapsa ita extenditur, vt exteriorem hanc membranam conficiat. Pericranij ergo interuentu dura meninx cranio suspenditur. In pericranio illud dignum obseruatione, quod à paucis animaduersum est, illud cranium vniuersum velare, nisi qua parte temporalis musculus ortum ducit: fertur enim supra musculum & tota phitam vsque ad ossa iugalia. Hæc pericranij portio musculum regens plerisque imposuit, qui duos musculi huius tendines describunt, internum & externum.

Ortus.

Obseruatio in pericranio.



S huic membranæ subiectum *κεεγλον* dicitur, quod sit velut *κεεγνος*, id est, *galea cerebrum tegens*, vulgus *caluam* & *caluariam* vocat. Osseum autem debuit esse cranium solius cerebri gratiâ; decebat enim hominis eam partem, quæ rationis particeps atque animæ sedes erat futura, solido tectâ, ne læderetur, munire. Crassum porro & rarum mira Naturæ prouidentia cōstructum est: crassum quidem, quia crassities extrinsecus occurrentibus iniuriis obstitit; rarum verò, id est, laxum & multis foraminulis peruium, tum ne pondere grauaret, tum vt succum pro alimento contineret, tum denique ad vaporum perspirationem. Nam cum caput sit velut caminus vniuersi & cucurbitulæ instar, (cuius figuram refert ex amplo in angustum definens) trahat continuo sorbeatque expirationes partium inferiorum, nisi exiguis illis cauernulis paterent ossa, assiduis vaporum haustibus cerebrum inebriaretur. Constat cranium pluribus ossibus, quæ & crassitie, & raritate, & soliditate ob functionum cerebri varietatem & medullarem substantiam differre debuerunt. Sunt autem octo, os frontis, ossa sincipitis duo, ossa temporum duo, os occipitis vnum sphænoïdes & ethmoides, quæ non per diarthrosin, sed per immobilem & compactam articulationem connectuntur, per suturas scilicet, tum proprias, tum communes, tum veras, quæ pectinatim aut mote dentatæ ferræ committuntur; tum spurias & illegitimas, quæ *περοσολλήμια λεπιδειδῆ* appellantur, id est, *squammosæ*, quod squammarum modo & imbricatum connectantur. Horum ossium historiam libro secundo accuratè descripsimus; eam igitur inde repetat studiosus lector.

*Cranium cō-
stru-ctum.*

*Crassum
& rarum.*

*Cranij ossa
offa.*

De membranis cerebrum velantibus, ac primùm de durâ meninge.

CAPVT VII.



PERTO caluatæ osse, membranæ sese offerunt due, quas primi Arabes *matres* appellant, veteres autem Græci *μηνιγσας*, Erasistratus *ἑπικεγενιδες*, Pollux, *εἰλαμίδες*. Hippocrates libello *περὶ ἀρχῶν*, *μηνιγσά παχέϊα*, hoc est, crassiorē cerebri membranā, temporis successu *χιτῶνα* euadere, & in tunicam transire scribit; quasi inter membranā & tunicam id insit discriminis, quod *μηνιγξ* ex tenuiore, *χιτῶν* ex crassiore materia fiat. Harū membranarū quæ supra subterque cerebrum velant, elegans est descriptio. Exterior ob crassitiem *παχέα καὶ σκληρὰ*, id est, *dura, crassa & cuticularis* dicitur: eius figurā & magnitudō ossibus caluatæ proportionē respondet. Nullus enim in cranio extat sinus, nulla cavitās, quā membrana hæc non impleat, vt in suprēma hac regione eadem sit duræ meningis, quæ pleuræ in vitali, & peritonæi in naturali regione ratio. Membrana hæc omni ex parte duplex est, vnde sit vt neotericorū quidam meningē duras geminas statuerint; alterā internā, candidiorem & aqueo humore magis oblitā, quæ tenuem spectat; alterā, externā, ossi caluariæ contiguā. Ego vnica agnosco meningē durā sibi continuā, licet diuidua sit, sic peritonæum in imo ventre vnicū statuitur, licet duplex sit; & membrana omnis, quantumuis tenuis, ad sensum diuidua est. Dura hæc meninx basi caluariæ adheret firmiter, nisi quā parte sita est glandula pituitaria, à superioriote autem cranij par-

*Meninges
quid.*

*Figura &
magnitudo.*

*Duplex est
omni ex parte.*

Craneum.

te tantum distat, quantū cerebro dilatando & constringendo satis erat; alligatur tamen cranio villorum interiectu, qui per suturas egredientes & expansi pericranium creant. Tenui autem membranæ connectitur venarum intermedio, quarum opera firmatur cerebrum. Est membrana hæc foraminibus multis peruiā, quibus cerebrum nervos, arterias, venas, in fundibulum & dorsalem medullam transmittat. Reduplicatur in capitis vertice, cerebrique dextram partem à sinistra seiungit, non tamen ad basim vsque pertingit, sed ad dimidium cerebri tantum. Hæc duplicatio similis est falci, qua segetes de meti solent, vnde & *falcis* dici solet. Posteriore verò parte quadruplicatur, cerebrumque à cerebello non penitus, sed magna sui parte dirimit. Inter has duræ meningis *διπλῶς*, seu duplicatas, conspicui sunt sinus quatuor, qui tanquam riuī & vasorum vicarij, sanguinem quoque uersum in cerebri substantiam effundunt. Hic deceptus fortasse Pelops vasa omnia à capite ortum ducere existimauit. In sinus hos, iugulares in tetra ingrediuntur. Cum enim amplissimum esset cerebrum, nec maiores venarum trunci illud ipsum pertingere possent, hos riuos veluti aquæ ductus construxit Natura, in quos venæ copiosissimum sanguinem ad cerebri nutritionem & animalium spirituum generationem effunderent. Ex his sinibus priores duo laterales sunt, eorumque exortus ad basim est iuxta magnum occipitis foramen; quo loci iugularibus internis ingressus patet; desinunt autem ad futuræ lambdoidis principium, vbi eo eunt ambo. Ex horum *συνδεσμῶν*, siue coalitu tertius nascitur sinus, qui per sagittalis futuræ longitudinem excurrens, ad narium ossa fertur. Ab hoc venulæ quamplurimæ hinc inde per tenuem membranam dispersæ vagantur. Herophilus *ἁλὼν* appellauit, quod ab eo tanquam torculari & cisterna, sanguis è iugularibus vasis corruat, in vniuersum cerebri corpus exprimat.

Falc.

Quatuor sinu
inter duplica-
turas.

Tertius sinus.

Tercular.

Cui sola fronti
dicitur contineri
de Hipp.Quartus si-
nus.Membrana
duræ vasa
triplex.

¶ sunt qui malint sinuum quatuor concursum *torcular* appellare. Tertius hic sinus ad frontis extrema protenditur, quæ ratione ab Hippocrate dictum puto libro *περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ ὥσμάτων*, inter caluariæ partes solam frontem si percutiatur, inflammationi expositam esse; quia sola frons continetur, non continet. Fit autem inflammatio, quando pars quæ continet, exonerat se in eam quæ continetur: contineri frontem indicat situs inferior & vasorum ferè omnium eò desinentium productio. Quartus sinus omnium breuissimus, inter cerebrum & cerebellum delatus, clunibus cerebri finitur. Mirabilis ergo est horum sinuum vsus & venarum ab illis ceu à iugi fonte manantium diuaticatio. In cæteris enim corporis partibus adeò propinquæ sunt arteriis venæ; vt & mutuo sese tangant & vena arteriam habeat perpetuò comitem: atin cerebro & eius membranis venarum & arteriarum dissimilis est distributio, venarum enim officia deorsum spectant, arteriarum sursum, quia venæ cerebrum irrigant laudabili succo, arteriæ spiritum continent qui ob tenuitatem ascendit faciliè. Vt autem venæ officia haberent deorsum, debuerunt prius ascendere, non per externam cutim, non per ossa, non per interiorem cerebri medullam; ergo per duræ meningis duplicaturas. Vfus duræ membranæ multiplex est; primus, vt cerebrum & spinalem medullam regat, atq; ita ab extrinsecus irruentibus iniuriis tueatur; secundus, vt cerebrum in dextrum & laeuum, in anticum & posticum dirimat; tertius, vt omnes caluariam nutriendas venas excipiat, & cerebro ac tenui membranæ instar lagenæ sit, ex qua patres hæ sanguinè ad necessarios vsus prolecent.

DETRACTA defectaque crassiore membrana, conspicua est pia mater, *λεπτή μεμβράνη*, ob tenuitatem & mollitiem dicta. Tenuis autem constructa est; tum, ut in omnes cerebri sinus sese insinuet, tum, ne grauitate & pondere cerebro sit molesta; tum denique ut vasa per vniuersum cerebri corpus deducat: quæ ratione *χορειαδής*, id est, *secundina* vocatur. Hæc proprium est & immediatum cerebri velamen, non exteriorem modò eius superficiem tegens, sed in penitiores eius recessus peruadens. Fertur enim ad ventriculos vsque, non à supernis partibus, ut existimat vulgus, sed ab infernis; ascendit quippe qua parte peluis est, & cum ea feruntur arteriole ex carotidibus & cervicalibus per latera sphænoïdes. In harum membranarum situ quis singularem Naturæ providentiam non admirabitur? Ut enim Deus ille, rerum opifex, ignem tenuissimū, leuissimum, rarissimum, maximèque perspicuum à terra densissima, crassissima, grauissima, opacissima aëris spatio & aquarum diuortio diuisit; ita diuini operis imitatrix & æmula natura, durissimam caluam à cerebro mollissimo, geminæ membranæ interiectu separauit. Quàm tristis semper & querula homini vita foret, si molle duro collideretur!

ADNOTATIO.

IN hac continentium partium historia, nihil occurrit controuersum, quod non fuerit à nobis libro secundo explicatum. Nam quæ de capitis sui & vsu contra Galenum afferri solent, ita conciliabuntur, si dixeris caput in perfectis animalibus solius cerebri gratiâ constructum esse, situm autem editissimum occupasse propter oculos, & ad reliquorum sensuum commoditatem. De motu capitis obscurissima est quæstio, quam in osteologia exposuimus, ubi Galenum à recentiorum calumniis vindicauimus. De pilorum generatione, an sint animati & nutriantur, nihil à nobis dictum; trita enim sunt hæc & omnibus nota. In dura meningis historia quadam obuersantur sed satis leuia. Putas Columbus duas esse meninges duras, quia duplex sit. Ego membranas omnes, etiam piam, duplices esse volo: non tamen propterea duæ erunt pleuræ, duo peritonæi, &c. sic cornea oculi tunica in quatuor aut quinque laminas secari solet, nemo tamen quinque corneas esse dicet. De sinibus dura membrana certant Anatomici, an inter illas membrana duplicaturas vena ferantur, an sint tantum canales, & aqueductus sanguinem vndique excipientes. Existimant quidam per eos sinus venas excurrere, nec sanguinem extra vasa contineri: propria autem sanguinis conceptacula venæ sunt, extra quas sanguis aut concrefcit, aut putrefcit; quia locus locati est conseruatio. Ego in interiore eorum sinuum cauitate venas nunquam obseruavi, sanguinem tamen tanquam in vase & conceptaculo, in illis contineri neque computrescere puto.

De cerebri præstantia, situ, figura, magnitudine, substantia, temperie, motu, sensu & usu.

CAPVT IX.



*Capitis di-
gnitas.*

*Cerebri præ-
stantia.*

*Cerebri solius
gratiâ omnia
constructa
sunt.*

OMINEM ob naturæ maiestatem *ἡνῶμα ἡνῶμα* ani-
mal adorandum & venerandum à sapientissimis Ægyptiorum
sacerdotibus appellatum fuisse aliquando diximus. Maiestatis
porrò huius imaginem licet vbique habeat expressam, lucent
tamen in capite plures diuinitatis illius & principatus animæ
radij. Quid sine capite est homo? Iacet mehercule sine nomi-
ne, sine honore, quasi truncus ignobilis. Sola principum capita auro, ære vel
marmore sculpta in pretio sunt. Per caput iurabant veteres; capitis nutu pacta
confirmabant. At caput solius cerebri gratiâ constructum est; illius enim & do-
micilium & propugnaculum dicitur Hippocati. Quantò igitur contentum eo
quod continet præstantius est, tantò cerebrum præstat capiti. Est hoc viscerum
excellissimum proximūque cælo; hanc habent sensus arcem, hic culmen altis-
simum, hic mentis est regimen. Est cerebrum non modò sensuum sedes & mo-
tum *ἡσχαρπερινῶν* artifex, membrorum vastissimas moles & musculorum
prætumida corpora nervorum fibris, quasi funiculis, non sine admiratione tra-
hens: sed & sapientiæ est domicilium, memoriæ, iudicij, cogitationum, quibus
opifici Deo humanum genus redditur simillimum. Platò diuinissimum hoc ap-
pellat membrum, nec solùm præcipuum, sed etiam totum in corpore. Homerus
ἡσχαρπὸν dicit, quòd ad instar primi orbis eius influxu ac illustratione inferiora mo-
ueantur & sentiant. Hic sacram Palladis arcem Poëtæ locant, dum eam è Iouis
cerebro pronatam fingunt; propterea à cerebri vsu & usu, tanquam re sacra, ab-
stinebant veteres, sternutantibus bene precabantur. Quod denique in mundo
est cælum, id in homine est cerebrum; illud intelligentiarum, hoc rationis est
domicilium. Sunt hæc sanè omnia diuinitatis cerebri certissima argumenta; sed
hoc vnum inter cætèrâ eius præstantiam luculenter demonstrat, quòd à cerebro
omnia famulentur, eiúsque solius gratiâ totum corpus constructum sit. Homo
namque ad intelligendum tantum est natus: at intelligentis facultatis sedes est
cerebrum. Intelligentem phantasmata speculari decet: non sit idolotum perce-
ptio nisi externorum sensuum (qui animæ velut satellites sunt & internuntij)
operâ: sensus itaque omnes in capitis regia & rationis conspectu sunt circuncic-
ti. Vt autem obiectorum varietatem sensus perciperent, locali motu eguit ani-
mal; hinc organa motus constructa sunt, muscoli, tendines, nerui, ad quorum to-
bur & stabilitatem ossa sunt efformata. Actiones hæc non exequitur anima sine
calido, quod vt quotidie exhauritur, ita continuo refarciendum est; hinc calor
duo fontes, cor & hepar, cordi, arteriæ & pulmo; hepati, venæ & naturalia orga-
na subseruiunt. Cerebri igitur gratiâ omnia sunt condita. Hæc visceris huius
præstantia est, hæc diuinitas. Sed si fabricæ concinnitatem, & solertem indoctæ
naturæ industriam in cerebri structura spectes, si regis huius domus columnas
& concamerata inuolucra superbi ædificij ingentem molem suffulcientia; si
atria, rhalamos, sinus quatuor, speculum lucidum, plexus arterioforum labyrin-
theos; si cerebri helices, & miram eius in nervorum propagatione sæcundita-
tem intucare, miraberis proculdubio, & cum vetustissimo Zoroastre exclama-
bis, *O homo; audacis natura miraculum!* Sed quid moror? Cur cerebri mirabilem
historiam non describo? aggredior itaque. Pars hæc diuinitatis particeps pro-
prium

De organis animalibus cerebro quippe. 525

prium apud veteres Græcos nomen non habuit, sed à situ, ἐγκέφαλον, quòd ἐν τῇ κεφαλῇ contineatur, dictum est. Plato à substantia, μυελὸν vocat. Non defuerunt qui homonymiam nominis fugientes, non μυελὸν simpliciter, sed cum addito ἐγκέφαλῳ, ad differentiam τῷ ῥαχίτι appellarint. Atheniensis Apollodorus nemini veterum opinatur cerebri nomen admissum in libris, proinde in Trachiniis Sophoclem λευκὸν μυελὸν, *albam medullam* dicere maluisse. Nos veterum dictiones retineamus; & Græcè ἐγκέφαλον, Latine *cerebrum* appellemus; hoc nomine, quicquid in cranij cavitare continetur, & à meningibus circumdatur, designantes. Situm est cerebrum in editissimo loco, tanquam arce ac domicilio omnium tutissimo, & ut irruentibus extrinsecus iniuriis minus foret obnoxium, ossibus vndiquaque quasi propriis sepimentis hoc obvallauit Natura. Decebat enim fœtus eam partem, quæ rationis particeps atque animæ sedes erat futura, & in sublime attolli, & solido tecto, ne læderetur, muniri. Situm hunc obtrinit propter oculos, qui cum essent velut speculatores, supremum postulabant locum. Figura cerebri continentis capitis figuram refert, & omni ex parte cranij interioris effigiem concinnè exprimit. Orbiculari figura tornatum est cerebrum, tum ut capacius, tum ut nocuentis minus occurreret; adde quòd diuinissimo membro, perfectissima debetur figura: est tamen quadamtenus oblongum, verticibus geminis extumescens: & vtrinque ad latera compressum. Eius magnitudo ingens est, & homini quàm cæteris animalibus, amplior moles, ut vnicum hominis cerebrum duobus bouum cerebris grandius sit. Id autem ob animalium functionum varietatem & perfectionem factum est. Sentiant quidem bruta, sed eorum sensus appetitus tantum gratiâ est cõparatus, ut vitam corpusq; tueantur, & quæ nocitura videntur, fugiant. Hominis sensus multo sunt perfectiores: non enim ad noxiæ fugam tantum aut vtilis prosecutionem, sed ad rerum differentias dignoscendas sunt comparati, ut docet Philosophus 1. Metaphys. Accedit principum facultatum, quæ maxima spirituum indigent copia, varietas: at multus non nisi à copioso sanguine gigni potest spiritus; copiosus autem sanguis pusillo corpore non concluditur. Substantia cerebri mollis est, alba & medullaris, ex purissima seminis & spirituum portione fabricata, sibi tamen propria, qualem in reliquo corpore nullam reperias. Non enim medullæ, quæ in ossium cauernis continetur, similis est; quia nec igneliquatur, nec per inedias aut febriles ardores minuitur; nec in calua cõtinetur, ut cranium nutriat, quin potius nutritur ctanium, ut medullam hanc contineat. Fluxilis est, inquit Galenus 1. De motu muscul. ossium medulla, & pinguedini similis; nec tunicis tegitur, nec arteriis & venis intertexa est, nec ipsi vlla cum musculis aut nervis intercedit communio, ut medullæ cerebri. Minimum hæc habet ἑλκυσθῆναι, πλεονεξῆναι τῷ κολλώδεος, id est, *minimum habet pinguis, multum autem glutinosi*, libello περὶ ἀρχῶν. Hanc cerebri substantiam glandulosam appellauit Hippocrates libello De glandulis. ἵκελον, inquit, ὡς ἐν τῷ ἐγκέφαλῳ, λευκὸς γὰρ καὶ ψαφιδῆς: *simile cerebrum est glandula, quia album & friabile*: & eadem commoda præstat capiti. Insidet namque cucurbitulæ instar, & inferiorum partium expirationes sorbet, quarum exhalationi nisi dehiscens caltia pateret, assiduis hatistibus cerebrum inebriaretur; maius tamen est cerebrum quàm reliquæ glandulæ. Substantia hæc cerebri mollis est, tum ut facilius idolorum fiat impressio, tum ut flexiles magis sint netui, tum ne pondere & duritie nimium grauet. Alba est autem cerebri medulla, & ratione materiæ, quia spermatica, & ratione finis, ut spiritus ani-

Nam à cerebri.

Situm.

Figura.

Magnitudo.

Cerebrum
cur amplius
humano.

Substantia.

Cur mollis
cerebri substantia.
Cur alba.

Empetria.

*Cerebrum vult
frigidum.*

Vfus cerebri.

Motus cerebri.

Sensus.

males limpidissimi essent, non obscuro & tenebricosi, quales sunt melancholicorum. Ex molli hac & medullari substantia collige temperamentum frigidum & humidum: unde summus Dictator libello *ἀπὸ ἀρχῶν*, cerebrum appellat, *μεσοπολιν* & *ψυχρὰ, καὶ ἐκ κοιλώδεος*, sedem frigidi & glutinosi. Oportuit autem frigido & humido elemento cerebrum excedere, ne membrum perpetuè cogitationi dicatum accenderetur, nève animales spiritus omnium tenuissimam ciòd vaneferent. In calidissimo cerebro motus essent furibundi ac temerarij, & sensationes deliræ, quales sunt phreniticorum. Adde quòd nec placidus vnquam somnus, qui animalium facultatum est quies, conciliaretur; nec limpidissimi vnquam essent spiritus, cum calidi proprium sit omnia perturbare. Cerebri vsum vnicum agnouit Aristoteles, refrigerationem cordis; sed non ea ratione constructum esse docet Galenus 8. De vfu partium, quinimò potius ad internorum sensuum & principum facultatum functiones edendas, & ad spiritus animalis generationem. Si enim glaciei instar ad solam cordis refrigerationem formatum est, quid tanto artificio sinuum, plexuum, neruorum & camerati corporis opus fuit? Mouetur cerebrum non animali & voluntario motu, non violento, sed naturali, eoque tum proprio & peculiari ad animalis spiritus generationem, temperationem, expurgationem, tum alieno, arteriarum quippe. Nunc enim sponte suadistenditur, nunc contrahitur, in diastole trahit ex mirabili plexu spiritum, & è naribus aërem; in systole interiores sinus coarctat & animalem spiritum è superioribus ventriculis in tertium quartumque; tum in sensuum organa profundit. Sentit cerebrum *ἐνεργητικῶς*, non *παθητικῶς*, id est, sensuum quidem omnium auctor est, ipsum tamen sensu nullo pollet, quia communis sensus est sedes, & de omni sensu iudicat, organum autem omne decet esse *ἄσπορον*. Vt ergo non videt cerebrum, nec audit, ita nec tactus sensilia sentit.

De singulis cerebri partibus.

CAP. X.



*Quid cerebrum.
Cerebri diuisio.
Anterior
post.
Posterior.*

*Anterior
cerebri diuisio.
Cur diuisum
cerebrum.*

QUAM AD MODUM diuinissimum hoc membrum diuersarum functionum motricum, sensificarum & principum opifex est; ita partium diuersi generis structura mirabiliter est efformatum. Singularum porò cerebri partium historiam Galenus 8. & 9. De vfu partium, necnon Vesalius septimo suæ Anatomiae libro multis capitibus descripserunt, sed satis consule. Nos cerebri omnes particulas, quales inrer secandū intuenti occurrunt, ordine exquisito delineabimus. Totum igitur illud corpus, quod caluaria continetur, vnico nomine *cerebrum*, à nobis appellatur. Eius autem duas statuimus partes, anteriorem & posteriorem: anterior, propter magnitudinem, totius nomen retinet, & propriè *ἐγκέφαλον*, dicitur cerebrum: posteriorem Græci *παρεγκεφαλίδα*, Erasistratus *ἐπαγκεφαλίδα*, alij *ἐγκεκενον*, Latini *cerebellum* dicere. Vtrumque cerebrum distinguit crassioris membranæ duplicatura, non quidem omni ex parte, sed superiore tantum: nam inferiore & media cerebellum cerebro est continuum. Cerebrum anterior rursus in dextram & sinistram partem proprio diaphragmate discretum est, ab ea quippe dūrè meningis portione, quam ob figuram vulgus *falcem messoriam* vocat. Id aurem ad faciliorem motum, leuitatem & nutritionem interioris medullæ factum puto. Nolim ramen existimes (quod somniarunt quidam) à summo ad imum diuisum esse cerebrum; nam

De organis animalibus cerebro quippe. 527

qua parte apparet, callosum corpus & in basi continuum omnino est sibi, nec sibi tantum, sed etiam rachitidi, & per hanc cerebello. Cerebri huius exterior superficies subcineritia potius, quam candida apparet. Eius autem figuram sunt qui tenuium intestinorum gyris, dempto epiploo, non ineptè conferant: infinitos enim habet anfractus & circumuolutiones plurtimas, quarum non pauca penitus in cerebri substantiam penetrat: unde partem hanc cerebri *χιρσοειδῆ*, id est, *varicosam* dicunt. Ridendi proculdubio sunt quicunque cum Erasistrato anfractus hos ad intelligendum constructos putant: ita namque asini intelligerent. Volumus cum Galeno tot mæandris intortum, tot anfractibus implicitum cerebrum, ut *χιρσοειδῆς* membrana nutriendo cerebro dicata, & vasorum omnium sustentaculum, sese in penitiores cerebri ductus insinuar. Nam cum vastissima sit cerebri moles, quomodo venę & arterię per superficiem tantum excurrentes, ipsi nutriendo & nativo calori conservando sufficerent? Sunt qui ad leuitatem, & ut facilius moueretur cerebrum, hos gyros constructos putet, alij ad cerebri substantiam fulciendam, ne molle humidumq; nimis hac illac diffunderet, alij ad spirituum & sanguinis recreationem, ne in diastole & plenilunio suffocaretur calor, alij ne vasa assiduo cerebri motu rumpantur. Extetnam hanc superficiem aliquantulum contemplatus, si cerebri medullam duorum vel trium digitorum crassitie secueris, statim se offeret altera cerebri pars, superiore candidior duriorque, venulis & arteriolis nullis, quę saltem sensu dignosci queant, ut nec membrana tenui attexta. Hanc veteres Gręci *τυλῶδες σῶμα*, aut *τυλλοειδῆς*, Latini *callosum corpus* ob durtiē, appellant. Huius interuentu quę prius discretę erāt cerebri partes dextra & læua, primum continuantur. Mox callosum hoc corpus in medio ferè cerebri, (medium intelligo inter supremum & imum) geminis ventriculis dextro & sinistro excavatum apparet. Hi sunt priores cerebri sinus, quos *anteriores* vocat Galenus, nos melius *superiores*, omnium amplissimi figura; situ, magnitudine, vsu & cæteris omnibus omnino similes. Figuram referunt sectionis circuli aut Lunę falcatę; ego mallem auriculę humanę assimilare. Siti sunt in medio cerebro tanto enim intervallo à fronte, quantum ab occipite distant, tantum quę ferè à basi quantum à vertice, propterea non rectè *anteriores* dicuntur, sed melius *priores* aut *superiores*. Magnitudine eadem donantur: sunt autem omnium amplissimi, quod spiritum crassiores continent; & gemini, ne altero eorum affecto alterius functio animali tam necessaria intercipiatur; læso enim alterutro, leuius cōtingit periculum, quàm si vterque afficiatur. Testis est Smyrneus ille iuuenis, qui vulnere in dextro sinu accepto euasit, non euasisset autem, ut scribit Galenus libr. 8. De vsu partium, si vterque ventriculus lauciatus fuisset. Horum ventriculorum multiplex est vsus. Primus ad spirituum animalium præparationem, unde animalis spiritus inchoati *ἐργασήσια* dicuntur: secundus ad inspirationem & expirationem cerebri: tertius, ad odores suscipiendos. Ad præparationem spirituum plexus constructi sunt: ad inspirationem verò & odores suscipiendos processus duo mammillares. Plexus in superioribus ventriculis siti, Gręcis *πλέγματα ἢ συσρέμματα χοροειδῆ* nominantur. Sunt venularum & arteriolarum textus labyrinthi, per tenuis membranę sursum ascendentis portiunculam excurrentes, in quibus excoquitur, attenuatur & præparatur animalis spiritus. Processus autem duo seu rubercula mammarum papillis simillima, ab ima parte horum sinuum, aut saltem propinqua admodum ad narium ossa cribri instat perforata, feruntur, tenui tantum velantur membra-

Figura exterior cerebri.

Cur anfractus illius cerebri.

Corpus callosum.

Priores cerebri ventriculi.

Figura sinus.

Magnitudo.

Cur gemini.

Vsus triplex.

Plexus choroidei.

Processus mammillares.

Odoratus or-
gana.

Septum luci-
dum.

Corpus calli-
sum.

Vfus camera-
e corporis.

Tertius ven-
triculus.

Duo ductus in
tertio sinu.

Infundibulum.

Glans pitui-
taria.

Rete mirabile
Galenus.

Alveolus
posterior.

Conarium.

Nates.
Testes.
Vfus.

Quartus
sinus.

Calamus.

na, nec crānio excidunt, propterea nervis non adnumerantur. Per hæc & aer ad cerebrum fertur, & odorum species transuehuntur, vnde odoratus organa vocantur. Quod ita libello περὶ ἀρχῶν expressit Hippocrates. *Olfacit cerebrum humidum existens aridorum odorem una cum aere per corpuscula ipsam trahens.* Quod si aliquando cerebrum mucosa eluie affluat, per hæc rubercula stillat in nates. Hos superiores ventriculos discludit tenuissima quædam cerebri portiuncula, quæ ob pelluciditatem *septum lucidum, speculum lucidum, lapis specularis* dicitur. Sub his duos statuit sinus Arantius, quos hypocampi seu bombycini vermis effigiem referre vult; sed ego portiones existimo esse superiores, maiores enim sunt quam vulgò soleant demonstrari. Tertius posthac sese offert ventriculus, cui tamen prius superstratum est σῶμα ψαλλοειδές, vel ψαλλιδόειδές, καὶ καμνιδόειδές, id est, corpus camerae modo extructum ex tribus quasi columnis suffutum. Refert toto suo ductu triangularem figuram inæqualibus lateribus constantem, & duobus quasi arcubus parte posteriore: anteriore verò vnicò cōstituitur. Huius corporis idem vsus est, qui fornicum in ædificiis, vnde fornix & testudo etiam nuncupatur: cerebri enim amplissimam molem Atanris instar, sustentat, ne tertium ventriculum comprimat. Sub camerato corpore tertius apparet sinus, qui nihil aliud est quam duorum concursus & communis cavitas, in quam superiorum ventrium uterque humilior sui sede dehiscit. Ventrem hunc medium appellat Galenus, vel quòd inter superiores duos, & inferiorem quartum sit situs, vel quòd centum ferè occupet cerebri: tantum enim ab occipite distat, quantum ab osse frontis. Geminos hic ventriculus de se profert ductus; quorum alter ad cerebri basim descendit, alter in quartum sinum dirigitur. Prior ille ex humiliori sede antroisum tendit, in cuius extremo portiuncula quædam tenuis membrana, primum latior, deinde angustior infundibuli instar, conspicitur, quam propterea πύλον χοάνηιν, id est, pelum & infundibulum vocant, per quod tanquam Hippocratis manica, cerebri pituita transcolatur. Pelui huic substernitur glans pituitaria, quæ cerebri superuacua carne sua porosa & bibula spongiæ instar excipit, tandemque per cunei foramina in palatum pederetum instillar. Ad latera autem apophyseon clinoidæon plexus apparet, quem πλέγμα διενούειδές, id est, rete mirabile vocat Galenus. Ego malim cum neotericis choroidem plexum, qui in superioribus ventriculis cernitur, rete mirabile appellare. Tres hæc particule infundibulum, glandula pituitaria & rete mirabile non nisi detracta tota cerebri medulla demonstrari possunt. Alter tertij ventriculi ductus priore amplior ad quartum sinum dirigitur, estque via à tertio ad quartum sinum, in qua exiguæ sese offerunt particule; primumque glandula turbinatæ figuræ & nuci pineæ non dissimilis, quam κωνοειδῆ & κωνάριον vocant. Hæc venis & arteriis in cerebrum fuis, reliquarum glandium instar pro firmamento esse creditur, vt liber pateat spiritui animali è tertio in quartum ventriculum adirus. Conario à tergo utrinque contigua sunt corpuscula quædam rotunda & duriuscula, quæ γλῶττιæ, seu nates, à forma vocantur, sub quibus testes apparent ὄρχαις & δίδυμοι dicti. Horum vsus est, vt canalem tertij ventriculi in quartum efforment, saluumque (vt aiunt) conductum spiritui animali præbeant. Quartus tandem occurrit sinus cerebello & spinali medullæ communis, omnium minimus & solidissimus. Hic primum amplior sensim artatur, donec in acumen desinat, ad instar calami scriptorij, vnde calamus appellavit Herophilus, processus autem illi vermiformes, Græcis ἐπιφύσεις σκαληνοειδείς non sunt cerebri, sed cerebelli portiunculæ inter meatu à tertio in

De organis animalibus cerebro quippe. 529

quartum sinum apertum seruantes. Errant ergo qui tenuem putant esse membranam corrugatam, quam in cerebri dilatatione necesse fuit extendi & in contractione plicari. Hæc anterioris cerebri & singularum eius partium brevis est descriptio.

De cerebello.

CAPVT . XI.

C O S T E R I V S cerebrum *παρεγκεφαλίδα, ἐπικεφαλίδα καὶ ἔγκρανον* Græci, Latini *cerebellum* dixerunt; quod videtur Natura in anterioris subsidium fabricasse; vt scilicet transmissum à cerebri sinibus animalem spiritum conseruaret & spinali medullæ adapteret. Latius est hoc quàm aut longius aut profundius, & latioris globi imaginem exprimit. Vtraque velatur membrana, tenui & dura, non tamen omni ex parte: nam inferiore cerebro continuum est. Color totus est subcineritius, substantia durior, crassiorque: gyri & anfractus externi sunt, nec interiorum medullam peruadunt. Cerebellum decuplo minus est cerebro. Situm est in ea caluariæ parte, quæ duobus occipitij fossis circumscribitur, non tamen totum occipitium occupat. Totum cerebellum quatuor partibus efformatur; quarum duæ laterales sunt, & duos quasi globos inuicem appositos constituunt. Duæ in medio sunt constitutæ, sũntque velut processus quidam cerebelli, vermium figuram exprimentes, vnde *σπινούσις σκωληκοειδὲς*, id est, *processus vermiformes* dicuntur. Eorum alter anterior, meatum à tertio ad quartum sinum apertum retinet: alter posteriori parti spinalis medullæ incumbit, & versus quartum sinum reflectitur, quem apertum conseruat.

Color.

Substantia.

Situs.

Cerebelli partes.

De spinali medulla.

CAP. XII.

C E R E B R I & cerebelli substantia tanquam è radice caudex, profunditur *μυελὸς ῥαχίτης*, id est, *spinalis medulla*, quam *cerebrum oblongum* quidam appellarunt. Sapiens in Ecclesiaste eleganti, sed obscura allegoria *funem* vocat *argenteum*; illius autem conceptaculum *fistulam sacram* dicunt. Aliis medulla hæc cerebri *πρυμνὸς*, appendix & vicaria dicitur. Eius eadem fere est quæ cerebri dignitas, nec minus de illius conseruatione sollicita fuit Natura, quàm de cerebro ipso. Vt enim cerebrum caluariæ ossibus vndique obuallatur, & duabus velatur tunicis: ita spinalis medulla vertebriis vndique quasi sepimentis circumdatur, & tenui ac dura meninge tegitur. Non paritur medulla hæc diuturnam oppressionem, & à perfecta vnius vertebræ luxatione, præcipitem mortem inferri existimarunt veteres. Hanc autem medullam necessario creari decuit, quia à cerebro nerui omnes in vniuersum corpus ferri non poterant, nec neruus sexaræ coniugationis exilis admodum ad crura, pedes & musculos omnes turò disseminari, vastissimæque membrorum moles mouere poterat. Medullam itaque creauit Deus, cuius in neruis propagandis mira esset fecunditas. Eam autem non à cerebello, vt vulgus sentit, sed partim à cerebro, partim à cerebello oriri existimo: Cum enim per ipsam tanquam communem officinam & aquæ ductum in neruos omnes ceu riuulos & ab iis in vniuersum corpus diffundi debeat spiritus, qui in cerebri sinibus perficitur, oportuit eius principium prope spiri-

Spinalis medullæ nomen.

Eius dignitas.

Necessitas.

Spinalis medullæ ortus.

*Spinalis me-
dulla divisa.*

*Quando ner-
ui à spinali
medulla ori-
antur.*

*Qui in capil-
lamenta ab-
sumuntur.*

tuum officinam locare; at in tertio & quarto ventriculo, purissimi & omnino defœcati continentur spiritus. Fir ergo spinalis medulla ex quatuor velut magnis radicibus, quarum duæ maiores, ex duabus cerebri partibus vtrinque nascuntur, aliæ duæ minores ex cerebello; ex quibus quatuor simul iunctis, duæ fiunt quæ spinalis medullæ corpus efformant. Ab hac spinali medulla infiniti propemodum emergunt furculi & innumeris ea fruticatur ramis in omnes ferè partes propagandis, quæ in certas quasdam coniugationes distinxerunt veteres Anatomici. Nos medullam ita diuidimus, vt alia sit intra caluam, alia extra caluariam. Ab ea quæ intra caluam est, septem illa nervorum paria oriuntur & processus mammillares præcipua odoratus organa, quorum historiam repete ex libro quarto. Altera verò medullæ pars vertebris obvallata, motum non habet systoles & diastoles vt cerebri substantia, ossibus tantum quæ motum habent concluditur; ab hac quomodo nervi omnes in brachia, crura & infernas partes diuarcandi prodeant paucis accipere. Spinalis medulla cerebri caudex tenui membrana immediatè velatur, à dura aurem & crassa distat aliquantulum, per tenuem illam excurrunt venulæ & arteriolæ vario modo implicatæ, medullam nutriendes & vitæ spiritum affundentes. Medulla autem è calvariæ rotundo & amplo foramine prodiens, primum amplissima & crassissima, sensim attenuatur, id est, medullarem substantiam paulatim amittit, non corpoream molem quam eandem vbique seruat; tandem cum ad dorsi fines peruenit, tota in funiculos & filamenta caudam ferè equinam refertentia absimitur. Nervii autem à sacra illa medulla prodeuntes, infiniti quidem sunt, sed quia dum vertebrarum foramina egrediuntur, simul coeuntes vnicum corpus effingunt, tot esse nervorum paria, quot sunt vertebrarum foramina voluerit Anatomici. Nervius ergo omnis in exortu suo fibras habet, multiplices ex medullari substantia & tenui membrana conflatas, quæ descendentes sensum à medulla separantur, & dum ad foramina vertebrarum accedunt, crassa membrana vestiuntur & in vnum coeuntes vnum constituunt nervum, qui postquam foramen egressus est, rursus in funiculos eosdem diuellitur. Quando autem magis spinalis medulla descendit, tantò altiùs fibræ illæ nervorum ortus sui principia ducunt, vt & dorsales & lumbares quidam nervi si paulò attentius inspexeris à cervicali medulla oriuntur. A lumborum principio ad ossis sacri extremum & plures sunt & crassiores funiculi, eadem tamen ratione circa vertebrarum foramina coeuntes. Quia ea parte maximè flectitur & curuatur spina antrosum & retrosum. Ne ergo aut premeretur, aut disrumperetur medulla, in capillamenta & funiculos eam absumi oportuit. Reliqua libro quarto sunt explicata.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An cerebrum facultatum principum sit sedes. QVÆST. I.

RACULTATES animales à Medicis ita distingui solent, ut alie sint αἰσθητικαί, id est, sensificæ; alie κινητικαί, id est, motrices; alie ἡγεμονικαί, id est, principes. Sentiens facultas duplex est; externa, cuius obiectū singulare est; & interna, cuius obiectum cōmune. Internam hanc facultatem Philosophi primarium sensum, vel sensum communem dixerunt. Solus hic imaginum constituit discrimina, & in cerebri substantia pro tribunali sedens, ante se positas & ad pedes genuaque iacentes rerum imagines contemplatur. Hic dulce ab amaro secernit, & album à dulci discriminat. Hunc Aristotelis circuli centro confert, quod ad eum externorum sensuum spectra, tanquam ad iudicem, & censorem, ferantur. Sentiendi hanc vim interiorem sequuntur principes facultates, primumque imaginatrix, quæ spectra eadem, sed puriora & ab omni materia contagio libera concipit, apprehendit, retinetque, ut dilapsis iis quæ sensus ciebant, illorum tamen vestigia in nobis hereant. Conceptionem eam phantasiam vocamus, per quam suprema illa vis anima intelligens concitatur & expergiscit ad speculandas uniuersalium rerum ideas. Hæc tandem omnia excipit memoratrix, quæ ceu fidissima tutrix & notionum omnium communis arcula, singula seruat ac condit. Tot statuantur à Philosophis & Medicis animales facultates, de quibus tria inquirenda. Primum, an cerebrum earum omnium sit sedes; secundò, an diuersæ sint in cerebro mansiones diuersis facultatibus dicatæ: postremò an à temperie, vel à conformatione cerebri principes facultates edantur, sintque similes vel organica. De sede rationalis anima varia sunt Philosophorum & Medicorum sententia. Herophilus circa cerebri basim eam locat; Xenocrates in vertice capitis; Erasistratus in membranulis cerebri; Empedocles, Epicurei & Ægyptij in tota pectoris lorica; Moschion in toto corpore; Heraclitus in extrinseca agitatione; Herodotus in auribus; Blemor Arabicus & Syenenfis Medicus Cyprius, in oculis, quod oculi animi indices sint & ad eius affectus omnes ita compositi, ut alter animus esse videantur; hos enim cum osculamur animum ipsum attingere videmur. Strato Physicus in superciliis: hinc enim superbia inhabitat, idcirco per supercilium factum aliquando Poëta intellexerunt; & ex superciliorum pilis animi indicia sumunt Physiognomi. Si enim in rectum porrigantur μέλας καὶ ἡδύς, mollem subesse animum significant; si iuxta nasum inflexi sint, σπουδὴν, scurrum; si iuxta tempora inflectantur, μάχην καὶ εἰρωον, derisorem & dissimulatorem; si verò in totum demissi φθόνον inuidum indicant. Peripatetici & Stoici omnes sentiendi & intelligendi vim in corde statuunt, quia quicquid principium est motus, id etiam sensus principium est: at cor motus omnis principium est, quippe viscerum omnium calidissimum & natui caloris uberrimus fons. Quinetiam in animi patibematis ut timore, agonia & deliquis, reflunt ad cor spiritus & calor, tanquam ad principem. Proferunt diuini Hippocratis auctoritatem libello De corde: Γνώον ὃδ, inquit, ἢ εἰ ἀποθνήσκῃς, ἀποθνήσκῃς ἐν τῇ λαγῇ κοιλίᾳ, καὶ ἀρχεῖ τῆς ἀλλῆς ψυχῆς. Τρεφεταὶ δ' ἔτε σιτοίων, ἔτε ποτίσιν ἀπὸ τῆς νήδους; ἀλλὰ καθαρὰ καὶ παρὰ τοῖς ὤμοις γέγονὺν ἐκ τῆς διακρίσεως ἔσματος: hoc est, anima hominis in sinistro cordis sinu est sita, & reliquæ animæ imperat; alitur autem neque cibis neque potibus à ventre, sed pura & illustri substantia ex sanguinis discretione. Nos cum Hippocrate, Platone, Galeno & Medicis omnibus cerebrum animalium omnium facultatum sedem esse volumus. Laeso enim cerebro, vulnerato, refrigerato, inflammatione obfesso, compresso,

Animalium
facultatum
diuisio.
Sentiens fa-
cultas dis-
plex, externa
& interna.

Imaginatio.

Intelligentia.

Memoria.

De sederatione
animæ,
opinionis va-
ria.

Opinio Peri-
pateticorum.

Aulismis
Hippocrati.

Cerebrum se-
des animalium
facultatum.

aut alio quoniam modo affecto, ut in phrenitide, melancholia, caro, catoche, epilepsia animalium omnium functionum manifesta lesio persentitur, & cerebro, non cordi admoti præstidia iuvant. Quod si cor principum facultatum esset sedes, corde affecto eiusque temperamento insigniter depravato functiones omnes laderentur, quia actio à temperie: ut in hectica febre, in qua alienatio est temperamenti, voluntaria & principes facultates illesæ manent. Corde violenter moto, ut sit in palpitatione, nec voluntarius partium motus depravatur, nec ratio ipsa. Quis neget ab aura pestilente, à venenato morfu & haustu vitalem vim oppugnari? At ita affecti & sentiunt, & ratiocinantur. Si nudaveris (ait Galenus 2. De placitis) cor atque depresseris, nec voce, nec spiratione, nec ulla prorsus voluntaria actione impediri animal cernes. Dum Hippocrates animam in corde locat, aut loquitur more vulgi, ut solet sæpissime: at vulgus animam in corde statuit. Sic diaphragma φρένας appellat, cum tamen præcordia vim nullam habeant, qua sapere aut intelligere possit animal, ut docet lib. De morbo sacro, aut per animam princeps intelligit animæ instrumentum, calidum scilicet. Sic 1. De diætâ, animam pro calido passim usurpat, dum ἀνδράπε ψυχὴν αἰσιν ὀρεῖται μέγξι γανάντε, id est, animam hominis usque ad mortem augeri scribit. & eodem libro, ἐστὶν αὖτὶς ὅς ἐστιν ἀνθρώπων ψυχὴ πνεῦς καὶ ὕδατος ἐν γαστρὶ καὶ ἐν σπλάγχνῳ: id est, irrepat in hominem anima ignis & aquæ commodationem sortita partem corporis humani. Per animam ego interpretor, calidum innatum humido primigenio, & spiritibus undique perfusum. Quod autem libello De corde, per animam calorem intelligat, hæc verba declarant, quod animam parissimo sanguine & maxime defecato nutriri velit. At animam 1. De diætâ, nec cibum nec potibus alterari posse scripsit. Quæ sententia, quia quoniam Sole illustrior est, & digna quæ auribus insculptur literis, hic transcribenda est: Τῶν τοιούτων ἀπάντων ἡ φύσις τῶν πόρων διὰ τὴν ψυχὴν πορεύεται αὐτὴν ὅτι δι' ὁλοῦν καὶ ἀγλαῖαν ὁποχρεῖται, καὶ ὥστε ὁλοῦν τὰ ὥστε πᾶσι, καὶ ὁλοῦν τοῖσι κατὰ μέρος γινέται, τοιαῦτα φρονέουσι. διὰ τὸ τοῦ γινέσθαι τὰ τοιαῦτα ἐν διαίτης μεδίσανται. φύσιν καὶ μεταπλάσσει ἀφ' ἑαυτῶν ὅτι τὰ. id est, eorum omnium à quibus alteratur anima, causâ ad meatuum per quos ipsa permeat, naturam referenda est: prout enim afficiuntur vasa in quæ se cedit, & ad quæ allabitur, & quibus admiscetur, talia sapiunt, propterea talia ex diætâ transmutare non possumus: naturam enim inaspectabilem immutata & alterare impossibile est. Libro De morbo sacro, cor nihil sapere affirmat; omnia vult esse in cerebri potestate. Cerebro, inquit, intelligimus, deliramus, insanimus, cum aut calidius fuerit, aut siccius, aut frigidius. Galenus 3. De placitis, cerebrum animalium omnium facultatum sedem esse rationibus multis convincit. & cap. 4. lib. 3. De locis affect. ex vulgi opinione fatuum hominem appellat, quod cerebrum non habeat. Addamus ad huius sententia illustrationem elegans Philonis argumentum. Vbiunque satellitium regium est, ibi

Rex à satellitio stipatus, sedem habet: sed totum animæ satellitium, sensuum quippe organa, in capite sita sunt: ibi ergo sedes animæ præcipua. Quod si sentiens facultas in cerebro locetur, ergo & intelligens, quia intelligentem, ut docet Philosophus, oportet phantasmata speculari. Statuatur itaque à nobis cerebrum animalium omnium facultatum & sensificarum & principum sedes.

Explicatur
Hippoc.

Animam
sapi usurpat
Hippoc. pro
calido.

Elegans Hip-
poc. locus de
immortalitate
anime.

Cerebrum se-
dem esse ani-
malium faculta-
tum.

Argumentum
Philonis.

Cum ergo principes facultates tres sint, imaginatio, ratiocinatio & memoria, earumque sedes statuatur cerebrum, an ille sedibus sint disclusa, nunc inquirendum. Principes functiones definit Galenus in Arte parua, ^{Quid principi} que à solo principio proveniunt, 2. De locis affectu, ^{facultat.} que à nulla alia parte, ut instrumento sunt, 7. De placit. que in solo cerebro sunt, non in aliis organis, ut motus & sensus. Vniuersa Arabum schola mansiones multas in cerebro statuit, & singulis facultatibus singulas sedes assignat. Hoc voluit Auicenna Fen. 1. primi, doctrina 6. cap. 5. necnon Auerroes in Canticis, libro De memoria & reminiscencia, & in Colliget. Itaque phantasiam in anterioribus ventriculis, rationem in medio, memoriam in posteriore ventriculo locant. Potest hæc opinio his rationibus stabiliri. Sensus ferè omnes in anteriore capitis parte sunt siti. Imaginatio sensilium spectra & imagines concipit apprehenditque: debuit ergo in anteriore sede locari. Ab imaginatione concitatur vis illa intelligens, & rerum imagines è potentia abstrahit: huic itaque proxima scilicet debetur sedes, eaque dignissima & tutissima, tertius quippe ventriculus. Intelligentia discretas rerum ideas memoriæ commendat, quas alius quasi in thesaurum condit, continet, asseruat; eius in postremo ventriculo omnium siccissimo est sedes. Præterea imaginatio, cum sit conceptio & sola receptione fiat, molliorem requirit cerebri substantiam, ut sensus; memoria durior, ut recondita & notiones diu custodiat, ratiocinatio mediocrem. At anterior cerebri pars mollior est, postrema durior, media medio se habet modo. Erit igitur imaginatio in anterioribus ventriculis, ratiocinatio in medio, memoria in posteriore. Tertiò disclusas esse sedibus facultates principes hæc demonstrant, quod læsa aut pereunte earum altera, altera remaneat incolomis: sæpè enim contingit imaginationem lædi illa ratiocinatione, cum ergo seorsim existant hæc facultates, primis subiectis differre videntur. Exsint ad huius rei confirmationem elegantes historie apud Galenum cap. 3. libri De Symptomatum different. & cap. 2. libri 4. De locis affectu. Theophilus cum aliqui prudenter differeret, tibicines tamen arbitratu esse in angulo cubiculi, & assidue clamitans inbebat eos à cubiculo expelli. Alius phreniticus obseratis intus ianuis, singula vasa quæ propriis nominibus designabat, ad fenestras deferbat, prætereuntes ad vnum interrogans, iuberent eam proicere. Narrat Thucydides eo tempore quo per Græciam & Peloponnesum tam immaniter sauebat pestis, quam plurimos ita eorum omnium quæ ante nouerant fuisse oblitos, ut nec familiares, nec parentes agnoscerent. In his itaque sola memoria, in Theophilo sola imaginatio, in illo phrenitico sola ratiocinatio ledebantur. Quinetiam nisi sedibus facultates principes sunt disclusæ, cur varij sensus constructi sunt? cur alij alius sunt nobiliores, nisi quia nobiliorum facultatum sunt sedes? Addamus rationem ex Physiognomie arcaui depromptam. Qui amplum habent occiput, hi memoria valere dicuntur: quibus scilicet & frons prominens, his felix imaginatio: contrà, quibus deest uterque processus, hos fatuos & stolidos agnoscit vulgus. Atque talis est de facultatum sedibus Arabum Philosophia. Iam ad Græcorum familiam accedamus. Putat huius scilicet princeps & antesignanus Galenus, principes facultates vnica sede firmari, circa eadem spectra negotiari, eodem instrumento, cerebro quippe, uti, efficiendi tamen rationem diuersam esse. Libro 8. De usu partium, sub nomine hoc ἡγεμονικὸν, tres principes facultates complectitur, easque in vniuerso cerebro insidere docet. Eodem libro facultates principes non modò in sinibus, sed etiam in toto cerebri corpore continere scribit. Quorsum enim tota cerebri substantia constructa esset? Tertiò De placitis, lesò ventriculorum altero, facultates omnes principes affici docet. Id quotidiana

nus rerum euentus communiftrat. Nam in epilepfia mentis & fenfuum omnium eft obfefio,
 non occupat autem obftructio hac omnes ventriculos. Phrenitis inflammatio eft cerebri &
 membranarum; at in huiusmodi morbo nunc leditur ratio fola, nunc imaginatio, nunc me-
 moria. Quis vnicum in phrenitide finum inflammatione obfideri dixerit? In melancholia
 idiopathica, quæ intemperies eft frigida & ficca, totius cerebri, unica interdum leditur fa-
 cultas, nunc ratio, nunc imaginatio. Sunt igitur per omnes finus & per totam cerebri me-
 dullam diffufa principes facultates, & in eadem fubiccti particula exiftunt, licet à fe inui-
 cem fint diftinctæ: fed unica anima diuerfarum facultatum munia, diuerfis vtens medijs,
 diuerfa temperie exequitur. Sic in vna & in eadem offis particula diuerfe in funt faculta-
 tet, attraxitrix, retentrix, affimilatrix & expultrix, quarum licet vna fepe afficiatur illa-
 ceteris, non dixerit propterea Medicus fedibus & fubicctis proprijs efle difclufas. Vt ergo
 in ventriculo à diuerfa intemperie diuerfe facultates leduntur, ab humida quippe retentrix
 magis, à ficca affimilatrix, non tamen alia eft coctricis, alia retentricis fedes. Ita de princi-
 pibus facultatibus ftatuendum efle cum Galeno fentimus, & vniuerfam cerebri fubftan-
 tiam principum omnium facultatū fedem efle, quæ fi paulo feniore exiteris, aptius memora-
 biter, fi humidior, melius imaginabitur. Qui Arabum dogmata fequuntur, Galenum eiu-
 dem fententie fauctorem nobis obiciunt. Nam libello De oculis, phantafiam in anteriore ce-
 rebri parte, rationem in media, memoriam in posteriore collocat. Nos germanum Galeni
 non efle cum libellum afferimus. Addunt, Galenum lefa imaginatione medicamenta
 fincipiti & anteriori parti ad mouere, quod in ea phantafia fit fedes. Sed non videtis Ga-
 lenum idem præftare in omnibus penè cerebri affectibus, vt caro, apoplexia, phrenitide, me-
 lancholia, 12. Methodi & 2. De compof. medic. fecundum locos, non ratione diuerfarum
 fedium, fed vt vis medicamenti ad interiores cerebri partes celerius permeet: alius autem
 penetrat anteriori parti ad motum, ob cranij tenuitatem & future coronalis raritatem. Ea-
 rum opinioni fauere fortaffe magis videbitur eiuſdem Galeni locus, qui fcriptus legitur
 cap. 2. libri 4. De locis affectis: Si, inquit, lefa anteriore cerebri parte, tertius afficiatur
 per confenfum ventriculus, cogitandi actio vitia bitur: videtur ergo velle non ledi ratio-
 nem, nifi tertio finu affecto. Comment. 27. fectiōis prima Prorrbet. Si humor, inquit, in
 aliqua cerebri parte firmetur, confequetur fymptomatis fpecies, quæ affinis erit tum nature
 partiū, tum humori, vt fi humor in anteriore parte firmetur fiet phrenitis in qua leditur
 imaginatio. Addit Galenus dum materia tranſluit in cerebro ex vna parte in aliam ſi-
 nuatur fpecies affectionis, fed pro parte affecta fymptomata mutantur, vt modo imagina-
 tio, modò ratio ledatur. Nos fanè in vniuerfo cerebro principes omnes facultates contine-
 ri volumus, fed in hac magis quàm in illa cauitate, aliam alia magis vigere non negamus,
 prout ſpiritus in hac, quàm in illa cauitate tenuiores ſunt, perfectiores & magis elaborati.
 Poſtremo obiciunt, ſi facultates principes ſedibus non ſunt difclufæ, cur finuum alij aliū
 ſunt nobiliores? Galenus cap. 5. libri 3. De locis affectis, & 8. De vſu partium, deſert prin-
 cipatum poſteriori, dum medio ignobiliores vult efle anteriores. Rurſum cap. 6. libri 7. De
 placitis Hippocr. & Platon. anteriorum finuum vulnera periculofa, medijs periculofiora,
 poſtremi periculofiffima ſcribit. Quod fanè non ratione ſtructure, temperamenti & ſubſtan-
 tiæ cerebri contingere videtur, cum hæc omnia vbique ſint ſimilia, ſed ratione facultatum
 in finibus contentarum. Reſpondemus, tertium & quartum finum præſtantes efle, non
 quod in his nobilior infideat facultas, ſed quod perficiatur in illis animalis ſpiritus, vt quāto
 hepar vtriculo, cor pulmone, & in corde ſiniſter finus dextro præſtat, tanto poſteriores cere-
 bri finus prioribus excellant. Concludamus itaque cum Galeno, principes omnes facultates
 vnicæ ſede firmari, ſimili inſtrumento vti corporeo, cerebri quippe ſubſtantia, diuerſo tamen
 modo operari pro varietate temperamenti & medijs.

Exempla.

Obiectiua.

Prima.
Solutio.

Secunda.

Reſponſio.

Tertia.

Reſponſio.

Quarta.

Solutio.

Concluſio.

De organis animalibus cerebro quippe.

535

An facultates principes à temperie pendeant cerebri, vel à conformatione, id est, an similes sint vel organicae actiones.

QVÆSTIO III.



BREVISSIMA est questio, ratio cuncturne cerebrum & phantasmata speculetur, quia tali prædeditum est temperamento, an quia tam mirabili structura est fabricatum. A conformatione sola principes facultates ede existimarunt quidam, quod autoritatibus & rationibus confirmant. Scribit Galenus 7. De placitis, causam prudentiæ in homine, esse varietatem structure cerebri & magnitudinem illius. Figura capi-

A sola ede conformatio docetur. Auctoritas. Ratio.

tis apud Hippocratem & Galenum si naturalis sit, sphaerica, oblonga, anteriore & posteriore parte protuberans, & utrinque ad latera depressa, signum est prudentis hominis. Contra acuminatum, & turbinatum caput, quod dicitur, quale censetur fuisse Thersitis apud Homerum, fatuum, stolidum & amentem arguit. Perunt statim principes facultates sola conformatione lesa, temperamento nondum vitiatum, ut in apoplexia, epilepsia & vulneribus capitis, oppletis & compressis cerebri ventriculis. Quomodo enim momento alterari potest temperies cerebri effracto cranio, & ab humore ventriculos opplenis? Constat igitur à structura & conformatione sola functiones ede principes, quia vitiatà conformatione statim intercipiuntur. Alij contra facultatum principum proximam & immediatam causam agnoscunt temperiem substantiæ medullaris & spirituum cerebri. Audiamus Pæonie familie columæ famulum Hippocratem 1. De diata, hæc apertissimis verbis docentem: πυρός τὸ ὑπόστατον καὶ ὕδατος τὸ ἐπὶ τὸν καὶ ἡσίων λαβόντα ἐν τῇ σῶματι φρονιμώτατα, id est, Cum in corpore pars ignis succissima & aquæ humidissima æqualiter temperantur, prudentissimum qui nascitur. Platonis in Theætetō hæc sunt diuina verba: Πῦρ καὶ ὕδωρ, id est, Non recte anima se habet in denso aut lutulento, molli nimis aut duro cerebro; molle enim celeres quidem ad percipiendum efficit, sed eosdem obliuiosos; durum diu memores, sed ineptos ad percipiendum, densum simulachra obscura continet. Galenus lib. 8. De usu part. cap. 13. Melius (inquit) foret existimare intellectum sequi non varietatem compositionis, sed corporis, quod cogitat, laudabilem temperiem: neque enim perfectio intellectus quantitatis spiritui tam attribuenda est, quam qualitati. Idem in Arte parua, ingenium ad tenuem & crassam cerebri substantiam refert. Ingenium autem appellat αἰσθητικόν, id est, solertiam, quæ definitur εὐσυχία, id est, inueniendi & coniiciendi præptitudo. Eodem lib. εὐμαθία, id est, discendi facilitas, substantiam cerebri mollem & humidam ostendit; δυσμαθία, siccam & duram; memoria facilis idem arguit. Leues & opinione inconstantes ferè sunt cerebro molli, quia calor viget mobilitate, qui verò pertinaces frigido, quia frigus ignavum; cui si accedat, siccitas, erunt pertinaciores, hinc sectarum auctores & fautores, ut plurimum melancholici. Libro, Quod animi mores sequantur temperiem corporis, animam appellat Galenus concentum qualitatum; & eam non videtur à temperie distinguere. Commentario in 6. Epid. & in Aphor. 6. sect. 2. necnon cap. 6. libri 3. De locis affect. temperiem cerebri mentem appellat. Ita enim enarrat Hippocratis Aphorismum, & melancholici sunt epileptici, & epileptici sunt melancholici; prout in hanc vel illam partem repit humor, sit viriusque affectus transmutatio & humoris μεταστροφis. Nam si in corpus & ventres cerebri effundatur humor, sunt epileptici; si in mentem, melancholici; per mentem intelligit temperiem: est enim melancholia intemperies frigida & sicca cerebri. Caterum dum animam temperiem appellat Galenus, non vult temperiem formam esse hominis ratione utentis, sed formam medicam, quæ sola in Medici considerationem cadit. Illud namque quod nec servari potest præsens, nec absens

Secunda.

Contraria opinio. Auctoritas Hippoc.

Plato.

Galenus.

Galenus animam appellat temperiem, cur, & quæ modo.

Quid sentia-
rent.

restitui, non cadis in *Medici contemplationem*: at intelligens anima, nec præsens seruari po-
test, nec absens restitui: solum autem temperamentum & præsens seruari, & absens restitui
potest. Erit igitur solum temperamentum forma hominis medica, quia *Medicus huma-*
num corpus considerat, non quatenus *Physicum*, materia constans & forma, sed quatenus
sanabile & egrotabile. Ex his satis patere arbitrantur quidam, facultates animæ principis
non à conformatione, sed à temperie cerebri exerceri. Nos de proposita questione hæc senti-
mus, functionum omnium efficientem causam nec solam esse temperiem, nec mirabilem cere-
bri structuram, sed animam intelligentem, quæ tamen vitæque causam admittat organi-
cam, amplitudinem cerebri scilicet, ventriculorum & spirituum, & similem, tempericam
quippe substantiæ medullaris & spirituum. Hinc collige, ratiocinationem nec absolui esse
organicam actionem, quia latetur in melancholicis & phreniticis, illæsa structura cerebri:
nec purè similem, quia collisis compressisque ventriculis, illæsa temperie vitatur, quin etiam
à sola temperie nec inchoatur, nec perficitur, nec à qualibet partis particula editur: sed mix-
tam esse actionem ex organica & simili, qualis est actio cordis & ventriculi. Mouetur
enim cor & pulsatur insita vi propriæque temperie; sed non contraheretur nec disunderetur,
nisi esset sinibus excavatum.

De cerebri usu contra Aristotelem.

QVÆSTIO III.

Cerebri usu
ex Aristote-
le.
Consultatur
Aristoteles.



Ratio valida.

Veni cerebri
usu.

Inquam in re Anatomica summus ille Natura genius & princeps *Peri-*
pateticorum Aristoteles absurda protulit, sanè quæ de cerebri usu
scripsit cap. 7. lib. 2. De partibus animalium, absurdissima omnibus vide-
buntur. Cerebrum vult refrigerandi cordis gratiæ tantum constructum,
quod exagum sit, & sine venis, quod homini cerebrum ideo sit maximum,
quia cor calidissimum. Hunc Galenus 8. De usu partium, his ferè ratio-
nibus conuellit. Cum cerebrum actu quouis ambiente, aëre etiam æstiuo calidius sit, quomodo
refrigerabit cor? an non ab aëris inspiratu, qui copiosissimus hauritur, temperabitur patius?
Si dicant *Peripatetici*, non sufficere aërem externum refrigerando cordi, sed requiri aliquod
viscus internum: Hoc eis obrudam, cerebrum longissimo intervallo à corde distitum esse &
ossibus caluaria undique obuallatum: debuisse mehercule aut in thorace locari cerebrum,
aut saltem interiecta ceruice oblongiore non distingui. Calcanea, inquit Galenus, maiorem
vim habent refrigerandi cor: illis namque refrigeratis & madentibus, statim vniuerso cor-
pori frigus communicatur, quod in cerebro refrigerato non contingit. Præterea cerebrum in-
calescet potius à corde, quàm cor à cerebro refrigerari queat, quia expirant continuo à corde
& præcordiis vapores calidissimi, qui natura sua leuissimi in sublime attolluntur. Accedit
ratio validissima, quæ Aristotelis & *Peripateticorum* dogmata euertit funditus. Si cerebrum
refrigerandi cordis gratiæ tantum constructum est, quid opus tam mirabili structura? quon-
sum cavitates quatuor, corpus cameratum, plexus arteriarum labyrinthi, conarium, glow-
tia, epiphysis scolicoides, spinalis medulla, nervorum propagines? Postremo, leo calidissimum
animal, cerebri ampliolem molem haberet quàm homo; & maribus calidioribus cerebrum
perpetuò amplius esset, quàm feminis. Quæ cum sensui & rationi aduersentur omnino, non
est cunctandum profiteri, cerebrum ad nobiliores & diuiniore vicius creatum, quæ ad cor-
dis refrigerationem. Est autem constructum cerebri corpus ad functiones animales, scem scilicet,
motrices, principes edendas, & tot sinibus excavatur, tot plexibus intertextum est ad spiritus
animalis generationem, cuius preparatio in superioribus sit ventriculis, elaboratio maior in
medio, perfectio in posteriori: nerui autè organa sunt animalis spiritum & motricæ ac sensifi-

De organis animalibus cerebro quippe. 537

tam facultatem deferentia. *Auerroes*, *Aristotelis* affecta, & *Medicorum* ubi se ostentavit *Quid sentiat*
 occasio, insectator acerrimus, *Aristotelem* excusare conatur, vultque cerebrum ea ratione *Auerroes*
 refrigerare cor, quod vitales spiritus calidissimos temperet. Verum demus cerebrum tempe- *Refellunt.*
 rare spiritus, sanè vix cordis & insignium artieriarum spiritus refrigerabit, sed eos tantum
 qui in cerebri substantia & membranis continentur: qui cum ad cor non resiliant, quomodo
 calorem cordis temperabunt? *Alexander Benedictus* cap. 2. libri 4. eandem videtur sequutus
 sententiam. *Albertus Magnus* vir doctior quàm politior, licet *Peripateticus* sit, in hoc ta-
 men ab *Aristotelis* doctrina recedit, vultque libro 12. De animal. cerebrum frigiditatem sua
 non minus calorem cordis temperare, quàm siccitas cordis cerebri humiditatem temperat.

An cerebrum sit nervorum principium, lege questionem 7. libri quarti.

An nervi arteriis venisque continui sint, lege questionem 8. libri quarti.

An nervi sensus motusque sint organa, questio 9. libri quarti.

An nervi motorij à sensifidis distinguantur, Questio 10. libri quarti.

Cur pereat sensus illa fo motu & contra, motus sensu non vitiat. Questio 11. libri quarti.

An sola facultas per nervos insuat, an cum facultate spiritus. Questio 12. libri quarti.

Per quam nervi partem internam an externam feratur spiritus. Questio 13. libri quarti.

Hac omnia ex eo libro repetenda sunt: Reliquæ questiones nunc explicandæ.

Cur vulnerata aut inflammatione obfessa dextra capitis aut
 cerebri parte, convulsio in oppositas partes cadit.

QVÆSTIO V.



DUPLEX hic ἀπόκλημα excutiendum. Primum, cur sauciata aut in-
 flammatione obfessa dextra capitis parte, sepe contingit convelli sinistras
 corporis partes. Alterum, cur percussa, aut obstructa alterutra cerebri par-
 te, interdum fit ut resolviatur corpus è diverso partis affectu. Utriusque
 dissolutio difficiles explicatus habet. Solent enim omnium ferè partium

affectus partium communicari, non ἀνὰ πάλιν; quia dextra dextris, *Affectus par-*
 sinistra sinistris sunt ὁμοφύλοι. Sic liene affecto dolet sinistra capitis pars, ut inflammato *tium è directo*
 hepate, dextra; & sectione 2. libri 6. Epidem. è directo laterum dolor, hypochondriorum *solent commu-*
 niscari.

tensio, lienis tumor, eruptio è naribus. De convulsione primum dicam quid sentio, mox de pa-
 ralyti. Convelli oppositas partes primum docuit Hippocrates libro De vulneribus

capitis. Oppositas autem intelligit nunc solius capitis, nunc totius corporis: solius capitis, dum

scribit, venas quæ per tempora excurrunt secandas non esse, quia periculum est convulsioni;

dextra quidem partis, si sinistra secetur & contra. Convulsioni autem quæ reliquas corporis

partes prehendit, meminit eodem libro. Si (inquit) purulentum os fuerit, pustule in lin-
 gua assurgunt, percussus cum delirio moritur, & convulsio plerosque corripit in

altera corporis parte. Si quidem dextra capitis pars sauciata fuerit, convulsio fini-

stram corporis partem occupat, & contra. Libro quinto Epidemidn. Puella Omilea

æstate media convulsionem experta est partium sinistrarum, cum in dextris esset pertusio; au-

tumno autem convulsa sunt ambae manus, quod in medio bregmate lapidis iactu esset per-

cussus. Septimo Epid. In historia filiorum Pharij & Emergi capite vulneratorum, Talibus

(inquit) contingit ut vomitus superueniant & convulsiones, idque si in dextris

fuerit vlcus, sinistra parte, si in sinistris, dextra. Itaque duo ex Hippocrate colligo. Pri-

imum, non semper convulsionem subsequi, sed tantum dum suppuratio fit aut facta est, aut dum

ingens est inflammatio; deinde non omnes sauciato convulsione illa corripit, sed plerosque, ut

perpetua veritatis non sit, percussa altera capitis parte oppositas partes convelli. Prioris con-

Effectus par-
tium è directo
solent commu-
niscari.

Convelli oppo-
sitas partes
docetur Hip-
ocratæ au-
thoritate.

Historia mul-
torum.

Cur leſi tem-
poralis muſcu-
lo alter con-
uellatur.

conuulſionis cauſſam assignare non eſt difficile; neque enim ſectio aut exoluto temporali muſculo dextro, conuulſio proprie dicta primo & per ſe in oppoſitum muſculum cadit, ſed ex euentu, quia muſculi omnes vel ſunt antagoniſtæ, vel congeneres: ſi ſint congeneres, vniuſ reſolutio, aut ſectio conuulſionem facit alterius: ſi ſint contrarij vt ſibi ſuccedant motus, altero eorum pereunte neceſſariò tollitur alter; ſi enim qui extendit muſculus præſcindatur, ſectetur qui- dem pars, ſed manebit in eo ſtatu ſemper, quia extendi amplius non poterit, accidentaria igitur & impropria eſt conuulſio. Alterius verò conuulſionis, quæ reliquarum eſt corporis par- tium, non capitis ſolius, ratio paulò eſt obſcurior, videtur tamen Hippocrates loci citati cauſſam agnoſcere malignam puris qualitatem, quæ membranas exquisitiſſimi ſenſus lanci- nans & neruorum principium pungens deprauatum motum excitet: fertur autem à parte vulnerata in ſanam, nunc ſola aura, nunc ichoris maligni portio. Aura per inſenſiles ductus expirat, quomodo verò à vulnerata parte in oppoſitam feratur ichor, explicare nò eſt ita fa- cile. Sanè aut eò tranſmittitur, aut decumbit, aut propagatur, aut denique exprimitur. Trāſ- mitti à vulnerata in ſanam nemo dixerit; non ſolet enim debilior pars in validiorem ſeſe exonerare. Neque etiam decumbit, quia decubitus omnis recta fit & ad perpendicularum. mo- tum quippe humoris ſequitur, qui cum à forma elementari pendeat ex Philoſophorum decre- tis, rectus erit ſimplexque: Aut ergo propagatur, aut exprimitur. Vtrūque hic ego agnoſco. Propagatur ſi nimia copia luxuriat, ſi ſubſtantia tenuiſſimus ſit, & qualitate acerrimus: ſic- bilis temperamento calidiſſima & ſurens dum internarum partium eryſipelas parit, ad ex- ternas uſque interdum ſeſe diffundit. Rubent apud Hippocratem in angina laryngū, & ſter- num & ceruix ſepe per ἐπὶ χύσσειν. Quid ergo ichoris tenuiſſimi per vniuerſam membra- nam diffuſionem impedit, ſi ad ſummum peruenit inflammatio: Quod ſi ichoris ea non ad- ſit copia quæ propagari queat, poterit ſaltem à dextera in ſiniſtram partem illius fieri expreſ- ſio, ut ſepe ab infernis ad ſupernas partes ſit ὁρμήσις: exprimitur autem per compreſſionem. Compreſſio à ſuppuratione quæ dum ſit vicinas partes diſtendit, quia efferueſcens humor ma- iorem occupat locum; hinc ὁρμήσις ὡς πύρρον. Propterea dixit Hippocrates conuulſionem tunc præcipuè excitari cum ſuppuratio ſit aut facta eſt. Puella Omileæ veriſimile eſt non dif- fuſum, ſed expreſſum ichorem à vulnerata parte in oppoſitam: aperto namque oſſe paucò manabat pure & ſanguine membrana. Poſſe ichoris guttula, ut & maligna aura conuul- ſionem excitare, dum neruorum membranas, quæ ſunt exquisitiſſimi ſenſus, vellicat. Expi- mitur ergo aut propagatur ſepe ab agra in ſanam partem humor qui conuulſionem parit, ne- que verò ichorem exprimi aut propagari neceſſe eſt, ſatis eſt ſi maligna expiret aura: verum duo hic obſeruātur inuoluta ſummæque ardua. Primum, quomodo à percuffa parte in oppoſi- tam ferri poſſit ichor, cum cerebrum in dextram & ſiniſtram partem proprio diaphragma- te eoque traſſiſſimo diſcretum ſit, adeſt quippe duræ meningis duplicatura; quæ quia ſimilis eſt falci, quæ ſegētes demeti ſolent, falx appellatur. Alterum, cur cum eadem puris acrimonia ſanciata partis membranam pungat, in eadem conuulſionem non excitat ut in oppoſite. Prio- ris diſſolutio ex Anatome petenda eſt. Mēbrana σκληρὴ calig. contigua ſuperiore & exte- riore parte tota eſt ſibi ipſi cōtinua, & velut aqueo humore oblita. Inter eā & cranij os reſta- gnat purulenta illuuius, quæ per membrana continuitatem & exprimi, & propagari à dex- tra in ſiniſtram eius partem facile poſſeſt, iuuante nihil nò orbiculari capitis figura. Expreſ- ſa hæc ab agra in ſanam partem ichoris portiuncula, nunc ob tenuitatem exuat à membra- nis in cerebri medullam & ab ea in neruos, unde eorum inflammatio; nunc per externam membrana partem decumbit in ſpinalem medullam, quæ eadem velatur tunica, ubi neruo- rum principium pungens conuulſionem excitat ſympathicam, ad eò ut vellicatis aut inflam- matis membranis potius contingat πᾶσι μὲν quam interna & medullari neruorum ſub- ſtantia affecta. Cur autem contingat vulneratam partem non conuelli ſed oppoſitam, nunc

Conuulſionis
oppoſita cauſſa
eſt maligna
qualitas.

Quomodo
ichor feratur
à ſina in agra
partem.

Quæſitiuus
duæ.

Quomodo fer-
ri poſſit ichor
in oppoſitam
partem.

Cur vulnera-
ta pars non
conuellitur.

inquirendum. Observatum est aliquando percussa dextra capitis parte, dextras etiam corporis partes conuelli, interdum oppositas tantum, sepe utrasque simul, & τας (inquit Galen.) & ἀρχὴς αὐτῆς ἀπὸ τῆς τοῦ αἵματος, id est, cum principatu attigerit inflammatio. Non ergo perpetuū est sauciata altera capitis parte alteram conuelli: sed cum sepius id contingat, causam ita scrutari placet. Conuellitur sepe opposita pars non autē percussa, quia quod ab agra in sanam expressum aut diffusum est pus, exitum non habet ibique stabulatur & inflammationem concipit, inde conuulso; qua autem in sauciata parte restagnat sanies, per vulnus & ossis sectionem liberum habet exitum; a quo membrana affectio vitari potest. Et hoc voluit fortasse Hippocrates, dum in puella historia dixit sinistras partes conuulsionem expertas, quoniam in dextris potius eras pertusio. Potest alia conuulsionis huius a nobis ratio assignari, eaque probabilis. Vulnerata pars non conuellitur sed opposita, quoniam extincta est planēque exoluta illius facultas & temperies, quę actionum omnium causa est insigniter laesa. Itaque stimulata non excitatur, nec ullum ciet motum. Est autem penē emortua pars a supuratione & pregrandi inflammatione, quod his verbis expressit Hippocrates libro περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ νόσμων, καὶ τὸ φλεγμαῖνον ἐκλεῖδονκεν ἐξ αὐτῆς καὶ γλιχράδες γίνεται. Opposita autem pars quia sensu pollet acriore, statim contrahitur, & in sui sympathiam eiusdem partis nervos omnes trahit; unde conuulso κατ' ἑξιν. Hanc meam coniecturam confirmat Hippocratis locus citatus. Dum enim in oppositam partem cadit conuulso, desperata sunt omnia; pustula, inquit, assurgunt in lingua, & ipse saucius cum delirio vitam finit.

Cur sauciata aut obstructa dextra capitis parte resoluitur opposita.

QVÆSTIO VI

DE paralyysi obscurior & scopulosior est difficultas; Cur sauciata alterutra capitis parte aut obstructo compressoque ventriculorum altero, opposita corporis partes resoluantur? Id verissimum esse multorum exempla testantur, & Medici ferē omnes tum veteres tum neoterici scriptis mandarunt. Hippocrates aliquando eius paralyseos meminit libro De vulneribus capitis, & in Coacis prænotionibus. Quicunque, ait, ex vulneribus capitis impotentes fiunt, superueniente febre sine horrore cōualescunt, alioqui apoplectici euadunt dextris partibus vel sinistris, id est, paralytici, sepe enim eras apoplecticum dicit Hippocrates. In historia filiorum Phani & Energi 7. Epidem. scribit ἀπερετὰς illos fieri, id est, impotentes, ἢ ἐν τοῖς δεξιότοις τὸ σώμα, ἢ τὰ ἀριστερά, ἢ δὲ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, τὰ δεξιὰ, si in dextris fuerit vlcus, sinistra parte, si in sinistris, dextra. Aretæus cap. 7. libri 1. De causis & signis diuturnorum morborum, idem sentit. Si caput, inquit, primò in dextra patiatur, sinistra, si in sinistra, dextra nervorum resolutione laborant. Salicetus theorema hoc catholicon profert. Quotiescunque vulneratum alicui caput fuerit, ita ut inde paralytis contingat, si vulnus dextra capitis parti inflatum est, paralytis fiet in sinistra corporis parte, & contra idem etiam annotauit Ioannes de Vigo, & Hollerius cōmentariis suis in Coacas Hippocratis prænotiones. Nos aliquando id obseruauimus: ergo τὸ ὅτι controuersum non est, sed δι' ὅτι, id est, cur, & quomodo id fiat maxima disceptatione certatur. Sunt qui existiment nervos in exorin ita implicari, ut dextri sinistras, & sinistri dextras perreptent partes, seseque intersecant in modum crucis, quę intersecctio χασμός dicitur. Itaque vulneratis, obstructis aut quouis modo affectis dextris partibus, sinistras nunc conuelli nunc resolui putant, & contrā; quòd scilicet earum principium afficiatur. Id voluerunt Cassius & Aretæus.

Resolui oppositas partes dicitur eautheratio Hippocr.

Historia.

Quomodo fiat illa paralytis sententia varia. Prima.

Cassio & Aretae opinio, secare se nervos.

Conuelliunt illa opinio.

Nervi non quoniam se intersectant.

Altera opinio, ferri per arterias spiritum animale & se interfecare arterias.

Conuelliunt illa opinio.

Vasorum cerebri diuiscatio.

Arteria cerebrum se intersectant.

Cassius nervos è basi cerebri originem suam ita trahere putat, vt è dextra parte orti ferantur in sinistram, & è sinistra in dextram sese inuicem decussantes. Aretae cum Cassio idem sentit. Non, inquit, dextri nervi in dexteram partes secundum rectum vsque ad extremum progrediuntur, sed ab initio enati, protinus ad oppositos transeunt, scissos in figuram literæ X, quam Græci $\chi\lambda\alpha\sigma\mu\acute{o}\nu$ vocant, permutantes. Sed eius opinionis leuitas redargutione nostra non eget. Docet enim $\alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon\lambda\alpha$ nervos omnes qui à cerebri medulla exoriantur in suo exortu progressu & insertione omnino distinctos esse, si optidos exceperis, qui in medio iuncte coeunt & coire debuerunt, vt recta ad pupillam ferantur nē ob molliem longū iter perperantes flaccescerent, ne ab vna planitie aliquando secederent; & ita delusi oculi obiectum simplex duplum iudicarent, vt denique visillum forme & spectra viderentur. Coeunt ergo soli optici, sed ita vt nunquā sese intersectent. Obseruauimus nuper secundæ coniugationis nervos in exortu continuos esse. Quod ad nervos spinalis medullæ spectat, dextri à sinistris discreti sunt, nullo modo sese interfecantes; absurdum est igitur conuulsionis & paralyticos, quæ sit è diuerso, causam ad nervorum intersectionē & eorum permutationem, vt loquitur Aretaeus, referre, cum figmenta sint hæc & mera nugæ. Sunt qui velint non nervos sed venas & arteriolas cerebri in basi primum, mox in plexibus illis labyrinthici choroide, inquam, & mirabili ita implicari, vt è dextra in sinistram & è sinistra in dextram partem diuarentur. Putant itaque compressis aut obstructis dextri cerebri sinibus, & partibus, conuelli, aut resolui sinistras corporis partes, intercepto scilicet spirituum commatu, oppresso obstructoque communi eorum fonte, tandemque denegato aditu spiritui quem non per medullarem & interiorē nervi substantiam, sed per arteriolas veluti tubulos in vniuersum corpus expandi sibi persuadent. Ingeniosa sanè & veri specie quadam adumbrata hæc mihi videtur opinio, sed quæ Anatomicis principiis aduersatur. Namque vt rem in paucis contraham, duo contendit hæc opinio, vasa scilicet sese interfecare, & per vasa non medullam spiritum ferri animale. Quæ quàm sint à vero aliena (ratione & sensu, quæ duo sunt rerum omnium $\chi\epsilon\alpha\tau\acute{\eta}\nu\epsilon\alpha$ & soli canes ad venationem caussarum) ita demonstrari potest. Vasa omnia quæ totum cerebri corpus eiusque membranas irrigant, à iugulari interno & arteriis carotidibus ac cervicalibus propagantur. At horum vasorum hæc est dispersio quam docuit nos $\alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon\lambda\alpha$. Iugularis dextra in dextrum, sinistra in sinistrum durioris membranæ sinum tanquam cisternam, sanguinem effundit. Ex horum sinuum $\sigma\upsilon\delta\epsilon\varsigma\mu\acute{\iota}$ concursuque tertius nascitur, qui per suturam sagittalis longi iundinem excurrens, ad narium extrema fertur ab hoc venulæ quamplurimæ hinc inde per tenuem membranam sparse vagantur; quartus verò inter cerebrum & cerebellum delatus clunibus cerebri finitur. Sinus hi tanquam riuus & vasorum vicarij sanguinē quoquoersum effundunt; ab iis tanquam torculari sanguis è iugularibus venis corruatus, in vniuersum cerebri corpus exprimitur. Coeunt ergo iugulares rami in tertio & quarto durioris membrana sinu, sed nunquam ita implicantur, vt dextri ad sinistras, sinistri ad dexteram ferantur partes, nulla est harum venarum intersectio nullus $\chi\lambda\alpha\sigma\mu\acute{o}\varsigma$. Arteriarum verò carotidon dextrarum cum sinistris nulla est intersectio, quia in eas membrane duplicaturas vitalem non refundunt spiritum, vt venæ sanguinem, nec dextra sinistris implicantur, sed quælibet arteria suum effingit formatque plexum, dextra dextrum, sinistra sinistram. Plexus hi in superioribus ventriculis conspiciuntur, $\pi\acute{\lambda}\acute{\epsilon}\gamma\mu\alpha\tau\alpha$ ἢ $\sigma\upsilon\varsigma\pi\acute{\epsilon}\mu\mu\alpha\tau\alpha$ $\chi\omicron\epsilon\sigma\iota\delta\delta\eta$ nunquam sese ita intersectant, vt dextri ad sinistras & sinistri ad dexteram partes ferantur, sunt enim superiores sinus proprio septo discreti. Quod si in basi cerebri ad latera apophyseon clinoidon implicari velis & sese interfecare carotidas, implicari quidem admittam eiusdem lateris arterias, id est, immis meris penè gyris, capreolis vitium bedere & amulā inorqueri, ad spiritus præparationem, sed sese interfecare & à dextris in sinistras ferri partes, planè inficiabor. Distant namque

κλινῶδ' ὄδῳ, foramina, per quæ ad cerebri basim, indeque κατ' ἔξιν ad superiores cerebri
 ventriculos ascendunt arteriæ. Id si nō credas, ita experiare. Immittatur in carotidem dextrā Experientia.
 tubulus qui insuffletur, videbis tunc dextrarum partium arteriolas magis inflari distendique
 quàm sinistrarum. Excutiamus ergo ab animis nostris caliginem illam, & ea vasorum in-
 terfectio quæ autopsiæ aduersatur penitus explodatur. Experientia fauet & ad stipulatur Ratio.
 ratio. Si enim vasorum hæc interfectio admittatur, perpetuum hoc erit, oppletis, aut com-
 pressis dextris partibus sinistras resolui, intersepto spiritui aditu. At sæpè observatum, est op-
 pletio dextro sinu, eiusdem partis nervos resolui. Sed esto, admittamus, non concedamus arte-
 riolas & plexus illos labyrinthos sese interfecare, an propterea compressis vasis paralytis è
 diuerso continget? Arteriæ solius vitalis spiritus sunt ἐργαστήρια & conceptacula. Vi-
 talis ille spiritus vitæ munia tantum exequitur, & innatum singularum partium calorem fo-
 uet, suscitatur, refarcitur, ad motum verò & sensum nihil confert; at in paralyti vivit pars motu
 & sensu omnino intercepto. Non ergo per arterias fertur animalis spiritus motus sensusque
 omnis author. Scio obstructis iugularibus venis & carotidibus arteriis, apoplexiam, caron,
 lithargum excitari, unde carotis arteria ληθαργικὴ καὶ δαποπληκτικὴ dicta est, Et
 eam apoplexia speciem τῶν φλεβῶν δαποπληκτικὴν vocare solet Hippocrates; sed fugax est ea
 apoplexia & ex euentu contingit, denegato videlicet aditu vitali spiritui, qui animali mate-
 riam subministrat. Hic autem de vera paralyti questio instituitur, quæ sit aut exolutis, ma-
 defactis & mollificatis (ut Arabis dictione utar) nervis, aut occlusis & interceptis anima-
 lis spiritus viis. Via porro hæc nervi sunt, qui licet conspicuā cavitatem nō habeant, est tamen
 interior eorum substantia tota σπιγγώδης καὶ αὐτοσπινώδης, per quam animalis facul-
 tas & ea quæ intus cient, videlicet τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς faciliè excurrunt. Hoc docti plerique non
 admittunt, & inter neotericos doctissimus Rondeletius ferri per arteriolas, non per medul-
 lam, animale spiritum contendit; medullæ autem hunc unicum agnoscit usum, ut tomenti
 instar exilia vasa fulciant sustineatque. Argenterius spiritum arterias nunquam deserere pu-
 tat. Antiquissima fuit Praxagoræ opinio, ut refert Galenus 1. De placitis, cap. 7. nervos
 arteriis esse continuos, nihilque aliud esse nervos quàm exiliores factas arterias. Verum hu-
 ius sententia leuitas ex eo coniunctur, quòd intercostales arteriæ exiles sint & plexuum ce-
 rebri arterioli angustissimis, quas tamen nervos nemo appellare ausit. Sed de his fusiùs libro
 quarto disputauimus: hic obiter hæc dixisse sufficiat; non posse per arterias ferri animale
 spiritum, quia vitali deducendo dicata sunt: at duos spiritus specie & forma distincti per
 eadem vasa ferri non possunt. Obstructo optico perit videndi actio, an interceptis arteriis?
 Minimè quidem, extingueretur enim omnino pars vitalis spiritus radiis non amplius illu-
 strata. Ergo affecta medullari substantia, luxatis vertebrae sæpè resoluitur corpus, quia
 premittitur nervi medulla, ex qua compressione spiritui animali denegatur aditus; calculosis
 πόλιν ἔμπρὸς κατ' ἔξιν crus è directo stupore torpet compressis nervis & musculis flecten-
 do cruri dicatis, quibus renes ambo incubant. Arterioli quæ per membranas nervos velantes
 excurrunt, vitæ spiritum nervis affundunt, non sentiendi mouendique facultatem. Non dif-
 ferunt arteriæ cerebri & nervorum ab aliis arteriis specie. At alibi animales nec gignunt, nec
 continēt spiritus. Adde quòd cuiusque rei forma à sola partis substantia tum alimento, tum
 spiritui inditur; plexibus illis præparandi & delineandi tantum spiritus prouincia delegata
 est, formam autem à sola medullari substantia in tertio & quarto ventriculo consequitur;
 alioqui frustra essent conditi ventriculi quatuor, quos partes esse cerebri nobilissimas, omnes
 admittunt. Postremò, ut cerebrum per medullarem substantiam cerebrum dicitur, estque
 medulla hæc princeps nobilissimi organi pars, memoriæ, cogitationum rationisque sedes; ita
 nervi præcipuam partem agnosco medullam, quæ sentientis & motricis facultatis imperium
 deferit, non per irradiationem solam, sed per corporeum spiritum. Propterea cerebrum appel-

Arteriæ non
deferunt ani-
malem spiri-
tum.

Rondeletij
opinio, ferri
per arterias
animalem spi-
ritum.

Comuellitur
ea opinio.

Nec ferri per
arterias spiri-
tus animale.

*Causa paraly-
si seu in oppo-
sita parte.*

lat Galenus, octavo De usu partium, nervum amplissimum & mollissimum; nervum vero parvum cerebri resiccatum & durius. Quod si interior nervi pars, ut voluit Rondelcius, fulciendis tantum stabiliendisque arteriis esset dicata, ignobilior mehercule hac esset nervi pars. Sæpe ergo inuicta Galeni & veterum doctrina, per interiorē nervi medullam non per arterias ferri animalem spiritum. His ita constitutis superest ut paralyticos, quæ à diverso sauciata partis contingit, causam aperiāmus. Potest è vulnerata parte dextra, ichoris portio κατ' ἄνω in superiorem ventriculū dextrum decumbere, ab eo in tertium sinum, qui communis est cavitās, ductus est conspicuus (ventrem hunc medium vocat Galenus, vel quod centrum ferè occupet cerebri, vel quod inter superiores duos & inferiorem quartum sit situs.) In eo sinu qui continetur humor velut in centro est cerebri. Quare si formæ elementaris motum sequatur, in decliniorē locum decumbet: at sana partis situs declinior esse solet; decumbit enim æger in sanum non saucium latus, doloris metuens. Quid ergo impedit quo minus è tertio sinu in quartum, & ab eo in spinalem medullam è diverso percussæ partis interdum decumbere possit humor, unde paralytis? Non est (quod somniant quidam) à summo ad imam basin diuisum cerebrum. Desinunt superiores sinus in communem cavitatem, in quam superuacua deponunt. Communis hæc cavitās in quartum sinum dirigitur, qui cerebello & spinali medullæ communis est. Non ergo Anatomicis principiis aduersatur, posse à dextro ventriculo ad tertium transmitti, pus, pituitam, sanguinem; ab hoc per quartum in spinalis medullæ partes varias, nunc dextram nunc sinistram, prout alterutra declinior, aut debilior fuerit. Afferri potest & alia ratio, quod per vulnus naturæ excrementitii humorem excernere solet, tum per fluxum sanguinis, tum per puris excretionem, tum per medicamenta quæ trahunt exhaustiuntque humorem, ita ut bene expurgetur pars affecta; at opposita pars quæ non expurgatur, faciliè afficitur, vel per στυμνία, vel materia ad eam transmissa aut decumbente. Sunt qui velint ad partem tumore aut inflammatione obsessam, spiritus ferè omnes confluere, unde fit ut illis defraudatæ oppositæ partes resoluantur.

Alteratio.

De animali spiritu, quænam sit eius natura, quis generationis
modus & locus. QVÆST. VII.



*Quid sit ani-
malis spiritus.*

Ad sensum & motum non solius facultatis, sed corporei cuiusdam spiritus influxum necessariò requiri, validissimis rationum momentis est à nobis confectum. Nunc quo nomine insigniendus sit ille spiritus, qualis sit eius natura, quis modus & locus generationis, breuiter explicare placet. Galenus spiritum hunc animalem ubique vocat, quod eo ad animales functiones, sensificas, motrices, & principes tanquam immediato organo utatur anima. Hunc definit cap. 17. libri 6. De usu partium, exhalationem quandam sanguinis benigni. Sunt qui cerebri viventis partem esse velint, & similem & organicam similem, quatenus certa temperie est insignitus; organicam, quatenus tenuis est, lucidus, subtilis, purus, mobilis. Hunc speciem & naturam non differre à vitali existimant quidam, sed accidentibus tantum, ut temperie, loco, principio à quo pendet, & diffusionis modo: animalis enim humidior est & magis temperatus; vitalis calidior; animalis è cerebro, vitalis è corde manat, animalis per nervos ad sensum & motum spargitur, vitalis per arterias ad functiones vitæ. Nos diuersam esse utriusque spiritus formam & speciem volumus, ut diuersa est chylosis ab hamatosis; diuersa enim sunt organa, diuersæ facultates, diuersus generationis modus, & ut alimentum noua cōctione nouam formam, proinde nouam denominationem accipit, ita & spiritus. Animalem hunc spiritum à vitali distinxit Galenus mille in locis, quicquid contrā asserant recentiores quidam, cap. 5. libri 12. Meth. Animalis, inquit spiritus cerebrum veluti fontem esse dictum.

*Diuerfus à
tali anima
spiritus speciem
& formam.*

De organis animalibus cerebro quippe. 343

est. Vitalis spiritus non aequè evidens demonstratio est, sed tamè cum in corde & arteriis contineri alienum à ratione non est. Quod si naturalis quidam spiritus sit, is in iecore & venis stabulatur. cap. 7. lib. 3. De locis affect. Epilepsia fit in cerebro impeditente humore animalem spiritum, qui in ventriculis eius continetur, quo minus possit exire. cap. 10. lib. 16. De usu part. arteria plexuum, animalem spiritum in cerebro contentum nutrant, qui cerè multum ab aliis spiritibus naturà discrepat. cap. 3. libri 7. De placitis Hippocrat. & Plat. Spiritus, qui in arteriis continetur, vitalis est & dicitur; qui in cerebro, animalis, non quod anime substantia sit sed primum eius instrumentum. Idem scripsit cap. 4. lib. 9. De usu partium. cap. 8. lib. 7. De placit. & cap. 5. lib. 9. De utilitate respirationis. Ex quibus colligere est, Galenum animalem spiritum à vitali discreuisse. Et sane necessarius fuit animalis iste spiritus, primum ut sentiendi & movendi vim que partibus insita non erat deferret; deinde ut facilius que extrinsecus adveniunt sentiremus: cum enim sensuum organa à sensibilibus momento affici debeant, citius ea alterabuntur si spiritibus referta sint, quàm si omnino solida essent: sed & spiritus hi rerum omnium species ab externis sensibus perceptas ad cerebrum transfuehant tanquam censorem & iudicem; iidem rerum externarum imagines in cerebro conservant, adeo ut animalis spiritus specierum locus & promptuarium dici possit. Sic in vertigine nec ipsa res, nec illius simulacrum, nec quicquam aliud præter spiritum voluitur, omnia tamen in gyrum & orbem agi videntur: Est ergo ad motum & sensum necessarius iste spiritus: Ad principes etiam facultates edendas illius ministerio cerebrum utitur, adeo ut & in cerebro, & extra cerebrum agat in cerebro, ad principes facultates; extra cerebrum, ad sensum & motum; stabulatur autem non modò in ventriculis, sed etiam in poris & tota substantia cerebri medullari, ut secundum poros perimeat ad principem facultatem, secundum ventres ad sensum & motum. Hic porro spiritus, motus sensuque & principum facultatum immediatum organum, specie quidem unicus est, obiectorum tamen & organorum varietate multiplex existimatur, quod docuit eleganter Aristoteles quinto De generatione animalium, capite ultimo. Sic se habet (ait) spiritus in rebus à natura institutis, ut malleus in arte fabrilis, unū scilicet instrumentum quod ad plures actiones est utile. Actuarius radiorum solarium exemplum affert, qui licet sint uniusmodi dissimiles, tamen & variegati redduntur pro varietate colorum. Natura verò animalis spiritus & modus generationis nunc explicandus. Materia duplex est, aer & vitalis spiritus; aer inspiratur per nares, vitalis spiritus per carotidas & cervicales arterias in cerebri basim fertur; ære nutritur spiritus hic, propterea duplicem respirationis usum agnovit Galenus, caloris nativi conservationem & nutritionem seu generationem animalis spiritus. Vtriusque materia si aditus ad cerebrum interceptatur, nulla fiet animalis spiritus generatio. Ligatis carotidibus fit apoplexia. Interclusis naribus prohibitaque respiratione extinguatur animal & sensu ac motu priuatur. Videtur tamen pugnantia loquutus Galenus, quæ concilianda sunt. Libro De usu respirationis, cap. 5. ait se in vivente animali arterias carotidas ligasse, non tamè propterea extinctum fuisse; solo ergo aëre nutriebatur animalis spiritus non vitali, libro tertio De placitis, & 9. De usu partium, scribit foueri posse animalem spiritum vitali per arterias delato, nulla aëris facta mentione. Dicamus posse animalem spiritum foueri ad aliquod tempus si alterutro priuatur alimèto, adest enim in plexibus choroide & mirabili commeatus, sed diu non posse. Cæterum eius præparatio fit in plexibus arteriolarum labyrinthicis, coctio in cerebri sinibus, distributio tandem in uniuersum cerebri corpus & nervos. Errant igitur, qui in plexibus propriam formam & speciem consequi hunc spiritum putant. Nam ad solam præparationem plexus omnes & testium & cæterarum partium constructi sunt, & cuiusque rei forma à sola partis substantia tum alimèto, tum spiritui inditur: adde quod arteriæ cerebri non distant ab aliis arteriis specie: at alibi animales non gignunt spiritus. Fit itaque in plexibus tantum præparatio, in

Animalis spiritus necessarius & usus.

Vertiginis natura.

Spiritus animalis quomodo multiplex.

Animalis spiritus mare.

Conciliatio lecorum Galeni de spiritu animalis.

Præparatio in plexibus fit, non perfectio. In ventriculis fit colla.

ventriculis autem coctio elaboratioque; alioqui frustra essent conditi sinus quatuor, quos partes esse cerebri nobilissimas omnes admittunt, cum ex eorum compressione & vulnere precipitem mortem inferri quotidie observemus.

De animali spiritu, Argenterij opinio conuellitur.

QUESTIO VIII.



RGENTERIUS acutissimus quidem vir, sed in Galenum nimis mordax libro De somno & vigilia, & commentariis suis in artem medicinalem, unicum esse spiritum cumque vitalem asserit, nec animale ad mittendum putat; ac primum suo more in praeceptorem Galenum inuehitur, cumque nunc lenitatis & inconstantiae, nunc ignorantiae accusat.

Inconstantiae quidem in materia spiritus animalis & loco generationis assignando. In materia, quia nunc ex aëre inspirato, nunc ex vitali spiritu, nunc ex sanguine fieri vult. In loco generationis, quia nunc in plexu, nunc in anterioribus ventriculis, nunc in posterioribus generari scribit, nunc in cerebri substantia & corpore contineri. Sed Galeni mentem non assequitur Argenterius, nec pugnantia loquitur Galenus. Materia enim remotissima animalis spiritus, sanguis est, propinquior vitalis spiritus, propinquissima aër inspiratus per mammillares processus, non in plexu, sed in superiores ventriculos delatus. Locus item generationis multiplex est: preparatur namque in plexibus & superioribus ventriculis, excoquitur in tercio, perficitur in posteriore: tandemque & in nervos, & in totum cerebri corpus diffunditur. Ignorantiae vero Galenum accusat Argenterius, quod ex plexu retiformi animale spiritum collegerit, quia nec in homine conspicuus est ille plexus, nec ad omnem spirituum generationem plexus requiritur: in corde quippe mirabilis ille vasorum textus non cernitur. Sed nunquā id voluit Galenus, sed dari animale spiritum, quia plexus in cerebro fuit. Hoc tantum asseruit 12. Meth. c. 5. & 7. De placit. Hipp. & Plat. c. 3. irrigari & ali spiritum hunc ex eo quod reticularis plexus suppeditat. Sed demus id voluisse Galenū, an propterea absurda loquutum existimabimus? non solet natura plexus creare, nisi ad novā elaborationem. In cerebro plexus apparet in signis, choroides dictus, ergo ad novi spiritus preparationem. Obicit Argenterius, in cordis sinu vitalem gigni spiritum: at nulli in corde vasorum plexus. Dicamus necessarios non fuisse in corde labyrintheos plexus, quia maior est vitalium spirituum quam animalium necessitas, maior itaque illorum copia requiritur, quam angustissima vasa conficere non potuissent. Animales etenim functiones perpetuo non sunt, & per somnum feriantur: vitales dormientibus nobis validiores. Quinetiam non omnes animales partes sentiunt, ut ossa, cartilagine, ligamenta, vivunt autem omnes. Quare cum maior vitalium spirituum fiat exhaustus, debet confertim & de rebus eorum fieri restauratio. Accedit, quod vitalis non ad vitæ munia tantum confert, sed animali etiam materiam suggerit: debet ergo copiosissimus generari; id autem in arterioliis & angustissimis canitibus fieri nequit. Postremo, cor viscerum omnium calidissimum statim coquit & generat spiritus, etiamsi per minimas particulas non fiat contactus: quod in cerebro frigidior non sit: fuit igitur in cerebro necessarius plexuum usus, non in corde. Pergit Argenterius Galenum lancinare. Cur, inquit, in plexibus cerebri, animalis spiritus generabitur, cum arteriae cerebri & reliquarum partium specie non differant? at alibi non generant, ergo nec in cerebro. Respondet, non in plexibus, sed in sinibus animale spiritum formam suam adipisci: preparatur tantum in illis viarum angustis, & velut rudimentum quoddam consequitur per vim & irradiationem cerebri: sic in preparantibus vasis per solum sup. o. delineatur semen; in mesaraicis per irradiationem hepatis preparatur sanguis, neque alium unquam

Accusat
Gal. inconstan-
tiae.

Nunq. asse-
quitur Galen-
ni mentem
Argenterius.

Accusat
Gal. ignoran-
tiae.
Defenditur
Galenus.

Obicit Ar-
genterij.
Responsio.

Cur in corde
plexum nulli
ut in cerebro,
rationis no-
stra.

Obicit Ar-
genterij.
Responsio.

De organis animalibus cerebro quippe. 545

plexuum usum agnoscit Galenus, quàm vitalis spiritus attenuacionem & animalis preparacionem. Quarto, non dari animalem spiritum, hac ratione contendit: si in cerebro contineretur spiritus quidam, perpetuò fierent sensationes cogitationesque; quia animæ facultates semper adsunt. Respondeo, animam non perpetuò operari, etiamsi organum habeat, quia impeditur sepe organum calore nativo intus retracto, ut per somnum. Præterea non suppetunt perpetuo animales spiritus, propterea non sunt continuæ animales functiones, sed per somnum feriantur: & hæc sola finalis est somni apud Medicos causa. Quinto, obicit animalem spiritum, si admittatur, non posse ad extremos pedes descendere, quia ignea & aërea natura est. Huic argumento iam satisfactum est, spiritus motu proprio omnes sursum extra ferri, dum verò ab anima diriguntur, in omnem partem demandari; sic brachium ab elementari forma sepe deprimitur, graue enim est; attollitur ab anima, & natiuus noster calor quoquoersum expanditur. Sexto, si plures sint spiritus, putat misceri & confundi hos, & ita à confusis permistisque spiritibus actiones non fieri. Sed demus confundi spiritus, quod verum non est, an propterea peculiarem quisque actionem non edet? cur vitalis vitamunia non exequetur, animalis sensum & motum non suppediabit? Non sunt contrarij hi spiritus, ut ex permissione vires retundant suas. Septimò, dilatationem pupillæ per spiritum arteriarum fieri vult, talis autem vitalis est, non animalis. Nos per arterias fieri non posse momentò pupillæ dilatationem clauso alterutro oculo existimamus; quia non coeunt vtriusque vli arterie, ut optici nervi, sed multum inter se distant, at non potest momentò vitalis spiritus cum arterioso sanguine ab uno in alterum locum per distantissima vasa remeare. Neque verò animalis illius spiritus influxus est necessarius, sola requiritur qualitas radiorum instar, nihil enim corporeum in instanti mouetur; at pro voluntatis imperio obsequuntur cerebro muscoli & tam citò quàm lubet extremum pedis articulum mouemus. Respondemus spiritum animæ organum illius iussus statim parere, & in nervis semper contineri qui alio influente reparatur, unde fit ut ante priorum exhaustum nouus quidam continenter suppetat, quod ita eleganti versu cecinit Lucretius.

Ergo animus cum sese ita commouet ut velit ire
Inque gredi, fert exemplò quæ in corpore toto
Per membra atque artus animali diffusa vis est:
Et facile est factu, quoniam coniuncta tenetur.

Tandem concludit vnicum esse spiritum influentem; quia unica est anima, vnicum influens calidum, vnicum partium alimentum; sanguis quippe, vnica aër qui inspiratur. Hæc sunt Argenterij in diuinum Galenum iacula; quæ quàm leuia sint & parum medica, doctiorum esto iudicium. Vnica sanè est anima, sed ea variis instructa facultatibus, vnicum alimentum, sed varia coctione variam formam suscipit, vnica aër variam pro partium substantia speciem induit. Ut ergo tres sunt animæ facultates, naturalis, vitalis, animalis; tria principia, cerebrum, cor, hepatis, tria organa his ministrantia, vena, arterie, nervi; ita spiritus tres specie & forma distincti statuendi sunt. Alioqui omnia erunt vnum, quia omnium vna est & communis materia. Possumus aliis usque validioribus telis Galenicam de animali spiritu sententiam impetere. Ea itaque exercitationis gratia ita ei aculentur. Quicumque spiritus in arteriarum cauo continetur, is vitalis dici debet: sed quicumque in cerebro continetur spiritus, in arteriis stabulatur, nec eas unquam deserit: erit igitur vitalis, non animalis omnis spiritus cerebri. Minor propositio ita confirmatur. Si exilit ab arteriis spiritus, aut in cavitates, aut in substantiam cerebri effundetur: quod si admittatur, densabitur statim spiritus; nam vapores feruidissimi à præcordiis astuantibus in cerebrum elati spiritibus multò tenuiores statim densantur. Esse autem vaporem spiritu tenuiorem hæc docent, quòd extra fertur vapor intus manentibus spiritibus. Respondeo, diuersam esse spirituum & va-

porum naturam. Retinentur ab anima spiritus, quia familiares sunt & cognati, vapores autem peregrini sunt & hostes, & velut Agar cum Ismaele. Itaque evanescent & densantur. *Secunda ratio.* Si arterias deserit spiritus cerebri, & in sinus effunditur, cum in tertio ventriculo duo sint ductus, anterior alter, alter posterior, cur ad hunc potius quàm illum feretur? Qui erunt satellites, qui spiritum hunc comitabuntur, ut ab arteriis prolapsus recta linea in quartum sinum, virginis modeste instar, pedetentim & placide se conferat? *Solutio.* Dic spiritum animæ instrumentum ab anima dirigi, & in hanc potius quàm illam partem diffundi, quia sic animæ placuit. *Tertia.* non videtur rationi consentaneum in cerebri ventriculis & generari & contineri spiritum aliquem, quia superuacuum expurgationi dicati sunt sinus. *Solutio.* Responde, naturam & mica parte uti ad varios usus. Ut enim nares primario ad odoratum & aeris inspirationem creata sunt, secundario ad expurgationem: ita priores cerebri ventriculi primario ad spirituum preparationem, secundario ad expurgationem constructi sunt. *Quarta.* Quare pupillæ dilatatio clauso alterutro oculo arguit ferri per arterias, non per nervos, spiritus optici enim nervi pupillam non attingunt, & inter opticum ac pupillam corpora sese interponunt quamplurima, eaque crassissima; crystallinus scilicet humor & aqueus, quos spiritus permeare nequit momento. Nam si pituita guttulam non pervadit in oppilatione optici, quæ guttam serenam parit, quomodo crystallini crassitiem permeabit? *Solutio.* Meas ergo spiritus per arteriolas, quæ cum tinea tunica ad pupillam feruntur. *Quinta.* Vrgeret sane hæc ratio, nisi nos docuisset Anatome, opticum nervum dum ad crystalloidem pervenit, non ibi desinere, sed in tunicam reticularem diffundi & amplificari; fertur autem reticularis tunica ad pupillam usque. Postremo, nullum esse spiritum animale, ita demonstrari potest: spiritus facultatum sunt delatores; sed animalis nulla facultas influit; facultas animæ est proprietas, proprietas est inseparabilis ab eo cuius est proprietas; ergo ubicumque erit anima, ibi & eius facultas; anima tota est in toto, ubique igitur eius facultas. *Solutio.* Respondet Philosophus ubique esse animæ essentiam omnibus instructam facultatibus, sed ubique non operari; quia ubique non habet organa: non movet, nec sentit sine animali spiritu anima, ut sine oculo non videt. Concludamus ergo animale quendam esse spiritum, qui in plexibus rudimentum, in sinibus perfectionem acquirat: indeque per totam cerebri substantiam ad functiones principes & in medullam spinalem ac nervos ad sensum & motum diffundatur.

An moveatur cerebrum propria & insita vi, an arteriarum motu.

QVÆSTIO IX.



Idem cerebri. **A**RDVA & difficilis admodum est quæstio, moveaturne cerebrum propria & insita vi, an aliena. Moveri cerebrum nemo nisi amens, aut in re Anatomica omnino imperitus negabit. Vulnere enim cerebro, effracto cranio, detectis meningibus manifestus deprehenditur motus, & in recens natis apparet antequam cerebrum tam conspicue palpitare, ut ossa ipsa, quæ mollissima eo tempore sunt, moveantur. Sed cum triplex sit apud Philosophos motus, naturalis, animalis & violentus, qualis sit cerebri motus discipatur. Visum est quibusdam cerebrum animalis motus principium esse non posse nisi ipsum voluntario cietur motu: absurdum enim esset, vim quandam à cerebro in univrsum corpus influere, nisi primum in eo tanquam fonte & principio inesset. Opinio hæc rationibus nullis stabilita, in Lyceo medico iactationem nullam habuit. Animalis namque omnis motus pro aëticus est, intenditur, remittitur & cessat pro voluntatis arbitrio: at non movetur cerebrum sponse nostra, sed sua: non est ergo illius motus voluntarius. Violentum nemo dixerit; opponitur enim Aristoteli 2. De ortu, violentum ei quod est secundum naturam: erit igitur

Volunt qui-
dem volunta-
rie movere.

Improbatur.

Violentus non
est ille motus.

ius naturalis. Naturale autem hic intelligo, non quicquid à natura sola dirigitur, sed quicquid voluntarium non est, quantumvis ab anima regatur. Virum verò motus hic totius sit cerebri, an partium tantum, & an insita vi moveatur, an aliena, arteriarum quippe & spirituum, valde est controuersum. Galenus cap. 2. lib. 4. De different. pulsuum, scribit voluisse quosdam membranas solas pulsare, alios cerebri tantum corpus, alios & cerebrum & membranas. Sunt qui animales tantum spiritus, non cerebri corpus moueri contendunt: quod illustrant exemplo vertiginis, in qua videntur omnia circumagi ob turbulentum & inordinatum spirituum motum. Vulgaris est opinio, moueri cerebrum non proprio motu, sed alieno, arteriarum quippe: nec respirare, ut voluit Galenus, nec contrahi distendique eius ventriculos. Rationum momenta hæc sunt. Non decet principium motus magis moueri, quam principium sensus sentire: cum ex Aristotelis doctrina αὐτὸ τὸ κίνητον omne debeat esse ἐκ τῶν οὐκ ἔστιν: at non sensus cerebri corpus, non igitur debet moueri. Præterea si respirat cerebrum propria vi, cum mollis sit eius substantia; & membrana quæ ventriculos ambit, tenuissima, disrumpetur in dilatatione & constrictione membrana. Quinetiam tertius & quartus cerebri sinus eadem temperie & substantia præditi sunt quæ anteriores, idemque ferè omnium usus. At non respirant postremi hi sinus, ergo nec superiores. Vrgent acutiore telo. Non apparet in vulneribus capitis, detecto cerebro, dissimilis cerebri & arteriarum motus, quinimò respondent sibi inuicem pulsationum concentus & rythmi. Quod si innata vi pulsaret cerebrum, contingeret aliquando diuerso motu cerebrum & arterias moueri. Postremò nulla sit attractio, nulla expulsio citra villorum operam: sic cordi suæ adsunt fibræ, ut & ventriculo, intestinis, venis & arteriis: at nulli in cerebro apparent villi, nullus ergo diastoles & systoles motus proprius. Proculdubio ita valide sunt hæc rationes, ut coegerint me aliquando huic sententia assentiri. Verùm Galeni scripta paulò accuratius euoluens, & quæ libris De odoratus organo, De usu partium, De Placitis Hipp. & Plat. scriptis mandauit, defixa mentis acie mecum ipse reputans, tandem mutauit consilium. Itaque cerebri corpus propria vi & insito motu respirare existimo. Audiamus Galenum conceptis verbis cap. ultimo lib. De odoratus organo ita differentem: Cerebro, inquit, natura motum non denegauit, quo spiritum trahat ad refrigerationem & nutritionem, & eundem reiciat ad superuacuum expurgationem. Cap. 4. eiusdem libri, Non impossibile est cerebrum sibi motum quandam, eumque exiguum præbere modò in seipsum, modò ex seipso, ita ut compressius sit cum sese contrahit, fusius verò cum se omni ex parte dilatat. Hæc Galen, cuius auctoritatem licet rationibus nostris stabilire. Certissimum est animale spiritum in cerebri ventriculis superioribus primum generari, eumque naturâ suâ æreum & calidissimum aeris sibi consocialis inspiratu indigere, tum ad nutritionem, tum ad refrigerationem: fertur ergo in cerebrum aer inspirantibus nobis, & expirantibus vapor fumidus animalis spiritus excrementum truditur. Hoc expressit eleganter Hippocrates libro De morbo sacro: ὅταν δὲ ἐπαλόη ἡ ἀνθρώπος κατὰ τὸ σῶμα, καὶ τὴν μυκτῆρα τὸ πνεῦμα, πρῶτον μὲν ἐς τὸν ἐγκέφαλον ἔρχεται. hoc est, Quum ore spiritum homo ducit & naribus adiunctis, primum quidem venit spiritus ad cerebrum. Hæc autem aeris in superiores cerebri sinus inspiratio, eiusdemque exspiratio, non fit per arterias, sed per tubercula mammarum papillis simillima, quæ odoratus organa sunt. Motus ergo cerebri, qui in inspiratione & expiratione perficitur, à cerebro est, non ab arteriis. Aerem porro per tubercula inspirari ita demonstratur. Per eosdem ductus & odor & aer simul feruntur, nunquam enim sentitur odor, quantumvis impetu pellatur in nares, nisi inspiretur aer: at per eos processus, non per arterias, fertur odor: per eosdem igitur ductus inspiratur aer, & ad anteriores ventriculos fertur. Præterea si pulsât cerebrum per arterias, insita vi ad generationem spirituum, cur non mouetur etiam spinalis medulla? Dices for-

Naturalis est. Quid per naturale intelligimus.

Prima opinio.

Moueri cerebrum arteriarum motu. Ratio 1.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Cerebri propria vi respirare.

Audiamus Galeni.

Ratio 1.

Secunda.

tasse non esse in medulla dorsali eam arteriarum copiam, qualis in cerebro deprehenditur. Sed neque eadem est etiam substantiæ moles. Quod si utrunque corpus conferas, eadem erit arteriarum, quæ per membranas medullam inuestientes sparguntur proportio. Non ergo mouetur spinalis medulla quia nulla sit in ea spirituum generatio, ut in cerebro. Tertia ratio est eiusmodi: Cerebrum distat aliquantulum à dura meninge, non ad systolem & diastolem arteriarum, neque enim ita attolluntur: non ad $\delta\upsilon\sigma\kappa\acute{\alpha}\delta\iota\sigma\tau\alpha\varsigma$; interiecta namque est tenuis membrana: ergo ad motum totius cerebri. Sic distat à corde pericardios tunica ad liberiores motum. Deinde quomodo tanta cerebri moles ab arteriis dilatabitur, (sic enim eas appello, quæ per vniuersum cerebri corpus sparguntur) cum insignes & amplissimæ arteriæ lienis corpus varum & perexiguum non moueant? Docet Anatome, viscus hoc infinitis arteriis intertextum esse, at lienem moueri nemo unquã obseruauit, nisi phlegmone aut tumore obfessum, quod partibus omnibus commune est. Postremo, si motus cerebri motus est arteriarum, non substantia medullaris, ridiculum erit & ineptum dicere cerebrum moueri; quia eius arteriæ mouentur. Nam eadem ratione ventriculus, intestina, lien, renes, mouentur, quia ubique pulsant arteriæ. Quod si medullam cerebri à diastole arteriarum impelli existimes, cur non & reliquæ omnes corporis partes palpitabunt? Præterea vermiformis processus, conarion, nates, indicant peculiarem quandam esse motum cerebri, qui ab arteriarum motu differt. Nam breuior redditus vermiformis, viam apertam quæ est à tertio ad quartum sinum, dum extenditur rimam claudit, ne remeet in superiores sinus spiritus, ut videatur idem ferè eius usus esse, qui valvularum, ad os magnæ arteriæ positarum, at rimæ illius apertio occlusioque, non est ab arteriis, sed ab innata viscerebri ipsius. Probabilius est ergo cum Galeno sentire, naturali motu cerebrum moueri, eoque proprio ad animalis spiritus nutritionem, temperationem, expurgationem. Ratio autem & natura motus hæc esto. Dum sese explicat cerebrum, ex naribus aerem prolecat per tubercula mastoidea, & ex arteriolarum plexibus spiritus, quos in quiete permiscet aeri: dum verò sese contrahit in systole, compressis lateribus interiores sinus coarctat, & animalem spiritum è superioribus ventriculis in posteriores profundit. Hic tamen non leuis sese offert scrupulus, an feratur ad cerebrum aer dum distenditur, aut cum contrahitur. Videtur in constructione inspirari aer, quia dum contrahitur cerebrum, abscedit aliquantulum à caluaria, hæc quia immobilis est cerebri contractionem non sequitur; aut ergo necesse est vacuum dari inter cerebrum & caluariam, aut aerem trahi qui locum illum impleat. Nos in dilatatione cerebri aerem inspirari existimamus, nec vacuum esse in contractione spatium illud volumus, quia fit in contractione & aeris & fumidorum vaporum in suturas expressio. Nunc obiectis in contrariam partem satisfaciamus. Obiiciebant primò, cerebrum motus principium, moueri non debere. Non debet sanè eodem motu, quo partes mouet, moueri: motum præbet partibus voluntarium, at ipsum naturali cietur motu. Mouetur ea ratione cerebrum qua sentit: sentit naturali sensu, ut ossa & viscera omnia, quo noxia expellunt irritata, ut in sternutamento & epilepsia mouetur ad animalis spiritus generationem. Erat secunda eorum ratio, non respirare cerebri ventriculos, quia in perenni ea distentione dirumpetur membrana tenuis: sed non vident in sternutamento & epilepsia validiorem esse magisque violentam cerebri contractionem, quàm in ordinario motu, non rumpitur tamen ea pellicula. In sternutamento colligit sese & contrahitur cerebrum ad exclusionem rei noxiæ: qualis enim in thorace est tussis, in ventriculo singultus, tale est in cerebro sternutamentum. In epilepsia contrahitur totum cerebrum & corrugatur. Obtrudunt nobis tertio, posteriores ventriculos non respirare, ergo nec anteriores. Nescio ego qua arte obseruare potuerint hos potius quàm illos non respirare. Sed demus posteriores non respirare, negatur eorum consequutio: maiore enim vel saltem magis conspicuo indigent motu superiores sinus,

Tertia.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Conclusio.
Ratio motus
explicatur.

Soluntur contrarie rationes.

Ad primum.

Ad 2.

Ad 3.

sius, quia in illis & preparatur & expurgatur spiritus in posteriore puri, sinceri & expurgati continentur. Non apparet, aiunt, dissimilis cerebri & arteriarum motus. Dico nō esse dissimilem, quia non est dissimilis usus: eadem est causa finalis generatio spirituum & eorundem expurgatio. Postremo, non moueri putant proprio motu, quia nulli apparent in cerebro villi. Respondemus, ossa alimentum trahere, & supernuacua expellere citra fibrarū ministerium. Quinetiam non eadem est cordis & cerebri ratio: cor enim villis indiguit non ad aëris, sed sanguinis tractionem expulsionemque. Trahit cor in diastole sanguinem per rectos villos, expellit eundem in systole per transversos. Cerebrum verò dum mouetur, solum aërem & vitalem spiritum tenuissimum haurit, ad quorum tractionem villorum adminiculo non est opus. Ex quibus satis patere arbitror, cerebrum insita vi moueri, non solo arteriarum motu.

An sentiat cerebrum.

QUESTIO X.



E cerebri sensu non ignobilis est controuersia. Sentire cerebrum auctoritate, experientia & ratione demonstrari potest. Hippocrates libro περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τρωμάτων, sentire cerebrum voluit. ὁ γὰρ ἐγκέφαλος τὰ χεῖρά τε καὶ μάλις αὐτὰ κατὰ τὸ βρέγμα αἰσθάνεται, τῶν κακῶν τῶν θυομένων, ἐν τετῇ σαρκὶ καὶ τῇ ὀστέῳ. bocest, cerebrum & citissime & maximè iuxta sinciput sentit

Cerebrū senti-
re.
Auctoritas
Hippoc.

mala, quæ & in carne & in osse fiunt. Galenus libro De plenitudine, Cerebrum, inquit, & spinalis medulla inter ea censentur, quæ sensum obtinent. Quod si in phrenitide dolor non sentiat, id fit quia mens aggrat. Libro De organo odoratus, cerebro manifestum tribuit sensum. Experientia & sensu id confirmatur. Narrat Galenus eodem libro cap. 4. historiam cuiusdam, cui cum nigellam tenuissimè iritam veterique oleo permixtam ore & naribus excipiendam iussisset, grauem in cerebro morsum per sensisse testatur. Quod euidenti, inquit, argumento fuit nigellæ modicum ad cerebri ventriculos peruenisse, quod aut membrana tenui aui fortasse ipsi cerebro inharens, dolorem excitauit. Ratione tamen id suaderi potest. Cerebrum sensus omnis fons est & origo: ipsum ergo sentire debet, propter quod cetera omnia sentiunt: namque axioma est logicum, Propter quod vnumquodque est tale, & illud magis tale. Præterea, nisi sentiat cerebrum, nō poterit ad noxiæ expulsionem insurgere, quomodo enim in sternutamento & epilepsia concutietur, ad exclusionem humoris aut vaporis vellicantis, nisi eius appulsus persentiat? Contraria opinio cerebrum non sentire, auctoritate, experientia & ratione aequè contendit. Aristoteles 3. De historia anim. cap. 17. & 2. De part. animal. cap. 7. cerebrum & medullam sensu tactus non sentire scribit. Galenus cap. 8. libr. 1. De causis sympt. Cerebrum, inquit, non ut sentiat, sed ut sensum instrumentis vim sentiendi præstet, a natura institutum est. Tertiò De causis sympt. Cerebrum organum non sentiens appellat. Experientia, qua nihil certius, huius rei fidem facit: vulneratum enim cerebrum nihil sentit, quamuis acuto specillo eius substantiam premas, aut de eadem aliquid detrahas, quod ego sapius obseruavi. Postremo, rationibus id demonstratur. Organum omne ex Philosophi doctrina debet esse αἰσθητόν, id est, omnis aliene qualitatis expers, sic in crystallino color nullus, in auribus nullus sonus, in lingua sapor nullus, & cutis qualitatum, quæ tactum ferunt, æstimator, temperiem moderatam obtinuit. Cerebrum sensus communis est sedes, & de omni sensu diiudicat: ergo sensus omnis expers esse debet. Præterea non debet cerebrum sentire, quia in supremo situm, cum exhalationes inferiorum partium cucurbitula instar trahat sorbeatque, assiduè earum haustibus afficeretur, & doleat perpetuò. Postremo viscerum ferè omnium, ut hepatis, lienis, pulmonum, substantia insensilis est: quare & cerebri. Huic sententia po-

Galenus aucto-
ritas.

Experientia.

Rationes,
Ratio 1.

Secunda.

Contraria
opinio.

Cerebrum nō
sentire.
Auctoritates
Experientia.

Rationes,
Prima.

Secunda.

Tertia.

Solentur rationes primæ opinari.

Quando cerebrum noxia sentiat.

Fernelij nova opinio reuocatur.

Præmissa Fernelij error.

Secundus.

Auctoritas Galeni.

Cerebrum nec sentit nec motum habet animalis.

tius quàm priori assentior, quia id voluit Galenus i. De causis symptom. ubi cerebrum non sentire vult, sed sensilium omnium differentias dignoscere tantum. Quæ in contrariam partem adducta sunt, mihi videntur satis lenia. Hippocrates cerebrum mala quæ in carne esse fiunt, sentire dixit, id est, ab illis affici & alterari. Sic ossa frigoris vim sentire dixit in Aphorismis, id est, à frigido alterari: sensus ergo nomen usurpat eo loco natura γένεως. Galenus cerebro sensum tribuit, non medullari eius substantia, quæ facultatum omnium animalium fons est & origo, sed tenui membrana, quæ in penitiores eius recessus se insinuat. Logicum illud theorema verum est in causis tantum homogeneis, iisque coniunctis: Sol enim non calidus calefacit. Quod dicunt cerebrum concuti ad exclusionem noxiæ, ergo noxia sentire. Respondemus, singulis partibus insitam esse vim naturalem noxiæ pellendi, quibusdam cum animalis sensu, aliis sine sensu. Sic ossa vi pollent excretitæ, & viscerum pene omnium carnes insensiles noxia percipiunt & pellunt. Sunt occulte quedam in rerum natura sympathiæ & antipathiæ. Fernelius cap. 10. libri 5. suæ Physiologiæ, novam & inauditam de cerebri motu ac sensu opinionem commentus est. Putat motum omnem à cerebri medulla, sensum omnem à meningibus manare: quia cerebri corpus motu agitur affluendo, nullo tangendi sensu præditum: contra quæ ipsum ambiunt membranae, immobiles per se sunt, præsertim crassa, tactu autem valent exquisitissimo: sic in delirio & lethargo, qui affectus sunt cerebri, nullus dolor: at si humor acris aut vapor in meninges effertur, gravis dolor excruciat. Atqui spina & nervi omnes medullam habent à cerebro, eamque meningibus vestitam, quæ singula talem vim & naturam habent, qualem ab ortu acceperunt. Ergo prior cerebri pars sensus, posterior motus principium est, meningibus autem tactus sumo-rigo. Qui nervi multi à medulla conferti sunt, motus instrumenta sunt; tangendi autem ij quos maiore ex parte meningibus protulerunt. Hæc Fernelij sunt verba, in quibus, pace tanti viri dixerim, absurda quamplurima deprehendo. Primum vult voluntarium omnem motum à medulla manare, quia medulla perpetuò movetur: quasi similis sit cerebri & nervorum ac musculorum motus. Cerebri motus naturalis est, diastole quippe quiete gemina & systole perficitur ad animalis spiritus generationem: at musculorum & nervorum motus voluntarius est. Præterea absurdissimum est existimare nervos, quo plus habent medullæ, eo ad motum esse aptiores, imò contra duriores ad motum, molliores ad sensum aptiores sunt, quia sensus passione, motus actione perficitur; & opticus nervorum omnium mollissimus plus habet medullaris substantiæ, quàm secunda coniugationis nervus; sentit tamen ille tantum, hic movet. Videretur potius membranas quàm medullæ assignandus motus, quia diffluit medulla, tenditur autem & contrahitur membrana. Sic puerorum nervi imbelles & mollissimi ad motum inepti sunt. Addamus his omnibus Galeni auctoritatem cap. 3. lib. 7. De placitis Hippoc & Platon. Movendi enim & sentiendi facultatem in cerebri tantum medulla contineri scribit, membranas verò ad vestiendam & nutriendam medullam tantum constructas. Explodatur ergo paradoxicon illud dogma, & statuatur cerebri medulla, motus sensusque omnis animalis expertus; motus tamen sensusque omnis animalis principium, origo & fons. Sensus quidem, quia sensilium omnium impressionem percipit: motus verò, quia imperium omne ad noxiæ fugam aut utilis prosecutionem largitur. Unde fit ut laborante cerebro nec moveantur, nec sentiant inferiores partes.



ONSENTIUNT in hoc Medici *¶* Peripatetici, cerebrū in actiuis qualitatibus esse frigidū, in passiuis humidū. Dissentiunt in eo, quod Aristoteles 2. De partib. animal. cap. 7. & cap. 5. lib. De somno & vigilia, cerebrum actu frigidū statuatur & refrigerandi cordis gratia constructū; Medici contra, actu calidū esse velint. Nam Galenus 8.

De placitis Hippo. & Plat. cerebrum quonvis ambiente aëre etiam est uocalidius dixit. Sunt qui Aristotelem cum Galeno ita conciliant, ut duplex sit cerebri temperamentum, alterum insitum, influens alterum. Insita temperie, propria compositione & substantia medullari frigidissimum statui debet, influente uero calidum: est enim spiritibus persusum, & arteriis quāplurimis intertextum. Si innatam spectes temperiem, eadem est cerebri & spinalis medulla temperies, quia eadem substantia medullaris: si influentem, cerebrum spinali medulla calidius dicitur cap. 9. libri 2. De temper. pertingentibus quippe ad arterias copiosiores, simulque attollentibus se eodem fumidis exhalationibus. Dicunt quidam cerebrum absolute & simpliciter calidū esse, sed frigidū dici comparate: est namque viscerum omnium frigidissimum. Et Galenus in arte Medica cerebrum quāntumuis calidū frigidissimo corde frigidius esse scribit. Qua ratione Hippocrates libello *De aëre, locis, et temporibus* cerebrum appellat *μικρόπολις τῷ ψυχρῷ*, hoc est, sedem frigidi. Verum non probatur nobis opinio hac. Nam si cerebrum frigidius est cute, qua medium obinet extimorum, debet potius frigidū dici simpliciter, quā calidū. Esse autem cute frigidius docet Galenus 2. De temperam. Obiicies nudatum cerebrum ab aëre statim refrigerari, cutem uero ab ambiente non affici. Dico alterari cerebrum, quia aëri non assuetum, ut cutis, sic dentes aëri assueti non luescunt, ut reliqua ossa denudata: vel etiam cerebrum tactu cute esse calidius, quia calua tegitur & membranarum arteriarumque plexus habet quāplurimos. Statuatur ergo cerebrum innata temperie cute frigidius, influente calidius. Frigidū autem esse decuit, ne accenderetur membrum perpetuæ cogitationi dicatum, ne spiritus animales tenuissimi euanescerent, & ne temerarij essent motus ac sensationes deliræ, quales sunt phreneticorum. Obiicies insuper si cerebrum frigidū est, quomodo animales gignit spiritus, & vitales attenuat: hac enim ualentissimi caloris sunt opera. Dico attenuari spiritum in plexibus arteriolarum, & in illis uiarum angustiis, animale uero fieri non tam manifesta qualis aë, quā insita & latente proprietate. Cur autem cordis calidissimi spiritus crassiores sunt, quā cerebri frigidissimi, id non ad agentis caloris imbecillitatem, sed ad patientis, materię scilicet dispositionem, referendum putamus. Cor spiritus gignit vitales ex sanguine per uenam cauam delato, cerebrum animales conficit ex vitali tenuissimo. Sic debiliior calor tenuis & *εὐπρεπὲς* alimentum coquet, validior crassum uix conficiet. Sit ergo in actiuis qualitatibus cerebrum frigidū. In passiuis humidū esse nemo dubitat, & insita & influente temperie, molle siquidem tangenti appareat. Creatum est autem à natura humidū, tum ad perfectiorem sensationem, sit enim sensio-passio: at humida facilius rerum imagines & spectra suscipiunt: tum ad exortum & propagationem neruorum, qui ob duritiem flexiles non fuissent, tum ne duritie & pondere nimium grauaretur; postremo ne inflammaretur membrum perpetuæ motioni, sensationi & cogitationi dicatum. Est autem (si utramque qualitatem inter se conferas) cerebrum humidius quā frigidius: nam inter partes humidatertius huic ordo debetur, inter frigidas fere postremus.

Conciliatio.
Aristoteles.

Actu cerebrū
cute frigidius

Obiectio.

Solutio.

Cur frigidum
esse debeat ce-
rebrum.

Obiectio.
Responsio.

Cur spiritus
cordis calidissi-
mi crassiores
sunt animalibus.

Cur humidū
creatum est
cerebrum.

Quot, & quæ sint excrementa cerebri, & per quos ductus expurgentur. QVÆSTIO XII.

Cerebrum cur
excrementis
abundet.



CEREBRUM substantia medullosum, nativo temperamento frigidum & humidum, cum pituitoso alatur sanguine, maximam insitam & naturam propriam ex alimenti superfluis excrementorum copiam congerit. Sed & cum caminus sit uniuersi, & cucurbitule instar (cuius figuram refert ex amplo in angustum desinens) insideat trunco corporis, sorbens trahensque ab infernis expirationes omnis generis, ut docet Hipp. libello

De glandulis, non est dubium, quoniam vaporibus oppletum & assiduus eorum haustibus velut inebriatum, supernuacua multa in se contineat: adeo ut & per se, quia frigidum humidumque, & ex euentu ratione situs editissimi, excrementis abundet. Excrementa hæc cerebri, si Hippocrati & Galeno credimus, duorum sunt omnino generum; alia sunt tenuia, alia crassa: illa, vaporis & fuliginis instar, per ductus ferè insensiles expirant sursum. hæc per patentes & conspicuos meatus deorsum expurgantur. Illis tenuioribus & vaporosis abundat cerebrum, ratione tantum situs: sursum enim conscendunt halitus, & vasa ad caput terminantur. Hiæ crassioribus ob frigidam & humidam temperiem, scatet magis quam reliqua viscera. Crassiorum autem quædam sunt pituitosa, aquea, serosa; quedam biliosa, quedam melancholica. Aquea ex reliquiis pituitosi & crudioris sanguinis, biliosa verò & melancholica ex terrena alimenti portione caloris vi tandem assata generantur, propterea amarescunt. Putat Argenterius aqueum & mucosum humorem, qui per nares & palatum excernitur, proprium non esse cerebri excrementum, quod multi pituitam nec expuant nec emungant: sed humorem esse vult in hepate genitum, cum sanguine mixtum, & in venis contentum, qui non in cerebro ab alimenti coctione generationem habeat, sed eo feratur, & cum ob imbecillitatem coctricis, aut intemperiem frigidam à cerebro assimilari nequeat, tamquam redundans & superfluis per os & nares excernatur. Quæ si vera sunt, quorsum in sella sphenoidis substernitur glans carne porosa & bibula? an non hæc illuiculi excipiende à natura dicata est? Si pituitosus hic humor in cerebro tantum intemperato gignitur, quæ glandula, quæ in omni cerebro, quantumvis temperato reperitur, usus erit: non solet sagax & providens Natura temere quicquam construere. Est mehercule in doctrina Argenterij nullus in fundibuli & glandula pituitaria in cerebro temperatissimo usus. Præterea falso imponis nobis, temperatos pituitam nec expuere, nec emungere unquam: nam Galenus cap. 13. Artis parua, docet in cerebro temperatissimo excrementa, quæ per nares & palatum expurgantur, (eiusmodi autem sunt aquea & mucosa) modicè se habere: nec sane perfecte sanitati tribuendum putamus, quod nihil unquam per palatum & nares excernatur. Sunt igitur (quicquid dicas Argenterius) pituitosa hæc & mucosa, propria cerebri excrementa, cum proprios habeant helices & canales, per quos expurgantur, huic soli vacationi dicatos. His de excrementorum cerebri differentiis ita constitutis, videamus nunc per quos ductus singula expurgentur. Tenuia & fuliginosa cum sua leuitate superiora petant, per meninges, cranium & cutim expirant: per meninges quidem & cutim non assestabili, sed insensili ductu, est enim earum corpus in vivente multis foraminulis peruium. At ossis crassiem & densitatem cum permeare non possent fulgines, futuris distinctum est cranium & cavernulis in diploë sinuatum. Crassiora autem excrementa cum naturali forma deorsum ferri debeant, conspicuos canales habuerunt: de quibus non satis constat inter Medicos. Hippocrates libro De locis in homine, & libello De glandulis, septem agnoscit ductus, per quos fluit à cerebro humor, per aures, oculos, nares, palatum, in guttur & gulam,

Excrementa
cerebri duos
generis, crassa
& tenuia.

Crassa quæ
sunt.

Error Argenterij de pituitosi cerebri excrementis.

Falso attribuit
Argenterius

Tenuia excrementa, quomodo & per quos ductus expirent.

Crassiora per quos ductus expurgantur. Septem ductus apud Hippoc.

per venas in medullam spinalem & in sanguinem. Galenus cap. 13. Artis parua, quatuor statuit canales, palatum, nares, aures, oculos. Idem sentit c. 3. libri 2. De locis affect. & primo De sanitate tuenda. Sed commentarius in Aphor. 21. sectionis 1. palatum & nares numerat tantum, ut & cap. 1. libri 9. De usu part. Declines, inquit, cerebri meatus tum per palatum in os, tum per corpus narium conspicuis ac magnis officiis, crassa eruantur excrementa. Primo De symptom. causis, & 8. De usu part. solum palatum vult esse idoneum expurgationis locum, dum animal belle coquit. nares autem ad aeris & odorum spirationem tantum. Comment. ad Aphor. 24. sect. 3. expurgationem per aures alienam à natura scripsit, puerulis exceptis, quibus per aures cerebrum expurgatur. Comment. ad Prog. 20. sect. 1. expurgationem per oculos non vult esse naturalem. Ita varia videtur sensisse Galenus de ductibus excrementorum cerebri. Nos ut dissentientes locos conciliemus, & quid verè statendum sit libere profiteamur, existimamus varia cerebri excrementa pituitosa, biliosa, melancholica per varios ductus expurgari: eorum autem alios esse ordinarios, nature maxime familiares & consuetos, alios extraordinarios, nec ita conuenientes. Ordinarij ductus pituitae expurgande dicati, sunt palatum & nares, magis tamen palatum, quia nares primario ad odoratum constructae sunt. Docet Anatome à tertio cerebri sinu ductum ferri conspicuum ad anteriorem cerebri basin, in cuius extremo tenuis membranae portiuicula quaedam primum latior, deinde angustior, infundibuli instar, conspicitur, $\pi\epsilon\lambda\omicron\upsilon\gamma\epsilon\iota$ $\chi\omicron\sigma\alpha\lambda\upsilon\varsigma$ Graeci, Latini peluim & infundibulum vocant, per quod sensim pituitosus humor, tanquam per Hippocratis manicam colatur: aqueum hunc humorem excipit glandula pituitaria spongie instar, quem tandem per cunei foramina pedetentim in palatum & os instillat. Quod si aliquando superiores cerebri ventriculi mucosa illuue affluant, stil-lat per tubercula mammarum papillis simillima in ossa cribri forma & nares. Biliosa per aures expurgantur continuo. Philosophantur autem quidam idè reici biliosa per aures, ut calore & siccitate tueantur aurium ossa praesiccitate sonora; pituitosa vero per os & nares expurgari, ut patuli illi meatus ea humiditate prohibeantur siccari. Hi ergo canales sunt ordinarij & familiares, per quos cerebri excrementa naturaliter expurgantur. Sunt alij ductus extraordinarij, per quos cerebrum humoris copia oppressum interdum sese exonerat: eiusmodi sunt oculi, spinalis medulla, & nervi, unde paralytis: sit nonnumquam per venas & arterias humorum decubitus in parotidas. Verum non sunt haec peculiaria cerebri, id est, medullaris substantia & ventriculorum excrementa, sed vasorum potius, ut venarum & arteriarum, à quibus glandularum tumores, ophthalmia, auriumque inflammationes. Ceterum excrementa haec in cerebro temperato moderatè se habent in substantia, quantitate, qualitate & excretionis tempore. In substantia, quia nec nimium crassa, nec nimis fluida sunt: in quantitate, quia sua copia non luxuriant: in qualitate, nec acrida nec salsa: in tempore, si à coctione excernantur. Vnicus superest nunc eximendus scrupulus, per quos ductus cerebelli & quarti sinus superflua expurgentur. Dicamus quarti sinus & cerebelli pauca esse excrementa, tum ob cerebelliduritiem, tum quia in eo sinu spiritus tenuissimi, sinceri & omnino expurgati continentur. Itaque pauca quae congeruntur superflua, facile digeritur. Anterior autem cerebrum quantitate maximum & temperie humidissimum superuacua multa congerit, quae per conspicuos canales expurgari debent.

Galenus va-
ria sentit.

Conciliantur
Galenologia.

Ductuum
alij ordinarij,
alij extraordi-
narij.

Pituita du-
ctum.

Biliosa per au-
res.

Ductus ex-
traordinarij.

Per quos du-
ctus cerebelli
& quarti si-
nus superflua
expurgentur.

De numero, usu, & præstantia ventriculorum cerebri.

QVÆSTIO XIII.

De numero
ventriculo-
rum.



L N historia ventriculorum cerebri multa sese offerunt controuersa: ac primum de eorum numero videntur dissentire Anatomici. Galenus quatuor statuit, duos superiores, quos anteriores vocat, medium qui communis est cavitatis, & postremum. Auicenna tres tantum numerat, supremum, medium & postremum; sed superiores duos, quia eandem habent figuram, magnitudinem, situm, structuram & usum, pro uno tantum numerat. Arantius duos addit sub prioribus, quos ab hip-

pocampi figura denominat: sed existimo hos partes esse superiorum, qui ita amplius sunt, ut vix tertia eorum pars in sectionibus publicis ostendatur. In usu ventriculorum superiorum reprehendit Galenum Vesalius, quod voluerit hos sinus odoratus esse organa, & ab his colari pituitam per processus in ossa cribri-forma. Dicimus pro Galeno anteriores sinus idcirco dici organa odoratus, quia ad eos feruntur odores, de quibus diiudicant; pituitam verò ab his sinibus per eos processus ad ossa ethmoidea colari quid prohibet, si mucosa illius cerebri affluat, cum sæpe per totum cerebri corpus diffusetur pituita, ut in apoplexia; & in nervos ac spinalem medullam diffundatur, unde paralytis? Obiciunt odoratus sensum extinguere, si per eos processus pituita transcoleatur. Dico à continuo fluxu & maxima redundantis humoris copia priuationem odoratus contingere, non tam ab obstructione processuum, quam ob foraminum ossis interclusionem. Sunt & recentiorum quidam, qui anteriores cerebri ventriculos spiritibus præparandis & excoquendis dicatos non esse contendunt, tum quia excrementorum sunt receptacula, tum quia animalis spiritus non eget sensili cavitare. Sed respondet Galenus ventriculos superiores & præparationi spirituum & supernaculo expurgationi inferuire. Sic per ethmoidea & odores ascendunt, & superflui vacuantur. Vt ergo quæ per palatū & nares quotidie vacuantur nullam olfactui & gustui inferunt noxam, si moderate se habeant; ita de cerebri excrementis dicendum.

Defenditur
Galenus à
Vesalijs ca-
bionata.

Obiectio.
Solutio.

De præstantia ventriculorum cerebri.

QVÆSTIO XIII.

De præstantia
ventriculo-
rum cerebri.



D E præstantia ventriculorum cerebri dissentientes quidam Galeni loci conciliandi sunt. Certissimum est inter cerebri partes principatum ventriculis deferendum esse, non quod peculiare sint facultatum principum sedes; sed quod in illis animalium spirituum fiat generatio. Id docet Galenus cap. 3. libri 7. De placitis Hippoc. & Plat. Si cerebrum, inquit, quomodo cumque incidas, non prius sensum & motū amittet animal, quàm ad aliquem ventriculorum vulnus penetraverit. Sed cum ventriculi quatuor sint, quis eorum nobilissimus sit queritur. Superiores sinus ignobiliores esse docet Galenus 8. De usu partium, cap. 10. 7. De placitis, & comment. ad Aphor. 18. sect. 7. exemplo adolescenti in Smyrna Ioniæ, qui accepto vulnere in altero superiorum ventriculorum, superstes tandem evasit. De tercio & quarto non sibi constare videtur Galenus, nam capite 5. libri 3. De locis affect. primauium desert posteriori. Spiritus animalis (inquit) in cerebri ventriculis, maximèque in postremo continetur, quamvis non contemnendus sit medius, perinde quasi non sit nobilissimus: multis enim rationibus adducimur, ut huc amplectamur, duos verò anteriores deseramus. Cap. 3. libri 7. De placitis Hippoc. & Plat. postremi quidem ventriculi vulneratio maximè omnium animalis lædit, secundo loco medij, minima ex anterioribus utriusque contrahitur. Hoc idem

Superiores
ignobiliores
sunt.

Postremus
nobilior an-
terioritate Ga-
leni.

quod sectiones collisiones quoque faciunt. His omnibus fauet ratio: ignobiliores enim perpetuo ventres apparent, qui amplitudine constant maiore. Quartus sinus omnium est minimus & angustissimus, spiritumque animale sincerum, defecatum & omnino expurgatum continet: reliqui duo spiritum preparant tantum. Ergo quartus omnium est nobilissimus. Contrarium tamen videtur sentire Galenus; nam 3. De locis affect. cap. 7. & 4. De locis cap. 2. tertium videtur prætulisse. Si aliquando (inquit) tota anterior cerebri pars afficitur, ea quæ sunt circa supremum ventrem (supremum autem eo loco medium intelligit, nescio quam ob rationem) ei consentire necesse est, & discursus actiones vitari. Si discursus in medio sinu, ergo nobilior. Cap. ultimo libri 3. De plac. explicans mythologiam fabellæ, quæ Mineruam fingit à Iouis vertice pronatam, idcirco ait, à vertice natam fingit, quia subest vertici medius, isq; principalis cerebri ventriculus, sapientia origo. Quinetiam tertij sinus præstantiam indicat mirabilis eius structura: & quod occipitij vulnera minus sint periculosa, quam scincipitis, ex Hippoc. lib. $\omega\epsilon\lambda\tau\omega\nu\epsilon\nu\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\eta\tau\omega\mu\acute{\alpha}\tau\omega\nu$. Καὶ πολλοὶ (inquit) ἐνφυγόντων τὸν θάνατον τῶν ὀπίσθεν τῖσιν σκομῶν τῆς κεφαλῆς, ὡς ὅτι τὸ πολὺ, ἢ τῶν ἐμπροσθεν: id est, Plures ex his qui posteriore capitis parte sunt vulnerati, mortem effugiunt, quam qui anteriore. Conciliabitur Galenus si dixeris, dum quartum sinum præstantiorem esse vult, ex propria sententia loquutum, dum tertium nobiliorem asserit, ex aliorum, ut Herophili sententia id pronunciaſſe. Non enim principibus facultatibus proprias sedes assignauit Galenus, ut alibi à nobis confectum est. Ab occipitis vulnere raro afficitur quartus ventriculus; resistit enim caro multa & ossis crassities duritiæque, scincipitis autem ossa tenuiora sunt. In tota cerebri historia Galenum errasse non video, nisi in plexu suo mirabili. Hic enim in homine ita est exiguus, ut oculorum aciem ferè effugiat. Mallem cum neotericis choroidem plexum, qui in superioribus cerebri ventriculis conspicuus est, rete mirabile appellare: in eo enim attenuatur vitalis spiritus, & animalis rudimentum quoddam consequitur.

Ratia.

Contrarium
videtur sen-
tire Gal.

Ratia.

Conciliatur
Galenus.Error. Galeni
in rete mira-
bili.

FINIS LIBRI DECIMI.





LIBER VNDECIMVS.

IN QVO SENSVM ORGANA DESCRIBVNTVR, MVLTÆQVE INTER PHILOSOPHOS ET MEDICOS controuersa explicantur.

HISTORIA ANATOMICA.

De faciei dignitate & partibus.

CAPVT PRIMVM.



*Facies cur ita
dicatur.*

*Facies soli ho-
mini propria.
Facies quomo-
do animi mon-
strat.*

*In facie solus-
tis indicia.*

Facies partes.

*Prout quid
& cur ita
vocetur.*

Supercilii.

*Facies diuisio
altera.
Cuius faciei
quid habeat
peculiare.*

APITIS eam partem quam Aristoteles *τρίγωνον* dicit, nos capillatā, accuratē satis descripsisse videor, nunc eam quæ caluæ subest pilis destitutam explica- re aggrediamur. Eam Græci *πρόσωπον* dicunt, nomi- ne à re ipsa accepto, quia *πρόσωπον ὁπῶσθε*, solique homini propriam esse volunt, quia solus homo pro- spicit anteuersus vocemque anteuersus mittit. Cæ- teris animalibus os, aut rostrum natura dedit; Latini faciem vocant. In ea sensuum omnium organa, oculi, nares, aures, & lingua locantur; propterea imago ani- mi dici solet; namque in superciliis superbia, in genis pudor, in mento maie- stas, in fronte sapientia, in vultu pulchritudo, in genis & mento honestas inha- bitant. Vnica facies est quæ oculos omnium commouet allicitque. Hæc prima visum percellit, prima placet, hæc solā supplices, hilares, tristes, erecti, summissi fumus; hæc sexum, ætatem, pulchritudinem, stirpem, & totius temperiem in- dicat. In hac salutis & mortis indicia manifesta lucent, propterea iubet Hippo- crates in Prognostico, vt faciem primum spectet Medicus, num similis sit sui, aut plurimum immutata in colore, figura, & mole. Faciei totius partes due sunt, superior & inferior. Superior à summā fronte ad intercilia vsque extenditur. Inferior à superciliis in extremum mentum: superior *μέτωπον* dicitur, Lati- nis frons, à ferendo, quod animi indicia præ se ferat: est enim tristitiæ, hilarita- tis, clementiæ, pudoris & seueritatis index, vnde τὸ μέτωπον τριπλῶν frontem perfricuisse dicuntur, qui verecundiam abiecerunt & impudentes sunt. Huius extrema ὄψεις, id est, *supercilia* vocant, quæ pro diuersis animi affectibus nunc attolluntur, nunc submittuntur; ideo per supercilium, fastum aliquādo Poetæ intellexere. Inferior faciei pars varias habet particulas, palpebras scilicet, angu- los duos nares, aures externas, genas, labra, os, mentum, quæ singulæ suo loco describentur. Rursum faciei partes aliz sunt continentes, aliz contentæ. Con- tinentium quædam communes, quædam propriæ. Communes vbique repe- riuntur, cuticula, cutis, adeps, membrana carnosā. Cutis id habet peculiare, quod variè perforata est in oculis, auribus, naribus, ore, vt septem sint in sacra. Palla- dis arce

dis arce fenestræ. Membrana verò licet in toto corpore sit nervosa, hîc verè carnosa est & musculosa, cutique ita hæret vt vix separari queat; vnde fit vt solius faciei cutis *περιερπινῶς*, id est, *sponte nostra* moueatur. Propriæ partes sunt muscoli faciem mouentes & ossa. Existimarunt multi faciem totam à solo panniculo carnoso moueri, quem propterea *μυῶδες πλάτυσμα*, musculum latum & cuticularem vocarunt. Sed fibrarum diuersitas & motuum varietas peculiare esse faciei musculos diuersarum partium motui destinatos arguit. Sui ergo sunt frontis, palpebrarum, narium & labiorum muscoli libro sexto descripti. Quæ verò in facie partes continentur nobilissimæ sunt, sensu quippe extetnorum, visus, auditus, odoratus & gustus organa; oculi, aures, nates, lingua, de quibus sigillatim est differendum.

Membrana carnosa faciei.

Faciei peculiare sunt muscoli.

Sensus omnes in facie locatos esse; cur quinque tantum sunt, & quæ sit visionis præstantia.

CAP. II.



NIMIA hominis, formatum omnium quæ sub Lunæ concavo sunt nobilissima, licet indiuidua sit, & *αυτομάτως*, in hoc tamē corporis ergastulum coniecta, non nisi sensuum ope intelligit, ratiocinatur, phantasmata speculatur; vnde dictum à Philosopho eleganter, nihil esse in intellectu, quod sensuum opera & ministerio prius non egerit. Vt igitur caput animalium facultatum sedes & rationis est domicilium, ita sensus ferè omnes, animæ velut satellites & internuntij, in capitis regia & rationis conspectu sunt circumiecti. Sensus hi quinque sunt, quia ex Philosophorum doctrina quinque sunt simplicia corpora, cælum & elementa quatuor. Visus apud Platonicos elemento stellarum proportionem respondet; eius quippe obiectum est *αὐγῶδες*, lucens & non vrens; odoratus obiectum igneum est, nam aromatica omnia sunt calida; auditus æreum; gustatus aqueum; tactus terreum. Sed & in vniuerso quod oculis cernimus, quinque tantum sunt obiecta propria, colores, soni, odores, sapores & qualitates tractabiles, primariæ, secundariæ. Accedit quod Aristoteli tertio De anima, media quibus sentimus quinque tantum modis alterari possunt, medium sensus, aut externum est, aut internum; externum aer est, aut aqua; internum caro & membrana. Aer & aqua ab externis alterantur, aut vt pellucida, & tunc visionis obiecta sunt; aut vt rara & mobilia, tuncque auditui seruiunt, aut vt humida sicco permixta, & odoratui subiiciuntur. Caro & membrana vel qualitarum primarum temperiem sequuntur, vel sicci & humidi mixtionem; illo modo tactus; hoc gustus obiecta dicuntur. Postremò quinque tantum sunt sensus, quia quinque tantum sunt necessarij; alij quidem simpliciter & absolute, alij ad vitæ dulcedinem. Absolutè necessarij sunt, tactus & gustus. Tactus animalitatis (date hanc vocem Philosopho) fundamentum est; gustus nutritionis, sine qua conseruari non potest animal, gratiâ est comparatus. Visus, auditus, odoratus vitam beatiorē reddunt. Illi ob necessitatem medium internū habuere, & ita cum organo coniunctum, vt non nisi ratione separari queant. Horum medium externum est. Sunt ergo quinque tantum externi sensus. inter quos visus omnium rectè philosophantium iudicio principatum obtinet. Eius præstantiam multa indicant, sed quatuor hæc inter cætera; rerum quas animo representat varietas; actionis modus omnium nobilissimus; obiecti par-

Animæ sensuum ope indiget.

Sensus externi quinque sunt, Ratio prima.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Quinque tantum sensus necessarij.

Sensus absolute necessarij duo, ceteri ex organo.

Visus omnium sensuum nobilissimus. Visus præstantiam quatuor indicans.

1. *Visus plures
differentias
communistrat.*

2. *Visus in
actione sua
ceteris ante-
cellit.
Visus quomo-
do ad intelle-
ctus naturam
accedat.*

Visus libertas.

3. *Visus in cer-
titudine.*

*Visus ob-
iectum nobilif-
simum.*

ticularis præstantia, lux scilicet qualitarum omnium diuinissima, & actionis certitudo. Primum plures rerum differentias nobis commonstrat visus; quia ferè omnia corpora colorata sunt, aut saltem sub oculorum conspectum cadunt, non autem tanguntur, nec sonum edunt omnia. Visus præter obiectum proprium, communia habet quamplurima, figuram, magnitudinem, numerum, motum, statum, situm, distantiam; vnde ad disciplinarum inuentionem aptissimus dicitur. Iam verò actionis modus reliquorum sensuum actioni antecellit. Fit enim in instanti visio, sine motu locali & ad distantissima interval- la; vnde ad intellectus naturam accedit proximè. Intellectus rerum ideas ab omni materiæ contagione liberæ complectitur: visus species tantum incorpo- reas, quas Barbari intentionales vocant, recipit: intellectus eodem tempore duo contraria comprehendit verumque à falso discernit; visus eodem instan- ti album nigrumque diiudicat, & dum percipit vnum contrariorum, non im- peditur à perfecta cognitione alterius. Intellectus *βούλησις* habet liberamque & cogi nesciam vim mentis; visus in actione sua speciem quandam præ se fert libertatis, quod reliquis sensibus denegauit Natura; aures enim perpetuò sunt patulæ, vt & nares: at oculi palpebras habent, quibus si velit animal possit non videre. Accedit tertio ad visionis præstantiam illius *ἀκρίβεια* & certitudo. Plus valet (vt vulgò dici solet) oculus testis quàm auris decem; & Thales tantum inter oculos & aures interesse putabat, quantum inter verum & falsum. Postremo visus dignitatem indicat obiectum *αὐγὰδες*, lux scilicet qualitarum om- nium nobilissima, communissima & notissima; qua ratione factum puto, vt Theophrastus visum hominis formam dixerit, & Anaxagoras ad hoc natos esse homines affirmauerit vt viderent.

De oculorum præstantia.

CAP. III.

*Oculi mirabi-
lis structura.*



*Oculi Sole
præstantiores.*

Visus in actione sua mirabilis est; ita visioni dicatum orga- num omnem superat admirationem; tot enim particulis tan- ta industria fabricatum est, vt nescio an cum Plotino & Syne- sio naturam magnā appellare auserim, quod pusillo corpufculo tā vatij generis particulas, tunicas, musculos, humores, netuos, venas, arterias concluderit. Ægyptij Solem adorabant & Dei in- uisibilis visibilem filium appellabant. Oculi duo microcosmi lumina & velut fulgentia sidera, dignitate & vsu Soli non cedunt. Sol radiis quidem suis vniver- sum orbem collustrat, sed nihil inde voluptatis; nihil commodi accipit. Oculi dum visum omnium spectra animo repræsentant, cum eo oblectantur, & ob- iectorum formam, magnitudinem, distantiam percipiunt, quod nulli alij sensui concessum est. Plato oculum diuinissimam appellat partem æthericamque: Sunt (inquit) oculi participes ignis cœlestis qui nō vrit, sed illuminando suauiter diem inuehit mundo. Orpheus oculum naturæ speculum vocat. Hesychius *ἡελίος ὀφθαλμός*, Solis portas; Alexander Peripateticus fenestras animi, sūt enim oculi animi indices, vt vultus animi est imago. In oculis animus inhabitat; animo cer- nimus, animo audimus, *νοῦς ὁρᾷ καὶ νῦν ἀκούει*; per oculos veluti per fenestram ad animum vsque penetratur, vt præclare dixerit quidam, *Ὁ φθαλαμὸς τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματος εἶναι*; Oculis anima speculum esse. Mitantur oculi, adamant, concupiscunt, amoris, iræ, furoris, misericordię, vltionis indices sunt. In audacia pro-

*Oculi animi
omnes affectus
expriunt.*

filiunt, in reuerentia subsident, in amore blandiuntur, in odio effertantur; gaudent animo hilares subridēt, eodem mœrente languescunt; animo ira flagrante exasperantur, in cogitatione ac cura quiescunt, quasi cum mente simul intenti; unde ex vario & multiformi contuitu variè nuncupantur, torui, truces, flagrantēs, graues, transuersi, limi, submissi, blandi. Denique ad animi affectus oculi sunt compositi, eius imaginem ita exprimentes, vt alter animus esse videatur; hos enim cum osculamur, animum ipsum attingere videmur: qua ratione factum puto vt Blemor Arabicus & Syenensis Medicus Cyprius animæ sedē in oculis statuerēt. Galenus oculum nunc vocat organum lucidum, nunc solarem animalis particulam, nunc diuinum membrum, tantumque oculis tribuit, vt eorum gratiā cerebriū constructum putet. Accedamus ad tribunal veritatis Hippocratem oculorum præstantiam breuiter indicantē sectione 4. lib. 6. Epid. ὀφθαλμοὶ ὡς ἀνίσχυουσιν, ἔγω καὶ γῆρον, vt valent oculi, ita & totum corpus. Maxima sanē ex oculis petuntur indicia ad salutem aut mortem. In ipsis tanquam in speculo lucent, tum robur facultatis, tum eiusdem imbecillitas. Vt enim in veste mundissima vel minima macula perspicua est, ita in puro sincerōque oculo vel parua motio patet sensumque efficit. Firma itaque & constans oculorū vis eorūque splendor, bonam de se ipem pollicetur, at eorundem impuritas, spirituum obtenebrationē arguit, quod in Prognostico & Coacis ita expressit summus Dictator, ὀφθαλμοὶν καθ' αὐτοῦ καὶ χηρὸς τὸ δὲ ἀχλὺ ὡδὲς οὐκ ἀστυόν. Naturæ genius Aristoteles secundo De generatione animalium, certa ex oculis signa fecunditatis colligit. Namque si in oculi canthum amarus liquor stilletur & lingua statim eo sapore inficiatur, signum erit fecunditatis. Sunt etiam (ait Philosophus) oculi spiritibus pleni & semine turgentēs, propterea concidunt & corrugantur iis qui nuper nupsēre. Cœcum postulare non posse Iureconfulti statuunt, quod insignia Magistratus videre nequeat. Præclara sunt ergo, ne dicam diuina oculorum encomia; nunc eorum structuram aperiāmus.

Animans in oculis locatur quidam.

Hippocrates quatuor oculis tribuit.

In oculis signa sunt fecunditatis.

De oculorum structura in vniuersum.

CAP. IIII.



OCVLI Græcis ὀμματα καὶ ὀψις dicuntur, παρὰ τὸ ὀπταίνειν, id est, à cernendo, ὀφθαλμοὶ etiam, quasi ὠπὸς θάλαμος, & φάσα, quod ex ipsis lumen oriatur: ἱλλοις à Poëtis, ἀπὸ τοῦ εἰλεῖν, à volubilitate. Latini oculos vocant ab oculendo, latent enim sub ciliis & velut sinuosa valle reconditi sunt. Hebræi oogon dicūt, quod altum denotat, vt semper memores simus, ad hoc nobis datos oculos, vt excelsa contemplerur. Vfus oculorum duplex est: alter communis homini & brutis, vt tanquam speculatores fugiant quæ nocitura videntur, & quæ vtilia sunt prosequantur. Est diuiniior alter oculorum vsus, soli homini proprius, rerum cognitio, Dei inuisibilis contemplatio per ea quæ visibilia sunt, ipsaque penē dixerim beatitudo; nam cæli specie recepta, intellectu aucto, opifici suo simillimus redditur. Vtrāque ratione ad vitæ simul & vsum, & dulcedinē cōferre creditur oculis. Figura oculi rotūda est, sed aliquantulū oblonga & πυραμοειδής; eius namque basis extrorsum est, conus introrsum ad neruū opticum. Figuram hanc obtinuit ad capacitatem, robur & agilitatem. Volunt optici non suffecturum oculum magnitudini capiendæ si non sit rotundus, & nihil nisi æquale sibi percipere; cum autem sit orbicularis, à quacunque patte.

Oculorum nominata.

Vfus ocularū duplex.

Figura oculi est rotunda & oblonga.

*Situs oculorū.**Cur in edito loco sit.**Cur anterior collocati.**Cur recedenti.**Oculi propugnacula.**Numerus oculorum cur duo.**Oculorū mirabilis sympathia.**Cur oculi eodem motu mouentur semper.**Magnitudo. Natura oculi aqua.**Color oculorū.**Temperies.**Connexio.**Sensus.*

occurrent radij, franguntur ad perpendiculararem, id est, diriguntur ad centrum pupillæ. Additur altera rotundationis ratio, vt celerius visu apprehendi multa valeant, quando globosis summa inest reuolutionis facilis, & sanè oculis mira volubilitatis accedit celeritas. Siti sunt in loco editissimo, anteriori & profundo: in editissimo quidè, vt velut exploratores interdum nocturne nobis excubantes eminens quæcunque nocitura sunt, aut profutura prospiciant. In anteriore, tum quia mouetur antrosum animal; debet igitur quæ illi obuersantur videre; tum quia ad visum molliissimo neruo opus erat qui à cerebello duriore oriri non poterat. Tandem in antrum quoddam velut sinuosam vallem, recediti sunt, & in cauum (orbitam vocant) retrusi, vt tutiores essent, & minor spirituum fieret dissipatio. Quinetiam vt extrinsecus irruentibus iniuriis minus forent obnoxij, ossibus vndiquaque & palpebris quasi propriis sepimentis obvallati fuere. Hinc enim genæ superioris ossa quæ malam attingunt protuberant; illinc nasus quasi murus, oculis inrelictus apparet, superiore frons & supercilia instar vallis; inferiore os genæ superioris prominet; vnde quaque verò ciliū vtrunque. Oculi duo sunt ob necessitatem: fecit enim vbicumque potuit natura totum ferè corpus geminum; sic aures duæ, nares, oculi, manus, pedes, &c. Figmenta ergo sunt quæ de Cyclopiis & Arismaspis quos Aristides *μονομαλῆς* vocabat, Æchylus *μονῶπας*, prodiderunt. Eorum mirabilis est sympathia, nam & læso altero statim afficitur alter, & vno eodemque motu simul & semel mouentur ambo, quod ego ad perfectionem visus factum puto. Nam si oculorum alter attolleretur, alter deprimeretur, obiectum quod natura simplex est, duplex appareret perpetuò; quia debent visoriorum conorū axes in vno eodemque plano locari. Accedit quod neruus secundæ coniugationis oculos mouens, in suo exortu continuus est, quod pauci obseruunt. Magnitudo oculorum tanta est, quanta ad rerum imagines percipiendas sufficiebat. Natura oculi tota ferè aquea est, mollis, lubrica, splendens, pellucida; vt celerius rerum omnium spectra, colores, imaginem exciperet. Sunt in homine solo variegati oculi & diuersi coloris; ceteris verò animalibus in sua specie perpetuò similes: sic bouum omnium nigri, ouium aquei, aliorum rufi; temperamento frigido sunt & humido, atque à similibus suæ naturæ causis faciliè leduntur, iuuantur autem modico contrariorum vsu. Conneditur oculus per opticum neruum cerebro, vnde maxima vtriusque partis communio. Oculus est acerrimi sensus, vnde fit vt citò deprauerur; sensus enim in animalibus breuioris vitæ causa est Aristoteli secundo de anima.

De singulis oculi partibus, ac primùm de musculis. CAP. V.

*Musculi oculorum sex.**Quatuor recti.*

OTVM oculi corpus musculis sex, tunicis sex, tribus humoribus, duobus neruis, venis & arteriis quamplurimis, adipèque copioso constituitur. Musculi vndiquaque oculum mira volubilitate versant, vnde à Poëta faciles appellantur, & à Græcis *ἄλλοι, ἀπὸ τοῦ εἰλεῖν*, à volubilitate. Ex his quatuor sunt recti, moribus rectis præfixi, & duo obliqui. Rectorum primus sursum, alter deorsum mouet, tertius ad læuam, quartus ad dextram trahit. Horum quatuor non dissimilis est structura, nec ortus principia multum à se distant. Oriuntur enim omnes ab vno ferè & eodem

principio , ab interiore scilicet & profundiore orbita, quam sphenoides portuicula constituit; hinc in varias adnatæ tunicæ partes lato satis nervosæque tendine inferuntur. Habuerunt autem tendines etiam si exiles sint admodum, ob continuitatem motus, quia oculus frequenter motus robusto eget motore. Errant ergo qui musculos oculi ab interiore membrana eaque crassa opticum ambiente, enasci putant. Hoc enim sensui omnino aduersatur. Neque verò à membrana debuerunt aut potuerunt enasci, non debuerunt, quia membrana exquisitissimi sensus nervum circumdat, itaque musculi in motibus suis nervum comprimerent & visioni obessent; non potuerunt, quia firmæ non adhærerent basi. Quatuor hi si omnes simul agant intrò oculum trahunt sistuntque. Obliqui duo versant & circumferunt oculum obliquè; alter superius, alter inferius, prior ab interiore orbita ortus, ut superiores quatuor, ad angulum maiorem fertur, ibique in chordam gracilem veteribus incognitam, à primo Fallopio eleganter descriptam definès, eam trochleæ obuoluit, tandemque in latus coniunctiuz obliquè inferitur. Trochleam voco cartilagineam, quæ canalè habet per quem currit dicta chorda, & ligamento membranæ ita ab angulo pendet, ut trochleæ speciem omnino referat. Musculus hic dum intrò ad principiũ trahitur, chorda sua, circulari quodam motu oculum ad maiorem angulum obuoluit; posterior ab interiore angulo & ea rima quæ duo maxillæ ossa iungit ortus, ad exteriorem angulum oculum transuersim amplexatus inferitur. Hunc ab oculo oriri & in oculum inferi existimauit Columbus; sed decepit eũ fortasse musculi huius obliquus & ferè latens inter alios situs. Septimus, quem describunt ferè omnes Anatomici & Vesalius, etiam nervum opticum ambiens, oculumque firmans ne exorbitet in quadrupedibus tantum, quæ prona terram spectant, reperitur; in homine nunquam. Sunt ergo sex tantum oculorum musculi, quibus singulis artificum filij nomina indidè. Primus attollens & superbus dicitur; secundus depressus & humilis; tertius adducens & bibitorius; quartus abducens & indignatorius; duo obliqui circumagentes, circulares, amatorij, quòd sint velut in amore duces.

Ortus mangifera-
larius etale.

Obliqui duo
musculi.

Trochleae.

Errat. Column-
63.

Septimus Fe-
sely musculus
non datur in
homine.
Nomen mu-
sculorum aculi.

De tunicis oculorum.

CAP. VI.



C V L V s cūm esset pellucidus & naturæ aqueæ, vt sua sede cōtineretur nec fluitaret, debuit corpore aliquo solidiore firmari: Constructæ ergo sunt in eum vsū tunicæ, humores, aqueum, cristallinum & vitreum ambientes; quæ visionem etiam non minimū iuuant. Aliæ namque oculum capiti coniectunt; aliæ splendore & pelluciditate visibilia species admittunt; quædam spiritum fouent & externum lumen refringunt; nonnullæ denique alimētum conueniens suggerūt. Tunicarum numerus valde est controuersus, nos sex tantū agnoscimus. Prima omnium situ est coniunctiua, Græcis, *ἐπιπεφυκάς*, Latinis adnata, inherens, candida, pinguis, consolidatiua. *Επιπεφυκάς*, quod eius ope & interuentu adherescant oculi, ne exorbitent. Coniunctiua, quia oculum vicinis partibus annectit alligatque. Album oculi dicunt, quod extrinsecus candida sit & callosa. Alexander Benedictus *fundam* vocat, vel quod non in totum orbiculata sit, instar fundæ qua lapides iaciuntur; vel

Tecnica scolastica con gli strumenti

Conjunctive
Nominative.

Aaa iij

quòd venulis constans & arterioliis quamplurimis, fundæ similitudinem præferat. Nascitur hæc ab ultimis pericranij oris, nec totum oculum tegit, sed ad circulum tantum fertur, quem *γεωμετρικὴ κυκλοτερὴ* orbicularem lineam vocant: *ἰρις* etiam dicitur à diuersitate colorum, *σφενδὼν* Polluci, quia pupillam in se contineat, vt funda lapidem; *σφαγὴ* corona. Tunica huius triplex est vsus. Primus, ne ossium duritie lædatur oculus. Secundus, vt capiti annectat oculum, ne in violentis motibus exorbitet. Tertius, vt oculi musculos propriis sedibus firmet. Secunda tunica *κροταυροειδὴς* dicitur, & *σκληρώδης*, cornea & dura, quòd duritie & pelluciditate cornu prætenue & accuratè politum ac derastrum referat; vel quòd, vt voluit Ruffus, cornu instar in laminas dissoluatur, pluribus enim ceu corticibus, constare dicitur. Oritur à crassa cerebri membrana optici medullam ambiente totumque oculum circumdat. Eius substantia dura est & densa, vt extrinsecus irruentibus iniuriis obstat; nò nimium crassa, vt visum speciem admittat & lumen externum celerius ad crystallinum permeet; non opaca, sed splendens & pellucida, ne perpetuè oculis tenebræ obuersentur; omnis alieni coloris expers; denique omni ex parte læuis, polita, tersa, ad perfectiorem luminis emissionem. Venulis, arterioliis & nervis caret; hæc enim visioni obessent; sed alimentum ab vnea sibi proxima mutuatur. Eius duplex vsus; alter vt sit crystallini propugnaculum, eumque ab ambientis aeris frigore & æstu tueatur; alter vt tenuiores tunicas & humores omnes complectatur. Sunt qui tunicam hæc duplicem esse velint, anteriorem quam corneam vocant, & posteriorem quam duram. Tertia tunica *ραγοειδὴς ῥωξ*, *χοροειδὴς* dicitur; *ραγοειδὴς*, quòd vutæ acinum & folliculum, à quo pedunculus auulsus est, figura, colore, tenuitate, læuitate externa referat; *χοροειδὴς*, quòd chorij instar vasa ferè omnium tunicarum suffulciat, vel quòd à tenui membrana quam *χοροειδὴ* dicunt oriantur. Substantia eius tenuis est: sed aliquantulum crassior quàm in cerebro, vt crystallinum & subiectas ei partes tueatur. Ortum ducit à tenui membrana neruum opticum inuestiente, hæc namque dilatata circulo totum oculum ambit, nisi parte anteriore, qua aliquantulum comprimitur, & rotundo ac satis exiguo foramine peruia est. *κόρη* dicitur vulgò, Ruffo *γλήνη*, Latinis pupilla, pupula, nigrum oculi, fenestra oculi. Alligatur vnea posteriore parte optico, reticulari, fibrosis nexibus, corneæ ad iridem vsque adhæret, sed non admodum validè, anteriore parte vndiquaque libera est, vt spirituum & luminis affluxu dilatari possit. Sola hæc inter oculi tunicas variè est colorata, sed non vnus omni ex parte coloris. Anterior pars quæ aqueum & crystallinum respicit, fusca & nigricans; exterior quæ iridem constituit, nunc cærulea, nunc castia, nunc nigra, pro diuersa cerebri & oculorum temperie apparet. Posterior verò intus quidem variegata est, primum subalba, mox viridis, dein cærulea, sed foris quæ corneam spectat, fusca vel nigra. Vneæ varij sunt vsus. Primus, vt crystallinum defendat, ne corneæ lædatur duritie; secundus, vt reticulari alimentum suggerat, & corneam quæ venis & arteriis caret nutriat; tertius, vt colore nigro & cæruleo dissipatos spiritus recolligat & luminis externi splendorem refringat. Itaque crystallinus tunica hac velut speculo recreatur; ideoque mollis constructa est venosa, varicolor, & perforata. Quarta *ἀραγοειδὴς* dicitur aranea, quòd tenuitate telas aranearum referat, ambit crystallinum & inuoluit immediatè; propterea tenuis & pellucida est, ne crassitie visioni obesset. Proprium est crystallini tegmen, eumque per ciliare inrestitium vicinis

*Coriunclum
vsus triplex.*

*Tunica cor-
neæ prima.*

Ortus.

*Corneæ vsus
duplex.*

Vnea nomina.

Ortus.

Pupilla.

*Vnea variè
est colorata.*

*Vnea varij
sunt vsus.*

*Aranea tu-
nica.*

partibus annectitur; venas nullas habet, sed à ciliari nutritur. Quintam ἀμφιβληστροειδῆ, id est, *reticularem* dicunt, à retis similitudine. Nascitur à medullari opri-
nerui substantia dilatata, propterea mollis est, alba & cerebri substantiam aqua dilutam refert. Galenus non vult propriè tunicam esse nec substantia; nec colore, sed medullam dilatatam. Diffundit hæc per crystallinum & vniuersum oculum visiles spiritus, & crystallini alteratione percipit, tandèmq; visilium spectra ad cerebrum tanquam iudicem desert. Postrema tunica veteribus incognita, *ὕαλος* dicitur, quod vitreum humorem omni ex parte ambiat, in cuius medio ciliare interstitium apparet cilij figuram referens. Est processus quidam choroïdis crystallinum vucæ alligās firmissimè; vnde Fallopio nexus & ligamentum dicitur; sed & aqueum humorem secernit à vitreo ne confundantur. Addunt quidam septimam tunicam ex muscutorum tendinibus constatam.

Vitreæ tunica, Ciliare interstitium.

De humoribus oculorum.

CAP. VII.



DETECTIS relectisque tunicis effluunt statim & in apertum profetuntur partes oculorum nobilissimæ, humores quippe, aqueus, crystallinus & vitreus; sed crystallino summus debetur honor; est enim quouis adamante pretiosior, quauis gemma illustrior; propterea anima oculi, specillum interius, cætrum oculi dici solet. Solus hic à coloribus alteratur visiliumque spectra recipit, & cum luminis vtriusque ad eum prohibetur appulsus, in-
rerni quidem in gutta serena; extetni in suffusione, quam guttam caliginosam Arabes vocant, perit videndi actio, quasi lucerna interextincta. Hoc posito, ponitur facultas videndi, reliquæ omnes partes aut visionem conseruant, aut præstantiorem reddunt; huic denique tanquam pticipi quæ in oculo sunt singulæ partes famulantur. Nam cornea tanquam vitro ad perfectiorem luminis emissionem vitur crystallinus; vucæ tanquam viridario a mœnissimo & colorum varietate aridente oblectatur. Pupilla fenestræ vicem gerit; aranea species retinet ne diffuant, vt plumbum in speculo; humor aqueus cœu propugnaculum externi luminis splendorem infringit & velut medium est delationis imaginum; vitreus ad instar coqui alimentum præparat. Nervus opticus visiles spiritus ad crystallinum deferret, & species ab eo ad cerebrum tanquam censorem & iudicem traicit, musculi & secundæ coniugarionis nervus velut equi crystallinum totumque oculum omni ex parte versant; ita crystallino subseruiunt omnia. Huius historiam exponere iam aggredior. Si prius humorem aqueum, quia primus sese in conspectum dat, descripsero. Aqueus ergo humor Græcis ὕδατωδης, λεωτός, κατάρδος, αἰουδης, nobis albugineus, tenuis, aqueus dicitur, quod renuitate & puritate aquam vel oui candidum referat: Auicenna glaciale excrementum vocat, sed malè. Situs est anteriore parte, vt sit crystallini propugnaculū, ne is circumdantium membranarum duritie lædatur; tum vt externi luminis splendor affatim occurrens, quodammodo infringatur, & cum interno lumine confuescat externum; est enim veluti medium quoddam delationis imaginum. Quin & glaciale perpetuò & vucæ interiorem partem quæ madore spongiæ similis est, irrigat albugineus, ne à perperuo motu exsiccetur. Adde quod ocularium instar simulacra ad crystallinum desert prohibetque ne visiles spiritus ef-

Crystallini lani.

Crystallino partes omnes oculi quomodo famulantur.

Aqueus humor.

Situs. Aquei humoris situs varij.

*Cryſtallinus
humor.*

*Cryſtallini
ſubſtantia.*

Figura.

Situs.

*Vitreus hu-
mor.*

*Vitrei hu-
moris uſus.*

fluant, Mitto quòd vucam à cryſtallino diſiungit & corneam perpetuò diſten-
dit, quibus corrugatis, & in ſe concidentibus perit vidèdi actio. Humor hic pars
eſt oculi viuens & ſpermaticea, non excrementum. Secundus humor Galeno
κρυσταλλοειδής υγρόν, nobis cryſtallinus & glacialis dicitur, quòd glaciem con-
cretam referat & cryſtalli modo pellucidus ſit. Auicenna, guttam & grandinem
vocat. Ætius à lentis figura *φακοειδής* lenticularem; alij à diſci ſimilitudine *δισκοειδής*. Sunt qui oculi centrum, animam oculi, ſpecillum interiùs vocitent. Hu-
moris huius ſubſtantia tota eſt aquea, non diſfluens, tamen qualis vitrei aut albu-
ginei, ſed denſa & cryſtalli modo còcreta, vt figi ac ſiſti in eo ſimulachra queant;
pellucida, non opaca, vt vernaculi luminis fulgore externo ſit *εὐπρόσφωτος* &
conſocialis; tenuis non craſſa, vt celemiùs vtrùque lumen admittat; coloris tan-
dem alieni expers, vt colorum omnium ſpecies citiſſimè excipiat. Figura rotun-
da eſt, ſed non planè globola, ne hinc atque illinc flueret, & in violentis motibus
à propria ſede exturbaretur; propterea quà pupillam ſpectat, preſſior; quà vitreo
immergitur, planior apparet. Situs eſt ſerè in medio oculi, velut in centro, vt
vtrùque lumen & internum & externum admittat facilè, neque vtriùque conſue-
ſcat nimium. Annectitur anteriore parte albugineo; poſteriore vitreo veluti in-
natat, vtrinque verò mediante ciliari tunica vucæ alligatur. Tunica regitur te-
nuiſſima *aranea* dicta. Denique princeps eſt viſionis organum; huius enim eſt
ἀλλοιωθῆναι πρὸς τινὸς τῶν ἑξωθεν χρωμάτων. Tertius humor *υαλοειδής*,
& vitreus dictus, craſſitie quidem & conſiſtentia vitro fuſo ſimilis eſt; ſed colore
& pelluciditate iam denſatum & refrigeratum vitrum penitus refert. Situs eſt
poſteriore parte, vt cryſtallinum admitteret, propterea in medio concauius eſt.
Eius ſubſtantia cryſtallino eſt mollior, aqueo tamè minus fluida. Huius vnicum
veteres agnouerunt uſum, qui tamen multiplex eſt. Primus vt cryſtallino alimè-
tum præparet; non enim ſanguis ruber per venulas ad cryſtallinà ferri debuit, ne
ſuo colore princeps viſionis organum, quod coloris expers erat, inficeret; vitri
tamen ſubſtantia non alitur. Secundus vt cryſtallinum conſeruet, ne membra-
narum duritie afficiatur. Tertius vt viſiles ſpiritus ad glacialis illuſtrationem
contineat.

De cæteris oculi partibus, nervis, venis, arteriis, ſpiritibus, adipe, glandulæ.

CAP. VIII.

*Nervi opti-
ci.*



*Optici cur-
ſus.*

VNT & alię oculi partes, nervi ſcilicet duo, venę, arterię, adeps
& glandulę. Nervorum aliter viſioni, alter morti inferuit; ille
opticus dicitur, eſtque primum nervorũ à medulla quę intra
caluā continetur prodeuntũ par. Hoc omnĩu molliſſimum &
ampliſſimũ, in ortu ſeparatũ, dein antroſum obliquè proten-
ſum, in medio ſerè pergreſſu iuxta ſellam ſphenoides còit, nò
per *χμασμόν* & interſectionem, nec per contactum ſimplicè,
ſed per medullę confuſionem, vt alterum ab altero nulla arte ſecernere queas.
Coire autem debuerunt nervi optici, tum ad robur, ne ob mollietiem longum
iter pererrantes ſlacceſſerent, tum vt eandem planitiem in pupilla obſervareñ,
ſecederent enim aliquando ſine eo amplexu, atque ita deluſi oculi, ſimplex ob-
iectũ duplex iudicaret; tum vt viſilium formę & ſpectra vnirentur; tum vt
commodè per foramen è caluaria prociderent & ad oculos rectà ferri poſſent;
poſtremò

postremò ut visibilis spiritus ab altero oculo in alterum momentò permearet ad visus perfectionem; sic enim clauso alterutro oculo, acutiùs videmus. Ita ergo confusi optici & coeuntes, mox separantur & per caluariæ foramen in oculi centrum feruntur; interior quidem eorum substantia mollis ac medullosa dum ad crystallinum peruenit, dilatur & per oculum visibiles diffundit spiritus, fitque ex ea dilatatione reticularis tunica; exterior verò quæ duplici velatur tunica tenui & crassa, in vueam & corneam absumitur, vnde fit ut per optici continuitatem animalis spiritus ad pupillam usque momentò feratur. Hos nervos *ὀφθαλμικούς*, id est, *meatus visorios* vocat Herophilus; nos sensilem & conspicuam eam cavitatem nunquam obseruauimus, sed omnium mollissimos & magis *αποσώδεις* esse volumus, quia visilem spiritum copiosissimum deferunt. Hi si obstruantur, ut in Arabum gutta serena, perit videndi actio. Altera nervorum propagatio oculos mouet: ab hac ramuli emergunt quamplurimi, in mûsculos omnes variè diuaticandi. Sunt motorij hi nervi in suo exortu continui, ut vnicum quasi funem constituant; vnde fit ut si oculum in latus moueas, aliter illius motum sequatur necessariò, quæ observatio noua est & pulcherrima. Sunt etiam in oculis venæ & arteriæ quamplurimæ; illæ à iugularibus, hæ à carotidibus oriuntur. A netuis, venis & arteriis feruntur ad oculum spiritus multi, visibiles, naturales, virales; vnde fit ut non eadem semper in oculis sit magnitudo, nò idem splendor; sed minimi interdum, languidi & obscuri appareant, ut iam iam morituri, aut iis qui Veneri nimium indulgent; interdum grandiores, alacres, splendidi. Quinetiam viuente animali oculus vehementer tensus summèque plenus, nec vlla omninò eius pars laxa corrugataque cernitur. At illo extincto nihilque dum aqueo effluxo, minor laxusque & rugosus oculus fit. Postremò oculorum altero clauso, aliter pupilla momentò dilatur, copiosiore scilicet spiritu per reticularem in vueam illapsa. Copiosus etiam adeps oculos oblinir, ne in perpetuis motibus æstuant & siccarentur, tum ut eos ab ambiens frigore tutaretur; vnde fit ut nunquam rigeant oculi. Sunt postremò iuxta oculum exiguæ caruncule & glandulæ. Caruncula siue caro glandosa *ἐγκυαυλὶς* dicta, in interiore angulo sita, impedit quo minus lacrymæ vel alius salus humor in genas profluat; deinde angulum hunc tuerur ne lacrymarum aut sordium acrimonia ædi possit. Nam cum palpebrarum contractione oculos ab externis iniuriis liberare conamur, omnia ad internum angulum protenduntur; propterea in externo talis caruncula non cernitur. Glandulæ verò in oculi angulis fixæ, humorem à cerebro defluentem excipiunt, oculos irrigant & ad motum aptiores reddunt. Per has copiosus humor exprimitur & lacrymæ fluunt.

Nervi optici manifestè cernuntur non sunt.

Nervi utrumque manus.

Observatio pulcherrima de continuitate nervorum secundis partibus oculi. Spiritus in oculis adesse multas.

Adeps oculorum cur.

Caruncula & glandulæ oculorum.

De oculi externis partibus, ac primùm de palpebris.

C A P. I X.



QUOD, ut extrinsecus irruentibus iniuriis minus forent obnoxij, ossibus quidem quasi propriis sepimentis vndique obvallauit Natura, & in antrum velut sinuosam vallem (orbitam vocant) reclusit; sed quia anterior eorum pars omnium nobilissima lumini externo, aeri, ventis, fumo, pulueri, animalculis aliisque corpusculis erat exposita, ne horum occursum ledere, palpebris ceu tegmētis & propugnaculis munivit; earum etiam operâ visus in actione sua speciem quandam præ se fert libertatis. Nares enim perpetuò sunt patulæ ut & aures; ar oculi palpebras habent, quibus si velit animal

Palpebrarum usus.

*Palpebrarum
nomen.*

*Palpebrarum
compositio.*
*Cutis palpe-
brarum laxa.*
*Palpebrae car-
tilagineae.*

*Musculi pal-
pebrarum.*

Palpebrae duae.

*Palpebra vni-
ca mobilis.*

*Palpebras
aperiens mus-
culus.*

*Palpebras
claudentes
musculi.*

*Pili palpebra-
rum.*

*Pilorum pal-
pebrarum visus.*

possit non videre. Palpebrae itaque à palpitando sic dictae Græcis βλέφαρα, quasi τὸ τοῦ βλέπεως φᾶρος, hoc est, visus tunica operculumve, ὀμματόφυλα καὶ καλύμματα, Aristoteli ἑλντοσί dicuntur, quod sint oculorum tegmenta & folia. Hæ quadrupedibus in superiore tantum gena, volucris in inferiore, struthiocamelus animalium sola ut homo utrinque palpebras habet. Palpebrarum compositio ex cutanea est substantia, cartilaginosa & musculosa. Cutis laxa est satis, ut contrahi & corrugari possit. Cartilago necessaria fuit, tum ad motum faciliorem, sit enim cartilaginis opera æquabilis oculorum apertio occlusioque; tum ut foris occurrentibus iniuriis obstitat; tum ut huic tanquam firmiori scopulo pili parui infingerentur, qui externorum occursum prohiberent. Si molliores fuissent palpebrae ex carne sola aut membranis contextæ, leui de causa conciderent, mollia enim citò flaccescunt: si duriores & omnino osses, non ita facile mouerentur, & sua duritie interiores oculi tunicae, quæ sunt exquisitissimi sensus, læderent; cartilagineæ ergo sunt & debuerunt esse: sed cartilago illa tenuis est, tum ad læuitatē, tum ut externi luminis exiguum umbram transmittat. Cartilagineæ hæ ab ossibus liberæ sunt & figuram habent semicircularem; eas autem inuestiunt intus quidem membranula, foris verò cutis. Tandem ad palpebrarum structuram concurrunt musculi, qui necessarij fuerunt, ut oculum aperirent & clauderent: clausi enim oculi visibilia imagines nunquam reciperent; aperti verò & ab extrinsecus occurrentibus tuti non essent, & citò deprauarentur, quia spirituum luminisque interni maxima fieret dissipatio: vicissim ergo prout res postulabat & aperiendi erant & occludendi. Geminæ sunt palpebrae, superior & inferior: illa maior homini & iis animalibus, quibus inferior manet immota, a uibus contra inferior superiori est maior. Et si autem duæ sunt, unicam mobilem fecit Natura, superiorem scilicet. Quid enim inferioris motu opus erat, cum per superioris motum ad inferiora claudatur, & per motum eiusdem ad superiora aperiatur oculus? Mouetur ergo superior palpebra sursum & deorsum. Sursum vnus musculi ope, qui ab interiore orbita, ab eodem ferè principio, à quo ille qui oculum sursum mouet, enatus, & in tendinem satis latum desinens, in palpebrae superioris tarsum inferitur, palpebramque attollens oculum detegit. Claudunt palpebram duo musculi. Alter ab interiori angulo ortus, totum circumdat cilium sphincteris instar; alter ab eodem angulo & nasi radice exortus in tarsum inferitur. Palpebrarum extrema, quæ dormientibus nobis mutuo coeunt, Russus χηλὰς & vngulas dicit, superius cauum, inferius subcauum vocat.

De ciliis & canthis seu angulis oculorum.

C A P. X.



ALPEBRARVM extremis pili adnascuntur, qui βλέφαρίδες Aristoteli, Nicandro σκηνία, cilia Gaza, pili palpebrarum Celso dicuntur; Polluci autem παροσί, quia eleganti ordine sunt dispositi; vnde etiam ab illa pilorum serie remorum in longis nauibus similitudinem referente, has cartilagineas παροσὶς vocant. Pili hi valli instar visiles spiritus & radios ab oculis manantes dirigere dicuntur, & simul cum palpebris oculos contra occurrentia animalcula, puluerem & alias sordes muniunt; eorumdem quoque nectus creber in vigilantibus est, tum ut visus recreetur, tum ne quid in oculos cum im-

petu feratur. Superioris palpebræ pili sursum versus leuiter inflectuntur: nam si vndique recti essent, vmbra oculis inducerent impedirentque quod minùs sursum videre possemus. Inferioris verò palpebræ cilia deorsum incuruantur. Partes palpebris communes in quas concurrunt ambæ Græcis *καὶ ὅτι* dicuntur, *ὅτι τὴ κνήθησιν*, id est, *pruriti sentire*, Latinis anguli. Bini sunt; alter iuxta nares, alter ad tempora; ille quod maior sit, magnus, internus, domesticus, *ἐγκαιστis* propriè, *παλὴρ* Polluci, *πηγὴ* Helychio, quod inde lacrymæ emanent appellatur. Hic *παράσιον*, *παράσιον* minor, externus, & Barbaris syluestris dicitur.

Canthi seu anguli.

De superciliis.

CAP. XI.



ANDEM ad oculorum tutelam supercilia sunt constructa, Græci *ὀφρύες* vocāt, Aristoteles *σχεπασματὰ τῶν ὀμμάτων*, Latini supercilia, quod supra cilium sint; hirsutæ sunt frontis extremitates siue pili supra oculum enati. Horum pars naribus proxima *ὀφρύων κεφαλὴ*, caput; pars ad tempora accedens *ἔρια* finis, cauda dicitur, intermedium verò inter supercilia sparium vnde nasus incipit quod depile est *μεσόφρυον* Rufus appellat, *μετωπὸν* Hippocrates, intercilium & glabellum nostri, quo in loco animæ principatum olim tribuit Strato. Hæc cum pro diuersis animi affectibus vel attollantur, vel submittantur, ideo per supercilia factum aliquando Poëtz intellexerunt. Hic ait Plinius superbiam inhabitare, alibi conceptaculum, sed hic sedem habet, in corde nascitur, huc fabit, hinc pender. Superciliorum vsus apud Galenum est, vt corporū maioris moles superne ad oculos decidentium incurfus excipiant. Tota superciliorum structura ex cute est, multis fibris carnosus à musculo frontis texta, adipe & pilis ex cute enatis. Cutis crassior est hac parte & durior; crassior vt imbricamenti instar melius oculos muniat, durior, vt pili numero sint æquales, nec in immensum crescant. Vt enim in palustri & vliginoso loco, nihil generatur, nec item in squalidior solo, ita in ficcior & humidior cuti pilos erumpere non datur. Est autem musculosa & laxa hæc cutis, quia promptè & laxè moueri debuit. Pili superciliorum *τυλοὶ* dicuntur Medicis. Eorum vsus est muri instar propulsare oculis aduersa, ea præsertim quæ à capite & fronte desluunt. Æquales sunt hi in longitudine, numero, & densitate. Si enim minores essent, pauciores & rariores, non ita oculum ab externis tutarentur; si longiores densioresque, pupillas occultarent & visioni essent impedimenro. Est autem eorum non recta sed obliqua insertio, vt omnia ab oculis facilius deflectant. Arque hæc oculi & singularum eius partium fidelis esto descriptio, nunc controuersa enodemus.

Superciliorum nomina.

Partes.

Supercilia quid denotent apud Poetas.

Superciliorum vsus.

Structura.

Cutis superciliorum cur sit crassa.

Superciliorum pili.

Eorum vsus.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

An visio emittendo fiat, vel recipiendo; vbi visionis natura accuratè explicatur.

QVÆSTIO I.

De visionis
naturæ senten-
tiæ tres.

Prima opinio.
Fieri emissio-
ne.
Optici.
Pythagoras.
Empedocles.
Plato.

Democritus.
Leucippus.
Epicurus.
Chrysippus.
Rationes
Platonice.

1.

2. 3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

opinio Peripatetico-
rum re-
ceptione sola
fieri.
Ratio 1.
Secunda.

DE visionis natura & videndi modo nobilis est controuersia, eaque philosophica potius, quam medica. Quia tamen eam Galenus libris De vsu partium, & De placitis Hippocratis & Platonis, eleganter exagitat, non erit ab instituto opere alienum, pauca quedam, eaque ex secretioribus philosophiæ mysteriis eruta, hic in apertam lucem proferre. Tres sunt præcipue de visionis modo Philosophorum sententiæ. Quidam enim emissionem sola, alij receptione sola visionem fieri putant: sunt qui partim emissionem, partim receptionem fieri contendunt. Prioris sectæ auctores varij sunt, diuersa omnino sentientes. Volunt Optici radios ab oculis exire ad rem aspectabilem pertingentes, radiorum verò figuram statuunt & v. g. p. 1. cuius conus sit in oculis, basis in re videnda. Pythagoras visionem fieri putat per luminis emissionem ad obiectum, cuius fiat ad oculum reflexio, non secus ac pila palmaria à manu in parietem impulsæ, à pariete repercussæ ad manum æquali impetu reuertitur. Empedocles, Hipparchus, Nicias visionem emissionem radiorum & luminis simul fieri volunt. Plato non radios, sed lumen emitti putat, idque non ad rem visam, sed vsque ad certum medij spatium. Democritus, Leucippus & Atheniensis Epicurus à rebus omnibus per corpuscula effluere imagines existimauerunt. Chrysippus & vniuersa Stoicorum schola, à corde ad oculorum pupillam ferri spiritum quemdam putant, qui ad rem vsque visilem extendatur. Emitteri igitur ab oculo quiddam ad visile obiectum prima hæc opinio contendit: quam his rationibus stabilium Platonici. Prima, venefici oculi fascinare solent, hinc illud Poeta,

Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.

2. Basiliscus aspectu hominem inficit. 3. Menstruas a mulier speculo velut tabo inficit. 4. Luporum aspectus rauos reddit homines. 5. Tiberius Cæsar creditur solo aspectu attonitum reddidisse militem. 6. Antiphonti, ut narras Aristoteles 3. Meteororum, semper mago sui ipsius ante oculos obuersabatur. 7. Cur ut acutius videamus, conungamus pupillam? an non ut radij & spiritus egredientes magis vniantur? 8. Cur oculus cernendo debilitatur si nihil emittitur? 9. Si fieri visio per receptionem, non emissionem, non oporteret converti oculum ad rem obiectam, & non intuentes videremus. 10. Nec magnitudo, nec figura cernerentur, oculus enim cum sit parvus, non posset res tam magnas recipere. 11. Dilatata pupilla melius videremus, quia maior fieret receptio. 12. Contraria species simul & senel in eodem susciperentur, quia oculus simul duo contraria obiecta conspiciat, album & nigrum. Postremo, minima res perinde cerneretur atque maxima: sed id falsum. Nam acies acus vergens in calum non percipitur, quia radij separati coire non possunt ob obiecti paruitatem. Quod si illam cernere volumus, necesse est ad latus nos contrahamus. Denique oculi igneæ sunt nature; nam & pyramidales sunt, & perpetuo mobiles, & nunquam rigent: ac igni proprium est aliquid semper emittere, lumen, radios, calorem. Hæc sunt Platonice & Opticorum rationes præcipue. Alterius sectæ princeps est Aristoteles 2. De anima, & libris De sensu & sensili, quem sequuti sunt omnes Peripatetici, Alexander, Themistius, Auerroes. Volunt hi visionem sola receptione fieri, non emissionem: quia sensio omnis cum sit passio, sola receptione fieri debet: sic auditus soni, odoratus odorum, gustus saporum, tactus qualitatum tractabilium sola receptione sunt. Præterea

qui humidiores habent oculos, semper obiecta maiora quam sint, conspiciunt, quia spectra ab humiditate crassiora redduntur. Tertiò, excellens visile destruit sensum. Quarto, in speculo imaginem rei oppositam cernimus, quod non fieret, nisi vestigium rei ab obiectis ad medium, & ad speculum usque multiplicaretur. *Quarta.* Quirit Aristoteles sect. 31. Probl. cur manus dextra perfectius operetur sinistra, oculus verò & aures equaliter videant audiantque. *Quinta.* Respondet facultates illas fieri agendo, has patiundo: at uterque sensus & utrumque organum eque patitur. Senes remota obiecta melius vident quam proxima: non ratione luminis, *Sexta.* radiorum & spirituum ab oculis exeuntium, exigui enim sunt, impuri & tenebrosi: sed quia species à distantissimo obiecto manans tenuior redditur magisque spiritalis & ad receptionem aptior. Stelle minutissima in hyemali serenitate conspiciuntur, non aestiva, quia hyeme *Septima.* earum stellarum species in aëre crassiori recepta terminantur & multiplicantur; aestate verò ob aëris raritatem terminatiue (ut vocabulis utar scholasticis) recipi non queunt, nec multiplicari. Galenus lib. 7. De placitis, & 10. De usu partium, ut Platonicos cum Peripateticis conciliet, visionem partim emittendo, partim recipiendo fieri vult. Ego sanè Galeno fauco tanquam preceptori. Non ille quidem meo eget patrocinio, per se satis magnus: sed quemadmodum solitus erat in ore habere, Vincat utilitas, ita nos, Vincat veritas. Malo igitur cum Aristotele (quem alteram naturam, sed eloquentissimam appellare possum) sentire, visionem sola receptione fieri, nihilque ab oculo ad rem visilem emitti, quod visioni inferuiat, id est, nec radium nec lumen, nec spiritus. Huius opinionis veritas his rationibus *Ratio prima.* stabilienda. Visionis organum aqueum est, aqua autem proprium est recipere. Aqueum esse ita demonstratur. Debet visionis organum esse diaphanum, ut sit inter obiectum, medium & organum, inter agens & patiens quedam analogia: at pellucidorum corporum alia sunt rara, alia densa; rara, species quidem suscipiunt facile, sed non retinent, sic aer specierum est plenus, sed effluunt statim, nec in eo videntur, ob raritatem; quinimò nec in vitro, nec in speculo imagines cernere licet, nisi plumbo aut densiore aliquo corpore retineantur. Utergo visibilium species in oculo retineantur diaphano & denso corpore opus est. Tale autem est aqua, nam ignis & aer diaphana sunt & rara. Ergo visionis organum aqueum est. Sed & principes oculi partes aqueae sunt. Proferam Alexandri nò inelegans argumentum. Quod ab oculis exit aut corporeum est, aut incorporeum: non incorporeum, quia nec exire, nec locum mutare, nec in oculo esse ut in loco, possunt incorporea: non corporeum, quia *Ratio 2. quae Alexandri est.* unico die destrueretur oculus, nec momento ad aethera usque ferretur, cum nullum corpus in instanti moueatur. Adde, quod spirantibus ventis dissiparetur, & daretur corporum penetratio. Quod si aerem huic corpusculo exeunti cedere velis, nunquam fiet visio, quia non fiet radij illius continuatio cum oculo, sed inter radium & oculos sese interponet corpus. Quae autem ab Opicis & Platoniciis allatae sunt rationes, ita ordine diluenda sunt. 1. Aspectu solo fascinationem fieri negamus, nisi arte magica. 2. 3. Basiliensis & menstruata mulier non aspectu insciant, sed quia expirat ab ore, oculis, naribus & uniuerso corpore iter quidam ac venenatus vapor, qui aerem inficit continuatione. 4. Quae de lupis obiciunt, ridicula sunt. 5. Tiberius non oculorum radiis, sed aspectu horrido militem perterrituit. 6. Antiphonta stultum fuisse praedicant, non ergo in oculis, sed in cerebro vitium erat. 7. Pupillam angustamus, ne ab externo lumine interni spiritus dissipentur. 8. Fatigatur videndo oculus ex vi & conatu, quem adhibet facultas ad firmandum oculum. 9. Debet conuerti oculus ad obiectum visile, quia non fit visio nisi per rectam lineam. 10. Non recipitur magnitudo, sed species tantum; quae cum sit immaterialis, tota recipi potest. 11. Dilatatio pupillae spiritus excludit, qui ad receptionem sunt necessarij. 12. Album & nigrum recipiuntur ab oculo simul & semel, quia per speciem tantum intentionalem, immaterialem & incorpoream recipiuntur. Postremo ideo non percipitur acies acus, quia non est proportionatum obiectum, *Ad 13.*

De receptione
quatuor in-
quirantur.
Quid recipi-
tur.

Sole species
recipitur.

Obiectio.

Solutio.

Obiectio.

Solutio.

2. De loco
receptionis.

3. De tempore.

4. De modo
receptionis.

Ex his cuilibet planum & apertum fit visionem non emissionem, sed sola receptione perfici. Huius autem receptionis natura obscurissima est, & multis difficultatibus involucribus implicata. Quae ut omnibus innotescat, quatuor inquirenda sunt: primum quid recipiatur: secundum ubi, id est in qua oculi parte fiat receptio: tertium, quando; postremo, quomodo. Quod ad primum spectat, Democritus & Leucippus recipi corpora existimauerunt: Epicurus obiecti visibiles radios: Alexander imaginem rei non tanquam in subiecto, sed velut in speculo. Nos cum Aristotele species tantum recipi existimamus. Haec autem speciei qualitas est incorporea, immaterialis, indivisa, intentionalem dicunt Philosophi, quae in medio & organo producit ac multiplicatur per simplicem emanationem ut è Sole prodit lumen, ex corpore umbra. Species haec non videtur, sed est id quo videmus, solum obiectum cernitur. Fitque videtur similis esse oculus speculo rerum obiectarum imagines in se recipienti, recipit namque speculum species omnes nihil emittendo, in hoc tamen differt oculus à speculo, quod in speculo nulla est anima vis, quae receptam speciem ad aliud transmittat tanquam ad iudicem. Verum quare hic fortasse quispiam, si species quae recipitur immaterialis est, quomodo afficit visum disgregando aut congregando spiritus? Respondeo, non à specie oculum affici, sed à colore, quatenus magis aut minus est luminosus. Luminosa enim omnia dissipant, quia aerei & lucidissimi spiritus nostri in lucem sibi consocialem abeunt. Sic alba, quia plurimum habent luminis, dissipant; nigra coeunt, quia spiritui adversantur. Sic aduentantibus tenebris reuocatur calor foris intro, & ut docet Galenus commentar. ad Aphorif. 15. sect. 1. hyeme idè somni sunt longissimi, quia noctes longissima. A lucidis ergo & albis leditur visio, & plerumque contingit cecitas, quoniam affecti similitudine quadam visibiles spiritus, tanto impetu erumpunt, ut ex violenta irruptione crystallini, humoris substantiam, aut ragoidem, aut aliud quiddam dirumpi, vel alterari oporteat. Obicitur rursum, si speciei receptio immaterialis est, cur oculus videndo fatigatur, cur melius non vident exerti & prominentes oculi, melius enim recipiunt. Respondeo, fatigari oculum non impressione specierum sed ex vi & conatu quem facultas adhibet ad operandum, ad firmandum oculum & ad contrahendos spiritus. Exerti autem oculi minus vident, quia dissipantur animales spiritus, qui ad videndum sunt necessarij, ut cum externo lumine coniuncti, species ad interiorum sensum transmittant. Secundum caput erat de loco receptionis, in qua scilicet parte specierum fiat receptio. Hic operis pretium est videre dissentientes Medicos & Philosophos. Sunt qui in cerebri substantia recipi velint species, quia ex Galeni doctrina sensus omnis à cerebro. Aristoteles in pupilla, (per pupillam autem crystallinum intelligit Philosophus.) Galenus nunc in crystallino, nunc in tunica aracnoide, quam leniorem & tersiorem esse vult omni speculo. Auenenna in opticorum coitu species recipi vult, & idè obiectum unicui apparere scribit, quia in eo coitu coniungitur visibilibus species. Nos in crystallino recipi species existimamus, quia princeps est & primarius visionis organum, in oculi centro positum, substantia figura & qualitatibus à reliquis particulis differens. Si tamè eos omnes conciliare velis, dicere receptionem in crystallino fieri, refractionem in tunica, perfectionem in coitu opticorum, perceptionem in cerebro. De tempore receptionis, quod tertium erat inquirendum, consentiunt omnes simul, fieri visionem cum specierum perceptione: percipitur autem in instanti species, nam celum confertim videtur, quia lux educens visibiles species, ipsa sese diffundit, easque simul per aerem transuectas in eius extremam superficiem, à qua palpebra contingitur, statuit, aperta palpebra species pupilla offertur, etque coniungitur minimo temporis momento. Postremo visionis modum eiusmodi est. Fit visio receptione sensibilibus specierum, non corporum. Haec species licet materie conditionem redolant, non tamen materialiter & tanquam corpora, sed velut vestigia corporum ab obiecto aspectabili ad pupillam per aerem medium lineis rectis ad angulum acutum producta feruntur. Plura

de visionis modo lege apud Alexandrum & Simonem Simonium Medicum & Philosophum eximium, comment. in lib. Aristotelis De sensu & sensili.

An aliquid intra oculum videri possit; & an per propriam speciem aut alienam: vbi de suffusionis & visorum natura quedam explicantur.

QVÆSTIO II.



NE quid ad perfectam visionis naturam desiderari possit, duo breuiter explicanda sunt. Primum, an intra oculum videri quidpiam possit: deinde, an quod videtur per propriam speciem videatur, an per alienam. Nihil intra oculum videri ita demonstrari potest. Scribit Aristoteles 2. De anima, sensile positum supra sensorium sensationem non facere.

Præterea si aliquid videretur, sequeretur idem esse instrumentum & obiectum. Quinetiā ad visionem tria requiri docet Philosophus, obiectum, medium & instrumentum. Postremò visio fit per receptionem specierum, quæ producuntur & multiplicantur in aëre: at si aliquid intra oculum cerneretur, non fieret visio per speciem, sed per obiectum reale. Adde quod vicia, quæ variè est colorata, cerneretur: at non videretur: nil ergo intra oculum videri potest. Contra videri aliquid & auctoritate & experientia suadetur. Auctoritas est Aristotelis cap. 2. libro De sensu & sensili, & 4. Meteor. quibus locis scribit videri aliquid intra oculum dum torquetur & mouetur in tenebris. Auctoritas experientiæ confirmatur: nam in imaginationibus quæ suffusiones præcedere solent, figura, magnitudo, situs & colores varij cernuntur, quæ omnia intra oculum sunt, non in aëre, quia ab omnibus æquè perciperentur, & iamiam futura hæmorrhagia critica marmariges ante oculos obuersantur. Hæc autem ut illustriora euadant, de visorum seu imaginationum natura pauca quedam hic annotare placet. Visorum apud Galenum 4. De locis affect. quedam sunt delirantium, propter idolorum vagum & incertum motum: sic phrenitici muscas venantur, floccos carpunt, festucas auellunt, à falsis imaginibus terrentur & exsiliunt: visa hæc non oculi, sed cerebri & imaginationis symptomata sunt. Sunt visa quedam oculorum & sentientis facultatis externæ propria, quando intuenti sese offerunt imaginationes falsæ; & ut scribit Auicenna, apparent in aere corpuscula & permixti colores varij, qui tamen nõ sunt. Visum hoc barbaris imaginatio dicitur. Definitur autem à Galeno apparatus externa propter opacum vaporem interpositum crystalloidi & corneæ. Symptoma est deprauatæ visionis, apparent enim externa colorata quæ non sunt, & iudicat oculus extra esse quod intus est. Causam huius symptomatis agnoscunt omnes vaporem opacum, qui inter corneam & crystallinum se interponit: opacum dixi, id est, ut vocant Barbari, non peruium, non diaphanum, & splendens. Nam si interiectum illud corpusculum diaphanum esset, visa hæc non obuersarentur, sed visibilium species puræ & impermixtæ ad crystallinum ferrentur. Locus autem vaporis aut corpusculi est spatium totum à corneæ ad crystallinoidem: neque enim si inter crystallinum & coitum opticorum contineatur vapor, imaginationem faciet, cum omnis specierum receptio in solo fiat crystallino; sed si forè vitreo permisceatur vapor, qui luminis interni appulsus prohibeat, videndi actionem minuet tantum aut extinguet omnino. Constat igitur in suffusionum principiis, in hæmorrhagia critica, in peripneumonia, in vertigine, in nausea & vomitu, & culices, & muscas, & marmariges ante oculos obuersari; quæ omnia in aëre externo non sunt; viderentur enim ab omnibus, sed intra oculum continentur. Nos de proposita questione hoc statuimus, videri posse intra oculum quidpiam, quia obiectum adest, corpusculum quippe interiectum, medium diaphanum aqueus humor, & organum princeps visionis, crystallinus humor, sed visionem eam imperfectam esse volu-

Aut aliquid videtur intra oculum. Ratio 1.

Secunda. Tertia.

Quarta.

Quinta.

Videri aliquid intra oculum.

Auctoritas.

Experientia.

De visis seu imaginationibus.

Visorum duo genera.

Visa cerebri vicia.

Visa oculorum propria.

Quid visus.

Causa visoria.

Locus vaporis.

Quid statuimus nos.

mus. Rationes autem in contrarium allate & Aristotelis auctoritates de perfecta visione intelligi debent. Obscurior altera exsurgit questio, an quod intra oculum est, tam in aere externo videatur esse, per propriam speciem, an per alienam conspiciatur. Dico per alienam videri, neque enim vapor contentus inter corneam & crystalloidem videtur sub specie vaporis, sed sub aliena specie in aere contenta: hac tamen aliena species, dum recipitur in oculo, sequitur naturam, colorem, magnitudinem & figuram vaporis in oculo existentis. Sic si internus vapor caeruleus sit, aut flavus, flavam & caeruleam speciem externi obiecti, ut parietis aut libri crystallino representat: si diffusus & parvus sit vapor, apparent velut volantes muscae: si in longum protensus, pili. Quod si per propriam speciem cerneretur quod intra oculum est, visus interior varie colorata videretur. Vnicus superest eximendus scrupulus, cur quod intra oculum est, externum apparet? Dico crystallinum humorem, externa assuetum visioni, quaecunque intus sunt extra iudicare.

An visionis organum igneum sit, vel aqueum. QVÆSTIO III.



De oculorum natura certant Platonici & Peripatetici. Plato in Timæo, quia visionem putat fieri luminis emissionem; oculum vult esse naturæ igneæ. Sunt, inquit, oculi participes ignis illius, qui non urit, sed illuminando suaviter diem inuehit mudo. Est autem apud Platonicos ignis triplex, lucens & urens, lucens non urens, urens non lucens. Platonis sententiam sequutus videtur Galenus 10. De usu partium, & 7. De placitis Hippocratis & Platonis: Oculum enim organum appellat lucidum, & solarem animalis partem. Platoniorum rationes sunt eiusmodi: Quorundam animalium oculi noctu coruscant, ut nocturnarum, & felium. Quibusdam ira flagrantibus ardent oculi. Quinetiam dum torquetur oculus, ignis & fulgoris speciem prodiit & in tenebris fricatus oculus micat. Scribit Aristoteles Antiphonti propriam effigiem perpetuo obuersari solitam. De Tiberio Cæsare multa narrat Plinius 11. naturalis historia. Galenus 7. De placit. Hip. & Plat. memorat accidisse cuidam per multas noctes ante cecitatis infelicitatem, ut copiosum lumen ab oculis exeuntem viderit. Præterea igneos esse oculos hæc demonstrant, quia agiles sunt & mobiles valde, mobilitas autem à calore. Pellucidi sunt, figuræ pyramidalis, maxime spirituales: quia in instanti operantur. Adde quod nobilissimo sensorio nobilissimum debeatur elementum, eiusmodi autem est ignis. Quinetiam tales sunt sensus, quales sunt res ipsi subiectæ: at color igneæ est natura; definit enim Plato colorem flammam à singulis corporibus manantem. Postremo nunquam rigent oculi, ut cæteræ partes: ignei ergo sunt. Aristoteles contra & Peripatetici omnes oculum aqueum esse contendunt: legite quæ contra Platonicos scripsit idem Aristoteles libro De sensu & sensibili. Nos postremo huic sententiæ assentimur potius. Hoc voluit diuinus Hippocrat. libello De locis in homine, nisi ὁ ὕψις (inquit) τοῦ δὲ τοῦ ἐν ὕψι φάλα ὕγρῳ ψέφεται: id est, visus à cerebri humido alitur. Hoc ipsum sensu Democritus, ut refert Aristot. libro De sensu. Hoc denique conuincit anatome, & tota oculi compositio. Nam princeps oculi pars, quæ primò visionem edit, tota est glacialis, eadem vitreo humori immergitur, & anteriore parte humorem habet aqueum propagaculi instar. Quod si ledatur, aut vulneretur oculus, quicquid ab eo effluit aqueum est. Sunt qui Aristotelem Platoni ita conciliare student, ut dicant in oculo duo spectari quæ visionem edant, spiritum visilem lucidissimum, à cerebro per nervos opticos influentem, & crystallinum humorem: ratione spiritus ac luminis interni, nec non obiecti luminosi igneum esse oculum volantem: aqueum verò ratione crystallini. Verum admittenda non videtur talis distinctio: ita enim sensorium omne igneum esset, quia habent omnia sensuum organa suos spiritus animales eiusdem

An quod intra oculum cernitur, per propriam speciem videatur. Solutio.

Cur quod internum est apparet. Solutio.

Plato igneum esse vult. Ignis triplex.

Rationes Platoniorum. Prima. Secunda. Tertia. Quarta. Quinta.

Sexta.

Septima. Octaua.

Nona.

Decima. Aristotelis contraria opinio, aqueum esse oculum. Hippoc. auctoritas.

Rationes.

Corporum Aristotelem cum Platone conciliat.

Improbatur.

eiusdem naturæ, tenuitatis & fulgoris: Non enim animalis spiritus variae sunt species, ut alij ad visum, alij ad auditum sine destinati. Praestat igitur cum Aristotele & veritate ipsa, simpliciter affirmare visionis organum aequum esse. Quæ autem pro Platonis afferri solent, nullius plane momenti sunt. Lucent oculi & sape emicat ab illis splendor, non ratione ignis, sed ob pelluciditatem, planitiem & levitatem crystallini ac tunicarum: quæcunque enim leuia sunt & tersa, micant eadem in tenebris, ut cornu. Accedit quod externum lumen, receptum à crystallino non statim evanescit. Mobiles sunt oculi, & propterea faciles à Poëta dicti, non ab igne, sed tum ab humido copiosissimo & lubrico, tum à spiritibus, tum à musculis sex validissimis, quibus facile est per exiguum membrum mouere. Spirituales dicuntur oculi ratione actionis; agunt enim in instanti; quia species recipiunt incorporeas & immateriales per totum aërem productas, & pupilla perpetuò obuersantes. Non rigent oculi, non quia ignei, sed ut docet Aristoteles in Problematis, quia adipe copioso circumfusi; qui licet efficientem causam agnoscat caloris imbecillitatem, auget tamen calorem reflexione, & suo lentore aëris percutientis ingressum prohibet. Accedit spirituum animalium copia & perpetuus oculorum motus.

Salmatur
Plurim.
rationes.

Cur luccet
oculi.

Cur mobiles.

Cur spirituales
dicti.

Cur uirgiti.

Cur oculi variè sint colorati.

QVÆSTIO IIII.



SCRIBIT Aristoteles 2. De anima, αἰσθητικὸν ὅλον ἀπορίον, id est, omnis qualitatis expertus esse debere, ne eiusdem qualitatis omnia sentiantur. Oculi visionis organa sunt, non debent igitur esse colorati, aliqui eiusdem coloris omnia apparebunt. Sic ophthalmicis & hypophagmate laborantibus rubra omnia apparent, ictericis, quorum oculi flaua bile suffusi sunt, flaua omnia videntur. Contra coloratos esse oculos, oculus ipse indicat; quorundam enim glauci sunt, multorum nigri, aliorum caerulei, virides, &c. Dicamus ex Aristotelis doctrina coloris nomen aliàs latius, nonnunquam strictius vsurpari: fusa & ampla significatione colorata dicuntur omnia, quæ sunt aspectabilia. Sic diaphana, licet sint interminata, colorata sunt; aërem appellat Aristoteles libro De coloribus, album, ignem rubrum. Est pressior altera coloris acceptio, quæ definitur color extremitas corporis pellucidi terminati. Prima significatione totus oculus coloratus est, omnes eius partes colorata, quia aspectabiles: posteriore sola coniunctiua & vna verè sunt colorata, adnata enim alba est, vna varicolor, nigra, caerulea, viridis, ut dissipatos spiritus recolligat, luminis externi splendorem refringat, & eo colore velut speculo, recreetur crystallinus humor Princeps autem visionis pars, quæ visilium species recipit & à coloribus alteratur, colorata non est, sed lucida tantum. At lumen & perspicuitas naturæ sunt communes omni species visibili obiectorum perceptionem iuuant. Observauit Aristoteles cap. 1. libri 5. De generatione animalium, quod etiam repetit Plinius natur. historia lib. 11. cap. 37. in homine solo oculos numerosissime esse varietatis, diuersique coloris, cæteris verò animantibus in sua specie perpetuò similis. Sic bouum omnium nigri, ouium aquini, aliorum rufi, excepto equo, cuius oculi interdum glauci, at homini versicolores. Colorum autem oculi quidam sunt extremi, quidam medij. Extremi apud Aristotelem, Galenum, Auicennam duo sunt, caesus & niger. Caesus aliquantulum est subalbus, & Aristoteles 5. De generat. animal. & Gal. cap. 27. Artis parua, caesum colorem videntur nigro opponere. Caesum Græci γλαυκὸν appellant, à νοῦτα, quæ γλαυξ dicitur, cuius oculi cum albedine virentes fulgent. Sunt qui γλαυκὸν καὶ χαρποδὸν confundant, cum tamen inter se distinguantur: nam etsi uterque color ad viridem tendat, γλαυκὸς ad album magis accedit, χαρποδὸς ad rufum. Aristoteles in oculorum physiognomia glaucum

Coloris acce-
ptus duplex.

Quomodo ocu-
lus coloratus
dici debeat.

Colorum oculi
differre.
Quid glaucus
color.

Quid χαρποδὸς.

timidi fuluum audacis animi signum docet; propterea leonum & aquilarum oculi proprie χαρποτολ dicuntur, senum vero & puerorum glauci. Vterque color fulget, sed glauci oculi fulgor est candoris, qualis in piscium squammis; fuluis splendor igneus, qualis in candentibus prunis. Intermedij oculorum colores varij sunt pro varia extremorum permissione. De horum colorum causis varij varia sentiunt. Empedocles oculum ex igne & aqua componebat: itaque ex ignis praeominio glaucum colorem; aqua vero exuperante nigrum fieri existimabat. Aristoteles 5. De generatione animalium, varietatis colorum causam refert ad humorum copiam & paucitatem; quod aeris & aque illustrat exemplo: si enim profundiorum aquam aut multum aera inspiciamus, utrumque nigrum & obscurum videbitur: si alterutrum paucum, caesus & splendens color apparebit. Itaque niger oculus à copia est humorum, glaucus à paucitate. Auerrhoes albedinem oculi à frigiditate fieri putat, quod alba ferè omnia frigida sint, ut cerebrum, adeps, medulla, ossa, membrana, nigredinem vero à caliditate. Galenus c. 27. Artis parua, colorum causam refert ad copiam splendorem & situm crystallini & aquei. Glaucus, inquit, oculus fit vel propter copiam, vel propter splendorem crystallini, aut propter situm prominentem, nec non tenuis & aquei humoris paucitatem ac puritatem. Niger vero oculus fit aut ob paruitatem crystalloidis, aut profundiorum eius situm, vel quia splendidus exquisitus non est, aut quia copiosior est aqueus humor, nec satis purus. Hæc Galenus. Auicenna varietatis colorum causam refert ad vneam tunicam, quæ ut variè colorata est, ita varios in oculo profert colores, nigra nigros, cerulea ceruleos, quem sequutus est Vesalius. Nos ut grauissimorum virorum dissensientes de oculorum coloribus sententias conciliemus, varietatis huius causas tres agnoscimus, humores, tunicas & spiritus. Humores oculi tres sunt, albugineus, crystallinus, vitreus. Postremus hic, quia videri nequit, & in posteriore oculi parte situs est, nihil aut certè parum admodum ad colorum varietatem confert; reliquis ergo glaciali & aqueo tota vis immutandi relinquitur. In his humoribus tria spectanda sunt, substantia, qualitas & situs. Substantie nomine puritatem aut impuritatem, splendorem, opacitatem, tenuitatem, crassitatem intellige quantitas copiam aut paucitatem humoris denotat: situs aut profundior est, aut magis prominens. Glauco itaque & albi coloris in oculo ex parte crystallini humoris, causa tres sunt, copia crystallinoidis, puritas seu splendor eiusdem, & situs prominens. Ita enim glacialis proprio & vernaculo fulgore albugineum & totum oculum illustrat. Ex parte albuginei due sunt glaucedinis causa, splendor & paucitas; paucus enim & purus humor aqueus, glacialis fulgorem minus impedit. Nigredinis contraria sunt causa: ex parte quidem crystallini paucitas, impuritas & profundior situs: ex parte aquei, impuritas & copia. Sed nobis fortasse aduersari videbitur, quod scripsit Aristoteles Probl. 14. sect. 14. Æthiopes nigros habere oculos, septentrionales albos: at in illis minor est aquei humoris copia, ob aeris ambientis calorem omnia siccantem, in his maior. Respondet, Æthiopum nigros esse oculos, ob paucitatem spirituum visibilibus, resoluuntur enim & dissipantur à calido, quo spirituum lumine deficiente obumbratus apparet oculus. Aquilonares vero spiritibus multis abundant. Intermedij colores à causis intermediis pendunt. Secunda varietatis colorum in oculo causa ad tunicam p̄ α γοειδῆ, id est, vneam, referri potest. Hæc enim sola quia variè est colorata, variegatum oculum profert. Sic in oculi circulo, iridem vocant, diuersi apparent colores, quia ea parte variè colorata est vneæ. Postremo ad varietatem colorum conferre aliquid visibiles spiritus existimamus: tenues enim puri, splendidi, copiosissimi, glaucedinis: crassi, impuri, caliginosi, pauci, nigredinis causa esse possunt. Esse autem in oculis spiritus hæc indicant, quod viuente animali oculus vehementer tensus, nec ulla eius pars laxa corrugataque cernitur, & eorum altero clauso alterius pupilla momènto dilatur,

Causæ varietatis colorum.
Empedocles.
Aristoteles.
Exemplum.

Auerrhoes.

Galeni opinio.

Auicenna opinio.

Nos varietatis colorum causas tres statuimus.
Prima causa ad humores referenda.
In humoribus tria spectanda.

Nigredinis causa.

Obiectum.

Responsio.

Secunda causa varietatis colorum.

Tertia causa.

copiosiore scilicet spiritu per reticularum in vnam illapso, quod denique oculi interdum languidi & obscuri appareant, interdum alacres & splendidi.

De musculis oculorum & eorum motu.

QUESTIO V.

CVLII cum sint velut speculatores interdiu nocturne nobis excubantes, in omnem partem moueri debuerunt, ut aspectu quocunque vel-
 lent facile conuerterent. Motioni huic inserviunt neruus secundæ con-
 iugationis & musculus sex; quorum primus attollit, secundus deprimit,
 tertius adducit, quartus abducit, & duo circumagunt. Omnibus vero
 simul operantibus & villos intenduntibus sistitur ac firmatur oculus:
 non autem (ut voluit Galenus, eumque sequenti Anatomici fere omnes) à septimo musculo
 neruum opticum ambiente firmatur, quia in quadrupedibus tantum, quæ prona terram spe-
 ctant, reperitur hic musculus, ne oculus exorbitet; in homine nunquam. Motum hunc, quo
 firmatur oculus, tonicum vocant Medici, qui duplex est, alter κατὰ φύσιν, dum æqua-
 liter musculorum omnium fibra intenduntur, ut videantur etiam in quiete agere muscoli:
 alter ὑπὸ φύσιν, dum fixi omnino manent & immobiles oculi inuitis nobis: πῆξιν vocat
 Hippoc. ἀκίνησιν & ἰσχύσιν libro De victus ratione in acutis. Contingit autem con-
 stantia hæc resoluta, imbecilla & extincta facultate musculorum, qui oculos movent, aut
 quia hi æqualiter in sua capita contenduntur, ἰσχύσιν ἰσθρὸν vocant, quæ affectio
 contraria est ἰππῶν, in qua instabiles & incontinentes oculi perpetuo moventur & vacil-
 lant, quasi contremiscent. Hos oculos ἐκταραμένους videtur appellasse Hippocrates:
 ἀσθένειους καὶ κινημένους διαταρατὸς. Sex ergo tantum sunt oculorum muscoli, non se-
 ptem: ex quibus quatuor motibus rectis præfixi sunt, duo oblique circumagunt. Ita con-
 ciliari poterunt dissidentes Galeni loci: nam 10. De vsu partium, quatuor tantum vult
 esse oculorum motus: quarto autem De locis affectis, sex oculorum motus statuit. De horum
 musculorum exortu non conuenit inter Anatomicos. Sunt qui ab interiore meninge eaque
 dura musculos omnes enasci putent. Nos quatuor rectos cum obliquo trochleatore ab interio-
 re orbita, quam sphænoïdes portiuacula constituit prodire volumus, experientia & αὐτο-
 ψία ipsa edocti. A membrana autem nec debuerunt, nec potuerunt nasci: non debuerunt,
 quia membrana exquisitissimi sensus neruum opticum circumdat: itaque muscoli in moti-
 bus suis neruum comprimerent & visioni obessent. Non potuerunt, quia firma non adhe-
 rerent basi.

Motus u-
gana.

De motu oculorum soluuntur problemata duo, eaque obscurissima.

QUESTIO VI.

DE oculorum motu problema excutiamus obscurissimum, & ἀνεπίγνωτον. Frab. 1.
 huic (quod sciam) planè enodatum. Cur oculi, cum musculos distinctos ha-
 beant seorsim, ac diuersis motibus non moventur, sed simul & sen-
 unico & eodem motu semper feruntur. Neque enim fieri potest ut dexter
 moveatur oculus immoto sinistro, nec potest dexter attolli depresso sinis-
 tro, quod nulli alij parti concessum est. Nam liberum est mihi brachium
 dextrum mouere sursum, & sinistram deprimere eodem momento. Proponit quæstionem hæc
 Aristoteles sect. 31. Problem. quam ita conatur soluere: Licet (ait) duplex sit oculus, est tamen
 unicum motus principium & eadem origo in coitu scilicet opticorum. Refert ergo causam
 in coitum opticorum. Idem sentire videtur princeps Arabum Auienna, & Galenus li-

Frab. 1.

Cur oculi si-
mul moventur
eodem motu.

solutio Ari-
stotelis.

Non probatur
Aristotelis
responsum.
Rationes no-
stra.

bris De usu partium, idè coire opticos putat, ne unum visile duplex appareat. Probabilia quidem hæc sunt, sed nobis non faciunt satis. Nam, opticorum coitus nihil ad oculi motum videt tantum opticus, & visiles ad crystalloidem desert spiritus, nec in oculi musculos infertur. Sola est secunda coniugatio quæ oculos mouet. In oppilatione nervi optici & eo affectu quem guttam serenam vocant Arabes, perit omnino videndi actio, ille so tamen oculorum motus; nihil ergo ad oculorum motum opticorum coitus prodest. Obseruauerunt quidam plerisque hominibus toto vite tempore de visu nunquam conquesti, ita conformatos fuisse opticos, ut omnino disuncti nunquam coierint. Absurdum est itaque existimare eodem motu moueri oculos; quia idem & unicum est motus principium in coitu opticorum, cum

Veraproble-
matis solutio.

nec coitus ille, nec opticus quicquam ad motum conferat, sed ad sensum tantum. Nos huius motus causam duplicem agnoscimus. finalem & instrumentariam. Finalis causat est sensus perfectio. Est autem sensus perfectio hæc, ut tale obiectum appareat quale est: at si diuersis motibus mouerentur oculi, ita ut alter sursum, alter deorsum ferri posset, sine dubio obiectum omne, quod unicum & simplex natura sua est, duplex perpetuo appareret. Itaque falleretur sensus omnium nobilissimus, & imperfecta esset videndi actio. Hoc si non credas, ita experiare. Si digito alterutrum oculum attollas aut deprimas, videbis obiecta omnia geminari, eorumque alterum elatius, alterum depressius intuebere, quia oculorum alter sursum, alter deorsum mouetur. Quod si alterutrum præcludas, euanescent gemina obiectorum apparitio, quantumuis oculum digito premas; quod si oculum dextrorsum vel sinistrorsum moueas, non apparebit obiectum duplex, quia in eadem sunt linea pupilla.

Quæstio.

Solutio.

Cur autem contingat ex diuerso oculorum motu geminari obiecta, inquisitione dignum est. Scribit Galenus cap. 13. lib. 10. De usu partium, visoriorum conorum axes in vno eodemque plano locari debere, ne quod vnum est, duplex appareat. At si oculorum alter deorsum moueatur, non erunt in eodem plano atque in eadem superficie oculorum papille: apparebit itaque obiectum duplex. Tunc enim quia non æquè radius vnus rem attingit, ut nec radius alterius, sensus quod bis percipit, tanquam duo se percipere censeat. Quod accidit etiam in tactu: nam si digitus vnus alteri ita implicatus superponatur, ut lapillum cum eo tangat, quod unicum est, tactus duo esse indicat. In paralyti & conuulsione musculorum oculi, sæpe contingit geminata obuersari obiecta, quia oculi ab vna secedunt superficie. Relaxatis item vel conuulsis opticis pupilla aquabilitatem non sustinet, vnde fit ut dupla omnia appareant sic ebriis interdum duplex apparet obiectum. Strabonibus geminata videtur omnia, quia pupillarum altera vel surrigitur altius, vel deprimitur. Quod si in eodem sint plano oculi licet duo sint, unicum tamen eis obuersabitur visile, quia eodem tempore species, & eadem magnitudo ab utroque oculo capiuntur, & sensui communi vna offeruntur, qui non nisi præsentia sensilia discernit. Concludamus ergo ratione primum finis (qui ut sæpe ex Aristotele inculcavimus, prima & præcipua causa est in operibus Naturæ) factu esse, ut oculi duo simul & semel moueantur, ad visus quippe perfectionem. Ad finalem causam, quam siue usum siue necessitatem vocas, nihil interest, natura instrumenta solet adaptare. Itaque nervos secundæ coniugationis, qui motus imperium & animale spiritum in musculos deferunt, idèoque latores dicuntur, ita construxit, ut in exortu continui sint, unicum finem constituentes, unde fit ut dexter moueri non possit, quin alter illius motum sequatur. Est autem hæc observatio noua & pulcherrima. Alterum problema ex Cassio veniamus, cur alterius tantum oculi affectus magis irritat? An, quia quum alter oculorum sanus secundam naturam se habeat, idèoque variis agitetur motibus, cum eo simul mouetur ager hinc fit, ut ægrum oculum concors motus exasperet: affectum siquidem membrum ex usu est imprimis quiescere. Sin uterque simul laboret, tolerabilis fit malum, simul enim quietem agunt ambo: itaque è quiete velocior succedit sanitatis adeptio.

Problemata 2.
cur alterius
tantum oculi
affectus ma-
gis irritat.

Solutio.



HUMORES oculi tres sunt, crystallinus, albugineus & vitreus. Crystallinum princeps esse visionis organum docet Galenus 2. Methodi, lib. De instrum. odoratus, 8. & 10. De usu partium, primo De causis symptom. & hæc inter cetera testantur, quod omnium sit maximè pellucidus, in medio oculi situs, quod solus spectra & imagines visuum excipiat, solus à coloribus alteretur, & in eo utriusque luminis interni & externi concursus fiat: propterea per suffusiones & opticorum obstructiones cum utriusque luminis ad crystallinum appulsus prohibeatur, perit videndi actio, quasi lucerna interstinctæ. De crystallino humore tria queri possunt; primum, an sit pars; deinde, an similis vel organica; postremo, an videndi actionem edat per suam temperiem, an per conformationem. Partem esse corporis animatam & viventem, auctoritate & rationibus demonstrari potest. Galenus cap. 6. lib. 1. Method. crystallinum inter partes numerat, ut etiam primo De symptomatum causis. Id suadet ratio, videndi enim actio est primariò, actiones autem partium sunt, nutritur & vivit, & cum ceteris partibus in utero generatur, circumscriptionem habet propriam; denique corpus est toti coherens, communi vita coniunctum, ad illius functionem & summe comparatum. Utrum autem similis sit pars, vel organica disceptatur. Similarem non esse contendunt quidam; quia nec os est nec cartilago, nec vinculum, nec membrana, nec vlla ex iisdecem, quas lib. De inæquali intemp. De elementis, & De tem. describit Galenus. Contra similis esse demonstratur cap. 6. libri 1. Meth. Similares, inquit, partes dicuntur, quæ in similes sibi partes secantur, ut in oculo crystallinus & vitreus; & alibi in quolibet organo perfectò, partem vult esse similem, quæ princeps sit actionis causæ, ut in oculo glacialis. Organicam verò partem esse indicat situs in medio humorum, figura lenticularis & magnitudo, quæ tria de essentia sunt organi. Dico simile & organicum non opponi; nihil itaque interest crystallinum & similem & organicam partem dicere: similis est ratione substantiæ & temperamenti, quia totus aqueus, pellucidus & sibi similis; organicus ratione figuræ. Unde affectum crystallini à Galeno 1. De sympt. causis, alij statuuntur similes, ut intemperies sicca, quæ glaucoma, & humida, quæ vixla & λωπία facit; alij organici, dimotio à situ sursum, deorsum, ad latera, intus, extra, magnitudo, parvitas & solutio continui. Dum Galenus decem tantum statuit partes similes, communes tantum intelligit, quæ ferè in uniuerso corpore reperiuntur: nam & medulla cerebri & dorsalis, & humores oculi partes sunt, quæ tamen ad illas referri nequeunt. Utrum verò visionem edat crystallinus, quatenus similis pars, an quatenus organica, id est, an ratione temperiei, an figuræ, altioris est contemplationis: videtur tamen Galenus cap. 6. lib. 1. Meth. ad temperiem referre. Crystallinus, inquit, princeps visionis est organum, quia alteratur à coloribus; alteratur, quia parum & pellucidum; parum autem & pellucidum est à temperamento. Magnitudo, unitas, lenticularis figura, situs in humorum medio non sunt quidem frustra, sed eundem usum visioni præstant, quem humores reliqui & membrana, id est, perfectionem visionem reddunt. Constat itaque crystallinum humorem partem esse. De vitreo & albugineo magis ambigitur: illum enim crystallini alimentum, hunc glacialis excrementum esse veteres omnes existimauerunt. Galenus cap. 1. lib. 10. De usu partium, vitreum humorem crystallino in alimentum cedere ita scribit: Humori crystallino, qui albus est, perspicuus ac splens, nutrirî quidem ex ipso sanguine planè non licebat, ut qui multum qualitatibus ab eo diffideret, sed alimentum quoddam familiarius postulabat, atque nimirum ei obtigit, comparatumque à natura fuit alimentum accommodatum humor vitreus, qui quantò crassior est sanguine, atque albus magis, tantò à crystallino humore hu-

Crystallinum princeps esse visum organum.

Crystallinum partem esse. Auctoritas.

Ratio.

An sit similis pars, vel organica crystallini.

Solutio.

An per temperiem vel conformationem suam actionem edat crystallinus.

An vitreus humor pars sit.

miditate atque albedine relinquitur. Si vitreo alitur crystallinus, non erit vitreus humor pars animata, quia pars nulla alteram nutrit. Galenus tamen cap. 6. libr. 1. Meth. vitreum humorem in simularium catalogum recenset: & cap. 1. lib. 10. De usu part. nutriti vult per διαπνδν in à tunica illum ambiente. Si nutritur, ergo pars est: Nos vitreū humorem non minus quàm glaciale partem esse oculi animatam existimamus: circumscriptionem enim habet propriam, generatur in viro ex purissima seminis portione, augetur cum ceteris partibus, alitur sanguine, & venulas accipit à ciliari interstitio, tunica tegitur propria, & semel effusus nunquam refarcitur. Qui vitreo crystallinum ali dicunt, improprie loquuntur: preparat quidem crystallino sanguinem, quem immutat, ne colore rubro & venulis inficeretur glacialis, quem omnis coloris expertem esse decebat, non tamen vitrei humoris substantia in glaciale unquam facescit elique assimilatur. Ita, inquit Galenus libello De oculis, se habet vitreus ad crystallinum, ut ventriculus ad hepar: at hepatis cibum preparat & subministrat ventriculus, tanquam famulus, ita & crystallino vitreus. Albogineum humorem putat Auicenna excrementum esse glacialis, propterea pariem negat: ad de, quod fluitat ut sanguis, & circumscriptionem propriam non habet. Nos pariem esse dicimus, quod eadem seruet perpetuo dotes figure, puritatis, quantitatis: quod usum visioni præstet, est enim crystallini propugnaculum, & instar ocularium, simulachra ad crystallinum deferret, propterea Aristoteli delator imaginum dicitur, quod si effluerit, refarciri vix potest, & visionem extinguit omnino: quæ dotes excrementis non conueniunt. Quinetiam crystallini excrementum non esse id indicat, quod inter hos duos humores intercedat tunica arachnoides. Atque fluitare & deerrare sanguinis instar, totique non coherere. Respondeo, extra oculum fluitare quidem, in oculo vero minime, neque enim locum mutat, sed certa sede perpetuo continetur.

Quomodo intelligendum sit vitres di crystallinum.

Albogineus vere pars est. Auicenna refellitur.

De opticorum exortu, coitu & insertione. QVÆSTIO VIII.



ERVVM opticum dignitate, usu, necessitate crystallino humori non cedere existimant quidam. In hoc visiliū species & simulachra recipi voluit Auicenna. Nos cum Galeno crystallinum princeps visionis organum esse docuimus, opticum verò solius facultatis & luminis interni spiritus quippe visilis delatorem esse. Ut autem optici historia omnibus innotescat, quatuor omnino de eo inquirenda, quis eius exortus, quæ insertio,

De opticorum quomodo coëat, & an sit cauus. De exortu multiplex est opinio. Putat Auicenna ab anterioribus cerebri ventriculis oriri, alij à medio cerebro, quidam à cerebello. Nos obseruauimus ab inferiore & posteriore cerebri parte, prope spinalis medulle exortum, imò, ut iam notauimus, ex spinalis medulle portione quæ calua tegitur, nervos oriri duos omnium amplissimos & mollissimos. Non potuerunt ab anterioribus ventriculis prodire, quia aderant ibi mammillares processus, nec à media cerebri basi, erat enim hic locus cerebro expurgando dicatus, nec denique à cerebello, quia visus nervum postulat inollissimum: at cerebellum durius est nec ita cādicat: ergo ab inferiore & posteriore cerebri parte oriuntur optici, utrinque unus, qui oblique protensi & separati in medio ferè progressu coeunt. De coitu hæc duo quærisolent quomodo coeant, & cur. Modus coitus non omnibus fuit cognitus. Voluerunt veteres ferè omnes Medici opticos in eo contactu sese ad crucis modum interfecare (quæ intersectio χααµµός dicitur) & dextrum nervum ad sinistrum ferri oculum: sinistrum ad dextrum. Alij non sese interfecare volunt, sed oblique tantum tangere. Nos paulo accuratius solertiūque coitus rationem inspectantes, misceri & confundi in medio utriusque nervi medullam existimamus; si enim contigui tantum essent nervi, non

Opinio vera.

De coitu opticorum.

Opinio vera.

confusi permistisque, non dilataretur momentò unius oculi pupilla clauso altero. *Cocunt*, *Cocunt* *optici* *Parto 1.*
 itaque optici, & ita in medio permiscetur itinere, ut alterum ab altero nulla arte fecernere
 queas. Hæc coitus ratio est: nunc finalem eius causam scrutari placet, id est, cur coire debue-
 runt optici. Primum coire oportuit opticos ad robur, ut scilicet eo amplexu nihil paterentur
 in longo via tractu. Erant enim omnium mollissimi, & longum iter perperantes flacce-
 rent, rectaque ad utranque pupillam non ferrentur, nisi in medio progressu unirentur. Sic
 solet natura que molliora sunt & infirmiora mediis quasi internodiis stabilire, ut in rectis
 abdominis musculis apparet. Secundo, coire oportuit opticos, ut eandem planitiem & super- *Secunda.*
 ficiem in pupilla observarent, nisi enim alicubi coirent, secederent aliquando ab una planitie:
 ita delusi oculi obiectum simplex duplum iudicarent. Debent namque, ut iam exposuimus
 ex Galeni doctrina capite 13. libri 10. De usu partium, visoriorum conorum axes in uno
 eodémque plano collocari, ne obiectum, quod unicum & simplex est, duplex appareat. Ga-
 lenus cap. 14. libri 10. De usu partium, tertiam huius coitus causam agnoscit, ut visilium *Tertia.*
 forma & spectra unirentur: licet enim per duo ferantur organa species, simplices tamen,
 non duplices apparent. Hoc voluit etiam Aristoteles sectione 3. 1. Problematum, ubi querit
 cur oculi simul & semel moveantur. Quia, inquit, unicum habent principium motus coitum scilicet
 optidorum. Idem sentit Avicenna. Ego tamen hanc coitus causam non valde probò: nam
 scribit Vesalius se in iuvene quodam observasse opticos nervos nulla parte cocuntes, qui to-
 to vite tempore de visionis depravatione nunquam fuerat conquestus. Scribit Aristoteles
 secundo De anima, & 4. Metaphys. sensus circa obiecta propria nunquam decipi. Quid
 ergo hac coniunctione est opus? Adde, quod si ex eo nervorum coitu id assequimur, ut utrius-
 que oculi species & forme uniantur, cur, que multa simul conspiciuntur, unum non appa-
 rent? Quætiã licet gemina sint nares & aures, obiectum tamen multiplex non apparet.
 Non ergo quia cocunt optici, obiectum simplex appareret, sed quia oculorum pupille in eodem
 sunt plano, & in rem visilem eodem momento feruntur. Quarto, coire opticos voluerunt *Quarta.*
 quidam, ut commodè per foramen è calvaria prociderent, & ad oculos rectà ferri possent.
 Postremò, coire voluit Galenus cap. 14. lib. 10. De usu partium, ut visilis spiritus ab al-
 tero oculo in alterum momentò permearet ad visus perfectionem: ita enim clauso alterutro
 oculo, acutiùs videmus. Hæ sunt coitus optidorum causæ omnes: nunc insertionis modum a-
 periamus. Opticus duplici constat substantia, interiore que medullaris est, & exteriorē mē-
 branea. Interior medulla, dum ad crystallinum humorem pervenit, dilatatur, & ita per u-
 niuersum oculum visiles diffundit spiritus. Ex eà dilatatione enascitur tunica, quam ἀ-
 μ-
 φικλῆσπος ὀφθῆ, id est, reticularem dicunt, que ut docet Galenus capite 2. libri
 10. De usu partium, neque colore neque substantia tunica nomen meretur, sed si eam in a-
 quam conieceris, cerebri mollem, albam & medullarem substantiam referre videbis. Ex-
 terior verò nervi optici pars duabus tunicis constat, quarum altera à tenui meninge, altera
 à dura propagatur: illa in tunicam πᾶν ὀφθῆ, seu vucam; hæc in κέρατον ὀφθῆ, seu cornicā
 absumitur: unde fit ut per optici continuitatem animalis spiritus ad pupillam usque mo-
 mentò feratur. De optidorum interiori cavitare, scripsit Galenus libro 10. De usu partium, *De cōiūctōe*
 manifestè esse canos, propterea Herophilus hos nervos ὀφθαλμοὶ appellavit, quod perforati *optidorum.*
 sint. Nos sensilem hanc κοιλίαν & cavitatem in nervis non admittimus: volumus ta-
 men opticos nervorum omnium esse mollissimos, magisque spongiosos, ut copiosissimum de-
 ferant animale spiritum.

HISTORIA ANATOMICA.

De auditus organo; ac primùm de aure externa, quam auriculam vocant.

CAPVT XII.

Auditus
præstantia.

Nomen.

Situs aurium.

Auricula.

Magnitudo
auricularum.

Figura.

Fus.

Partes singu-
la.

VEM ADMODVM aspectus ad vitæ dulcedinem & com-
 moda magis est necessarius; ita auditus ad excipiendam at-
 tem, sapientiam & scientiam est accommodatior: vnde à
 Philosopho *disciplina sensus* dicitur. Ille ad inuentionem,
 hic ad communicationem aptior est. Hoc sensu vix credi
 potest quàm mirè animus commouetur; idè Theophras-
 to *ἀκουσικὴ αἰσθησις παθητικωτάτη* dicitur, & Herodotus *ἐν τοῖς ὤσιν τὸν
 θυμὸν οἰκᾶν*, id est, *in auribus iracundiam inhabitare* voluit. Visionis organum
 variis coagmentatum particulis, musculis, tunicis, humoribus, neruis, arteriis,
 venis, omnem superat naturæ admirationem: auditus *αἰσθητικὸν* labyri-
 nthis, cochlea, fenestellis, tympano, aquæ ductibus & ossiculis tribus miro artifi-
 cio concinnatum, omnibus stuporem parit. Auditus organa, Græcis *ὦτα*
καὶ ὠατα, à voce accipienda, *ἰκοαὶ*, Polluci dicuntur, Latinis aures, quod voces
 hauriant. Hæ, quia sonum recipere debent, qui natura sua in sublime fertur, in
 altis corporum partibus sunt collocatæ, & sitæ ad latum vtrumque in eadem li-
 nea cum oculis. Patulæ semper sunt aures, quia dormientibus etiam præsidio
 sunt, vt sono perfecti, sese tueantur. Geminæ autem factæ sunt ob sensus ne-
 cessitatem. Auris apud Hippocratem alia est externa, alia interna. Externæ au-
 res propriè *auricula* appellantur, de quibus existat illud in Prognostico, *ὦτα
 ψυχρὰ καὶ διαφανέα, καὶ συνεσπλημένα, ὀλέθριον*, id est, *aures frigide, pellucide,
 & inuulse mortifera*. Harum substantia mediam inter ossa & carnes naturam ob-
 tinuit, cartilagineam quippe & paucò sanguine irrigatam: si enim auriculæ fuis-
 sent ossæ, leui de causa frangerentur & dormienti animali essent impedimē-
 to; si molles & carneæ, non seruarent figuram fornicis vel conchæ, ærisque
 ingressum prohiberent, facillè enim concidit caro, contunditur, nec sonum re-
 pellit. Quia ergo sunt cartilagineæ, & occurrantium eludunt imperum, & ca-
 uum satis amplum efformant quod æris sonum excipit. Auricularum magni-
 tudo non eadem omnibus animalibus, sed homini perexiguæ sunt, tum ad or-
 natum, tum quia plume tegendum erat caput. Neque verò omnibus animalibus
 insunt auriculæ; nam iis quæ penna, cortice, aurfquamma teguntur, quia coriū
 habent durum, vt & auius, meatus auditorius parit. Habent auriculæ semi-
 circularem penè figuram & in retna regione antri in modum excauatam. Non
 sunt ad ornatum tantum, vt existimarunt quidam, constructæ auriculæ, sed vt
 irruentis aeris sonum excipiant, & si fortè audiendi meatum præterfugerit aer,
 à posteriore parte repulsus, antrosum versus cauitatem ingrediatur. Sic Ha-
 drianus Imperator, vt acutiùs audiret manus cauas auribus obrendebat. Narrat
 Galenus consulem Artianum, quòd minus liquido auditu uteretur, caua manu
 admota auribus, audiisse meliùs: & quibus ex vulnere aut alia quauis de causa
 præcisæ sunt aures, ij sonos & articulatas voces fluitantis aquæ aut resonantis
 cicadæ in modum exaudiunt. Harum auricularum partēs variæ sunt. Superior
ἑπὶρύγωμα, id est, *ala* vocatur, seu *pinna*; extremus eius ambitus ab anteriori in
 interiori

interiorem retrusus κυβοειδής, & κυρτοειδής, gibbosus & cubiformis dicitur. Dimidius orbis vel semicirculus sub hoc ambitu rotundus & in mucronem exurgens ξυστήρ vocatur. Concauum interius totum κόγχη καὶ κογχήλον, conchula dicitur: cavitās verò iuxta meatum auditorium, in qua velut in alueo sordes colliguntur, κυψέλη, aluearium; sordes autem, Αἰγινετὰ ῥ' ὕπης ἐν τοῖς ὠσὶ, sordiculas in auribus vocat, quorum vsum Cicero secundo De natura Deorum, agnoscit, vrsi quæ minima bestiola conetur irumpere, in sordibus his tanquā in visco inhærescat. Inferior pars pinguior & carnosa ab ala pēdens λοβός vocatur, lobus, aut, vt volunt quidam, ἀπὸ τοῦ λαμβάνειν, quod eam partem apprehendamus cū quempiam admonemus, & hæc fortē ratio est, cur aures memoriæ sit consecrata; vel cum Meletio παρὰ τὸ λωβέειν, quasi deturpare vel abscindere diceret; pars hæc in verecundia rubere solet. Partes habet inferiorem & superiorem; inferior παραλόειον; superior ἀντιλόειον dicitur. Tota autem auricularum circumductio ἐλιξ vocatur, quo nomine notatur implicatio, & opposita pars ἀνθέλιξ. Aures vni homini ferè semper immobiles sunt: si quando tamen eas moueri contingat, vt in quibusdam obseruauī, exiguum musculorum operā id fieri existimandum. Primus anteriori parte situs à fine extremo & superiore muscoli frontis ortus, in eam auriculæ partem definit, quæ ἀντιλόειον dicitur. Trahit auriculam ad superiora & anteriora. Alter ab occipitio oritur angusto principio; & latior euadens, posteriori auriculæ inferitur, eamque ad posteriora trahit. Tertius portiuncula est latissimi & cutanei illius muscoli qui ad aures vsque excurrit.

Conchula.

Aluearium.

Sordes aurium.

Lobus aurium
cur ita dicitur.

Aures in
quibusdam
mouentur.
Aurium
musculi.

De aure interna, quæ verum auditus est organum. CAPVT XIII.



VRIS interna verum auditus organum, in osse petroso situm habet, inter eos processus, qui mammæ ritu protuberāt, μασοειδές vocant, & eam apophysem, quæ ossis iugalis porcionem constituit. Arem hanc internam quatuor constituunt meatus, qui ordine describendi sunt. Primus statim foris obuius, semperque patens, πόντος ἀκουσικός, id est, meatus auditorius dicitur.

Auris interna situm.

Primus auris meatus.

Tortuosus est, obliquus, rotundus, angustus: tortuosus quidem, ne aer externus confertim & derepentē iruens membranam lædat; obliquus, vt vehemēs sonus obliquo eo ductu frangatur, & vt percussus aer colligatur: rotundus, vt plus aeris contineat: angustus, vt corpusculorum & bestiolarum, quæ ingentes cruciatus afferre solēt, ingressus prohibeatur. Meatus hic non oblique deorsum, sed oblique sursum fertur, vt si quid extraneum ingressum sit, facilius elabatur. In huius cauiratis extremo septum adest, primam cavitatem à secunda discerniculi vice discriminans. Septum hoc osseum non est, quia externi aeris ad internum prohiberetur appulsus, nec vtriusque concursus fieret: non carneum, quia nimis rarum foret, sed membranofum. Membranam hanc tympanum vocant, quod tympani modo tendatur. Tenuis est, densa, sicca, pellucida & exquisitissimi sensus. Tenuis quidem, vt sonum & externum aerem admittat facile; densa, vt externis obsistat iniuriis; sicca, vt melius perfonet. Eam primus omnium descripsit eleganter Hippocrates libello περὶ ἀρχῶν: Τὸ δὲ δέρμα τὸ πρὸς τῇ ἀκοῇ πρὸς τῷ ὀστέῳ τῷ σκληρῷ λαπιὸν ὅστιν, ὡς περὶ ἀεὶ χυλὸν ἐκέρτατον τῷ ἄλλῃ δερμάτος τεκμήριον δὲ πολλὰ, ὅτι ἐκέρτατον ἢ χεῖ μάλιστα. hoc

Tympanum.

Descriptio
tympani ex
Hippocrate.

Situs tympani.

Ortus.

Causa surditatis rara. Secundus auris meatus.

Aër vernaculus.

Partes in hoc motu contentae.

Tria ossicula.

Articulatio ossiculorum.

Chorda tympani obesa.

Musculi exigui.

Ossiculorum aurium usus.

est, pellicula in ore iuxta os durum tenuis est, velut aranearam tela, & omnium pellicularum siccissima. Quod autem id quod siccissimum est maxime resonet, multa signa sunt. Situs habet obliquum membrana hæc, ne aër aut externa corpuscula recto motu eam impetant. Ortum ducit non à pia meninge, nec à neruo quintæ coniugationis dilatato, vt voluerunt quidam, sed à portiuncula duræ meningis, cuius naturam omnino refert. Hoc in loco dignum est obseruatione, membranam hanc à prima conformatione crassiorem & densiorem surditatis insanabilis causam esse. Quod si aliquando humoris influxu madcat, grauem & difficilem auditum parit. Statim post membranam conspicuus est meatus secundus, quem Aristoteles cochleam vocat, alij peluim. In hoc aër continetur vernaculus ambienti confocialis, quem immobilem vocat Philosophus secundo De anima, & princeps auditus organum, vt visionis crystallinum humorem statuit vulgus. In secundo hoc ductu multa occurrunt veteribus Anatomicis incognita, attentioribus, præsertim Eustachio & Volchero, eleganter descripta. Nam quia internum hunc aërem ab externo primū pulsari & percuti, deinde percussum soni imaginem ad neruum ἀκουσικόν traicere, tandem vt purus remaneat, expurgari decuit; ideo in secunda hac cauitate organa pulsationi, traiectioni & expurgationi dicata constructa fuere. Pulsationi inserviunt tria ossicula, chorda & muscoli; delationi fenestellæ duæ, expurgationi ductus in palatum vergens. Tria ossicula à forma potius, quàm ab officio & vsu nomina sortuntur: quorum primum malleolo, secundum incudi respondet, tertium stapedem antiquorum refert; triangularis enim est figuram literæ Græcæ Δ representans. Sunt ossa hæc solidissima vt resonent, &, quod mirum est, eorum in puerulo eadem est quæ in sene magnitudo. Ossicula hæc tria intra membranam sunt constituta, & ita articulantur, vt malleolus processu suo membranz appendeat, tubere autem suo incudis cauitati inarticuletur. Incus molarem dentem (vt volunt quidam) representans, duobus cruribus innititur, quorum breuiore tympano affirmatur, longiore stapedi obligatur. Stapes basi sua latiuscula fenestræ ouali immerfus, summo & acuto apice incudis minimum tuberculum excipit. Tria hæc ossicula tympano implicantur chordæ cuiusdam tenuissimæ ope, quæ toti membranæ, perinde vt neruus militari tympano, attenditur. Tam exilis est chorda, vt quid sit, neruus ne an vena, an arteria dubitetur. Ad sunt postremò ad pulsationem muscoli ita exiles, vt ferè sensum fugiant. Putat Arantius malleum tantum moueri, reliqua duo immobilia esse: mouetur malleus duplici motu, fluxus & refluxus ad motum tympani. Fluxus aëris solius membranam pellentis vi & impetu fit, recursus verò à musculo. Ossicula hæc cum chorda externi aëris appulsu vibrata, perinde ad distinctionem sonorum conferunt, atque dentes ad vocis explanationem. Errant autem qui ossicula ita moueri putant, vt inuicem percussa strepitum edant: nam internus ille sonus externum confunderet, & qui in magnis articulationibus vehementes eduprur motus, sine strepitu sunt. Est ergo horū ossiculorū vsus, vt species soni excipitur, permeet ad interiora & excrementis aurium patear via. Stapes enim superiorem fenestram claudens, ab incude mouetur, incus à malleo, malleus à membrana aëris externi appulsu percussa. Hæc igitur pulsationis sunt organa, ossicula tria, chorda & muscoli. Impulsus ab externo aëre & alteratus aër vernaculus ad neruum ἀκουσικόν imagines soni traicere debet. Huic delationi foramina duo exigua, quasi fenestellæ, dicata sunt; superior fenestella

oualis dicitur, inferior nomine caret: inrer vrramque tuberculum apparet. Tandem ad aëris vernaculi expurgationem canaliculum construxit natura, qui ad palatum fertur: ductus hic cartilagineus est, & quandam habet pelliculam valvulæ instar, vt ab ære in os recrementis expurgandis pateat aditus, non autem recurrat in aurem eadem illuies. Alium huius canaliculi vsum agnoscunt quidam, vt insitus & congenitus aër noui per os inspirati impulsu recreetur, tum vt aëri externo violentius irruenti, vt in bombardarum strepitu, pateat per hanc viam aditus. Hæ sunt cavitatis secundæ omnes particulæ, quæ, vt demonstrantur, artificiosam manum expostulant. Tertia sequitur cavitatis, quam *labyrinthum* vocant, quod multis quasi cuniculis & conclauibus furtim agatur. Horum anfractu hunc vsum agnoscimus, vt sonus per angusta transiens loca acutior fiat, nec dissipetur. Postrema cavitatis Fallopio *cochlea* dicitur, quod testæ cochleæ similis sit; sunt qui *foramen cæcum* vocitent. Tandem neruus apparet *αὖτος ὁδός, auditorius*, à quinta coniugatione exortus, qui sonorum omnium imagines ad sensum communem, tãquam indicem & censorem, vehit. hæc aurium externatum & internatum brevis esto descriptio. Sub auribus, & pone aures conspicuæ sunt glandulæ, parotides dictæ, in quas inebriarum cerebrum plerumque sese exonerat. Vnde vulgus *cerebri emunctoria* vocat, & earum glandularum tumores, Hippocrati *parotides* appellantur.

Fenestella
dus.
Tuberculum,
Canaliculus
ab aure ad
palatum.

Terrie Cantor

Quarta can-
tas.
Nervus andi-
ferus.

Glandule paroides.

CONTROVERSIÆ ANATOMICÆ.

De audiendi modo.

OvÆst. IX.

DE audiendi modo varie sunt Philosophorum sententia. Alcmaeon dedit nos audire existimavit, quia aures intus sunt vacuae; vacua autem omnia resonant. Diogenes aerem in cerebro contineri voluit, eumque percuti vocibus; & iam divini Hippocratis temporibus iactationem habuerat hac opinio. Ita enim libello περὶ ἀρχῶν in eos invehitur: Καὶ εἰσὶ τινες οἱ ἐλεῖται φύσιν ζυγισθῆναι, ὅτι οἱ ἐγκέφαλος ἔστιν οὐ καὶ αἶμα, τὸ δ' ἐκ αὐτῶν ῥήνεται, αὐτὸς τε γὰρ οἱ ἐγκέφαλος ὑγρὸς ἔστιν hoc est, Sunt quidā qui de natura scribētes cerebrū sonū edere prodiderūt. Hoc autē fieri non potest: nā cerebrum ipsum humidum est, & nullum humidum resonat. Plato auditum fieri aeris interni pulsatione scripsit. Nos missis lubricarum opinionum fluctibus, audiendi modum, & totam auditus naturam brevi & facili oratione aperiemus. Cum enim veteribus Philosophis & Medicis, Aristoteli dico & Galeno, incognitum fuerit audiendi organum, tot particulis tam affabre concinnatū non possumus perfectam auditus naturam ex eorum scriptis intelligere. Hac igitur quomodo se habeat, paucis aperiam. Tria ad sensum requiri docet Aristoteles 2. De anima, & libro De sensu & sensili, obiectum, medium & instrumentum. Obiectum auditus est sonus, ut aspectus color. De soni natura plura hoc loco differere non institui; sunt enim ex Physicorum principiis illa ipsa repetenda. Hoc tantum obiter annotare placet. sonum qualitatem esse ortam ex aeris fractione, quae fit collis corporibus duris solidisque; mollia namque facile cedunt, & vi impellentis non resistunt. Medium auditus est aer externus; de aqua dubitant Aristoteles, an vox in ea exaudiat. Pisces ramen optime audire novit qui mugilum nocturnae interfuit piscationis. Instrumentum auditus auris est non externa, sed interna, quatuor cavitatibus constans, multisque particulis veteribus incognitis. Sic itaque fit auditus. Percussus à duris solidisque corporibus aer externus & soni

Opiniones va-
riae.
Alimen.
Dietet.

Place.

*Quomodo
fit audire.*

Quaid Gause.

*Medicus au-
diens.*

Organisms are
diverse.

Verus audiendi modus.

qualitate affectus, vicinum aerem alterat, hic proximum afficit, donec cōtinuatione quadam ad aurē peruentum fuerit. Vt enim si in aquam lapillos inieceris, circuli enascuntur, quorum alter alterum excitat; ita ex aeris percussione velut circuli in aere generantur, donec successione ad auditus organum sit peruentum. Auicenna hanc percussis aeris continuationem non inscitē vndam vocalem appellat. Motus verò huiusmodi momento non fit, sed in tempore, unde fit ut post ictum sonus è distantissimis locis non subito exaudiat. Aer soni imbutus qualitate per meatum auditorium foris obuium semperque patentem, primū mēbrane sicciſſima maximēque sonore (quam propterea tympanū vocant) alliditur: meninx pulsata ossicula tria mouet, eiusque characterem soni momento imprimi. Hunc sonum vernaculus aer & congenitus statim excipit, quem per fenestellas in historia descriptas in tortuosos anfractus & labyrinthum, mox in cochleam defert, ab hac in neruum auditorium traici, & ab eo ad communem sensum, tanquam censorem & iudicem. Atque hic verus est audiendi modus. Cetera quæ in Philosophorum scholis de medio auditu, de soni natura, de organo, an aerum sit, an aquum, terrumue, agitari solent, Physicis excutienda relinquo. Hisce libris Medica tantum & Anatomica consecrari consilium est.

An infusus & vernaculus aer in aure contentus primum sit & princeps auditus instrumentum. QVÆST. X.



Aurium secunda cavitare, quam cochleam vocat Aristoteles aer continetur innatus & vernaculus, quem implantatum dicunt barbari. Aristoteles 2. De anima, inædicatum & immobilem appellat. Immobilem interpretantur quidam, quia non mouetur ab alio, sed idem in auribus semper manet: alij immobilem dicunt, quia naturalem nullum habet sonum, sed potest omnes sonorum differentias suscipere. Hunc aerem princeps & primum esse auditus organum existimauerunt veteres, & huius aeris ratione auditus naturam aerem esse docuit Aristoteles 2. De anima, & libro De sensu & sensili. Ego aerem hunc ad auditum maximè necessarium esse puto, & sine eo auditum vix fieri: sed princeps esse auditus organum nunquam mihi persuaserim. Theorema est catholicum & perpetue veritatis, in omni organo perfecto partem esse quandam, cui tanquam principi debeatur actio: sic in hepate *παρέρχουσα*, sanguificationem; in oculo crystallinus, visionem; in musculo caro motionem; in naribus processus mammillares odoratum edunt. Sed aer hic congenitus similis pars non est: ei ergo tanquam principi talis non debetur actio. Partem non esse, ita demonstratur; Pars omnis similis aut spermatica est, aut carnosa: aer hic neque ex semine, neque ex sanguine ortus sui primordia ducit. Dices fortasse non aerem esse simplicem, sed quandam spiritum, at neque spiritus dici potest. Namque si vitalem esse putes, vitalis arterias non deserit: si animale, ergo & in ceteris sensuum organis animale spiritum princeps organum statuere oportet. Est spiritus communissimum anima instrumentum, quo ad actiones omnes edendas utitur nobilis illa forma: sed ut in oculo peculiaris est pars, quæ primo visionem edit, crystallinus scilicet; pars similis & spermatica ex purissima seminis portione procreata: ita in aure pars quadam similis statui debet. Talis autem non erit congenitus iste aer, quia ab aere externo non differt, nisi puritate & quiete: & ab aere externo generatur, non per coctionem & elaborationem; ut spiritus, nec per aliquam animæ actionem, sed per noui aeris continuum appulsum, qui partim per aurium foramen semper patens & anfractuosum, ad cochleam fertur, partim inspiratione per canaliculum quandam velut aqua ductum, edtraiciitur. Præterea ex Aristotelis doctrina 2. De anima, nihil

Aerem infusum non esse princeps auditus organum. Retinetur natura. Prima demonstratio. Pars non est.

expers anima alicuius sensus est instrumentum : aer autem insitus expers est anima ; quia anima non est actus corporis simplicis, neque etiam organa habet anima. Cur enim cum ab aere externo generationem habeat nec ab aliqua anima facultate excoquatur, animatus potius erit huiusmodi aer, quam qui in reliquis cavitatibus continetur. Quiescit autem in aere aer, non in ceteris cavitatibus, quia angusto est coercitus conclavi, & ob foraminis cæci anfractus exire non ita facile potest. Non ergo auditus organum dici debet, sed potius medium internum. Ut enim à corporum collisione percutitur aer externus, ita ab externo colliditur aer iste internus, idque tympani, chordæ, & ossiculorum trium interiectu. Alteratus idem aer soni characterem & speciem omnino denudatum deferret nervo quintæ coniugationis in utranque aurem expanso, qui præcipuum auditus est organum ; ut processus mammillares odoratus. Requirit autem medium hoc internam in omni sensu exemplo demonstratur. Albugineus humor aspectus, salina gustus, cuticula tactus, ossa spongiosa odoratus media sunt interna, in quibus formæ à rebus denudantur, & ita denudatæ ad principis αἰσθητικῶν traiciuntur.

Cur quiescit
fit aer ille insi-
tus.
Aer ille me-
dium est in-
ternum, non
ergo autem.

De mira aurium & palati, linguæ ac laryngis sympathia.

QVÆSTIO XI.



VRIVM & vocalium organorum mirabilem κοινωνίαν multa pate-
faciunt, quæ naturæ Genius sectione 32. Problematum eleganter expo-
suit. Nam attentè audituri non respiramus, sed spiritum cohibemus ; of-
fidentes sonos non ita exquisitè audimus. Si scalpello auris tympanum
vellices, sicca statim excitatur tussis. Surdastri omnes ægè loquuntur, &
per nares vocem reddunt. Qui à prima conformatione & ortu surdi sunt, si pariter sunt
ὄψωδοι, & obmutescunt. Postremò si ore & dentibus citharam capiat quis, & utramque
obturet aurem, acutiùs audit ; unde fit ut surdi per os melius audiant. Sunt hæc communia-
nis aurium & vocalium organorum, oris, linguæ & laryngis, certissima argumenta. Sed
societatis huius ratio non omnibus cognita est. Sunt qui existiment nervum quintæ coniuga-
tionis ἀρυσίον, & septimæ qui linguam mouet, in exortu eadem vestiri tunica, propter
eâque earum partium affectus faciliè communicari ; sed contrarium suadet αὐτοψία : di-
uersi enim sunt utriusque coniugationis ductus, satisque longo inter se distanti intervallo.
Nos duplicem huius communionis causam agnoscimus : quarum altera ad nervum audita-
rium, altera ad canaliculum veteribus incognitum referenda est. Nervus quintæ coniuga-
tionis varios de se promittit surculos, maior in aurem & membranam exquisitissimi sensus
expanditur, & sonorum omnium species ad cerebrum deferret minor ad linguam & laryn-
gem excurrit. Ob vasorum ergo communionem, quæ una est apud Hippocratem & Galenū
causâ τῆς συμπαθείας simplicis, aurium & linguæ affectus faciliè communicantur : hinc
vellicata, auris membrana, tussis sicca : cuius meministi Auicenna. Hinc surdi ferè omnes
muti sunt, aut saltem ægè loquuntur, affecto nervo auditorio : qui cum septimæ coniuga-
tione implicatur. Vulgare enim illud non probo, idè obmutescere surdos, quia idioma nullum
addiscere potuerunt, & quia auditus sensus est discipline. Nam si idè tantum obmutescunt
surdi, cur gemitus & suspiria, quæ pathemata sunt naturalia, difficulter edant ? An non, ut
primi rerum inuentores, verba & dictiones fingerent, quibus animi sensa & conceptus
exprimerent, si eas proferre possent ? Hominem quantumvis surdum, ratione ad inuentionē
armauit natura. Est altera huius societatis causâ quæ fit per canaliculum cartilagineum,
velut aquæ ductum, qui à secundo auris meatu ad os & palatum fertur. Ductus hic tum
expurgando aeri vernaculo & aurium recrementis dicatus est, tum ut insitus aer noui per

Aurium &
vocalium or-
ganorum mi-
rabilis sym-
pathia.

Facile illa
communio.
Optimo quo-
rundam.

Duplicem com-
munionis il-
lius causâ.

Non idè ob-
mutescunt
surdi, quia
idoma addi-
cere nequunt.
Secundâ soci-
etatis causâ.

os inspirati appulsu recreetur; denique ut aeri externo per auris foramen impetu irrumpi, ut in bombardarū strepitu per hanc viam pateat aditus. Ab ore igitur ad aurē, & ab aure in os liberē meat remeātque aer, unde fit ut bene audiri cōhibeamus spiritum, ne inspirato aere copiosissimo impleatur cochlea, & tendatur tympanum. Oscitantes verō sonos acutē non exaudimus; quia oscitatione ita distenditur & inflatur tympanum, ut sonos excipere nequeat. Postremō scalpentes aurcm saluam excitamus, quia ea compressione fit sordium expressio in ductum cartilagineum, & ab eo in linguam.

HISTORIA ANATOMICA.

De organo odoratus.

CAP. XIII.



VEM AD MODVM speculatores sublimia ascendentes plura villiū spectra acutiū intuentur: & ut voces ac soni ex alto melius quā ex humili loco exaudiuntur; ita olfactus ascendentem vaporem, qui naturā igneus est, com modius excipit, quā descendente. Ut ergo aspectus & auditus organa, oculi quippe & aures editissimum occuparunt locum: ita odoratus organum in eadem capitis regia tanquam arce, est collocarum. Organum hoc Græcis ῥίς dicitur; fortasse quod per ipsū effluant sordes: Aristoteli μυκτήρ, ab aliis μύσστηρ, à mucore, Polluci ῥάβαν, Latini *nasum* appellāt. Inest naso venustas, & quid Regium, quasi peculiari quædam imperandi dexteritas in eo eniteat. Egyptij in suis hieroglyphicis sagaces homines notabant naso, & Festus sagaces natos vocat; idē & obesa naris & emunctæ quosdam dicimus, dum altero stupiditatem, altero ingenij perspicaciam significamus. Nasus soli homini altior ad decorem, neque alij animalium eminer. Huius non vnicus apud Medicos est vsus, sed varius & multiplex. Primum enim per nasum odorum omnium species ad cerebrū feruntur: quod ita libello περὶ ἀρχῶν expressit Hippocrates: ὁσφραίνεται δὲ ὁ ἐγκέφαλος ὑγρὸς ἐὼν τῶν ξηρῶν αὐτὸς ἔλκων τὴν ὀσμὴν ἐν τῇ ἀέρι διὰ τῶν ἐρογχιῶν ξηρῶν ἐόντων: hoc est, *olfacit cerebrum humidum existens aridorum odorem unā cum aere per corpuscula cartilaginosa ipsum trahens*. Præterea per nasum ducitur aer, rum ad pulmōnem, rum ad cerebrum, ad spiritus animalis generationem. Tertiū per nares mucosa cerebri eluuiēs expurgatūr. Mitto quod formationi vocis inserviunt, & ad faciei ornatum atque decorem. Ob necessarios hos vsus licet vnicus sit nasus in medio faciei situs, geminæ tamen creatæ sunt nares, ut altera oclusa, altera pateat. Nasi historiam ita partiiri placer, ut quemadmodū autis alia est extetna, alia interna, ita nasus alius externus, alius internus statuatur.

Externus in facie situs & prouuberans, nulli non conspicuus, ab oculorum inter-
nis angulis acuto mucrone incipiens, ad labiorum ferē principium desinit. Con-
stat nasus variis particulis, ossibus, cartilaginibus, musculis, venis, arteriis, neruis,
membrana & cute. Ossa tria sunt; vnum vtrinque, quæ tertium ab ethmoide
exortum quasi interiectus paries determinat. Ossa hæc ad medium vsque nasi
tantum feruntur, reliquum totum est cartilagineum: non enim rotum nasum
decurrit esse osseum, ne ictu vel casu faciliē frāgeretur: sed basim osseam esse oportuit
ad efformandam cavitatem; extrema verō cartilaginea, ut & commodius
emungi possent nares, & facilius inspirantibus ac expirantibus dilatarī, & ad ar-

Situs.

Nomen.

In naso inest
quid Regium.

Vsus nasi.

Primum.

Secundus.

Tertius.

Numerus.

Nasus exter-
nus.Nasi paries
significat.
Ossa.

cendos odores fædos celerius occludi; denique vt externos impetus quassantes contudentesque tutius effugere possent. Ossis acuminata pars $\rho\acute{\alpha}\chi\iota\varsigma$, spina vocatur, tota verò pars, dorsu & summū nasi dicitur. Cartilaginosa nasi pars $\alpha\kappa\rho\omicron\pi\iota\gamma\iota\omicron\nu$ vocatur: Cartilaginēs nasi quinque sunt, duæ elatiores nasi ossibus asperis adnatæ, & tres infimæ; quarum duæ laterales tubuli forma præditæ, & interrespirandum mobiles, $\pi\tau\epsilon\rho\acute{\upsilon}\gamma\iota\alpha$ Græcis dicuntur $\upsilon\pi\eta\gamma\alpha\iota$, Latinis *ala* aut *pinna*: media verò septi modo vtranque discludens $\delta\acute{\iota}\alpha\phi\epsilon\rho\gamma\mu\alpha$ nuncupatur, interseptum, interfinium, discrimen narium, quod duplex est, interius propriè septum dicitur, & prominentius ac labris vicinius, carnosum, $\kappa\acute{\iota}\omicron\nu\alpha$ vocant, columnam. Foramina autem duo seu fenestræ $\pi\omicron\rho\omicron\iota$, $\rho\acute{\iota}\nu\epsilon\varsigma$ $\rho\acute{\alpha}\theta\omicron\nu\epsilon\varsigma$, $\theta\alpha\lambda\acute{\alpha}\mu\alpha\iota$, id est, *cavernæ*, Aristoteli $\delta\chi\epsilon\acute{\iota}\upsilon\mu\alpha\lambda\alpha$ spiritus vel muccoris vehicula appellantur. Hæ narium pinnæ voluntario motu mouentur, idque per exiguorum musculorū opera, ex quibus duo dilatant, à fronte acuto carnosūque exorti principio; duo constringuntur labiorū musculis continui; vnde fit, vt quoties per nares aliquid trahimus, superius labium constringere cogamur. Venas habet nāsus à iugularibus, quales inter duas pinnas interdum secare solemus: arterias accipit à catotidibus; nervos à tertia coniugatione. Totum hoc nasi corpus ossibus constans & cartilaginibus, duabus cingitur membranis, exteriorē altera, altera interiorē. Exterior cutis est adipe denudata, ne in immensam molem accresceret nāsus, quod turpe & indecorum foret. Interior crassa est, tum vt patulæ sint perpetuò nares, ne caro increfcens eas angustet; tum vt lubricæ sint in mucosæ illuuei delapsu. Nasi summitas ob rotunditatem $\sigma\phi\alpha\iota\rho\acute{\iota}\omicron\nu$ dicitur globulus orbiculus. Pili verò qui in naribus nascuntur à festo vibrissæ vocati sunt, quòd cū euelluntur, vi caput vibratur.

Cartilaginēs

Musculi.

Venæ, arteriæ, nervi.

Cutis nassive adipe.
Membrana interna.

Nasi interni descriptio.

CAP. V.



NASVS internus verum odoratus organum, duabus constat partibus, osse ethmoide & processibus mammarum ritu protuberantibus. Os ethmoides in media frontis basi sitū ad summam nasi radicem fertur, narium totam ferè cavitatem opplens. Partes habet naturæ dissimiles, quæ varia sortiuntur nomina. Prima interior est, multis foraminibus cribri instar peruia, propriè cribrosa dici debet: altera extra caluariæ basim in narium cavitare contenta rara est & fungosa, spongiosam nominant. Tertia tenuis est, solida, levis, planam vocat Fallopius. Cribrosa pars foramina habet multa, eaque exigua & obliqua. Exigua, ne durū aliquod corpus crassūque extrinsecus feratur ad cerebrum; obliqua, ne impurus aer repenti irruens, rectā cerebri vetriculos subeat. Horū foraminum vsus, alius est primarius, alius secundarius. Primarius duplex, alter ad aeris inspirationem; alter vt odorum species cum aere in cerebrū ferri possint. Secundarius vsus est expurgatio cerebri. Licet enim per infundibulum tanquam Hippocratis manicam in bibulam illam glandulam transcoletur pituita, si tamen aliquando superiores cerebri sinus mucosa illuue affuant, stillat per tubercula mammarum papillis simillima in ossa cribriformia & nares. Altera ossis pars rara est, laxa, fungosa, spongiæ aut pumicis instar, vnde spongiosa dicitur, opplet vtrinque narium cavitatem. In ea verissimile est inspiratum cum odoribus aerem alterati, vt in auri cochlea & labyrintho aer præparatur

Nasi interni descriptio.
Ethmoidis ossis descriptio

Cribrosa pars.

Ethmoidis foraminum vsus

Spongiosa pars et humidus.

Mammillarium processuum usus.

auditorius. Alteratus in illis anfractibus aer cum odoris specie in processus mammillares fertur, qui nervi sunt mollissimi à cerebro prodeuntes membranis diti & tenui ut reliqui nervi non velati. Processus hi, quia peculiarem habent naturam, figuram & compositionem; ossa autem, cartilaginee & membranae ubique similia sunt, praecipua odoratus organa esse creduntur. Accedit quod nulla in naso est pars quae tam facile ab odoribus alterari queat: tubercula autem haec quia spiritu plena & vaporosa facile odorum species recipiunt, & quia nervorum naturam redolent, perceptam qualitatem internoscunt.

CONTROVERSIAE ANATOMICAE.

Quod verum sit, & praecipuum odoratus organum: ubi refellitur Aristoteles.

QUESTIO XII.



Nomni perfecto organo varia partium genera observari saepe à Galeno est proditum. Sunt partes quaedam principes, quibus primò & per se debetur actio; sunt partes quae actionem reddunt praestantiores, sunt quae eas conservant. Nasum odoratus esse organum, nemo negat: sed cum nasum varie constituant partes, ossa, cartilaginee, muscoli, nervuli, membranae & processus mammillares, cui parti tanquam principi debeatur odorandi actio, non convenit inter Medicos & Peripateticos. Aristoteles 2. De anima, & libro De sensu & sensibili, nasum externum in facie conspicuum odoratus praecipuum statuit organum, in quo operculum valvulae instar fingit, quod nunquam nisi inspirantibus nobis aperiatur, unde sit ut non nisi inspirantes odores percipiamus. Galenus libello De odoratus organo, tribus aut quatuor capitibus in Aristotelem invehitur, docetque nasum externum ad olfactum conferre quidem, sed praecipuum eius organum intra calvariā locatum esse. Est autem elegans haec Galeni demonstratio ex singularum nasi partium enumeratione. Nec ossa nec cartilaginee, nec membrana, nec nervus per membranam expansus, verum odoratus organum esse possunt, ergo nulla nasi externi pars. Ossibus & cartilaginibus non odorandi modo, sed ne tangendi quidem sensus datus est; sunt itaque inepta ad olfaciendū organa. Adde quod aiunt ne omne id est, sensorium, naturā & compositione cum sensibili communicare debet, ut ab eo facile aliteretur: cum odore autem nihil nisi vaporosum convenit, à qua natura longissimè absint ossa & cartilaginee. Membrana naves invehit quidem sensu pollet exquisitissimo, sed crassior est quā ut odorum species excipere queat. Quinetiam tunica haec linguae palato & ori communis est: at in illis partibus odores non percipit. Sed & si membrana haec verum esset odoratus organum; appulsus odorum perciperetur perpetuò: at non nisi inspirantibus nobis odorum sit perceptio: si enim totam narium cavitatem moscho, ambáro & similibus odoratis impleat, membranamque totam oleis odoratis illinis, nunquā nisi aerem inspiratione trabas, odorem percipies. Non ergo in osse, cartilagine, membrana & aliqua nasi externi parte collocandum praecipuum odoratus organum. Quod autem somniasit operculum summus Philosophus inspirantibus nobis patens, cessante inspiratione concidens, non agnoscit Galenus locis citatis, neque id bonus unquā admittet Anatomicus. Sed demus esse in profundis naribus hanc valvulam, eamque nunc aperiri, ut aeri & vaporibus ingressus pateat, nunc claudi cessante inspiratione, erit proculdubio operculi illius motus aut animalis, aut naturalis, aut violentus. Voluntarium esse nemo dicet, quia ad animalē motum valvula non est opus, & animalis omnis motus animae iussu obsequitur, voluntati nostrae pariet: at nunquam aperitur haec valvula, nisi aerem ducamus. Adde, quod voluntarij motus immedicatum

Aristoteles
nasum externum
statuit
principem odoratus
organum.
Refellitur
Aristoteles.

Ratio Galeni
prima.

Secunda.

Membrana
non est
principium
organum.

Valvula
Aristoteles
nulla est.
Refertur.

diatum organum est musculus: in profunda autem narium cavitare musculi non reperiuntur. Neque etiam naturalis erit hic motus, ut valvularum cordis, quia perpetuus est cordis motus, & sponte sua non nostra perficitur. Violentum si existimes ab aere quippe inspirato impelli, audi repugnantem tue opinioni Galenicam observationem. Si fistula in nares immissa cohibito spiritu copiosissimum aut aerem aut liquorem impellas, cur non aperietur operculum, si aliquod sit: cur non odorum in naribus fiet perceptio? Obtrudet fortasse Peripateticus quidam, & eadem in nos iacula retorquet: si processus mammillares precipua sunt odoratus organa, cur vi & impetu per fistulam pulsus odoratus aer non percipitur? Respondet Galenus aerem per fistulam impulsam, si spiritum cohibeamus, ad cerebrum nunquam pertinere, quia aere omnia iam sunt plena contractio per expirationem cerebro: at dum insita vi dilatatur cerebrum, amplificantur spatia omnia, tuncque ad vacuum fugam aere inspirato implentur. Nunquam ergo ad cerebri processus & eius ventriculos fertur aer, nisi inspiratione: quia nisi dilatentur organa, quomodo aer eos poros subibit, qui iam aere sunt pleni? Si aer non nisi inspiratione ad processus mammillares ferri potest, ergo nec odoris species. Ut enim soni character & qualitas non nisi per interiectum aerem ad auditus organum traicitur: ita nec odoris qualitas ad odoratus organum. Abeat ergo cum suo commento Aristoteles. Volumus cum Galeno & Medicis omnibus princeps odoratus organum intra calvariā esse collocatum, & portionem esse cerebri, processus quippe & tubercula duo mammarum papillis simillima, quae summo narium ossi obiecta insident. Hoc admirandus Hippocrates libello *de ap. xlv* sic prodidit: Olfacit cerebrum aridum odorem unum cum aere; per corpuscula cartilaginosa ipsum trahens. Hoc Galenus libello De odoratus organo, 8. De usu partium, & 1. De symptomatum causis, testatur. Hoc denique rationes haec suadent. Ea pars princeps aestimanda est, quae peculiarem habet substantiam, figuram & compositionem, Galeno auctore 6. De placitis Hipp. & Plat. sed inter omnes nasi partes processus hic peculiarem habent naturam, figuram & compositionem, quam alibi nusquam reperias; ossa autem cartilaginea & membranae ubique sunt similes: ergo his processibus princeps actionis causa adscribi debet. Accedit quod nulla in naso pars est, quae ab odoribus alterari queat; tubercula autem haec quia spiritu plena & vaporosa facile odorum species excipiunt; & quia nervorum naturam redolent, perceptam qualitatem internoscunt. Auerrhoes Medicorum acerrimus impugnator, ut Aristotelem taceatur, Galeni sententiam lenibus machinis subvertitur conatur. Si, inquit, processus mammillares odoratus essent organa, obstructis naribus eorum quae ore conteruntur, odor perciperetur, quia ab ore & palato ad ea tubercula aeri aditus patet manifestus. Praeterea ciborum qui in ventriculo continentur, odor perciperetur, exspirant enim toto coctionis tempore à ventriculo ad cerebri vapores. Postremo quia his tuberculis caret animalia, non olfacerent. Quibus ita satisfaciendum puto. Etiam si ab ore ad eos processus pateat via, non tamen occlusis naribus odorum fiet perceptio; quia offerri primò debent naribus odores, ibique preparari. Non fit itaque sine naribus odorum perceptio; non tamen ob id precipua odoratus organa dici debent. Sic sine albugineo humore non fit visio, eum tamen princeps visionis organum nemo dixerit. Est & alia ratio, cur occlusis naribus quae ore conteruntur, & quae in ventriculo continentur, non sentiuntur; quia odor ille nimio ventriculi & oris humore perfusus se exere non potest, & sensui nativam speciem imprimere. Est enim odor sicci apud Philosophum 2. De anima, ut sapor humidus: sic qui coryza laborant, odorum imagines non suscipiunt. Praeterea non sentitur odoratus vapor à ventriculo ad cerebrum delatus; quia nimium familiaris, confociatus & quasi nativus est redditus: itaque ab eo non fit alteratio. Sic qui alius sapius uti solent, sedum ipsi eorum odorem non sentiunt. Quae tandem obicit Auerrhoes, animalia multa sine processibus his odores percipere, Galeno non aduersantur: de perfectis enim

Observatio
Galeni pul-
cherrima,
obiecta.
Solutio.
Cur non sen-
tatur odor, nisi
inspirato aere.

Quidnam ve-
rum sit or-
ganum odoratus.
Processus mā-
millares.
Auerrotes

Ratio 1.

Secunda.

Auerrohis
rationes contra
Galenum.
Ratio 1.

Secunda.

Tertia.

Defenditur
Galeni &
Auerrohis
satisfit.
Cur occlusis
naribus quae
in ore & ven-
triculo conti-
nentur, non
sentiuntur à
cerebro.

Conclusio.

animalibus loquitur non de imperfectis, quæ ut sine ossibus stant, sine pulmonibus vivunt, sine naribus & tuberculis mammillaribus respirare & olfacere nihil prohibet. Cœcladamius ergo tubercula illa duo mammillarum ritu extuberantia præcipua esse odoratus organa, sine naribus tamen & osse illo spongioso odorû perceptionem fieri non posse. De odorû natura & odorandi modo, an ex odorabili obiecto sola realis qualitas exeat, ut voluit Plotinus, an corporeum quid, ut existimavit Heraclitus, an sola odoris imago, ut voluerunt Peripatetici, plura hic differere non est huius loci atque temporis.

HISTORIA ANATOMICA.

De cæteris faciei partibus externis, genis, labiis, mento.

CAPVT XVI.

Malum quid.

Pili faciei.

Bucca.

Mussææ.

Labia.

Prolabia.

Mentum.

Barba.



CCVRRVNT etiam in facie externa multæ patticulæ, ac primum genæ, sup̄erna & inferna, ἀνω καὶ κάτω γένος. Illius superior pars leuiter inter nasum & aurem sub oculis eminens, ac mali instar rubens, pudoris sedes, μῆλον dicitur, malum; Hippocrati verò κύκλος προσώπου. Pili qui faciem primò vestiunt, ἰσλαοί, ab iulo verme qui numerofo pedum ordine fertur. Inferior malæ pars laxior, quæ spiritu inflatur, propriè γνάθος buccadicitur. Locus sub naribus ad labrum superius pertingens, vbi primùm lanugo prorumpit, μύσαξ, ἀπὸ τοῦ μυκτῆρος, à mucco narium qui illic distillat dicitur, & ὑπόρριον; cavitatis autem vel sulculus valleculæ similis φίλτρον, quasi diceretis amoris illecebras. In hac parte pili primò prorumpunt, idcò προπαγώνιον seu probabium vocant; dum verò rigidi fiunt μύσακες, mystacæ Latinis dicuntur. Sequuntur labia aut labra Tullio, quæ musculosæ sunt oris extremitates ipsum claudentes & aperientes, χείλα vocant, ἀπὸ τοῦ χέειν λόγον, quod sermonem fundant. Duo sunt, superius ἀνώχειλον, & inferius κάτωχειλον. Horum partes prominētiōres prolabia appellantur, προχειλίδιον Polluci, προὐλή χείλεος Hippocrati. Rubentes eorum partes προσόμια, timæ autem ῥαγάδες, foramen medium ab utrisque efformatum cum mutuo diuiduntur, στόμα, os. Inferioris labij pars in acutum definens γένειον, γένυς mentum dicitur, aliis πώγων, quod barba exoneretur. Huic mento fouea ornatus caussâ impressa νύμφη, τύπος vocatur; acutior menti pars ὀξύγυνος. Pars catnōsior à menti sine acuto incipiens ἀνστρεῶν, quod ibi maximè barba florebat dicitur, buccula à Suetonio. Tandem in mento barba cernitur, quæ cum primò erumpit χυῖς, lanugo vocatur, cum adoleuit, πώγων; pili verò barbæ γενειάδες dicuntur.

De ore & partibus in eo contentis.

CAP. XVII.



S Græcis στόμα καὶ λογιῶν, Homero μάσαξ sub natibus statim locatum est. Eius vsus alius primarius est, alius secundarius. Primarius duplex: alter, ut alimenta in ventriculū ingerantur, fiatque in eo chylosæos præparatio; alter, ut feratur in pulmones aer, tum ad vocem edendam, tum ad nutritionem, temperationem & expurgationem vitalis spiritus. Secundarius oris vsus est, ut vomitu ventriculi, & spuitione thoracis ac pulmonum excrementa foras pel-

latur. Ore aperto quamplurimæ partes conspicuæ sunt, gingivæ, dentes, palatū, ^{orū partes.}
 vuula, lingua, fauces & paristhmia. Gingivæ Græcis γῆλα, carnes sunt immobi- ^{gingivæ.}
 les, in eum usum constructæ, ut dentes in alveolis firmient ac stabiliant, gingi-
 varum exterior pars γῆλον vocatur, interior ἐνυλόν, *connexio*, χαλινός, id est, *frænum*. Dentiū historiam in osteologia descripsimus. Sexdecim sunt in utra-
 que maxilla; ex quibus quatuor sunt τομαῖς seu incisores, duo κύνοντες seu cani-
 nini, & decem γομφίοι καὶ μύλοι seu molares. Nudi autem omnino non sunt,
 sed oris pulchritudini & dentium salutī simul consulens Natura, gingivis ne
 horriduli essent, illos muniuit, labiis verò licet mollioribus tanquam clypeo
 obtexit, ut veluti septum frigidiorē aerem ingressu prohibeant frangantque
 & immutent. Palatum, superior est oris pars, Græcis ἔργονός, ἔργονίσκος, quasi ^{palatum.}
 oris cælum dicitur, aliis ὑψώων, quibusdam testudo & solum oris, Latinis pa-
 latum, quod dentibus seu palis vallatum sit. In huius extremo foramina duo cō-
 spiciuntur, per quæ narium & palati maxima est societas. Vuula caruncula est ^{vuula.}
 fungosa à palato iuxta narium meatus in os propendens. Hæc dum integra est,
 γαργαρεών, id est, *gurgulio*, & πλῆκτρον, id est, *plectrum* vocatur: dum malè affe-
 cta est, si superna sedē tenuior sit, inferna crassior, instar vix pendētis, σαφ-
 λή, id est, *ona* & *vuula* dicitur: si verò teretē habeat formam, χιλιών, id est, *co-*
lumella nuncupatur. Huius hunc usum agnoscunt Medici, ut aeris frigidioris ^{vuula usus.}
 inspirati impetum frangat, ne in pulmones tam subitò irruat; unde fit ut qui-
 bus hæc caruncula præscinditur, vox statim lædatur: & Alexander in Proble-
 matis quærit, Cūr quibus gargareon præscinditur, ij ferè omnes contabescant.
 Respondet, frigidum aerem rectè ad pulmones ferri, densari & crassescere fri-
 gidi inspiratu sanguinem, tardiorēque ad motum pulmones effici, atque ita ex
 valido ad motum conatu disrumpi vasa. Fauces, seu φάρυξ, totam eam capaci-
 tatem denotat, quæ hiantē ore percipitur. Vocatur autem hæc faucium regio ^{fauces.}
 ἰσθμός, ab angustia, quod angustissima sit, & varij generis organa contineat.
 Glandulæ duæ iuxta isthmum collocatæ, παρίσθμια, seu *tonsille* dicuntur: quæ ^{paristhmia.}
 fauces, os, & linguam saliva irrigant perpetuò, non enim gustatio sine madore
 perficitur, ut neque coctio in ventriculo sine elixatione.

De lingua.

CAP. XVIII.

LINGVA gustatus & sermocinationis organū, Græcis γλῶσσα
 & γλῶτλος dicitur. Varro linguæ nomē ex eo deriuat, quod ^{lingua cur}
 cibum liget, vel quod dentium septis quasi muro circumual- ^{dicitur.}
 lata atque ligata sit: vulgus à lingendo dictam putat. Euripi-
 des ἀγγελον λόγον, *sermonis nuntiam* vocat. Lingua pusil- ^{lingua pra-}
 lum quidem mēbrum est, sed magna iactat: per eam (inquit ^{stancia.}
 Apostolus) benedicimus Deo & maledicimus hominibus. Ecce quantulus
 ignis quā magnam siluam incendit! Naues à minimo gubernaculo quo-
 cunque dirigentis voluerit impetus, circumaguntur. Lingua corpusculum
 animi omnes conceptus exprimit: propterea multis custodiis, dentibus quip-
 pe, labiis & fræno linguam muniuit & firmavit Deus Opt. Max. ut tot carce-
 ribus & clathris clausa mens prius deliberet quā proferat, verbūque prius
 transeat per limam, quā per linguam. Est itaque nobilissimus & penè diui-
 nus linguæ usus, soli homini proprius: unde organum dialecticum rectè ap-
 pellatur, & voluntatis nuntia. Sunt alij linguæ usus homini & cæteris animan- ^{lingua usus}
 tibus.

Figura.

Sens.

Substantia.

Structura.

Caro.

Membrana.

Nervi tres.

Linea disclo-
dens linguam,
duo, vti
Hippocrati.

Vena.

Arteria.

Ligamentum.

Frenulum.

Musculi 10.

tibus communes, vt scilicet saporum differētijs omnes dignoscant, quaraione gustatus organū dicitur, & Aristoteli primo de historia animalium, τὸ δ' αἰσθητικὸν χυμῶ γλῶττα, *inest pars sentiens saporem lingua*, deinde vt eius moru esculemra trudentur & transmittantur in gulam. Figuram & magnitudinem cam obtinuit, quæ ori vndique se applicare posset & ciborum ingestionem minimè impediret: vt autem ad morum promptior esset, ex latiore basi in acutum mucronem sensim definir. Basis latior ἐπιγλωσσις dicitur, finis acutior πηγλωσσις. Superior & asperior pars iuxta palatum ἐπιγλωσσις, excavationes vtrinque χηραμοὶ & παρὰ στυγε. Situs nulli non est conspicuus. Substantia carnea est. Tota autem eius structura varijs coagmentatur particulis: carne enim constat sibi propria & peculiari, tum membranjs, dein nervis tribus, postmodum venis & arterijs quam plurimis, tandem musculis decem, & ligamento validissimo. Caro mollis est, rara & laxa, spongiæ instar, dignoscendis saporibus maximè idonea: per eam fibræ excurrunt nullæ, quò fir vt musculo-
sa dici nequeat, sed peculiaris, qualem in reliquo corpore nullam reperias. Carnem hanc membrana regit tenuissima, ori & palato communis, in quam nervi tertij & quartæ coniugationis expanduntur. Hæc saporum omnium agnoscit discrimina & humore aliquo fucata (vricteris & febricitantibus contingit) deprauati sensus causa esse solet. Nervorum paria tria per linguam disseminantur: priora duo per tunicam sparguntur, & gustui inferuiunt, postremum in linguæ musculos ad morum & loquutionem diuascatur. Linguæ corpus totum sibi continuum est, nullò que sepro, vt veterum quidam existimant, discluditur, in dextram ramen & sinistram partem lineæ cuiusdam interiectu dirimitur, quam primus Hippocrates in Coacis διανοῦν, seu medianam dixit: ad cuius imitationē Aristot. i. De gen. animal. διεξαινεῖν, vocauit. Venæ sub lingua apparent duæ à iugulari externa exortæ, quas vulgus raninas dicit. Totidem arteriæ à carotidibus prodeuntes venas has comitantur. Medio inferioris linguæ corpori, ligamentum validissimum subiicitur, cuius auxilio suffulra linguæ mollities, facilius vibrari ac produci potest. Huius extremæ parti funiculus adnascitur, quem linguæ frænulum vocant. Nam cum incitata & volubilis esset naturâ suâ, ne forrè indomita plus æquo in loquacitatem solueretur, eo tanquam fræno cohibetur. Tandem musculi sese offerunt decem, quorum operâ sursum, deorsum, antrorsum, retrorsum, & in latera lingua mouetur. Sursum mouent duo à styloide processu in mediam ferè linguam inserti, deorsum totidem, ab inferiore maxilla, quæ sunt molares exorti, antrorsum aut extrorsum duo, ab interiore mento pronari, retrorsum duo à basi ossis hyoïdis prodeuntes, dextrorsum vnus, sinistrorsum item vnus à cornibus superioribus ossis hyoïdis ambo exorti, & in linguæ latera inserti. Hos linguæ varios & diuersos motus non parum iuuant ossis hyoïdis musculi. Lingua non omnibus eodem modo. Tenuissima serpentibus & trifulca, vibrans & prælonga, lacertis bifida & pilosa, virulis marinis duplex, piscibus tota adhærens, leonibus ac pardis imbricatæ asperitatis ac limæ similis. Homo inter cætera animalia linguam habet absolutam mollissimam & latam, vt commoda ad vtrumque officium sit, hoc est & ad sapores percipiēdos, & ad litteras exprimendas: ira enim conformata facilius se contrahit, producit, dilatat. Patet hoc in iis quibus non satis absoluta est, blæsi enim & balbi fiunt.



LIBER DVODECIMVS. IN QVO ARTVVM HISTORIA DESCRIBITVR.

HISTORIA ANATOMICA.

Breuis artuum descriptio. CAPVT I.



HUMANVM corpus in tres regiones seu ventres & extrema secuiimus. Trium regionum naturalis, vitalis & animalis partes omnes continentes & contentas qua fieri potuit breuitate & perspicuitate lustrauius: nunc artuum historiā hoc libro describere placet. Quemadmodum rami arborum caudici; ita artus trunco corporis adnascuntur. *κῶλα* Græci dicunt, alij *ῥῆμα*, quidam *ἐκφυάδες*, *enata*, *adnata*, *explantata membra*; Latini artus vocant ab artando. Sunt autem artus duo, superiores & inferiores. Superiores communi vocabulo ma-

*Artus duo,
& superiores
inferiores.*

nus vocantur. Veteres enim nominarunt *χεῖρα* eorum membrum brachij ab humero ad extremos digitos vsque, & quod nos manum, illi *ἄκραν χεῖρα*. Inferiores artus pedes dicuntur, de quibus postea. Manum totam Hippocrates & Galenus diuidunt, εἰς τὸν βραχίονα, τὸν πῆχυν καὶ τὸ ἀκρόχειρον, id est, *in brachium, cubitum & summam seu extremam manum*. Brachium, Celso humerus, *ὤμος* Aristoreli, *ἀκροκώλια* Polluci, aliis *ὠλένη*, Felso armus dicitur. Huius caput quod lato scapularum ossi inferitur *ἀκρωμία* Polluci, *ἑσσωμικ* Eurypidi vocatur; extremitas verò *ἀκρωλένιον*. Cavitas sub humeri articulo Aristoreli est *μασχαλή* axilla, Xenophonri *μαλλή*, ala vulgo, quia in ea pili quasi pennæ nascuntur. Secunda manus pars aut media *πῆχυς* dicitur, quod extremo brachij compacta sit, & *ὠλένη*, quibusdam *ἀγκών*, Latinis cubitus, vlna, Tullio lacertus. Huius ad brachium commissura *βαθμὺς* Polluci; flexus verò cubiti pro-ruberans *ἀγκών* dicitur Ruffo. Tertia pars *χεῖρ ἄκρα*, *ἀκρόχειρ*, *summa manus*, sic dicta à *μανάδο*, quod ex brachijs manet; tres habet partes *καρπὸν* seu brachiale, *μετακάρπιον* seu postbrachiale, & *δακτύλος*, id est, *digitus*, de quibus suo loco. Hæc nimirum est rotius manus communis diuisio: singula nunc accuratiùs persequamur.

*Manus diuisio
Brachium.*

Cubitus.

*Summa extre-
ma.*

De totius manus partibus in vniuersum.

CAP. II.

Vena totius
manus.

Basilica.

Profunda.

Subcutanea.

Mediana.

Cephalica ve-
na.Arteria ma-
nus.Nervorū ma-
nus paria sex.
Primum.
Secundum.

Tertium.

Quartum.

Quintum.

Sextum.

Manus my-
culi.

Ossa manus.

TOTIVS manus partes propriæ (communes enim ut cuticulâ, cutem, adipem, membranâ nervosâ hîc prætereo) sunt vasa, muscoli & ossa. Vascorū nomine venas, arterias & nervos intellico. Venæ quæ per manū totâ diuariçatur omnes ab axillari radio scaturiunt. Sunt autê duæ taprû, quarû altera per interiorê, altera per exteriorê brachij partem fertur: illâ vulgus basilicâ vocat, hanc cephalicâ. Basilicam Hippocrates τὴν εἰσω φλέβα id est, *venam internam appellat*, alij hepaticâ & iecorariam. Hæc in profundam & subcutaneam diuidi solet. Profunda axillari arteriæ & tertio nervorum pari attenla ad medium cubiti flexum fertur, in radium & cubitum ramos spargens. Subcutanea per cutim excurrit, & dum ad cubiti articulationem peruenit, in duos finditur ramos, quorum alter ad internum cubitum delatus cum humerariæ ramo vnitur, & ex eo coitu communis vena enascitur, quam medianam vulgus vocat, Arabes autem venam nigram. Alter per infernum brachij latus descendit, ramulis in vicinam cutê & partes subiectas dimissis. Cephalica, quod in affectibus capitis secetur; Hippocrati extetna, quod brachij exteriora perreptet, aliis humetaria, quod per humerum feratur inter deltoidem musculum & pectoralis tendinem superficiei tenus delapsa, dum ad cubiti flexum peruenit, in duos dirimitur ramos, quorum alter in interiorem cubitum obliquè latus cum basilicæ ramo coit & communem venam parit; alter insignior per radium ad eius ferè medium descendit, hinc obliquè ad carpum excurrentem manū externam ferè totam irrigat, & conspicuo ramo inter paruum digitum & annularem desinit. Arteria ab axillari ramo similiter prodit, sed vnica est, basilicâ dicût. Eius duo sunt ramî, profundus & subcutaneus. Vterque varios ex se diffundit riuos; est tamê subcutanei furculus quidam in carpo conspicuus, quo loci pulsuum differentias admota manu explorare solemus. Per manum totam sex paria nervorum disseminantur. Primum à quinto cervicis spondylo prodiens, in deltoidem musculum & cutim vicinam absumitur. Secundum à sexta vertebra scaturiens in bicipitem musculū primum fertur, mox musculo cubiti longissimo ramulum largitur, tandem vbi flexum cubiti attingit, in duos secatur ramos. Tertiu secundo permistū in brachij musculum bicipiti substratum riuos diffundit. Quartum omnium crassissimū sub eodem musculo cum basilica profunda & arteria interna delapsū in varios scinditur ramos. Quintum inter musculos cubitum extendentes & flexcentes delatum ponè internam brachij apophysin præteruectum tertioque permistum pari, in digitos absumitur, minimo nervulos duos, medico duos, medio vnum distribuens. Sextum par inter cutem & membranam nervosâ per internam brachij apophysin delapsū, in cubiti cutim desinit. Atque hæc totius manus sunt vasa, quorum descriptionem repetere ex libro quarto. Musculi totius manus sunt quamplurimi. Alij enim brachium, alij cubitum, alij radium, alij carpum, alij digitos mouent, de quibus libro de carnibus. Ossa totius manus varia sunt. Vnicum est brachij os; duo cubiti, cubitus & radius; octo carpi; quatuor metacarpij, digitorum quindecim, quibus sesamoidea addere licet, quæ omnia libro secundo sunt accuratè descripta.



MOMINEM, audacissimæ & omnia confidenter molientis naturæ decus, nudum quidem & inermem in nuda humo natali die abiicit Deus ad vagitus statim & ploratum: sed duobus eū armavit præsidii validissimis, quæ cæteris animantibus denegauit, ratione & manu. Ratio artium omnium ars est & officina, ars ante omnes artes. Manus organum est ante omnia organa.

Cum enim nullum sit eorum quæ particularia sunt, omnium tamen est capax, & ut de anima dicebat Philosophus, potestate quodammodo est omnia. Manuum operâ leges conscripsit homo, aras crexit Deo, naues, domos, lyram, omnia telorum genera construxit. Taceo pingendi, fingendi, scalpendi nobile artificium. Manibus pollicemur, vocamus, dimittimus, minamur, supplicamur, abominamur, timemus, interrogamus. Manuum operâ licet inermis nascatur homo, à mutis tamen animantibus tutus est, & ea omnia quæ firmiora nascuntur, imò ferociora, etiam si vim cœli fortiter patiantur, ab homine tamē tuta esse non possunt: plus denique homini confert manuum industria, quàm taurorum impetus, ferini aliorum dentes, ungula: nam quicquid vniuersi ambitus complectitur, manuum solertia nostri firmitur. Ideo Anaxagoras quidam physicus animaduertens, quanta cum ratione & quàm scitè hoc membrum fabricata natura esset, pronuntiavit, non posse ad vllarum rerum effectiōnem excogitari organum magis affabrè, aut accuratius perfectum, nec dubitavit, ut refert Plutarchus ἐν ταῖς χερσὶν τὸ αἰὲν αἰλλῶν τὸ βέλτερον τῶν ἀνθρώπων στοιχείαν, id est, manibus ascribere sapientiæ humanæ ortum & causam. Quod tamen non probat Galenus primo De usu partium. Non enim idè sapiētissimum est animal homo, quia manus habuit: sed quia est sapientissimum animal, idè manibus instructus fuit: manus namque hominem artibus non instituerunt, sed ratio. Sunt manus rationis ac sapientiæ ministræ, sermonis velut vicariæ, conceptuum interpretēs; cogitationes enim nostras amicis per litteras significamus. Manus fidei consecrauit Numa Pompilius, propterea manuum contactu pacta confirmamus. Fuit etiam Persis sanctissimum fidei pignus: idè maiorum hæc fuit saluatio, ut hac potissimum se corporis parte venerarentur. Qui adorant, manum solent deosculari & capita submittere. Manus in Ægyptiorum hieroglyphicis fortitudinem denotat, idè qui auxilium querunt, dextram petunt. Est apud chironanticos manus non modò organum organorum, sed velut figura temperamētī, habitus, morum, ut talis sit apud eos extima vola manus, qualis est intima cordis. Stigmata enim & lineamenta manus videntur esse, velut cœlorum impressiones & naturæ nostræ vestigia, quæ internarum rotarum motus, nativam inclinationem, infortunia, vitæ longitudinem & breuitatem denotant. Ea denique est manuum dignitas, ut idè figuram rectam & in cœlum versam habuerit homo, quia manus habuit.

Manus duo tribuuntur rationem & manum.

Manus opera quod præstet homo.

Anaxagoras manibus sapientiæ humanæ ortum tribuit.

Manus sermonis vicaria.

Manus fidei dicata.

Manus fortitudinem denotat.

Manus apud chironanticos figura est morum.

De usu, figura & structura extremae manus. CAP. IIIL.

Manus offici-
cina.Manus usus
tres.
Primus.

Secundus.

Tertius.

Figura ma-
nus.Manus stru-
ctura.Manus pri-
marie pars
musculus est.
Nervus, pars
sine qua non.Ossa & un-
gues perfe-
ctiorem red-
dit actiuam
manus.Adiuvamen-
tus manus con-
servantes
partes.

A N V S verum officium est apprehendere, cuiusque propria actio est apprehensio; unde ὄργανον ἀπληκτικόν dicitur, ut pes ὄργανον μεταβατικόν: ergo primarius erit hic manuum usus ut apprehendat. Alter usus est ut sit tactus estimatrix & iudex. Licet enim per totum corpus & externum & internum diffusus sit tactus, quia fundamentum est animalitatis; exquisitius tamen qualitates quæ tactum feriunt primarias & secundarias extrema manu sentimus quam cæteris partibus, modo callo vti fossoribus non sit obducta; ideo & polita est & depilis ea parte cutis. Est & manus ad dolores levandos, ad iniurias propulsandas & ad anticarum partium tutelam accommodatissimum organum: propterea ad hos usus omnesque functiones obeundas, & figuram qualem cernimus obtinuit, & structuram mirabilem. Figuram quidem oblongam eamque in plures partes diuisam habuit, ut figuras omnes sphericam, rectam, cauam complecteretur, quandoquidem omnes ex tribus constituuntur lineis curua, caua & recta. Sed & figura hæc & maxima corpora, & minima corpuscula equaliter apprehendit: minima enim summis duobus digitis indice & magno comprehendit; paulò maiora iisdem quidem digitis, sed non extremis; quæ maiora, tribus digitis, magno, indice & medio; quæ adhuc maiora, quatuor; deinceps & quinque, post hæc tota manu. Quod si vnica parte eaque sibi continua constaret manus, æquale tantum cuiusque ad moti corporis magnitudinem apprehenderet. Neque verò satis erat diuisam esse in digitos manum; debuerunt iidem digiti diuerso ordine, non in vna eademque recta linea locari, & quatuor digitis opponendus fuit vnicus, qui parua omnino flexione curuatus cū singulis quatuor oppositis actionem seruaret. Hæc figuræ totius ratio est. Structuram autem si attentius cōtempleris, singulare naturæ artificium miraberis: ea porro eiusmodi est. Quia manus nobilissimum erat & perfectissimum organum, variis eam coagmentauit particularis Deus, quas omnes facilioris doctrinæ gratiā ad quatuor genera reuocare placet. Primum earum est quæ actionem primò & per se edunt; alterum earum sine quibus actio non fit: tertium earum quæ perfectiorem actionem edunt; postremum earum quæ actionem conseruant. Princeps & primaria manus pars musculus est, quia non fit sine motu apprehensio; musculus autem volutarij motus immediatum est organum. Pars sine qua non fit apprehensio nervus est: non enim mouet musculus sine imperio, imperium deserit nervus cum spiritu tenuissimo, ideoque lator dicitur. Quæ perfectiorem edunt actionem sunt ossa & ungues: ossa enim robur & stabilitatem præstant, sine quibus flecti quidem & extendi possent digiti, sed ob mollitiem semper essent tremuli, nec quicquam arctarent cōtinerentque. Ungues etiam apprehensionem iuuant. Quæ actionem conseruant particulæ sunt venæ, arteriæ, cutis adæpsque. Venæ enim manum sanguine irrigant; arteriæ vitali eam perfundunt spiritu; cutis adæpsque omnium ἐκδιδόναι καὶ ἐπιστάζειν, id est, colligationem exhibent.

Similarium omnium particularum que manum constituunt ratio explicatur.

CAPVT V.

MVSCVLVS itaque princeps manus est pars, cui primo & per se debetur apprehensio. Cum autem musculi partes præcipue duæ sint, caro & tendo, tendines multos & paucam carnem digitis apposuit Natura, quia leuem simul & tenuem esse extremam manum oportebat, non grauem & crassam. Tendines autem hi, ab exortu ad insertionem vsque rotundi sunt ad *δυσπιδαν*, sed dum inferuntur latiores fiunt ad faciliorem motum. Quia verò digitorum plures erant motus, recti flexio scilicet & extensio, & obliqui, dum adducuntur & abducuntur, tendines externa internaque parte & ad latera sunt locati. Quot autem sint manus musculi, quis eorum ortus, insertio, structura, docuimus libro quinto in musculorum historia. Nervi plures ex quarto & quinto brachij coniugio in musculos digitorum & cutem sparguntur, qui sentiendi & mouendi facultatem impertiuntur. Ossa manus, alia sunt carpi, eaque octo, alia metacarpij, eaque quatuor, quæ stricta & immobili articulatione cōnectuntur; alia digitorum, quæ per diarthrosin articulantur; moueri enim debuerunt digiti vt figuras omnes apprehenderent. Sunt autem tria tantum digitorum ossa, non plura, nec pauciora; plura namque perfectam extensionem læderent, pauciora tam diuersas particulares figuras non admitterent. Hæc omnia ad motus facilitatem per ginglymon cōnectuntur. Iuuat autem varietatem moruum & cartilago extrema circundans, & pinguis oleosusque humor mucii instar articulos obliniens. Quia verò dum artus hos, animal quocunque vuln inflectit, ne distraherentur & ex sedibus suis excideret, Natura vinculis ea colligauit, & ossicula sesamini seminis figuram exprimentia apposuit. Nam quæ internis manus articulis insunt ossicula, hos intrò luxari prohibent dū manum vehementius extendimus, quæ verò externis manus articulis sunt locata, ne in flexione extrema foras luxentur impediunt. Ossium porrò manus historiam repete ex libro nostro de ossibus; nam singula hęc transcribere hominis esset otio abutentis. Ossa ergo perfectiorem reddunt actionem. Si enim sine ossibus essent digiti, solæ illæ actiones ederentur, in quibus circulo eos pliacari oportet. Vngues etiam melioris vsus gratiâ constructi sunt, dura namque & exigua corpuscula faciliè effugerent, nisi digitorum extremis durum quoddam corpus carnes firmas & stabiliens apponeretur. Venæ, arteriæ, cutis ad epique actionem conseruant.

*Caro digitorum
est pauca.*

Nervi digitorum.

Ossa manus.

*Digitorum
ossa tria
tantum.*

Vincula.

*Ossiculorum
sesamoidem
figos.*

*Vngues me-
liori gratiâ
constructi.*

Dissimilares manus partes explicantur de carpo & metacarpio. CAP. VI.

EX TREMA manus tres habet partes dissimilares, carpum, metacarpum & digitos. Carpus Græcis *καρπός*, Latinis brachiale, rasseta Barbaris, roseta aliis, quia eam partē rosas ac variis floribus exornare solebant, octo constat ossibus duplici ordine distinctis, quæ propriis carēt nominibus. *Μετακαρπίον, ἀνδρῶν*, Metacarpus, & à constructionis forma cum pectore *σῆτος*, pectus, *λέγιον*, Auicennæ pecten manus, postbrachiale, Celso palma, diuiditur in partem in-

Carpus quid.

Metacarpus.

*Palma manus**Vola.**Monticuli
manus.**Lineæ manuum.**Linea vitæ.**Linea naturalis.**Linea Veneris.**Manus dua
sunt.**Ambidextri*

ternam & externam. Interna quæ manum cauam reddit dum exporrecta est, *γέναρ* Hippocrati dicitur, quod per ipsam ictus infligantur, Latinis palma, dum curuata & concava, *κοίλη* vola manus. Externa quæ est auersa manus, *ἐπίσγέναρ*, *κλίς*, *προκάρπιον* & *δῶρον* dicitur. In palma & vola manus multe obseruantur particule. Nam eius initium aliquantulum extuberans *ρίζα χειρὸς*, radix manus vocatur; medium, *μετέσχητον* quasi interstitium. Sunt & tubercula manus pulpam constituentia (monticulos vocant Chiromantici) & lineæ. Monticuli prominentiores sunt & carnosiores partes, *γέναρα* proprie dicuntur, *ἀπὸ τοῦ γέναι*, id est, *ἀπὸ percutiendo*. Monticulus pollicis substratus, mons Martis; qui indici adheret, mons Iouis; qui medio, Saturni; qui annulari, Solis dicitur; qui minimo subiicitur, Veneri dicatus est: Thenar autē, id est, spatium quod pollicē indicēque intercedit, Mercurij montē, hypothenar montē Lunę vocat. Lineæ verò seu incisurę, *γεγραμμαι καὶ τόμαι* in vola manus multe sūt, ex quorū aspectu Chiromantici mira pollicētur, & vitę longitudinē ac breuitatē, infortunia, natiuam inclinationem, euentus omnes prælagiunt. Quatuordecim describi solent, sed tres sunt præcipuę: prima pollicis ambitum circumscribens *ζωνφόρος*, *vitifera*, linea vitę nuncupatur, ab aliis *καρδιακή*, *χρονική*, *temporalis*. Secunda transuersum per mediam volam delata ad Lunę montem extenditur, *ἡ πωλική*, *iecoraria*, *ἀναγκαία*, *naturalis* dicitur. Tertia ab hypothenare incipiens, ad indicis monticulum fertur, mensalis, rhoralis & Veneris linea appellatur. Cæterum manus prona *πρυμνή* *χειρ*, supina *ὀπίσθια* dicitur; dum verò clausa est, *πυγμή* pugnus vocatur; dum compressa & digitis complicatis, ita vt articuli, præcipuē medij digiti extent, condylus vocatur, vnde condylo ferire dicunt. Rursū obseruandum manus duas esse: adiutricem enim alteri alteram effecit natura. Dextra *δεξιὰ*; sinistra, *ἀριστερά*, *λαία*, *σκαιά* dicitur. Sūt qui vtraque manu commodē vtuntur, & hi *ἀμφότεροι δέξιοι*, *ambidextri* appellantur. Mulier apud Hippocratem sectione quinta Aphorismorum ambidextra non fit.

De digitis manus.

CAP. VII.

*Digitus
partes.**Digitus qui
que tactum,
et cur.**Pollex.*

OSTREMA superest manus pars quæ digitos complectitur, *δάκτυλοι* dicuntur, quorum ordines velur in aciem dispositi *φάλαγγες* vocantur. Eorum pars vel interna est, vel externa. Internæ partis articulationes, internodia *σκιεαλίδες*, *κόνδυλοι* dicuntur: eorum autem partes extremæ vbi pulpæ teretes digitos terminant, *ῥάγες κορυφαί*, Latinis *uæ*, *vertices*, *acini*, *cacumina*. Externa pars protuberantias habet iuxta articulos, quæ Græcis *κόνδυλοι*, nobis nodi dicuntur. Primi *προκόνδυλοι*; medij *κόνδυλοι*, postreми *μετακόνδυλοι*. Sunt autem in qualibet manu quinque digiti, nec plures aut pauciores, vt perfecta fieret apprehensio, esse debuerūt. Si enim pollicem demas, aliorum omnium vis & robur perit; si minimum tollas, vix ea quæ circulo apprehendi debent amplexaberis. Fuerunt autem inæquales, vt figuras omnes & moles magnas paruâsq; comprehenderent. Primus, quod robore cæteris æquipolleat pollex dicitur, Græcis *ἀνίχην*; Hippocrati *μέγας καὶ δίκωνδυλος*, quod duo tantum habeat internodia. Habet hic digitus peculiare musculos flectentes, extendentes, adducētes, abducētes, quia habet in suis motibus ali-

quid peculiare. Secundus *δείκνυς* index & demonstrator ab usu vocatur, quod eo in rebus indicandis uti soleamus; Suetonio salutaris, *λίχανος* à quibusdam, à *λείχω*, quod est lingo, quoniam ad condimenta exploranda in obsonia immisus lingitur; alij *δὸν ἔλαιν χαλάν*, quod inter hunc & pollicem magnus sit hiatus, unde *λίχας* vocatur, mensura interstitij inter pollicem & indicem. Tertius *μέσος*, *medius*, καὶ ἀπὺ γὰν Atticis, σφαίκελος, *obscænus*, *verpus*, *famosus*, *impudicus*, quia hoc extenso homines deridere vel infamia notare solebant. Quartus *ἰατρικὸς*, id est, *medicus*, quo prisci solebant pharmaca miscere, *δακτυλιώτης* etiam, id est, *annularis*, quia annulos illo digito gestabant, *ἐπιβάτης*, *ῥάμεσος*. Quintus *μικρὸς*, *minimus*, ob breuitatem, *μούψ*, *ὠλίτης*, *αὐτίκλαν*, quod eo aurium sordes expurgare soleamus. Constant singuli digiti tribus ossibus, quæ per ginglymon articulantur, ut libro de ossibus explicatum est. Tandem extremis digitorum ad perfectiorem apprehensionem apppositi sunt ungues, ex coctionis tertiæ crassioribus excrementis pronati, ideò continuo crescunt & in longum tantum ut pili. Est autem imperfecta eorum accretio, quia non fit tractio-
ne alimenti & assimilatione, sed per appositionem tantum. Sunt mediocriter
duri, ut externorum impetum eludant, rotundi, ad securitatem, Græci *ὄνυχες*
vocat. Eorum principium *ρίζονυχία* dicitur, radix; pars alba lunula candi-
cans circa unguium radicem *ἀνατολή*, id est, *ortus*; extremitas unguium *ἀχρονυχία*; pellicula radici annata *ἀργυρέα* à quibusdam; maculae albæ, men-
dacia; loca abscondita sub unguibz *κρυπτα* vocantur. Hæc nimirum est su-
periorum artuum brevis descriptio, nunc inferiora persequamur.

De pede in uniuersum eiusque præstantia, figura, structura, usu.

CAPVT VIII.



PT solus homo quia animalium sapientissimum erat, manus habuit organum ante omnia organa: ita solus inter pedestria bipes fuit & erectus homo, quia manus habuit. Quis enim pronus aut supinus equitare, vitam ciuilem ducere, scribere, naues construere, aras Deo erigere, omnia telorum genera iaculari, aliasque præclaras & penè diuinas artes exercere posset? Fuisset prudentissimo animali quadrupedum figura omnino inutilis valdeque incommoda; nam nec cælum intueri, cuius gratiâ se natum dicebat Anaxagoras, nec verè sedere posset ad contemplationem: fit enim (ut vulgo dicitur) anima sedens prudentior; mitto quod non ei liceret per aspera, inæqualia & decliua loca tam faciliè ambulare, turres ascendere, domos ædificare. Conueniebat quidem ad celeritatem pedum multitudo; sed homini quid ea celeritate opus erat, cum animalia omnia vincat industria sua? Plus enim homini potest ratio quàm natura mutis, plus linguæ & sermonis velocitas, quàm leuitas vsusque pennarum. Bipes ergo fuit & esse debuit, ideòque solus rectus stat, & solus sedet. Pedis proprium officium est ambulare, vera actio est ambulatio, ideò *ὄργανον* dicitur *μεταβαλικόν*, *instrumentum ambulatorium*, non quidem simpliciter, sed ut maximè conueniat sapienti animali. Fit autem ambulatio alteto quidem ctare in terra fitmato, altero verò circumlato; sed firmari quidem pedis, circumferri autem totius cruris est actio: ergo cum per stationem &

motum fiat ambulatio, illius quidem, pedes extremi sunt instrumenta, huius autem tota crura. Ad firmam autem tutamque stationem & ad varios motus perficiendos, figuram, & structuram qualem cernimus obtinuerunt pedes. Nam & in varios articulos diuisi sunt, & oblongi latique constructi sunt, non tamen æquè oblongi ac in manibus, non tam ad speciem, quàm vt nifu concitatos in cursu iuuarent. Etenim pressis in humum digitis mirum est quantò tutius totum propellatur corpus. Sed & caui in medio fuerunt pedes, vt omnia loca peruadere queant: nam cauis & mediis gibba amplectuntur; digitis verò in rectis, obliquis, decliuis & præruptis vtuntur. Pedum maxima est cum manibus similitudo & visi sunt sine manibus quidam, qui pedibus manuum functionem obirent.

De pedis totius partibus similaribus.

CAP. IX.



PEs Græcis ποὺς, ab ischij & coxendicis articulo ad extremos vsque digitos protenditur. Diuiditur in partes similares & dissimilares: similares vt in manu, aut cōtinentes sunt, aut contentæ. Continentes, cuticula, cutis, adeps, membrana neruosa. Contentæ sunt, vasa, carnes, ossa. Vasa trium sunt generū, venæ, arteriæ & nerui. Venæ omnes à ramo crurali ortum ducunt.

Ramus hic cruralis plures ex se promit furculos, per femur, tibiam & extremos pedes, numerosa ramorum serie sparfos; sex tamen maximè conspicuis fruticatur. Sunt autem hæ omnes propagines, saphena, ischias minor, muscula, poplitea, suralis & ischias maior. Saphena seu malleoli vena ad inguinis glandulas nata, per internam cruris partem inter cutem & membranam carnosam delata, ad malleolum externum descendit, & in pedis superni cutim variè absumitur. Ischias minor è regione saphenæ, in anteriorem ischij cutim & eius loci musculos distribuitur. Muscula in duos finditur ramos: minor in tibiæ musculos extensores riuos diffundit: maior profundior in omnes ferè femoris musculos diuaticatur. Poplitea ex ramis duobus cruralis cocuntibus conflata, furculis aliquot in cruris cutim posticam sparsis per medium poplitem delapsa, nunc in suræ cutim absumitur, nunc ad calcem vsque descendit, nunc per externum malleolum fertur, Suralis in suræ musculos & cutim tibiæ internæ disseminata, circa malleolum internum reflexa, latus internum pedis & cutim pollicis, rarè alios digitos adit. Ischias maior portione maiore per suræ musculos delata absumitur in furculos decem, singulis scilicet digitis binos, minore autem inter peronem & calcem cessante, interdum perforato medio ligamento, in musculum digitum pedis abducentem & cutim spargitur. Arteria cruralis iisdem ferè riuulis fruticatur, adeò vt vena comitem habeat arteriam. Nerui autem quatuor insignes per totum pedem disseminantur, qui ex tribus infernis paribus lumborum, & quatuor supernis ossis sacri nascuntur. Primus & summus sub peritoneo ad paruum trochanterem delapsus, in cruris musculos eiusque internam & externam cutim priusquam genu attingat, absumitur. Secundus & inferior cum vena & arteria crurali per inguen in crus descendit, ramumque insignem cum vena malleoli per internum femur ad pedem vsque emittit, cuti vicinæ interea ramulos largitus: maior au-

*Pedis figura
ad ambulati-
onem cōmoda.*

*Pedum cum
manibus simi-
litudo.*

*Similares to-
tius pedis
partes.*

Vena pedis.

Saphena.

Ischias minor.

Muscula.

Poplitea.

Suralis.

Ischias maior.

*Arteriæ
dis,
Pedis totius
nerui qua-
tuor.
Primus.*

Secundus.

tem pars cum vena & arteria in internos cruris musculos dispergitur. Tertius his inferior furculos musculis penis & quibuldam cruris, nec non cuti inguinali largitur, dein in propinquos musculos supra cruris medium definit. Quartus nervorum omnium crassissimus, siccissimus, validissimus, ex quatuor
 sup̄ernis partibus ossis sacri ortus, inter os sacrum & ilium elapsus, ramulos vicinis partibus vt cuti natium & cruris, nec non substratis musculis largitur; deinde in duos abit ramos, eorum minore secundum peronem delapso digitis singulis binos dat furculos; maiore autem per tibiam & pedem protenso digitis singulis binos quoque dat ramos: sed ambo hi rami musculorum capita & cutim tibie ac pedis obiter adeunt & texunt. Atque hæc vasorum brevis esto descriptio. Musculi pedis varij sunt: alij enim femur fleant, extendunt, adducunt, abducunt, circumagunt; alij tibiam iisdem motuum generibus agunt; alij pedem fleant, extenduntque; alij denique pedis digitos mouent, quorum historiam repetere ex libro nostro de carnibus. Ossa totius pedis quamplurima sunt. Femoris vnicum est os; tibie duo, perone & tibia cum rotula; pedij ossa septem sunt; metapedij quinque; digitorum quatuordecim, quibus sesamoidea addere potes. De his libro de ossibus disseruimus.

Pedis totius dissimilares partes explicantur.

CAP. X.



MAGNUS pes diuiditur vt & manus in tres partes dissimilares, *Pedis partes.*
 μηρὸν, id est, femur, κνήμην seu tibiam, & πόδα paruū pedem. *Femur.*
 Femur à ferendo dictum putant, quòd eo sustineatur animal.
 Eius carnosæ & pulposæ partes πλιγίδες & πλιχάδες ab Hippocrate vocantur; anteriores & externæ πωραμήρια; pulposa articulationis infernæ pars posterior, in quam genu inflectimus, ἰγυὺς poples dicitur, quòd post plicetur, anterior γόνυ genu. Altera *Poples.*
 pedis magni pars à genu ad calcem fertur, κνήμη dicitur & σκέλος, ἀπὸ τοῦ *Genu.*
 σκέλειν, quòd excarnis sit. Partes habet anticā, posticam, externam, internam.
 Anterior carne denudata ἀντικνήμιον vocatur, *Antisibiale,* quibulda ἀκανθα, quòd acuta sit, posterior pulposa Hippocrati γαστροκνήμιον, Latinis *sura:* exte- *Tibia partes.*
 riori pars παρακνήμιον à Polluce; interior προκνήμιον vocatur; bini verò pro- *Sura.*
 cessus inferni & excarnes, τὰ σφυρά καὶ πέλαι, Latinis malleoli dicuntur. *Malleoli.*
 Postrema superest pedis pars, πούς ἀκρος, *extremus pes, parvus pes,* appellatur, πέλαι *Pes extremus.*
 Arcadibus. Hoc totum corpus tanquam basi & columna sustinetur, estque ve-
 rum ὄργανον μεταβατικόν, *instrumentum gradiendi.* τριμερὴς is est, id est,
 in tres diuiditur partes, vt manus, in πωδὸν, μεταπωδὸν & digitos. *Pediū Hip.*
 pocrati σῆτος ποδός, ossibus septem constat; ex quibus quatuor propria habue-
 runt nomina, tria nomine carent. Pedij postrema pars & rotunda πέλαια dici-
 tur, Latinis *calc;* infima verò qua terram calcamus, πέλαια & σφυρόν, *calcaneum.* *Calc.*
 Altera pedis extremi pars quinque ossibus constans metacarpo respondens με-
 ταπωδὸν & tarsus dicitur. Eius pars inferior planta pedis solum & vestigium di-
 citur, Græcis πέλμα καὶ τύλωμα; superior quæ ante digitos existit σῆτος pe-
 ctus. Tandem sequuntur digiti quinque, manuum digitis respondentes, qui suos
 habent ordines, ternas σφυραλίδας efficientes, excepto pollice Articulantur

*ossiculum
sesamoideum
in pede visus.*

ossa hæc per ginglymon, & sesamoidea habent ad firmiorem articulationem: faciunt enim ossicula hæc, ut pes stantibus nobis & ambulantis etiam per aspera loca, sit firmior, & ne digiti, lapidibus, vel re alia quavis altiore velut euerfi, dum stamus, aut ambulamus, promptè luxentur. Hæc nimirum est artuum omnis brevis descriptio.

FINIS LIBRI DVODECIMI.



DEO OPTIMO MAXIMO

GRATIARVM ACTIO.



AM ergo DEVS optime Maxime, ad extremum magni huiusce operis finem peruenimus. Sit tibi soli, qui lucem omniluce clariorem incolis, ad quam nullus aditus patet, qui, vt vetustissimus Poëtarum Orpheus canit, es

Πάντων γενεῶν, ἀρχὴ πάντων, πάντων ἐτελεύτησας,
Πάντ' ἐσθλόν, καὶ πάντ' ἐπακούεις, καὶ πάντα βεβήεις.

Tibi (inquam) immortalis, sit summus honor &

gloria εἰς τὰς αἰῶνας τῶν αἰώνων. In omnibus quidem, etiam minutulis, lucent diuinæ tuæ maiestatis radij; sed in humani corporis fabrica mirabilem tuam potentiam, incredibilem sapientiam & infinitam bonitatem apertius declarasti: potentiam, in prima formatione; sapientiam, in structura; bonitatem, in vſu, actione & consensu partium. Tu enim ex nihilo ferè, guttulis scilicet aliquot seminis & sanguinis tam diuersi generis particulas, ossa, cartilagineſ, vincula, membranas, villos, venas, arterias, neruos, carnes, formaſti. Tu ſingula hæc mirabili artificio ſapienter diſpoſuiſti, figuram, ſitum, magnitudinem, numerum, ſtructuram, ſubſtantiam vt cuique conueniebat tribuens; oſſibus ceu palis & columnis totius corporis ædificium ſuſtentans; cartilaginibus articulos ferè omnes incruſtans & obliniens; vinculis omnia neceſſens alligansque; membranis tanquam corticibus ſingula veſtiens; neruis ceu funiculis membrorum vaſtiſſimas moles non ſine admiratione trahens; venis tanquam riuis vniuerſum corpus irrigans; arteriis velut tubis & aquæ ductibus ſingulas partes ſpumante ſanguine & vitali perfundens ſpiritu; carnibus ſpatia vacua explens omniâque colligans; adeò vt nihil in ſtructura corporis ſe ingerat fortuitum, vt beluinus exclamabat Epicurus, nihil quod ſapientiæ tuæ maiestatem non referat. Tu denique cuilibet parti peculiarem vſum & actionem tribuiſti, omnes verò tanta conſpiratione nexuiſti, vt videatur eſſe σύμρῳα μὲν, σύμνοια μὲν, συμπαθὲς πάντα, confluxus vnus, conſpirationo vna, conſentientia omnia. Tibi ergo omnipotenti, ſapienti & infinitæ bonitatis DEO hymnum gloriæ cum REGIO tuo Propheta ita canam:

Confitebor tibi Domine, quia tua ſapientia magnitudinem declaravi in mei corporis fabrica.

Informem maſſam meam viderunt oculi tui, & in libro tuo omnes ſcribentur, dies formabuntur, & nemo in eis.

Non eſt occultatum os meum à te quod feciſti in occulto; & ſubſtantia mea in inferioribus terra.



INDEX RERVM ET VERBORVM QVAE TOTO HOC OPERE CONTINENTVR COPIOSISSIMV3.

A

SOLA conformatione
cerebri facultates prin-
cipales edi docetur.
pagina 535
Ab ossibus aggrediendum
cur. 50
Abdominis obliqui mu-
sculi externi quatuor
sunt & duo interni. 198



Abdominis muscoli. ibid.
Abdominis musculi sectione difficiles. 208
Abdominis musculi an thoracis potius quam ven-
tris inferioris gratia constructi sint. 209
Abdominis musculorum primarius vsus. ibid.
Abdominis musculorum vsus. 199
Abdominis musculorum figura dissimilis ab aliis. ibid.
Abortus quid. 437
Abortus ante motum & post motum. ibid.
Abortus est etiam si non exeat foetus. 438
Abortus nomina. 437
Acromion quid. 95
Actio quid sit. 24
Actio quid differenti & vsus duplex. ibid.
Actiones simularum tantum esse docetur. 40
Actiones an sint simularum tantum. ibid.
Actio organica quid. ibid.
Actiones aliae naturales, aliae animales, aliae mixtae.

503

Actio finis est structura. 24
Actio communis quid sit. ibid.
Actio primata quid sit & quod duplex. ibid.
Actio simularis quid sit. ibid.
Actio organica quid sit. ibid.
Actio in principum parti simulari debetur, sed per-
fecta actio toti organo. 41
Adeps ventriculi coctionem inuauat per accidens. 282
Adeps cur facile accenditur. ibid.
Adeps quomodo pars appetitur. ibid.
Adeps natium calorem conseruat. 275

Adeps motum faciliorem reddit. 276
Adeps pabulum est calor ignei. ibid.
Adeps cur sit circa cor. 281
Adeps cur in cerebro nullus. ibid.
Adeps oculorum cur. 565
Adeps an pars sit corporis animata & viuens. 282
Adipis & pinguedinis differentia. 275
Adipis & carnis discrimen. 283
Adipis materia. ibid.
Adipis vsus. ibid.
Adipis nomina. 279
Adipem à frigido cori opinio Galeni, rationes. 280
Adipis efficiens causa calor. ibid.
Adipis efficientis causa, quid sentiendum. ibid.
Admirandum natura conatus in partu. 448
Ad quam facultatem vitalis sit referenda. 471
Aegyptij quam graui supplicio hodie grassatores ex-
cipiant. 286
Aegyptij quomodo corpus disidant. 30
Aër vernaculus. 582
Aëris preparatio. 482
Aërem insitum non esse princeps auditus organum. 584
Aër ille insitus cur quietus sit. 585
Aër ille medium est internum non organum. ibid.
Aër formarum plenus. 413
Affectus paruum solent è directo communicari. 537
Albugineus humor verè pars est. 578
Albugineus humor crystallini excrementum non
est. 578
Allantoides quid. 401
Alimentum quibus celerius deficit. 447
Alimentum refert ideam partu à qua manat. 137
Alimentum triplex. 305
Alteratio à temperie, rubor à colore perficitur. 138
Alueoli quid & eorum foramina venis, arteriis &
nervi dicata. 79
Aluearum quid. 581
Amari Lusitani de valumilis azygos figmentum. 115
Ambidextri qui. 598
Ambulatio quomodo fiat. 599
Amnios quid, & cur dicta. 401

INDEX RERVM

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| <i>Analogia elegans solis & cordis.</i> | 4 | <i>Anima hominis nuda.</i> | 6 |
| <i>Anatreus Vesalium accuratissimè scripsit sed dānatur à multis quòd in Galeum nimis sit mordax.</i> | 21 | <i>Anima cur nuda, elegans descriptio.</i> | 7 |
| <i>Anatome cervissima dux ad sui cognitionem.</i> | 10 | <i>Anima unica varia prestat.</i> | 474 |
| <i>Anatome docet nos quomodo sint animi mores componendi.</i> | ibid. | <i>Animalis regio cur supremum occupavit capis locum spiritibus mediis & naturalis infimam.</i> | 170 |
| <i>Anatomes cognitio quid regibus & principibus inserviat.</i> | ibid. | <i>Animalia perfecta sine liene vivunt.</i> | 313 |
| <i>Anatomen qui Reges & Principes excolerint.</i> | 11 | <i>Animalium corpora quot modis alterentur.</i> | 337 |
| <i>Anatome quàm utilis ad Dei cognitionem.</i> | ibid. | <i>Animales facultates perfectissime in faminis.</i> | 376 |
| <i>Anatome utilis Philosopho naturali & morali.</i> | 12 | <i>Animalium facultatum divisio.</i> | 331 |
| <i>Anatome utilis pectus & pectoribus.</i> | ibid. | <i>Animale & perpetuum non sunt contraria.</i> | 503 |
| <i>Anatome necessaria ad prognosim & ad curationem.</i> | 13 | <i>Animalis spiritus necessitas & usus.</i> | 343 |
| <i>Anatome necessaria chirurgis & pharmacopoeis.</i> | ibid. | <i>Anima sensuum ope indiget.</i> | 557 |
| <i>Anatome utilis ad veterè scripta intelligenda.</i> | ibid. | <i>Animam in oculis locarunt quidam.</i> | 559 |
| <i>Anatomen duobus modis comparare possumus, in speculatione & doctrina.</i> | 14 | <i>Animalis spiritus in factu transpiratione sola necitur.</i> | 435 |
| <i>Anatomica leges.</i> | 15 | <i>Animalis facultas non est radicaliter in corde, ut volunt quidam.</i> | 35 |
| <i>Anatomicus ordo triplex.</i> | ibid. | <i>Anima sine spiritu nihil movetur.</i> | 166 |
| <i>Anatomicam doctrinam quomodo comparare possumus.</i> | ibid. | <i>Animi pathemata quàm noxia.</i> | 444 |
| <i>Anatomica omnia instrumenta.</i> | 22 | <i>An in puello fiant coctiones.</i> | 430 |
| <i>Anatomica observatio nullos esse intercartilagineos musculos.</i> | 205 | <i>Annularis cartilago.</i> | 106 |
| <i>Anatomes scribenda duplex methodus.</i> | 15 | <i>Anteriores cerebri sinus cur odoratus organa dicuntur.</i> | 514 |
| <i>Anatome duplex, historica & scientifica.</i> | 22 | <i>An quod intra oculum cernitur per propriam speciem videatur solutio.</i> | 572 |
| <i>Anatomes definitio.</i> | ibid. | <i>Appetens facultas cum sensu & sine sensu.</i> | 306 |
| <i>Anatomes altera definitio.</i> | ibid. | <i>Appendicum usus apud Galeum duplex.</i> | 60 |
| <i>Anatomes distinctio Græca quid significat.</i> | 21 | <i>Apophysis nomina.</i> | 54 |
| <i>Anatome duplex, exquisita & rudior.</i> | 39 | <i>Apophysis quid.</i> | ibid. |
| <i>Anatomici omnes errarunt in ortu & insertione musculorum obliquo rum abdominis.</i> | 208 | <i>Apophyseon usus duplex.</i> | ibid. |
| <i>Anacatharsis quid.</i> | 485 | <i>Apophyseon & epiphyseon differentia.</i> | ibid. |
| <i>Animam Galenus appellat temperiem, cur & quomodo.</i> | 535 | <i>Aponensis definitio.</i> | 31 |
| <i>An aliquid intra oculum videri possit.</i> | 571 | <i>Aque pericardij usus.</i> | 464 |
| <i>Anastomoses mirabiles radicum porta & causa à paucis animadvertisse.</i> | 121 | <i>Aquam hanc in omni vivente reperiri.</i> | ibid. |
| <i>An anastomoseon que in vasis cordis sunt primus usus ad pulmonum nutritionem.</i> | 422 | <i>Aquei huiusce humoris generatio unde fiat.</i> | 465 |
| <i>Anastomoseon usus primus.</i> | ibid. | <i>Aqueus humor quid, situr.</i> | 563 |
| <i>Anastomoseon usus secundus generatio pulmonum.</i> | ibid. | <i>Aquei humoris usus varij.</i> | ibid. |
| <i>Anastomoseos usus impugnatur.</i> | 425 | <i>Arabum excusatio nulla.</i> | 31 |
| <i>Anastomoseos acceptiones variae.</i> | 424 | <i>Arabum interpretatio improbat.</i> | 36 |
| <i>An eodem modo moveantur arterie & cor.</i> | 479 | <i>Araaea tunica.</i> | 563 |
| <i>An cor in sua dilatatione percutiat pectus, an in contractione.</i> | 475 | <i>Aranij opinio de membranarum factu nos probatur.</i> | 407 |
| <i>Anima prestantia, sola creatur, sola est indivisibilis & cur sola immaterialis.</i> | 2 | <i>Arenularum color unde.</i> | 333 |
| <i>Anima specierum est locus.</i> | ibid. | <i>Aretæi & Cassij opinio secare se nervus.</i> | 540 |
| <i>Anima in medio rerum est gradu.</i> | ibid. | <i>Aretæi de dolore dentium opinio.</i> | 85 |
| <i>Anima natura angelica.</i> | ibid. | <i>Archangelus Picholeminem controuersa multat perit.</i> | 21 |
| <i>Anima expressam habet imaginem trinitatis.</i> | 16 | <i>Argentij in Fernellium calumnia.</i> | 31 |
| <i>Animam naturam ininspectibilem vocat Hippocrates.</i> | ibid. | <i>Argentij in Galenum calumnia.</i> | 36 |
| | | <i>Aristotelis laus.</i> | 19 |
| | | <i>Aristoteles ignoravit non pauca in peculiari animalium historia & sectione.</i> | 10 |
| | | <i>Aristoteles unicus agnoscit principium cor scilicet.</i> | 31 |
| | | <i>Aristoteles ingratus in Hippocratem.</i> | 441 |
| | | <i>Aristotelis mentem non assequuntur iuniores.</i> | 36 |
| | | <i>Aristotelis sententiam qui sectati fuerint de animalium venarum.</i> | 129 |

ET VERBORVM.

| | | | |
|---|-------|--|-----------|
| <i>Aristotelis de usu testium opinio impugnatur.</i> | 346. | <i>Articulationes ancipites à Vesalio & Columbo pro-</i> | |
| <i>Aristoteles feminam male appellat animal imper-</i> | | <i>positas non ignoravit Galenus.</i> | ibid. |
| <i>fectum.</i> | 368 | <i>Articulatio non rectè opponitur symphysi.</i> | 64 |
| <i>Aristotelis opinio de motu cordis.</i> | 472 | <i>Artificiosa sectio quid sit, & quæ requirantur ad</i> | |
| <i>Aristotelis opinio de motu pulmonis.</i> | 507 | <i>sectionem eam.</i> | 22 |
| <i>Aristotelis de ortu venarum opinio.</i> | 130 | <i>Arus duo, & cur ita vocentur.</i> | 65. & 593 |
| <i>Arytenoides cartilago.</i> | 106 | <i>Asclepiadis opinio de motu articularum.</i> | 478 |
| <i>Aromatica & suaueolentia cur hysterica suffoca-</i> | | <i>Aspera arteria cur cartilaginea.</i> | 511 |
| <i>tionem pariant.</i> | 362 | <i>Aspera arterie cartilaginee in pulmonibus circu-</i> | |
| <i>Arteria cur cartilaginea.</i> | 106 | <i>lum absolunt.</i> | 107 |
| <i>Aphis nomen varium.</i> | 55 | <i>Aspera arteria cur cartilaginea.</i> | 106 |
| <i>Arteria nomina.</i> | 143 | <i>Astragalus quid.</i> | 99 |
| <i>Arteria nomen tria vasa habuerunt.</i> | ibid. | <i>Auerroes in muliercularum deliramentis nimis cre-</i> | |
| <i>Arteria duplex consideratio.</i> | ibid. | <i>dulus.</i> | 394 |
| <i>Arteria definitio ut pars similis.</i> | ibid. | <i>Auerrois de tractu alimenti opinio nulla.</i> | 331 |
| <i>Arteria definitio ut pars organica.</i> | 144 | <i>Auerrois de cordis motu opinio.</i> | 472 |
| <i>Arteria duas tunicas habent.</i> | ibid. | <i>Auenzgar ossa sentire vult.</i> | 59 |
| <i>Arteriarum vili quomodo se habeant.</i> | ibid. | <i>Auicenna de principatu partium opinio, eiusdem de-</i> | |
| <i>Arteriarum usus.</i> | ibid. | <i>finitio principis partis.</i> | 34 |
| <i>Arteria cur membranosa.</i> | ibid. | <i>Auicenna quomodo Aristotelem interpretatur.</i> | 34 |
| <i>Arteria tunica crassissima est.</i> | ibid. | <i>Auicenna principis partis definitio.</i> | 36 |
| <i>Arteria spirituosum sanguinem continent.</i> | ibid. | <i>Auicenna quartodecimo mense gestatum foetum</i> | |
| <i>Arteria influentem cordis calorem diffundunt.</i> | | <i>vidit.</i> | 441 |
| <i>ibid.</i> | | <i>Auicenna de ortu nervorum opinio.</i> | 156 |
| <i>Arteria carotides cur ita dicte.</i> | 143 | <i>Aures cur due.</i> | 10 |
| <i>Arteria cur difficile coalescunt.</i> | 46 | <i>Aures cur cartilaginee.</i> | 105 |
| <i>Arteria quid, & quomodo trahant.</i> | 145 | <i>Aurium musculi tres.</i> | 186 |
| <i>Arteria venis nobiliores.</i> | ibid. | <i>Auricularum cordis motus dissimiles.</i> | 481 |
| <i>Arteria ascendens distributio.</i> | ibid. | <i>Auricularum magnitudo, figura, usus.</i> | 580 |
| <i>Arteria magna descendens distributio.</i> | ibid. | <i>Auricula.</i> | ibid. |
| <i>Arteria umbilicales due.</i> | 147 | <i>Aurium situs.</i> | ibid. |
| <i>Arteria venosa quid.</i> | ibid. | <i>Aures in quibusdam moventur.</i> | 581 |
| <i>Arteriarum umbilicalium communis usus.</i> | 425 | <i>Aurium musculi.</i> | ibid. |
| <i>Arteria venosa & arteria magna.</i> | 469 | <i>Auris interna situs.</i> | 581 |
| <i>Arteria implentur dum dilatantur.</i> | 479 | <i>Auris primus meatus.</i> | ibid. |
| <i>Arteria non quia implentur dilatantur, sed quia di-</i> | | <i>Auris secundus meatus.</i> | 582 |
| <i>latantur implentur.</i> | 480 | <i>Aurium fenestella due.</i> | 583 |
| <i>Arteria venosa an ad pulmonis motum moueatur.</i> | | <i>Aurium tuberculum.</i> | ibid. |
| 504 | | <i>Aurium & vocalium organorum mirabilis sym-</i> | |
| <i>Arteria venosa non eodem agitur motu quo ar-</i> | | <i>pathia.</i> | 585 |
| <i>teria.</i> | ibid. | <i>Aures soli homini immobiles.</i> | 8 |
| <i>Arteria venosa duplicem usum agnouerunt Ana-</i> | | <i>Auricularum usus.</i> | 105 |
| <i>tomici.</i> | ibid. | <i>Aures cur ita dicte.</i> | 580 |
| <i>Arteria foetus qua vi pulsant.</i> | 431 | <i>Aures cur parula.</i> | ibid. |
| <i>Arteria à corde moventur.</i> | 480 | <i>Aures cur gemina.</i> | ibid. |
| <i>Arteria venosa sanguis spirituosus est, & à corde</i> | | <i>Auricula cur homini exigua.</i> | 580 |
| <i>manat.</i> | 483 | <i>Auricularum piuma.</i> | ibid. |
| <i>Arteria venosa tertius usus arteriosum sanguinem</i> | | <i>Audituri attentius cur cohibemus spiritum.</i> | 586 |
| <i>ferre ad pulmones.</i> | ibid. | <i>Auditus praesentia, nomen, situs.</i> | 580 |
| <i>Arthrodia.</i> | 55 | <i>Auditus quomodo fiat.</i> | 583 |
| <i>Aphis quid sit.</i> | 62 | <i>Auditus medium.</i> | ibid. |
| <i>Articulatio quid sit.</i> | ibid. | <i>Auditus organum.</i> | ibid. |
| <i>Articulatio duplex.</i> | ibid. | <i>Audiendi verus modus.</i> | 584 |
| <i>Articulationis species tertia ventra & anceps est.</i> | 56 | <i>Augusti ad Caium nepotè de anno climacterico con-</i> | |
| <i>Articulationis essentia in quo consistit.</i> | 62 | <i>gratulatio.</i> | 445 |
| <i>Articulationis nomen varium apud veteres.</i> | ibid. | <i>Authoris institutum.</i> | 31 |
| <i>Articulationes mobiles per antonomasiam tales di-</i> | | <i>Authoritates Galeni.</i> | 41 |
| <i>cuntur.</i> | ibid. | <i>Exagon duplex communio.</i> | 462 |

| | |
|--|-------|
| B Alanus quid. | 343 |
| Bartholomeus Cabrolus de Anatome scripsit. | |
| 21. | |
| Barba quid. | 590 |
| Bilis ab hepate pelli videtur. | 316 |
| Bile ali vesicam Tobertus vult, nos verò contra: authoritates. | ibid. |
| Bilis acrimonia cur non leditur vesicula. | 317 |
| Biliosi quot modis dicantur. | 310 |
| Biliosa expurgantur per aures. | 553 |
| Bile quomodo alatur pulmo. | 317 |
| Bile quomodo oblectetur vesicula. | ibid. |
| Bilis assimilari nequit. | 317 |
| Bilis cur ferri debent ad vesiculam prius quam ad intestinum. | 318 |
| Biliosi conformatione qui sint. | 320 |
| Biliosi temperamento. | ibid. |
| Biliosi xlii rj Ana. | ibid. |
| Biliosæ ex euentu qui. | ibid. |
| Bonum quid. | 306 |
| Brachij partes. | 96 |
| Brachij caput. | ibid. |
| Brachium sursum mouent musculi duo, & deorsum duo, antrosum vniuersum retrosum tres. | 593 |
| Brachij circulares motus ab omnibus eius musculus fit. | ibid. |
| Bregma cur ita dicatur. | 519 |
| Bruta cur certa habeant tempora partus. | 443 |
| Bruta que ad humanum corpus magis accedunt secundanda. | 15 |
| Bruta cur sepius concipiant. | 304 |
| Bucca quid. | 590 |
| Bulles res, & mille filamenta in principio conceptus cernere licet. | 402 |

| | |
|---|-------|
| C Alanus quid. | 528 |
| Calceus os. | 99 |
| Calidi, frigidi, humid', sicc'i triplex acceptio. | 488 |
| Calidum immaturum cur langueat quotidie. | 49 |
| Calor natiuus mitis est non igneus. | 58 |
| Calor urere dicitur quomodo. | 58 |
| Caloris influxus duplex. | 345 |
| Caloris motus duplex. | 498 |
| Callus inanimatus est. | 46 |
| Callus quomodo fiat. | 45 |
| Callus quomodo crescat. | 46 |
| Callus cur in osse sano non generatur. | ibid. |
| Caluaria mollis cur puerorum. | 73 |
| Caluaria partes continentes & contenta. | 519 |
| Calumnia neotericorum in Galenum. | 18 |
| Calumniae prime depulsi. | ibid. |
| Cammati corporis usus. | 528 |
| Canaliculus ab aure ad palatum. | 583 |
| Canidior & albedo cur in adipe. | 282 |
| Canina appetentia quid. | 306 |
| Capillat a partis nomina. | 119 |
| Capitis nomina, & duplex acceptio. | 517 |

| | |
|---|-------|
| Capitis figura. | ibid. |
| Capitis figura nos naturalis multiplex. | ibid. |
| Capitis tres figurae deprauatae apud Hipp. | ibid. |
| Capitis naturalis figura qualis sit, cur rotunda. | ibid. |
| Capitis superior regio cur ossa, cur media pars ossa, partim carnea, & inferior cur carnea. | 170 |
| Capitis diuisio. | 519 |
| Capitis matris duo. | 90 |
| Capitis nomine quid intelligamus. | 61 |
| Capitis magnitudo. | 57 |
| Capitis dignitas. | 514 |
| Caput homini rotundum. | 8 |
| Caput duplex. | 54 |
| Caput est velut caninus vniuersi. | 61 |
| Caput cur oblongum & protuberans, cur ad latera compressum. | 66 |
| Caput omne acutum an in vitio sit. | 75 |
| Caput quot modis acuminatum esse possit. | ibid. |
| Caput oculorum eratis constructum putat Galenus. | 76 |
| Caput necessarium ad oculorum tutelam. | 77 |
| Caput cur variè debuit moueri. | 191 |
| Caput flectentes musculi. | ibid. |
| Caput quid eiusque termini. | 169 |
| Caput cur rotundum. | ibid. |
| Caput cur ad latera compressum & variè protuberans. | 518 |
| Caput quid quid. | ibid. |
| Caput magnitudo laudatur. | 517 |
| Caput cur in editissimo loco. | ibid. |
| Carnem gingiuarum cur & lani vocent. | 81 |
| Carnem musculum vocat Hippocrates, & musculum carnem. | 174 |
| Carnis variae acceptiones. | 169 |
| Carni viscerum actio principalis debetur. | 170 |
| Carnis viscerum usus. | ibid. |
| Carnis musculose usus. | ibid. |
| Carnis beneficio voluntarius omnis motus perficitur. | 183 |
| Carnium quatuor differentia. | 169 |
| Carnium usus communes. | 170 |
| Carnosa partes in conceptu omnia sunt vltima. | 404 |
| Carotriplex. | 18 |
| Caro precipua est musculi pars. | 175 |
| Caro organum tactus à Peripateticis. | 176 |
| Caro cuiusque partis precipua est organi pars. | 183 |
| Caro conceptum primum significat. | 169 |
| Caro idem est quod musculus. | ibid. |
| Caro cuiuslibet parti peculiaris. | ibid. |
| Caro proprie dicta quid. | ibid. |
| Caro viscerum affusio est. | ibid. |
| Caro viscerum quomodo simplex dicatur. | 170 |
| Caro hepatis qualis. | ibid. |
| Caro pulmonum cur lenis & rara. | 171 |
| Caro cordis qualis sit. | ibid. |
| Caro linguae qualis. | ibid. |
| Caro musculosa precipuam ferè corporis molem constituit. | 173 |
| Caro triplex similis est. | 39 |

| | | | |
|---|-----------|--|-------|
| Caro glandosa. | 170 | Cerebri motus violentus non est. | 546 |
| Caro viscerum est insensibilis. | ibid. | Cerebri usus verus. | 536 |
| Caro fibrosa princeps musculi pars. | 182 | Cerebri vasorum diminutio. | 540 |
| Carotidibus arteriis ligatis cur pereat sensus & motus. | 34. & 159 | Cerebri arteria non se interfecant. | ibid. |
| Carpi ossa octo. | 97 | Cerebro omnia famulantur. | 37 |
| Carpi ossum duo ordines. | 98 | Cerebrum corde prestantius. | 26 |
| Carpum flectit duo musculi, extendit totidem. | 194 | Cerebrum quomodo sentiat. | 33 |
| Carpus quid. | 597 | Cerebrum cur frigidum. | ibid. |
| Capus Mundinum illustravit commentarius. | 21 | Cerebrum an corde prestantius. | 37 |
| Capus quid. | 573 | Cerebrum corde esse prestantius nos existimamus. | ibid. |
| Cartilaginee palpebrarum. | 104 | Cerebrum prius gignitur quam calvaria. | 76 |
| Cartilaginee cur in interiori non absoluant circuli. | 106 | Cerebrum homini amplissimum. | 8 |
| Cartilaginee articulorum. | 108 | Cerebrum figuram dat toti corpori. | 37 |
| Cartilaginei ductus qui in aure reperitur usus. | 586 | Cerebrum ad vim pulsatilem nihil confert. | 38 |
| Cartilaginei definitio. | 102 | Cerebrum cur expurgatione egeat. | 68 |
| Cartilaginum usus varij. | 103 | Cerebrum figurari à cranio, rationes. | 76 |
| Cartilaginum connexus multiplex. | 104 | Cerebrum debuit in capite locari ob actionem oculorum. | 77 |
| Cartilaginum natura eadem ferè quæ ossium. | 102 | Cerebrum sensus & motus principium esse. | 156 |
| Cartilaginum usus. | 103 | Cerebrum cur non sentiat. | 157 |
| Cartilaginum differentie. | ibid. | Cerebrum cur amplius homini. | 525 |
| Cartilaginum diuisio. | 104 | Cerebrum sedes animalium facultatum. | 531 |
| Cartilago & os in quo differant. | 102 | Cerebrum quid, & eius diuisio. | 526 |
| Cartilago trochleæ simul in magno oculi angulo. | 104. | Cerebrum cur frigidum. | 525 |
| Cartilago cur insensibilis. | 102 | Cerebrum cordis refrigerandi gratià non est constructum. | 536 |
| Cartilago media natura inter os & ligamentum. | ibid. | Cerebrum monetur sine villis. | 549 |
| Cartilago faciliorem, securiorem & diuturniorem motum reddit. | 103 | Cerebrum moveri. | 546 |
| Cartilago externos impetus frangentes & contumaces eludit. | ibid. | Cerebrum volunt quidam voluntariè moveri. | ibid. |
| Caruncule renum papillis similes. | 329 | Cerebrum propria vi respirare. | 547 |
| Caruncule 4. florem virginem constituentes. | 356 | Cerebrum sentire. | 549 |
| Caruncula & glandula oculorum. | 565 | Cerebrum non sentire, aut horitates. | ibid. |
| Caruncularum usus duo. | 356 | Cerebrum quomodo noxia sentiat. | 550 |
| Ca' & En quid sit. | 140 | Cerebrum nec sentit nec motum habet animalemyst | 550 |
| Caerna & sinus in maxilla superiori. | 78 | tamen sensus omnis & motus animalis origo. | 550 |
| Cavitatum differentia. | 54 | Cerebrum an cute frigidum. | 551 |
| Cavitas nulla in hepate cur. | 311 | Cerebrum cur frigidum esse deuit. | ibid. |
| Cellularum varietas improbat. | 414 | Cerebrum cur excrementis abundet. | 552 |
| Cerebelli usus, color, substantia, situs. | 529 | Cerebrum nervorum principium est & originis & officij. | 556 |
| Cerebelli partes. | ibid. | Cervix quid. | 54 |
| Cerebri situs dignissimus. | 38 | Cervicis & dorsi cartilaginei. | 107 |
| Cerebri prestantie elegans demonstratio. | 37 | Chylus cur non rubet in intestinis. | 139 |
| Cerebri altere demonstratio. | ibid. | Chylus an à calore potius quàm à forma ventriculi fiat. | 307 |
| Cerebri usus. | 526 | Chorion quid, & cur ita dicatur. | 401 |
| Cerebri motus, sensusque. | ibid. | Chorda tympani obtensa. | 582 |
| Cerebri temperamentum duplex. | 551 | Chirurgica observatio in apertione thoracis. | 95 |
| Cerebri excrementa duorum generum, crassa & tenuia. | 552 | Ciliare interstitium quid. | 563 |
| Cerebri figura exterior. | 527 | Clavicula cur ita dicte. | 93 |
| Cerebri priores ventriculi. | ibid. | Clavicula cur soli homini & simini data. | ibid. |
| Cerebri substantia cur mollis, cur alba. | 525 | Clavicularum figura & connexio. | ibid. |
| Cerebri temperies. | 526 | Clavicularum cartilago. | 108 |
| Cerebri membranae quomodo sentiant. | 160 | Clysteres an ad ventriculum ferri possint. | 300 |
| Cerebri prestantia. | 524 | Clysteres quomodo ad hepar ferantur. | ibid. |
| Cerebri solius gratià omnia constructa sunt. | ibid. | Clysteres an ferri possint ad ventriculum usque. | 29. |
| Cerebri nomina, situs, figura, magnitudo. | 525 | Cliatoris musculi. | 209. |

INDEX RERVM

| | | | |
|---|------------|---|-------|
| <i>Citatus quid, & usus.</i> | 356 | <i>Connexio duplex, physica & mathematica.</i> | 23 |
| <i>Coalitus partium duplex est.</i> | 49 | <i>Contenta quid.</i> | 25 |
| <i>Coalitus secundum primam intentionem fit per sym-</i> | | <i>Continentia.</i> | 102. |
| <i>physim seu aggregationem.</i> | ibid. | <i>Contractio primarius est motus & proprius exten-</i> | |
| <i>Coalitus secundum intentionem secundam fit per</i> | | <i>su secundarius, & decidens tertius.</i> | 176 |
| <i>colligationem.</i> | ibid. | <i>Conuelli oppositui parres, docetur Hippoc. authen-</i> | |
| <i>Coccyx.</i> | 91 | <i>tate.</i> | 537 |
| <i>Coccyx quid.</i> | 107 | <i>Conuellitur eorum opinio, qui venam umbilicalem</i> | |
| <i>Coctio prima in fundo ventriculi fit.</i> | 305 | <i>omnium primam agnoscunt.</i> | 408 |
| <i>Coctio omnis à peculiari fit partis substantia.</i> | 138 | <i>Conuulsio quomodo febrem sedat.</i> | 159 |
| <i>Cognitio sui ipsius vera est Philosophia.</i> | 9 | <i>Conuulsio quomodo fiat.</i> | 182 |
| <i>Coile quid propriè.</i> | 302 | <i>Conuulsiones oppositæ causæ est maligna qualitas.</i> | 538 |
| <i>Coitus ad generationem.</i> | 368 | <i>Cornua in utero muliebri non sunt.</i> | 527 |
| <i>Coli intestini varia nomina.</i> | 292 | <i>Cornea tunica nomina, ortus, usus duplex.</i> | 562 |
| <i>Coli situs ratio elegans.</i> | 293 | <i>Corone quid.</i> | 54 |
| <i>Colis inflationem esse docetur animalem.</i> | 350 | <i>Corpori humani præstantiam quatuor indicat.</i> | 3 |
| <i>Colli partes externæ, anteriores, posteriores, latera-</i> | | <i>Corporis præstantia ex temperie indicat.</i> | 2 |
| <i>les & internæ.</i> | 510 | <i>Corporis humani diuisio multiplex.</i> | 269 |
| <i>Colici doloris in paralyfin transmutatio.</i> | 158 | <i>Corpus hominis cur è celesti materia constatum non</i> | |
| <i>Colicus dolor in arthriticum mutatur, & contra.</i> | 159 | <i>est, sed elementari.</i> | 3 |
| <i>Colon circa lienem angustissimum est.</i> | 501 | <i>Corpus hominis nudum.</i> | 7 |
| <i>Colon cur dolore sæpe infestetur.</i> | 293 | <i>Corpus callosum.</i> | 527 |
| <i>Colon cur ascendat.</i> | 301 | <i>Cordai interpretatio non probatur.</i> | 372 |
| <i>Collum thoracis gratiâ constructum.</i> | 510 | <i>Cordis dignitas.</i> | 32 |
| <i>Colores quomodo oculum afficiant.</i> | 570 | <i>Cordis sinister sinus arteriosus.</i> | 468 |
| <i>Colorum varietatis causæ.</i> | 574 | <i>Cordis dignitas & usus.</i> | 465 |
| <i>Colorum varietatis nostres causas statuimus.</i> | ibid. | <i>Cordis necessitas.</i> | 466 |
| <i>Columbi opinio non de usu arterie venosa conuel-</i> | | <i>Cordis nomina, figura, situs.</i> | ibid. |
| <i>litur.</i> | 519 | <i>Cordis basis exquiritur in medio, & cur.</i> | ibid. |
| <i>Columbi error de musculis laryngis.</i> | 204 | <i>Cordis macro cur in anteriora & sinistram laeua.</i> | ibid. |
| <i>Columbi error de peritoneo.</i> | 285 | <i>ibid.</i> | |
| <i>Colymbi de preparatione vitalis spiritus opinio con-</i> | | <i>Cordis temperamentum, compositio & substantia.</i> | 467 |
| <i>uclitur.</i> | 482 | <i>Cordis caro dura, & cur.</i> | ibid. |
| <i>Colymbi in Galenum calumnia de figura ossium ca-</i> | | <i>Cordis mirabilis motus.</i> | ibid. |
| <i>piens nulla.</i> | 77 | <i>Cordis vene, arteria, nervi, adeps.</i> | ibid. |
| <i>Colymbus malè Galenum arguit de epiphyxi.</i> | 61 | <i>Cordis duo sinus.</i> | 468 |
| <i>Colymbus anatonem descripsit accuratè.</i> | 21 | <i>Cordis septum medium.</i> | ibid. |
| <i>Colymbus diuisionem Galenicam de ossium structu-</i> | | <i>Cordis auricularum usus.</i> | ibid. |
| <i>ra improbat.</i> | 61 | <i>Cordis vasa quatuor.</i> | 469 |
| <i>Colymbus symphysys naturam ignorauit.</i> | 63 | <i>Cordis valvula undecim.</i> | ibid. |
| <i>Colymbus errat, dum laryngis cartilaginei in nume-</i> | | <i>Cordis valvularum duo genera.</i> | ibid. |
| <i>rum ossium ascribit.</i> | 106 | <i>Cordis motus causæ obscurissima.</i> | 472 |
| <i>Colymbi de membranis mesaraicarum figmentum.</i> | | <i>Cordis motus duplex.</i> | ibid. |
| | 123 | <i>Cordis motus quomodo naturalis intelligendus.</i> | 473 |
| <i>Coma quid.</i> | 519 | <i>Cordis motum manare à facultate.</i> | 474 |
| <i>Communis carniū usus & peculiare.</i> | 169 | <i>Cordis motus duo.</i> | 475 |
| <i>Comerium quid sit.</i> | 172. & 528 | <i>Cordis distentio contractione prior.</i> | ibid. |
| <i>Conceptio quid & signa.</i> | 394 | <i>Cordis & arteriarum motum diuersum esse.</i> | 479 |
| <i>Conceptio an fiat sine voluptate.</i> | 395 | <i>Cordis caro an musculoſa sit.</i> | 481 |
| <i>Conceptio peculiaris est uteri actio.</i> | 396 | <i>Cordis caro cur villosa.</i> | 482 |
| <i>Conceptus secundæ raræ vitales.</i> | 417 | <i>Cordis ventriculus spirituosus cur non occupat</i> | |
| <i>Conchula quid.</i> | 581 | <i>dextrum situm.</i> | 484 |
| <i>Conferitur vitalis facultas cum celesti vi.</i> | 471 | <i>Cordis affectus vari & mirabiles.</i> | 485 |
| <i>Conformatio partis quid.</i> | 23 | <i>Cordis caro qualis sit.</i> | 482 |
| <i>Conformatio duplex.</i> | 409 | <i>Cordis quàm vehemens sit calor.</i> | 489 |
| <i>Conformationis tempus.</i> | ibid. | <i>Cordis substantia carnea est.</i> | 491 |
| <i>Coniunctiua nomina.</i> | 561 | <i>Cordis motus perpetuus est.</i> | ibid. |
| <i>Coniunctiua usus triplex.</i> | 562 | <i>Cordis & solus elegans analogia.</i> | 4 |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Corde Lefo nec motus nec fensus intercipitur. | 33 | Cruralij rami diftributio. | 125 |
| Cor ad ideam motus voluntarij nihil confert. | 38 | Cryftallini partes omnes oculi quomodo famulentur. | 563 |
| Cor fua fponfe mouetur non noftra. | 33 | Cryftallini humoris laues. | ibid. |
| Cor facultatum omnium fedens efle non poffe. | 34 | Cryftallini fubftantia, figura, fitus. | ibid. |
| Cor vim animalem cerebro non tribuere. | 35 | Cryftallinum princeps efle vifionis organum. | 577 |
| Cor cerebro ancillatur. | 37 | Cryftallinum partem efle. | ibid. |
| Cor venarum principium Aristoteli. | 33 | Cryftallini ali vitreo, quomodo fit intelligendi ibi. | ibid. |
| Cor nervorum principium Aristoteli. | ibid. | Cryftallinus humor quid, | 564 |
| Cor prima eft fanguinis officina. | ibid. | Cryftallinus an per temperiem vel conformationem fuam actionem edat. | 577 |
| Cor primum eft fenforium. | ibid. | Cryftallinus an fit fimilaris pars vel organica. | ibid. |
| Cor nec venarum nec nervorum efle principium demonstratur. | ibid. | Cubiti & radij nomina, partes, articulatio. | 97 |
| Cor non eft motus animalis principium. | ibid. | Cubitus & radius contrario fe habent modo. | ibid. |
| Cor preftantius cerebro efle volunt Peripatetici & Stoici. | 87 | Cubiti quatuor funt mufculi. | 193 |
| Cor ineptum efle organum fensus. | 156 | Cuboides os. | 99 |
| Cardus motus non eft voluntarius. | 157 | Cur à capitis offibus incipiamus. | 65 |
| Cor nervorum principium affirmât Peripatetici. | 155 | Cur de cartilaginibus poft offa differendum. | 102 |
| Cor ultimum mories Aristoteles & Galenus. | 404 | Cur fensus tactus ad extrema v alidior. | 164 |
| Cor non eft primum vimens. | 404 | Cur fape folida alimēta deplutuntur non liquida. | 173 |
| Cor non eft primum nutritius. | 134 | Cur carni facultas movendi infusa fit. | 183 |
| Cor vici cum habet nervulum. | 157 | Cur in angina laryngis rubent sternum & cervix. | 204 |
| Cor non mouetur primo. | ibid. | Cur reflexio in colo. | 293 |
| Cor non exquisitè sentit. | ibid. | Cur depravatatum conceptum potius quàm nullum molietur natura. | 357 |
| Cor non prius formiatur quàm cerebrum. | ibid. | Cur mas citius in utero conformatur. | 409 |
| Cor vifcerum omnium calidiffimum. | 489 | Cur femina extra uterum celerius perficitur. | ibid. |
| Cor agens difsimulare. | 490 | Cur femina extra uterum celerius crefcat Hippocrat. duplicem caufam agnofcit. | 410 |
| Cor quomodo mufculus appelletur. | 492 | Cur patri, matri, avo, abavo funt fimiles puelli. | 412 |
| Cor abfceffus non fert. | 495 | Cur varius fit Hippocrat. in fuppuratione dierum qui feptimeftram partum complet. | 442 |
| Cor primus refpirationis author. | 496 | Cur vena pulmonum fit arteriofa & arteria venofa. | 469 |
| Cor primum non generari. | 404 | Cur cōtracto corde diftenditur auricula finiftra. | 480 |
| Cor quid agat in diaftole. | 475 | Cur dexter finus & auricula cordis pofterius moveri videntur. | 494 |
| Cor quid agat in hiftole. | ibid. | Cur aer ad fpirationē commodior quàm aqua. | 498 |
| Cor omnes affectus tolerat. | 494 | Cur cartilaginei circulum non perficiant. | 511 |
| Cor graves affectus non patitur. | ibid. | Cur in capillamenta abfumitur fpiritalis medulla. | 530 |
| Cor frigidum ftatuit Auerroës. | 488 | Cur lefo temporali mufculo alter conuellitur. | 538 |
| Cor efle calidum Hippocrates. | 489 | Cur vulnerata pars non conuellitur. | ibid. |
| Cor ficcu vult Auerroës, humidu Auerroës. | 490 | Cur in corde plexus nulli, ut in cerebro yationes noftra. | 344 |
| Cor venofa ali fanguine. | ibid. | Cur fpiritus cordis calidiffimi craffiores funt animalibus. | 551 |
| Coftarum nomina. | 94 | Cur humidum creatum eft cerebrum. | ibid. |
| Coftarum articulatio duplex. | ibid. | Cur occlufis naribus quæ in ore & ventriculo continentur non sentiuntur à cerebro. | 589 |
| Coftarum figura. | ibid. | Cutis foli homini polita. | 9 |
| Coftarum partes. | ibid. | Cutis organum tactus. | 274 |
| Coftæ cur cartilagineæ. | 95 | Cutis ad custodiam carnis. | ibid. |
| Coftarum differentia. | ibid. | Cutis totius fymphyfin facit. | 275 |
| Coftæ vera fpiria. | ibid. | Cutis craffities non femper ineptos arguit. | ibid. |
| Cotyle quid. | 54 | Cutis ratione ftructura organum tactus dici debet. | 277 |
| Cranij duplex tabula. | 65 | Cutis quomodo equalis non fentiat. | ibid. |
| Cranij parvum figura multiplex. | 66 | | |
| Cranij offa octo. | 521 | | |
| Cranium quid. | 65 | | |
| Cranium cur fuit offeum, craffum & rarum. | ibid. | | |
| Cranium cur pluribus offibus conflet. | 66 | | |
| Cranium cur ita dictum. | 521 | | |
| Cranium cur craffum & rarum. | ibid. | | |
| Cremafteres mufculi. | 200 | | |
| Cremafteres uteri. | ibid. | | |
| Crista galli quid. | 73 | | |

| | |
|---|--|
| Cutis quomodo imbecillima sit cū sit tēperata. 278 | Denarius numerus perfectus. 446 |
| Cutis non fit ex carne rescicata. 279 | De numero ventriculorū cordis Aristot. opinio. 493 |
| Cutis non fit ex carne & nervo. ibid. | De numero ventriculorum cerebri. 514 |
| Cutis simul cum ceteris partibus generatur. ibid. | Dentium caninorum usus. 83 |
| Cutis communis actio quā sit. 279 | Dentes molares. ibid. |
| Cutis prinata actio. ibid. | Dentes sapientia. ibid. |
| Cutis nomina omnia & definitio. 273 | Dentium radices. ibid. |
| Cutis membrana est. ibid. | Dentium radices cur gena superioris plures sunt. ibid. |
| Cutis substantia ex semine & sanguine fit. ibid. | Dentis corpus an totum sentiat an pars. 84 |
| Cutis non coalescit prima intentione, sed per cicatricem. ibid. | Dentem totum sentire. ibid. |
| Cutis temperies. ibid. | Dentes cur ab intemperie potius dolent quā a lutione continui. ibid. |
| Cutis figura, color. ibid. | Dentes ex semine fieri. 85 |
| Cutis foramina. 274 | de Dentium generatione Hippoc. opinio. ibid. |
| Cutanei pori cur. ibid. | de Dentium generatione quid sentiamus. ibid. |
| Cutis differentia. ibid. | Dens totus sibi est continuus. 86 |
| Cutis usus & actio. ibid. | Dentes statim enadunt ossei. ibid. |
| Cutis emunctorium vniuersale. 275 | Dentes cur crescunt & renascuntur. ibid. |
| Cutis est organum tactus Medicis. 277 | Dentes cur fracti callo non obducuntur. ibid. |
| Cutis organum cur sensile supra sensarium non sentiri dicatur. ibid. | Dentes ossa non esse generationis. ibid. |
| Cutis temperamentum. 278 | Dentes cur renascuntur. 47 |
| Cutem non esse temperatam, rationes. ibid. | Dentes cibos diuidunt. 82 |
| Cutis ortus & generationis vulgaris opinio. ibid. | Dentes vocis articulationi seruiunt. 16 |
| Cutis actionē nullam officialem edere creditur. 279 | Dentes ad pugnam constructi. ibid. |
| Cuticula medium est tactus. 272 | Dentium affectus quem aquasillas vocant ses stuporem. 84 |
| Cuticula pro ornamento est. ibid. | Dentes cur primarias qualitates magis sentiant quā secundarias. 85 |
| Cuticula quomodo differat à vera cute. ibid. | Dentes quomodo à frigido afficiantur. 87 |
| Cuticula nomina, & quid cuticula. ibid. | De numero vasorum, controversia. 407 |
| Cuticula generatio à frigido. ibid. | Dentes cur ita dicti. 80 |
| Cuticula consistentia diuersa. ibid. | Dentium definitio. ibid. |
| Cuticula varij usus. ibid. | Dentes sunt ossei, & cur durissimi. ibid. |
| Cuticulam curare quid. ibid. | Dentium cauitas non eadem adultis & pueris. ibid. |
| D | |
| Dartos quid. 340 | Dentium nervi, vena & arteria. ibid. |
| De admotione topicorum laborante ventriculi officio. 306 | Dentes sentiunt. ibid. |
| De coitu opticorum. ibid. | Dentes cur sentire oportuit. ibid. |
| De cauitate opticorum. 579 | Dentes cur continuo crescunt & renascuntur. 81 |
| Decembris natalis. 440 | Dentium articulatō per gomphosim. ibid. |
| De duodecimstri controversia. ibid. | Dentium symphysis per nervos, membranas & carnes. ibid. |
| Decimus tertius longissimus Hippocrati. ibid. | Dentium mirabilis symmetria & connexio. ibid. |
| Decimo tertio gestari posse authoritas Massarij. 441 | Dentes cur sese tangunt. ibid. |
| De ductibus colidochis noua & falsa Fallopij opinio, rationes verò nostrae. 318 | Dentes quo tempore generantur. ibid. |
| De generatione mole. 397 | Dentes anteriores cur prius erumpunt. ibid. |
| De luitio actio mista ex naturali & animali. 514 | qui nati cum Dentibus. ibid. |
| De luitationem à natura fieri. 515 | Dentium triplex generatio apud Hippoc. ibid. |
| De luitationem animale[m] esse. ibid. | Dentes cur primis annis decidunt. ibid. |
| De luitio mista est actio. ibid. | Dentes quales sunt in prima generatione. ibid. |
| De luitationis actio quomodo naturalis & animalis, & cur. ibid. | Dentium usus quinque. 82 |
| De luitationi dicati musculi. ibid. | Dentium maior numerus cur semper minor anteponendus. ibid. |
| Dei mirabilis potentia lucet in hominis structura. 11 | Dentium numerus. ibid. |
| Dei sapientia in artificio partium apparet. ibid. | qui Dentem unicū habuerunt. ibid. |
| Dei bonitas infinita in structura corporis. 12 | qui plures Dentium ordines habuerunt. ibid. |
| De macrocephalis. 379 | Dentium incisorum nomina. ibid. |
| Democritus Abderita cur secabat corpora. 10 | Dentes canini. ibid. |

ET VERBORVM.

| | |
|---|-----------|
| De opticonum ortu opiniones varie. | 578 |
| De praesantia ventriculorum cerebri. | ibid. |
| De sanguinis preparatione controuersa. | 482 |
| De situ pueli conciliantur loci Hippocrat. dissentes. | ibid. |
| De testium usu opinio medicorum & nostra. | 347 |
| De testium & thoracis sympathia. | 349 |
| De tempore motus vario in fetu. | 435 |
| De vena umbilicali observatio rara. | 408 |
| Dexter ventriculus nobilior esse docetur sinistro. | ibid. |
| Dexter cordis ventriculus quomodo solius pulmonis gratia constructus. | 493 |
| Diabetes caussa. | 335 |
| Diarthrosis quid. | 55 |
| Diarthroses species. | ibid. |
| Diaphragma quomodo moueatur. | 207 |
| Diaphragma in expiratione attendatur. | 208 |
| Diaphragma quid. | 458 |
| Diaphragma cur Hipp. Διάφραγμα appellavit. | ibid. |
| Diaphragma totum duplex. | 459 |
| Diaphragma respiratorium ventris inferioris. | ibid. |
| Diaphragma cur veteres σπλίς appellauerint. | 460 |
| Diaphragmatis phrenitis. | ibid. |
| Diaphragmate inflammato cur phrenitis. | 461 |
| Diaphragmatis finis in medio est. | 207 |
| Diaphragmatis situs inuariat motu intestinorum. | 208 |
| Diaphragmate inflammato cur retrahantur hypochondria. | 461 |
| Diaphragmatis ortus. | 197 |
| Diaphragmatis motus. | ibid. |
| Diaphragmatis expiratione fieri contractione. | ibid. |
| Diaphragmatis compositio. | 459 |
| Digitorum ossa cur tria tantum. | 597 |
| Digitorum nervi. | ibid. |
| Digitorum caro cur pauca. | ibid. |
| Digitorum vincula. | ibid. |
| Digitorum partes. | 598 |
| Digitus quinque tantum, & cur. | ibid. |
| Digitorum ossa. | 98. & 100 |
| Digitorum quatuor musculi cur fere sint similes. | 194 |
| Digitus flectunt musculi tres. | 195 |
| Digitus adducunt lumbrici musculi & abducunt interossei. | ibid. |
| Dioctes quomodo corpus diuidat. | 30 |
| Diocles Celsij diuisio humani corporis. | 269 |
| Diploe quid. | 65 |
| Disimularis pars quid sit. | 29 |
| Disimilares partes sunt inagis animae organa quam similes. | ibid. |
| Distinctio organorum mouentium. | 458 |
| Diuisio partium generationi dicatarum. | 338 |
| Diuerfa vasorum cordis & structura in fetu. | 420 |
| Dolor osium ignotus. | 59 |
| Doloris grauis acceptio duplex. | 332 |
| Doloris acerbis duo tempora. | 333 |
| Dormientes raro extremas habent figuras. | 177 |
| Dormientes cur moueantur. | 163 |
| Dormientium imaginatio brutorum imaginationi | |

| | |
|--|-------|
| similis, & cur. | ibid. |
| Dorsum quid. | 452 |
| Dorsi musculi. | 199 |
| Ductus septem per quos excrementa expirent. | 552 |
| Ductus per quos cerebelli & quarti sinus superflua expurgantur. | 553 |
| Ductus duo in gravidis ad excretionem seminis ueteribus incogniti. | 416 |
| Ductus duo in tertio situ cerebri. | 528 |
| Ductus pituitae. | 553 |
| Ductuum alij ordinarij, alij extraordinarij. | ibid. |
| Duo spectanda in ossibus. | 53 |
| Dura meningis descriptio. | 521 |
| E | |
| Efluxus quid ex Hippocrate. | 438 |
| Eiaculationem utramque non est necesse simul fieri. | 395 |
| Elegans structura totius artificium. | 12 |
| Ethyroides quid. | 340 |
| Empedocles ossa calida esse voluit. | 58 |
| Empirici quid sint. | 485 |
| Empyricorum pus quatuor modis expurgatur. | ibid. |
| Enarthrosis. | 55 |
| Epididymis quid. | 339 |
| Epiglottidis musculi in homine non reperiuntur. | 190 |
| Epiglottis cur cartilaginea. | 513 |
| Epiglottidis usus duplex. | ibid. |
| Epiglottidis erosio. | 515 |
| Epiglottidis nomina. | 105 |
| Epiglottidis figura. | ibid. |
| Epiglottidis usus duplex. | ibid. |
| Epiglottidis nomina. | 513 |
| Epiglottidis descriptio. | ibid. |
| Epiphyyses quibus ossibus insunt, & quot. | 53 |
| Epiphyyses cur ranae & laeae. | 54 |
| Epiphyseon substantia qualis. | 53 |
| Epiphyseon usus. | ibid. |
| Epiphysis quid. | ibid. |
| Epiphysis est os per se. | ibid. |
| Epiphysis in puerulis aliquando luxatur. | ibid. |
| Erasistrati de renum usu opinio nulla. | 330 |
| Error Epicuri conuincitur. | 6 |
| Error Galeni in rete admirabili. | 555 |
| Error Argyreij de pituitosis cerebri excrementis. | 552 |
| Ethmoides os cribri instar cur est perforatum, usus. | 73 |
| Ethmoides os quale in puerulis. | 74 |
| Ethmoidis ossis nomina, situs, cribrosa pars, spongiosa, plana. | ibid. |
| Ethmoidis ossis descriptio. | 587 |
| Ethmoidis cribrosa pars. | ibid. |
| Ethmoidis foraminum usus. | ibid. |
| Ethmoidis spongiosa pars. | ibid. |
| Eunuchi mali sunt moris. | 344 |
| Exanguia sine musculis mouentur. | 181 |
| Excrementa tenuia & crassa quomodo & per quos ductus expirent. | 552 |
| Excrementa tria coctionis secundae. | 314 |

INDEX RERVM

| | |
|--|-------|
| Excrementa cerebri teporati quomodo se habeant. | 553 |
| Excrementis tribus cur conceptacula propria dicantur natura. | 315 |
| Excrementum duplex, utile & inutile. | 376 |
| Excrementitium humorem excipere secundarius est mammarum usus. | 454 |
| Exempla varia similitudinis. | 411 |
| Explicatur Galenus de irascibili & concupiscibili. | 471 |
| Expurgari per urinas pus. | ibid. |
| Expurgatur pus per diarrhoeam. | 486 |
| Expurgatio colorem conservat. | 500 |
| Expurgatio puris per abscessus. | 486 |
| Expurgatio per uterum. | ibid. |
| Expurgatio puris per quas vias fiat. | ibid. |
| Expurgationis via per urinas. | ibid. |
| Expurgationis veri ductus à Galeno patefacti. | 487 |
| Ex venis maxima petuntur indicia. | 120 |

F

| | |
|--|------------|
| Facies cur ita dicatur. | 556 |
| Facies hominis quid habeat mirabile. | 8 |
| Facies soli homini propria. | 556 |
| Facies quomodo animi imago. | ibid. |
| in Facie salutis indicia. | ibid. |
| Facies unde dicta. | 184 |
| Facies quomodo moveatur. | ibid. |
| Facies partes. | 556 |
| Facies divisio. | ibid. |
| Facies cutis quid habeat peculiare. | ibid. |
| Facies membrana carnea. | 557 |
| Facies peculiare sunt musculi. | ibid. |
| Facies pili. | 500 |
| Facultates non influunt nisi per spiritus. | 345 |
| Facultatium sedes ibi locanda ubi earum apparent organa. | 35 |
| Feces cur forteant. | 300 |
| Fecum retentio animalis est non naturalis. | 297 |
| Fecum causa efficiens materialis. | 300 |
| Fœmina quid. | 367. & 368 |
| Fœminas semen emittere. | 381 |
| Fœmina cur mare celerius crescat & generet. | 373 |
| Fœmina cur salacior. | ibid. |
| Fœmina & maris definitio. | 367 |
| Fœminam cur creari decuit. | ibid. |
| Fœmina & mas quid. | 368 |
| Fœmina primum monstrum in natura. | ibid. |
| Fœminas non esse fortiores sed morosiores ferocioresque. | 373 |
| Fallopj laus. | 21 |
| Fallopj de osium magnitudine interpretatio non probatur. | 60 |
| Fallopj de vesicula biliaria usu opinio nona conculitur. | 319 |
| Fauces quid. | 591 |
| Femoris os. | 98 |
| Femur sunt duo, musculi extendunt tres, adducunt tres, abducunt sex. | 201 |
| Fernelij nova opinio reuocatur de sensu cordis. | 550 |

| | |
|--|-------|
| Fernelij defensio contra Argenterium. | 32 |
| Fibula perone. | 99 |
| Fibre primæ sunt & vera solida venarum particule. | 119 |
| Fibre an admatum venarum sint comparate. | 140 |
| Figura circularis & quadrata in humano corpore conspicua. | 4 |
| Figura recta corporis. | 1 |
| Figura recta causa efficiens duplex. | 3 |
| Figurarum inspectio non omnino damanda. | 14 |
| Figura partis quid. | 24 |
| Figura recta causa efficiens anima est calor. | 3 |
| Figura recta causa materialis. | ibid. |
| Figura recta causa finalis triplex. | ibid. |
| Figuram rectam cur habuerit homo. | 10 |
| Flatum vires. | 25 |
| Fœtus prior vita simplicissima. | 417 |
| Fœtus diuersa nutritio. | 101. |
| Fœtus unicam edit coctionem. | 418 |
| Fœtus excrementa. | ibid. |
| Fœtus per quas vias alimentum trahat. | ibid. |
| Fœtum ali sanguine puro. | 419 |
| Fœtus vita dissimilis. | 420 |
| Fœtus non respirat. | 425 |
| Fœtus transpirat tantum. | 429 |
| Fœtus respirare non potest nec debet. | ibid. |
| Fœtus alimentum ab umbilico trahit. | 286 |
| Fœtus multi cur primis diebus suffocentur. | 426 |
| Fœtus humanus cur non habet acetabula ut bruta. | 401 |
| Fœtus secunda conformatio ex sanguine, quo ordine carnes effinguntur. | 402 |
| Fœtus partium differentia. | 405 |
| Fontanella quid. | 74 |
| Foramen quid. | 83 |
| Foramina capitis quot. | ibid. |
| Formatio omnis à semine est. | 31 |
| Fossa quid. | 83 |
| Fossa capitis quot. | ibid. |
| Fovea duplex in osse frontis, foramina duo, fossa duplex & sinus amplissimi. | 68 |
| Fundamenta partium simul iaciuntur. | 401 |
| Fractura quintam speciem negat Fallopius. | 68 |
| Francisci Rosseti Regis Medici de artu venarum opinio. | 130 |
| Francisci Valesij de nutritione ventriculi opinio improbat. | 308 |
| Francisci Rosseti Regij Medici opinio de anastomosis cordis non probatur. | 427 |
| Franciscus Rossetus librum edidit de partu Cesareo. | 448 |
| Frigidum spermaticum partibus est inimicum. | 48 |
| Frons osium nomina, circumscriptio, figura, substantia. | 68 |
| Frons quid, & cur ita vocetur. | 556 |
| Frons cur debuit moveri. | 186 |
| Frontis pars anterior in pueris membracea est. | 69 |
| Frontis duo musculi. | ibid. |
| Frons pudoris indicium. | 68 |

| | |
|---|-------|
| G Galeni laus. | 17 |
| Galeni doctrinam sibi ipsi consentire. | 19 |
| Galeni definitio de ossibus datur à quibusdam. | 58 |
| Galeni accusatio de situ muscularum abdominis. | 108 |
| Galeni rationes de ortu venarum. | 131 |
| Galeni ratio improbat à quibusdam. | ibid. |
| Galeni de communiione vasorum elegans demonstratio. | 421 |
| Galeni opinio de motu prima & secunda vertebra & recentiorum contraria. | 91 |
| Galenus nihil de circulari motu. | 92 |
| Galenus quomodo artem Anatomicā illustravit. | 18 |
| Galenus quomodo excusari poterit de exortu hepatis. | 405 |
| Galenus agnoscit quid habeant simile quid item dissimile hominis & simiarum ossa. | 57 |
| Galenus male accusatur. | ibid. |
| Galenus habuit duos sceletos integros. | ibid. |
| Gallicè qui scripserunt de Anatome. | 21 |
| Gasp. Bahinus de Anatome scripsit accuratè. | ibi. |
| Gemelli an iisdem membranis concludantur. | 414 |
| Gemelli cur ita inter se sint similes. | ibid. |
| Gemellorum causa. | 413 |
| Gena inferior elegans forma in homine. | 79 |
| Gena inferior cur moueatur. | ibid. |
| Gena inferior duobus constat ossibus. | ibid. |
| Gena inferior luxatio cur periculosa. | ibid. |
| Generatio perfectorum animalium quomodo fiat. | 338 |
| Generatio foeminarum triplex. | 410 |
| Generatio marium triplex ex Hippocrate. | ibid. |
| Generationi partium dicatarum necessitas. | 337 |
| Generationis varij modi. | 367 |
| tria ad perfectam Generationem requiruntur. | ibid. |
| Generationis duo principia. | 373 |
| Generationis partium ordo. | 400 |
| Genitalia virorum & mulierum quomodo distinguantur. | 352 |
| Genitalia virorum & foeminarum non differre nisi situ. | 358 |
| Genitalia mulierum à virorum genitalibus omnino differre. | ibid. |
| Genitalia virorum. | 338 |
| Genitalia quomodo differant utriusque sexus. | 359 |
| Genitalium nulla similitudo. | 369 |
| Genitalium muliebrium diuisio. | 338 |
| Genitalium sensus cur ita exquisitus. | 338 |
| Gingiva. | 591 |
| Ginglymos. | 55 |
| Ginglymos duobus fit modis. | ibid. |
| Glandule in cerebro due. | 172 |
| Glaus pituitaria parotides amygdale. | 173 |
| Glandula vesenterij. | ibid. |
| Glandula laryngis. | ibid. |
| Glandula prostat e. | ibid. |
| Glandule ad carnes cur referendae. | 171 |
| Glandula definitio. | ibid. |
| Glandula alba & pingues. | ibid. |

| | |
|--|-------|
| Glandule cur rari & spongiosae. | ibid. |
| Glandularum primus usus est vasa firmare. | ibid. |
| Glandularum situs super sphincterem. | 351 |
| Glandis & glandosi corporis distinctio. | 348 |
| Glaus pituitaria. | 528 |
| Glandule parotides. | 583 |
| Glaucus color quid. | 573 |
| Glene quid. | 55 |
| Glottis propriè quid. | 105 |
| Gomphosis quid. | 56 |
| Gonorrhea causa. | 384 |
| gon quid apud Hippocratem. | 349 |
| Graudabruta cur marem non admittunt ut mulier. | 415 |
| Guillelmi Rondeletij de liene opinio. | 322 |

H

| | |
|--|-------|
| H Abitus ossium squammosorum quid. | 69 |
| Hæmorrhoidalis vena. | 123 |
| Hæmorrhoides internæ & externæ sunt. | 325 |
| Harmonia quid. | 56 |
| Hepatis nomina. | 309 |
| Hepatici cibos auersantur. | ibid. |
| Hepatis necessitas. | 310 |
| Hepatis gratia partes omnes in imo ventre contentæ condite sunt. | 36 |
| Hepatis dignitas & nomina. | 309 |
| Hepatis situs, figura, magnitudo, compositio, substantia. | 310 |
| Hepatis vasa. | 311 |
| Hepatis usus. | 312 |
| Hepar an princeps sit pars. | ibid. |
| Hepar an spiritum naturalem gignat. | ibid. |
| Hepar cur non est primum nutriendum. | 134 |
| in Hepate cur non omnia rubent. | 339 |
| Hepar primum omnium parenchymatum. | 403 |
| Hepar primum formati. | 404 |
| Hepar cur nullam cavitatem habet. | 133 |
| Hepar principium est venarum radicationis & officij. | 136 |
| Hepar homini continuum non in lobos diuisum. | 310 |
| Hepar carnosum viscus. | ibid. |
| Hepar cur calidum. | 311 |
| Hepar cur humidum. | ibid. |
| Hepar cur sinus nullos habeat. | 314 |
| Hepar ventriculo calidius. | 307 |
| Hermaphroditæ quot modi fiant. | 399 |
| Hippochondrij acceptio multiplex apud Hippoc. | 270 |
| Hippochondrium quid sit propriè. | 271 |
| Hippogastrica regionis partes. | ibid. |
| Hippocrates quàm fuerit in scribendo religio sus. | 75 |
| Hippocrates multa de vena caua scripsit. | 124 |
| Hippocratis excusatio & eius laus. | ibid. |
| Hippocrates quid per tractionem intelligat. | 372 |
| Hippocrates quantum oculis tribuat. | 559 |
| Hippocrates eam septenarij vim in partu videtur agnouisse. | 446 |
| Hippocrates non ignoravit eam Anatomem qua confert ad usum. | ibid. |

INDEX RERVM

| | |
|--|--------------|
| <i>Hippocrates quàm eleganter deſcripſerit oſſium natu-
ram.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Hippocraticæ partium differentia.</i> | 25 |
| <i>Hippocratis laus.</i> | 16 |
| <i>Hippocratis elegans locus pro illuſtratione ſymph-
ſeas.</i> | 64 |
| <i>Hippocratis opinio de ſuturarum varietate.</i> | 74 |
| <i>Hippocratis de ortu venarum ſententia varia.</i> | 129 |
| <i>Huius qui naturalem omnino actionem eſſe volunt ſa-
tiſiſit.</i> | 503 |
| <i>Hiſterica ſuffocatio.</i> | 361 |
| <i>Hiſtoria multorum de conuulſione.</i> | 537 |
| <i>Hiſtoria de reſolutione oppoſitarum partium.</i> | 539 |
| <i>Hiſtoria ſatyri.</i> | 384 |
| <i>Hiſtoria monſtrorum.</i> | 399 |
| <i>Hiſtoria Fernely vrachum confirmandi.</i> | 407 |
| <i>Hiſtoria cuiusdam ſabini uxoris.</i> | 411 |
| <i>Hiſtoria multiplicis partus.</i> | 413 |
| <i>Hiſtoria de gemellis.</i> | 417 |
| <i>Hiſtoria portentosa lit hopeny.</i> | 438 |
| <i>Hiſtoria diuelli poſſe oſſa pubis in partu.</i> | 449 |
| <i>Hiſtoria de lactis generatione.</i> | 455 |
| <i>Hiſtoria rara altera de legato magni ducis Florentie.
ibid.</i> | 455 |
| <i>Hiſtoria puellæ cuiusdam ſuppreſſæ urina.</i> | 407 |
| <i>Hiſtorie multorū qui cohibito ſpiritu extincti ſunt
voluntate ſola ita imperante.</i> | 502 |
| <i>Hiſtorie elegantes de veris ductibus expurgationis.
487</i> | |
| <i>Hiſtoriarum de affectibus cordis.</i> | 495 |
| <i>Hiſtoria de imaginatione.</i> | 413 |
| <i>Hiſtoria ſeminarum in mares conuerſarum.</i> | 358 |
| <i>Hiſtoria.</i> | 364 |
| <i>Hiſtoria.</i> | 378 |
| <i>Hiſtoria de ſedibus diſtinctione.</i> | 533 |
| <i>Hominis tam præclara inſignia partim animæ, par-
tim corpori accepta referenda.</i> | 2 |
| <i>Hominis cum mundo collatio.</i> | 4 |
| <i>Hominis ſimplicia corpora.</i> | 5 |
| <i>Hominis corpus quid habeat peculiare.</i> | 8 |
| <i>Hominem tribus præſidiis armavit Deus.</i> | 7 |
| <i>Hominis ſtructura Dei liber eſt.</i> | 11 |
| <i>Hominis ſtructuram Galeni non ignorare.</i> | 18 |
| <i>Hominis corpus non vni oſſe ſed pluribus conſtat.</i> | 55 |
| <i>Hominis omnia ſeruiunt iſte nulli.</i> | 16 |
| <i>Hominis nomina.</i> | 3 |
| <i>Homini duo tribuit natura, rationem & manū.</i> | 595 |
| <i>Homo quàm magnificus & egregius titulus exornet-
tur.</i> | 1 |
| <i>Homo ſolus formatus ad rationem vniuerſi.</i> | 3 |
| <i>Homo cur parvus mundus.</i> | 1 |
| <i>Homo audacis naturæ miraculum.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Homo ſolus formatus ad rationem vniuerſi.</i> | 3 |
| <i>Homo ſolus cur figuram rectam habuit.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Homo natus ut celeſtia contempletur.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Homo medium eſt generis.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Homo ſolus bipes.</i> | 9 |
| <i>Homo ſolus ſedet.</i> | <i>ibid.</i> |

| | |
|--|--------------|
| <i>Homo cur bipes.</i> | 599 |
| <i>Homo ſolus vniuerſum omnium temperies in ſe con-
cludit.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Homo omnia in ſe continet, quæ vniuerſus cientes
mundus.</i> | 4 |
| <i>Homo quid rationis & manuum opera præſtet.</i> | 7 |
| <i>Homo cur multiplices partes nō edat ut bruta.</i> | 413 |
| <i>Humani corporis præſtantia ex quatuor indicatur.</i> | 2 |
| <i>Humidum duplex vniuerſi & excrementitium.</i> | 392 |
| <i>Humorum ab utero ad mammaſ reſluxus.</i> | 364 |
| <i>Hydropici quomodo aperiendi.</i> | 288 |
| <i>Hydropici qui curati aperto vmbilico.</i> | 287 |
| <i>Fuit hoc anno me præſente & iubente
iueni cuidam hydropico eadem ſectio ad-
miniſtrata in aquis illis Niuernenſibus quas
Pogenſes vocat. Aderat illuſtriſſimus & ge-
neroſiſſimus Dux de Bouillon, Galliarum
Polemarchus, alique magnates quamplu-
rimi, aderant & Medici claſſiſſimi Peiteus,
Bernardus, le Fonillou, fuit intra quadra-
ginta dies ſanatus: tutò ergo ſecari poteſt
medius vmbilicus.</i> | |
| <i>Hydropicorum aquæ paulatim ſunt educende.</i> | 288 |
| <i>Hydropicorum noua vmbilici punctio.</i> | 287 |
| <i>Hieronymi Mercurialis doctiſſimi Mædici de cau-
ſis variolarum opinio.</i> | 391 |
| <i>Hieronymi Mercurialis de mola opinio non probet-
tur.</i> | 397 |
| <i>Hymen non reperitur.</i> | 357 |
| <i>Hymen an reperitur, & veterum opiniones no-
ſtraque.</i> | 366 |
| <i>Hymen membrana illa perforata nō datur, ſed præ-
ter naturam adnaſcitur.</i> | 366 |
| <i>Hyoides os non mouetur per ſe.</i> | 203 |
| <i>Hyoidis oſculo muſculi.</i> | 189 |
| <i>Hyoidis muſculi cur facti ſint.</i> | 203 |
| <i>Hyoidis oſſis cur vinctula decuit eſſe carnea.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Hyoidis muſculi non ſunt motui deſtinati.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Hyoidis muſculi cur.</i> | 181 |

I

| | |
|--|--------------|
| <i>Iacobus Guillemetus tabellæ artē Anatomice
illuſtrauit.</i> | 31 |
| <i>Ichor quomodo ſeratur à ſana in agram partem.</i> | 538 |
| <i>Ichor quomodo ferri poſſit in oppoſita partem.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Ilia quid.</i> | 271 |
| <i>Imago Trinitatis lucet in anima.</i> | 2 |
| <i>Imaginatio quid poſſit ad ſimilitudinem.</i> | 413 |
| <i>Imaginatio ſola ſimilitudinis naturæ cauſa eſſe
non poteſt.</i> | 411 |
| <i>Imaginationis vires.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Incriſi dies qui inter primum & vltimum inter-
cedunt integri numerandi ſunt.</i> | 442 |
| <i>Incerta eſſe homini & varia partus tempora.</i> | 439 |
| <i>Indiuidua quomodo ſint æterna.</i> | 337 |
| <i>Inſlatio eſt cum voluptatis ſenſu.</i> | 350 |
| <i>Inſlatio coli duplex, naturalis & præter naturam.</i> | |
| <i>351</i> | |
| <i>Ingenium quid.</i> | 535 |

| | | | |
|--|-------|--|------------|
| <i>Inspirationis sicne maior quàm expirationis neces-</i>
<i>sitas.</i> | 475 | <i>Lacte nutriripuellum in utero, quomodo intelligi</i>
<i>debeat.</i> | 457 |
| <i>Instrumentum duplex, quo & in quo.</i> | 43 | <i>Lacte quomodo alatur embryo.</i> | 420 |
| <i>Intercartilaginei nulli sunt musculi.</i> | 197 | <i>Laryngis quatuor cartilaginee.</i> | 512 |
| <i>Intercostales musculi ab intercartilagineis non dif-</i>
<i>ferunt.</i> | 205 | <i>Laryngis musculi quatuordecim tantum.</i> | ibid. |
| <i>Intercostales musculi quid habeant peculiare dum</i>
<i>agunt & dum quiescunt.</i> | 206 | <i>Laryngis musculi quatuor communes sunt.</i> | ibid. |
| <i>Intercostaliū musculorum verus usus.</i> | ibid. | <i>Laryngis proprii decem.</i> | ibid. |
| <i>Interpretatio quorundam de uteri ascensu ad he-</i>
<i>par.</i> | 360 | <i>Laryngis glandule.</i> | 513 |
| <i>Intestina tenuia.</i> | 291 | <i>Laryngis cartilaginee quatuor.</i> | 106 |
| <i>Intestina non aluntur chylō.</i> | 296 | <i>Laryngis quatuordecim musculi.</i> | 190 |
| <i>Intestina quomodo carnosā dici debeant.</i> | 301 | <i>Laryngis proprii musculi sunt decem.</i> | ibid. |
| <i>Intestina cur anfractūosa.</i> | 289 | <i>Larynx cur cartilagineus.</i> | 106 |
| <i>Intestina cur membranēa.</i> | 290 | <i>Larynx cur moueri debuit.</i> | 190 |
| <i>Intestina crassa quē sint.</i> | 292 | <i>Larynx ex quibus componitur.</i> | 512 |
| <i>Intestini appendix in puerulis ampliōr.</i> | ibid. | <i>Larynx cur cartilagineus.</i> | ibid. |
| <i>Intestina an vim habeant attractricem.</i> | 294 | <i>Larynx etiam si totus sit cartilagineus cur asopha-</i>
<i>gum non premit in deglutitione.</i> | 107 |
| <i>Intestina an vim habeant retentricem.</i> | 296 | <i>Latini scriptores Anatomices.</i> | 20 |
| <i>Intestina an vim habeant concoctricem.</i> | 297 | <i>Laurentij Ioberti opinio de vesicula nutritione im-</i>
<i>probatur.</i> | 316 |
| <i>Intestini dei nomina.</i> | 292 | <i>Liber de septimestri partu germanus est & Hippo-</i>
<i>craticus.</i> | 442 |
| <i>in Intestinis nulla est communis facultas attractrix.</i>
295 | | <i>Lien tri alit sanguinem crassiorē quàm hepar, sed</i>
<i>nutritur tenuiori.</i> | 323 |
| <i>in Intestinis cur fibra recta.</i> | 296 | <i>Lien cur sepe scirrhis infestetur.</i> | 324 |
| <i>Intestinarum vniuersalis descriptio, nomina.</i> | 289 | <i>Lien cur cavitatem non habeat.</i> | 325 |
| <i>Intestinarum motus duplex, naturalis & animalis.</i>
299 | | <i>Lienis situs, figura, magnitudo, & compositio.</i> | 321 |
| <i>Intestinarum substantia & situs.</i> | 301 | <i>Lienis situs.</i> | 320 |
| <i>Intestinarum nomina.</i> | 289 | <i>Lienem inuri posse.</i> | 323 |
| <i>Intestinarum anfractus cur.</i> | 290 | <i>Lienteria quid sit.</i> | 297 |
| <i>Intestinarum tunica propria.</i> | ibid. | <i>Lienteria causā.</i> | 295. & 296 |
| <i>Intestinarum situs.</i> | 291 | <i>Ligamenta nervi appellantur.</i> | 109 |
| <i>Intestinarum sensus cur hebetior redditur.</i> | 290 | <i>Ligamenta sensilia cur.</i> | ibid. |
| <i>Intestinarum fibra.</i> | ibid. | <i>Ligamenta tria capitū.</i> | 110 |
| <i>Intestinarum motus peristalticus.</i> | ibid. | <i>Ligamenta superiorū maxillæ & inferiorū gena-</i>
<i>vincula.</i> | 111 |
| <i>Intestinarum venæ cur innumere sint.</i> | ibid. | <i>Ligamenta hyoïdū.</i> | ibid. |
| <i>Intestinarum longitudo, situs & connexus.</i> | 291 | <i>Ligamenta spinæ.</i> | ibid. |
| <i>Intestinarum duæ, ægæ non seu delineatio.</i> | ibid. | <i>Ligamenta thoracis.</i> | ibid. |
| <i>Ioannis Botalli de usu anastomoscos cordis opinio</i>
<i>consuetur.</i> | 483 | <i>Ligamenta brachij & omoplate.</i> | 112 |
| <i>Iuniorum quorundam opinio.</i> | 34 | <i>Ligamenta carpi & digitorum.</i> | ibid. |
| L | | <i>Ligamenta ilij, cubiti, femoris & tibiæ.</i> | ibid. |
| <i>Labia.</i> | 390 | <i>Ligamenta tarsū.</i> | 113 |
| <i>Labia cur moueri debuerunt.</i> | 187 | <i>Ligamenta digitorum.</i> | ibid. |
| <i>Labiorum cutis musculoſa est.</i> | ibid. | <i>Ligamenta quomodo ab ossibus oriuntur.</i> | 110 |
| <i>in musculis Labiorum duo fibrarum genera.</i> | ibid. | <i>Ligamenta quæ à cartilaginibus oriuntur.</i> | ibid. |
| <i>Labirynthus in aure quid.</i> | 583 | <i>Ligamenti propria significatio.</i> | 109 |
| <i>Labor corpus firmat.</i> | 410 | <i>Ligamenti acceptio duplex.</i> | 108 |
| <i>Labium superius mouent sursum duo musculi, deorsum</i>
<i>totidem; inferius sursum duo, deorsum toti-</i>
<i>dem.</i> | 187 | <i>Ligamenti definitio.</i> | 109 |
| <i>Lac non gigni ante conceptionem.</i> | 455 | <i>Ligamentorum materia.</i> | ibid. |
| <i>Lac posse generari ante conceptionem.</i> | ibid. | <i>Ligamentorum alimentum.</i> | ibid. |
| <i>Lac quomodo ad mammas feratur, & cur.</i> | 456 | <i>Ligamentorum usus nouem.</i> | ibid. |
| <i>Lac cur generari incipit tertio quartoque mēse.</i> | ibid. | <i>Ligamentorum differentia.</i> | 110 |
| <i>Lactis duplex differentia ex Hippocrate.</i> | 455 | <i>Ligamentum linguae.</i> | 111 |
| <i>Lactis prima generatio.</i> | 456 | <i>Linea natiuitatis.</i> | 598 |
| | | <i>Linea vitæ.</i> | ibid. |
| | | <i>Linea naturalis.</i> | ibid. |
| | | <i>Linea Veneris.</i> | ibid. |

INDEX RERVM

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| <i>Linea linguam discindens duplex.</i> | 592 | <i>Manus primaria pars musculus est.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Lingua homini mollissima & lata.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Manus nervus pars sine qua non.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Lingua cur dicta.</i> | 591 | <i>Manus actionem reddunt perfectiorem ossa & v-</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Lingua cur unica.</i> | 10 | <i>gues.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Lingua cur variè moveri debuit.</i> | 189 | <i>Manus actionem conservantes partes.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Lingua decem musculi.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Manus ossa.</i> | 597 |
| <i>Linguae praestantia & usus varij.</i> | 591 | <i>Manus palma, vola.</i> | 598 |
| <i>Linguae venae, arteriae, ligamentum, frangulum &</i> | <i>ibid.</i> | <i>Manus monticuli.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>musculi 10.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Mares calidiores feminis, rationes.</i> | 370 |
| <i>Lobus aurium cur ita dictus.</i> | 581 | <i>Mares ex semine generantur calidiores.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Loci quamplures quibus docetur Hippocratem pul-</i> | 476 | <i>Mares ex dextris partibus generantur.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>simum non ignorasse.</i> | | <i>Mares dieta calidiores utuntur.</i> | 371 |
| <i>Ladonicus Diuresis Regis medicus & professor cla-</i> | | <i>Mares calidiores, confirmatur auctoritatibus.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>rissimus praefata edidit commentaria in Coacas</i> | 332 | <i>Maris conformatio celerior & motus citius quam</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Hippocratis praenotiones.</i> | | <i>in femina.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Lumborum & intestinorum consensus.</i> | 294 | <i>Maris exclusio celerior semina.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Luna vires.</i> | 392 | <i>Marium solidior habitus.</i> | <i>ibid.</i> |
| | M | <i>Mas quid.</i> | 367 & 368 |
| <i>M</i> | | <i>an uno coitu Mas & femina generari possint.</i> | 414 |
| <i>Macrocephali macrocephalos generabant.</i> | | | |
| <i>378</i> | | | |
| <i>Malleoli.</i> | 99 | <i>Mas solus cur in se non generet.</i> | 43 |
| <i>Malum quid.</i> | 590 | <i>Mas & femina quomodo semina effundunt.</i> | 334 |
| <i>Mammae puelli aetatem, sexum & sanitatem in-</i> | 364 | <i>Materia prima novam semper appetit formam.</i> | 337 |
| <i>dicant.</i> | | <i>Maxilla superior cur immobilis.</i> | 78 & 187 |
| <i>Mammae virorum.</i> | 453 | <i>Maxilla inferior cur moveri debuit.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Mammae glandulae sunt.</i> | 454 | <i>Maxilla superior quibus futuris terminetur.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Mammarum nomina.</i> | 453 | <i>Maxilla inferior cartilago.</i> | 108. |
| <i>Mammarum muliebrium structura.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Maxillae figurae variae.</i> | 187 |
| <i>Mammarum situs cur in pectore.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Maxillae superiorum numerus ostium.</i> | 79. |
| <i>Mammarum numerus, & cur geminae.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Maxillae ad novam dentium generationem sunt</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Mammarum usus varij.</i> | <i>ibid.</i> | <i>aptiores quam cetera ossa.</i> | 86 |
| <i>Mammarum & uteri societas.</i> | 454 | <i>Maxilla motus sex.</i> | 187. |
| <i>Mammarum primus usus qui sit.</i> | 455 | <i>Maxillam aperientes cur duo tantum musculi.</i> | 188 |
| <i>Mammarum situs in homine & ceteris animalibus</i> | | <i>Maxillam moventes ad latera masseteres.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>diffinitus.</i> | 8 | <i>Maxillarum nomina.</i> | 78 |
| <i>Mammarum & genitalium partium sympathia</i> | | <i>Meatus auditorius quatuor habet camerae.</i> | 70 |
| <i>mirabilis.</i> | 349 | <i>Meatus femini & urinae communis.</i> | 343 |
| <i>Mammillarum processuum usus.</i> | 588 | <i>Mediastinum quid.</i> | 462 |
| <i>Manus in tres partes dividitur.</i> | 96 | <i>Medulla quid.</i> | 59 |
| <i>Manus duae sunt.</i> | 598 | <i>Medulla an sit ossium alimentum.</i> | 60 |
| <i>Manus divisio, brachium, cubitus.</i> | 593 | <i>Medulla cervicis aut dorsi interdum laesa cur perit</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Manus extrema.</i> | <i>ibid.</i> | <i>femoris motus, ille so brachio.</i> | 164 |
| <i>Manus venae totius.</i> | 594 | <i>Medulla Aristoteli non est ossium alimentum.</i> | 60 |
| <i>Manus arteriae.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Medulla Hippocrati & Galeno est ossis alimen-</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Manus nervorum paria sex.</i> | <i>ibid.</i> | <i>tum.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Manus musculi.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Medulla spinalis dispersio caudae equinae similis.</i> | 164. |
| <i>Manus ossa.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Melancholicus succus quomodo a liene servatur in</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Manuum opera quid praestet homo.</i> | 595 | <i>ventriculi fundum.</i> | 325 |
| <i>Manibus sapientia humana ortum tribuit Anaxa-</i> | | <i>Melancholicus succus cur effundatur in ventricu-</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>goras.</i> | <i>ibid.</i> | <i>lum.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Manus sermonis vicaria.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Melancholici cur parum adipis habeant.</i> | 281 |
| <i>Manus fidei dicata.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Melancholicus humor cur in ventriculi fundum</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Manus fortitudinem denotat.</i> | <i>ibid.</i> | <i>effundatur.</i> | 325 |
| <i>Manus apud Chironanticos figura est morum.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Melancholicus humor aqua ab Hippocrate vocatur.</i> | 326 |
| <i>Manus officium.</i> | 596 | | |
| <i>Manus usus tres.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Melancholicus humor per urinas expurgatur.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Manus figura.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Melancholicus humor per quos ductus ad renes &</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Manus structura.</i> | <i>ibid.</i> | <i>vesiculam excluditur.</i> | 327 |

ET VERBORVM.

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| <i>Membrana & tunica quid differant.</i> | 113 | <i>Mythologia elegans.</i> | 380 |
| <i>Membrana definitio.</i> | ibid. | <i>Mola caro est otiosa & infirma.</i> | 397 |
| <i>Membrana cur lata est, densa & tenuis.</i> | 114 | <i>Mola cur in sola muliere gignatur.</i> | ibid. |
| <i>Membrana immediatum est organum tactus.</i> | ibid. | <i>Mola cur per triennium in utero maneat.</i> | 399 |
| <i>Membrana non est princeps organum.</i> | 388 | <i>Mola nunquam fit sine semine.</i> | 398 |
| <i>Membrana legitima & illegitima quæ.</i> | 114 | <i>Mola quomodo moueatur.</i> | ibid. |
| <i>Membrana vniuersales & particulares quæ.</i> | 115 | <i>Mola per multos annos gessatur.</i> | ibid. |
| <i>Membrana cerebri quomodo sentiant.</i> | 160 | <i>ad Mola generationem duo requiruntur.</i> | ibid. |
| <i>Membrana cur prius formentur.</i> | 401 | <i>Mola nomina & definitio perfecta.</i> | 397 |
| <i>Membrana prima omnium generantur.</i> | 405 | <i>Mola generatio.</i> | ibid. |
| <i>Membrana prima effinguntur.</i> | 406 | <i>Mola signa quibus dignoscitur.</i> | 398 |
| <i>an Membrana à vi fiant formatrice.</i> | ibid. | <i>Mola & pueruli motus dissimilis.</i> | ibid. |
| <i>Membrana an à virili aut muliebri semine fiant.</i> | ibid. | <i>Moles carnea loco cotyldonon.</i> | 401 |
| <i>Membrana dura vsus triplex.</i> | 322 | <i>Momi calumnia damnatur.</i> | 6 |
| <i>Membrana fetus.</i> | 115 | <i>Monstra in sexu.</i> | 399 |
| <i>Membrana editi animalis.</i> | ibid. | <i>Monstra in conformatione, in figura, in magnitudine, in situ & numero.</i> | ibid. |
| <i>Membrana singularum partium.</i> | ibid. | <i>Monstra unde fiant causa varia.</i> | ibid. |
| <i>Membrana omnes corporis duplices.</i> | 285 | <i>Monstra quomodo fiant ex parte materia.</i> | ibid. |
| <i>Membrantarum tres vsus communes.</i> | 114 | <i>Monstra quomodo fiant ex parte agentis.</i> | ibid. |
| <i>Membrantarum peculiare vsus varij.</i> | ibid. | <i>Monstri definitio.</i> | ibid. |
| <i>Membrantarum materia.</i> | ibid. | <i>Mortui cur pedibus primis efferrī solent.</i> | 439 |
| <i>Membrantarum officium.</i> | ibid. | <i>Motus pueruli animalis est.</i> | 433 |
| <i>Membrantarum differentia.</i> | ibid. | <i>Motus cordis non est tremulus.</i> | 473 |
| <i>Membratosa corpora quæ sint.</i> | 115 | <i>Motus triplex.</i> | ibid. |
| <i>Membranularum cordis vsus.</i> | 132 | <i>Motus cordis non est compositus.</i> | 474 |
| <i>Muryz & xuro quomodo distinguantur.</i> | 113 | <i>Motus ad opposita conuenit animatis omnibus.</i> | ibid. |
| <i>Meninges quid.</i> | 521 | <i>Motus voluntarij distinctio.</i> | 502 |
| <i>Meningium figura & magnitudo.</i> | ibid. | <i>Motus concussiu.</i> | 508 |
| <i>Meninges tenuis cur constructa, situs.</i> | 513 | <i>Motus seminis varij enodantur.</i> | 412 |
| <i>Menses fœminarum cur non ante 14. annum fluat.</i> | 386 | <i>Motus voluntarius quid sit.</i> | 174 |
| <i>& cur 50. anno cessent.</i> | 386 | <i>Motus non est de essentia articulationis.</i> | 62 |
| <i>Mensem lunarem Hippocraticum esse volunt quidam.</i> | 441 | <i>Motus à musculo.</i> | 350 |
| <i>Mensus quaterplex.</i> | ibid. | <i>Motus apud Medicos triplex, animalis, vitalis, & naturalis.</i> | 116 |
| <i>Mensus progressionis quid.</i> | ibid. | <i>Motus varia sunt organa.</i> | 160 |
| <i>Mensus apparitionis quot dierum.</i> | ibid. | <i>Motus sæpe perit illa sensu, raro sensus superstitie motu, cur.</i> | 162 |
| <i>Mensus communis quot dierum.</i> | ibid. | <i>Motus maiorem spirituum copiam postulat quam sensus.</i> | ibid. |
| <i>Mensus Hippocrati reuera est 30. dierum & solaris.</i> | ibid. | <i>Mouens & motum in plerisque idem sunt.</i> | 43 |
| <i>Mentum quid.</i> | 590 | <i>Mulier quomodo carnes habeat rariore.</i> | 372 |
| <i>Mesenterium quid, structura & ortus.</i> | 294 | <i>Mulier sana sine voluptate nunquam concipit.</i> | 395 |
| <i>Mesenterij nami distributio.</i> | 123 | <i>Mulier cur ultra 11. non gesserit.</i> | 447 |
| <i>Mesenterij vena an similes semel chylum vehant & reuehant sanguinem.</i> | 140 | <i>Mulier plus congerit sanguinis quia minus digerit.</i> | 373 |
| <i>Mesenterij venas omnes eadem vi conditione seruauit.</i> | 142 | <i>Mulier ambidextra non fit.</i> | 371 |
| <i>Mesenterij nomina.</i> | 294 | <i>Mulierem carnes habere rariore quomodo sit intelligendum.</i> | 372 |
| <i>Metacarpij ossa.</i> | 98 | <i>Mulieres quomodo decipiantur in tempore conceptionis.</i> | 440 |
| <i>Metacarpus quid.</i> | 597 | <i>Mulieres viris calidiores demonstratur.</i> | 369 |
| <i>Methodus compositionis.</i> | 15 | <i>Mulieres cor habent calidius, & pulsus frequentior viris.</i> | 370 |
| <i>Methodus resolutionis.</i> | ibid. | <i>Mulieres non esse viris animosiores.</i> | 372 |
| <i>Methodus librorum de usu partium explicatur.</i> | 19 | <i>Mulierum hepar calidum.</i> | 370 |
| <i>Microcosmi meteorologia.</i> | 5 | <i>Mulierum accretio validior & vegetior procrea-</i> | ibid. |
| <i>Mirabilis obseruatio Galeni de vasorum cordis unionis factu.</i> | 420 | <i>trix.</i> | ibid. |
| <i>Mirum quomodo præcludantur & resiccantur vasa cordis edito fœtu.</i> | 421 | | |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| <i>Mulierum pulsus cur frequentiores.</i> | 372 | <i>Nasi membrana interna.</i> | ibid. |
| <i>Mundi utriusque comparatio ex Peripateticorum doctrina.</i> | 5 | <i>Nasi interni descriptio.</i> | ibid. |
| <i>Mundanus Anatomus scripsit methodo analytica.</i> | 20 | <i>Nasi cartilaginee quinque.</i> | 105 |
| <i>Mundus parvus cur dicatur.</i> | 1 | <i>Nasus soli homini eminens.</i> | 8 |
| <i>Musculi reguntur & reguntur.</i> | 174 | <i>Nasus inest quid regionum.</i> | 186 |
| <i>Musculi similes partes tres.</i> | 177 | <i>Nasum externum Aristoteles statuit princeps odoratus organum.</i> | 188 |
| <i>Musculi dissimiles partes tres.</i> | ibid. | <i>Nates.</i> | 528 |
| <i>Musculi congeneres qui.</i> | 178 | <i>Natura quam sit sui diligens.</i> | 337 |
| <i>Musculi antagoniste.</i> | ibid. | <i>Natura quam male nouerca appellatur.</i> | 6 |
| <i>Musculi nomine carnem intellexit Galenus.</i> | 208 | <i>Natura eternitatis amida.</i> | 397 |
| <i>Musculi nomina & duplex consideratio.</i> | 174 | <i>Natura discretivis & excretivis vires impetiales.</i> | 142 |
| <i>Musculi definitio à structura & ab officio.</i> | ibid. | <i>Natura miraculum in partu.</i> | 436 |
| <i>Musculi temporales dignitas.</i> | 78 | <i>Natura leges certa.</i> | 447 |
| <i>Musculi dissimiles partes tres.</i> | 175 | <i>Natura miraculum in partu.</i> | 448 |
| <i>Musculi sunt 405.</i> | 179 | <i>Natura motus certi.</i> | 393 |
| <i>Musculi principem partem nos agnoscimus carnem fibrosam.</i> | 182 | <i>Natura necessitatem explicare difficillimè est.</i> | ibid. |
| <i>Musculi duo nasum dilatant.</i> | 186 | <i>Nauiculare os.</i> | 99 |
| <i>Musculi duo claudentes maxillam.</i> | 187 | <i>Nephritis quomodo à colico dolore dignosci queat.</i> | 332 |
| <i>Musculi temporales dignitas.</i> | 188 | <i>Nephriticus dolor colicum sæpe mentitur.</i> | ibid. |
| <i>Musculi digestivici cur dicti.</i> | ibid. | <i>Nervi acceptio multiplex.</i> | 148 |
| <i>Musculi usus hyoidis tensioni potius quam motui sunt destinati.</i> | 189 | <i>Nervi vincula adducuntur.</i> | ibid. |
| <i>Musculi deglutitioni inservientes.</i> | ibid. | <i>Nervi propriè dicti.</i> | ibid. |
| <i>Musculi quatuor sectantur cervicem, extendunt totidem.</i> | 192 | <i>Nervi definitio.</i> | 149 |
| <i>Musculus latus quid.</i> | 176 | <i>Nervi substantia duplex.</i> | ibid. |
| <i>Musculus organum est.</i> | 174 | <i>Nervi interiori parti præcipua est illius pars.</i> | ibid. |
| <i>Musculus cerebrum, nervus, tria organa sunt motus, & quomodo.</i> | ibid. | <i>Nervi cavitatem consuetam non habent.</i> | ibid. |
| <i>Musculus an voluntarij motus organum sit.</i> | 180 | <i>Nervi organa sunt sensus.</i> | ibid. |
| <i>Musculus buccinator.</i> | 187 | <i>Nervi organa motus.</i> | ibid. |
| <i>Musculus temporalis.</i> | 188 | <i>Nervi non sunt immediata organa motus.</i> | 150 |
| <i>Musculus in ore latitans.</i> | ibid. | <i>Nervi optici quomodo coeant & cur.</i> | 151 |
| <i>Musculorum partes.</i> | 174 | <i>Nervi optici manifestè cavi non sunt.</i> | 152 |
| <i>Musculorum quatuor sunt motus.</i> | 176 | <i>Nervi quomodo oriuntur à medulla.</i> | 153 |
| <i>Musculorum figura qualis dum agunt & dum quiescunt.</i> | 177 | <i>Nervi cervicis qui sunt.</i> | ibid. |
| <i>Musculorum differentia omnes.</i> | ibid. | <i>Nervi brachij & manus.</i> | 154 |
| <i>Musculorum numerus incertus.</i> | 179 | <i>Nervi thoracis, lumborum, ossis sacri & pedis.</i> | ibid. |
| <i>Musculorum temporalium affectus periculosi.</i> | 188 | <i>Nervi sensus motusque organa sunt à Galeno.</i> | 159 |
| <i>Musculosa faciei cutis quid sit.</i> | 184 | <i>Nervi sensorij non omnes à cerebro orti ducunt.</i> | 160 |
| <i>Musculum non esse motus organum Averroës contra Galenum oppugnat.</i> | 180 | <i>Nervi duri non omnes ad motum sunt destinati.</i> | ibid. |
| <i>Musculus opticum ambiens in brutis quid agat.</i> | 181 | <i>Nervi consuetam cavitatem non habent.</i> | 168 |
| <i>Mustaces quid.</i> | 590 | <i>Nervi quomodo à spinali medulla oriuntur.</i> | 170 |
| | | <i>Nervi nunquam se intersecant.</i> | 140 |
| | | <i>Nervi recurrentes.</i> | 152 |
| | | <i>Nervi arterii non sunt continui ut volebat Praxagoras.</i> | 157 |
| | | <i>Nervi omnes motorij etiam sunt sensifici.</i> | 161 |
| | | <i>Nervi interior substantia paros habet.</i> | 166 |
| | | <i>Nervi præcipua pars medulla est.</i> | 168 |
| | | <i>Nervorum mollities & durities unde.</i> | 161 |
| | | <i>Nervorum septem paria.</i> | 151 |
| | | <i>Nervorum & cerebri structura & substantia similis est.</i> | 157 |
| | | <i>Nervorum & venerum nulla est continuïtas nec similitudo.</i> | 158 |
| | | <i>Nervorum mollities & durities non facit nervorum species distinctas.</i> | 161 |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| <i>Nervorum ortum indicavit Hippocrates.</i> | 17 | <i>Occipitis os cur validissimum esse debuit.</i> | ibid. |
| <i>Nervorum tria genera apud Galenum.</i> | 148 | <i>Occipitis os non omni ex parte equaliter crassius est.</i> | ibid. |
| <i>Nervorum collatio.</i> | ibid. | | |
| <i>Nervorum communis usus.</i> | 149 | <i>Occipitis foramina.</i> | 72 |
| <i>Nervorum actio.</i> | 150 | <i>Occipitis ossis summi quatuor sunt processus duo.</i> | ibid. |
| <i>Nervorum differentia omnes.</i> | ibid. | <i>Occipitis ossa quatuor habent partes.</i> | 74 |
| <i>Nervorum mollietates à tribus pendet.</i> | ibid. | <i>Oculi in homine solo variegati.</i> | 8 |
| <i>Nervorum ortus omnis à posteriore est cerebro & spinali medulla.</i> | 151 | <i>Oculi figura cur rotunda & oblonga.</i> | 559 |
| <i>Nervus sensorius à cerebro motrices à spinali medulla oriri vult Galenus.</i> | 160 | <i>Oculi cur eodem motu moventur semper.</i> | 560 |
| <i>Nervosa corpora quæ sint.</i> | 148 | <i>Oculorum magnitudo.</i> | ibid. |
| <i>Nervus parvum est cerebrum.</i> | 168 | <i>Oculi natura cur aquea.</i> | ibid. |
| <i>Nervus parvus est sine qua non potest fieri motus.</i> | 175 | <i>Oculi cur in edito loco siti.</i> | ibid. |
| <i>Nervus princeps musculi parvi.</i> | 182 | <i>Oculi cur anteriùs collocati.</i> | ibid. |
| <i>Nervus immediatè non movet.</i> | ibid. | <i>Oculi cur reconditi.</i> | ibid. |
| <i>Nervus, cerebrum & musculus tria organa motus, & quomodo.</i> | 150 | <i>Oculi propugnacula.</i> | ibid. |
| <i>Nervus unus & idem sentit ac movet.</i> | ibid. | <i>Oculi musculorum ortus.</i> | 561 |
| <i>Nervus quomodo organum motus.</i> | 160 | <i>Oculi musculorum nomina.</i> | ibid. |
| <i>Nervus immediatè non contrahit muscolum.</i> | 208 | <i>Oculi vasa.</i> | 565 |
| <i>Nervus opticus.</i> | 564 | <i>Oculi mirabilis structura.</i> | 588 |
| <i>Nervi optici cur coeunt.</i> | ibid. | <i>Oculi sole præstantiores.</i> | ibid. |
| <i>Nervi optici manifestè caui non sunt.</i> | 565 | <i>Oculi animi omnes effectus exprimunt.</i> | ibid. |
| <i>Nervus oculum movens.</i> | ibid. | <i>in Oculis signa sunt fecunditatis.</i> | 559 |
| <i>Nervus auditorius.</i> | 583 | <i>Oculi quod est internum cur apparet.</i> | 571 |
| <i>Nigredinis causa.</i> | 574 | <i>Oculi cur lucent.</i> | 573 |
| <i>Noctambuli mira præstant & cur.</i> | 163 | <i>Oculi cur mobiles, & cur spiritales dicti.</i> | ibid. |
| <i>Non à sola imaginatione fieri similitudo individui.</i> | | <i>Oculi cur non rigent.</i> | ibid. |
| 411 | | <i>Oculi coloris acceptio duplex.</i> | ibid. |
| <i>Nonimestris partus omnium maxime legitimus.</i> | 440 | <i>Oculi colorum differentia.</i> | ibid. |
| <i>Nonus & verus usus loborum pulmonis.</i> | 496 | <i>Oculi cur simul moventur eodem motu.</i> | 575 |
| <i>Nulla cordis & nervorum est similitudo.</i> | 157 | <i>Oculi effectus cur alterius tantum magis irritat.</i> | 576 |
| <i>Nullus nervus ab antica cerebri parte oritur.</i> | 160 | <i>Oculi cur in alto sint collocati.</i> | 10 |
| <i>Nulle sunt via à cerebro ad testes qua semen deferant.</i> | 379 | <i>Oculi cur variè moveri debuerunt.</i> | 185 |
| <i>Numerus nullam vim agendi habet.</i> | 392 | <i>Oculorum musculi sex, & eorum ortus.</i> | ibid. |
| <i>Numerus par femina est, impar verò masculus.</i> | | <i>Oculi duo eodè & simili motu semper moventur.</i> | 576 |
| 444 | | <i>Oculorum motus tonicus duplex est.</i> | 575 |
| <i>Nutrix valentior.</i> | 370 | <i>Oculorum distantia & depravatio.</i> | 8 |
| <i>Nutritio quomodo similis actio.</i> | 40 | <i>Oculorum tunica tres ab optico dilatato sunt.</i> | 151 |
| <i>Nutritio duplex, perfecta & imperfecta.</i> | 308 | <i>Oculorum nomina.</i> | 559 |
| <i>Nutritio factus per umbilicum.</i> | 417 | <i>Oculorum usus duplex.</i> | ibid. |
| O | | <i>Oculorum situs.</i> | 560 |
| <i>Obliqui motus capitis à quibus musculis.</i> | 191 | <i>Oculorum numerus, & cur duo.</i> | ibid. |
| <i>Obliqui musculi quatuor semicircularè motum edentes.</i> | ibid. | <i>Oculorum mirabilis sympathia.</i> | ibid. |
| <i>Observatio pulcherrima de duabus tunicis peritonæi & situ vesicæ.</i> | 284 | <i>Oculorum color, temperies, connexio, sensus.</i> | ibid. |
| <i>Observatio nona de venarum continuitate.</i> | 121 | <i>Oculorum musculi sex.</i> | ibid. |
| <i>Observatio pulcherrima de spinali medulla.</i> | 164 | <i>Oculorum tunica cur constructa.</i> | 561 |
| <i>Observatio nostra de ductu quo gravida semen ejaculatur.</i> | 352 | <i>Oculorum canthi seu anguli.</i> | 567 |
| <i>Observatio in pericranio.</i> | 510 | <i>Oculorum motionis organa.</i> | 575 |
| <i>Observatio pulcherrima de continuitate nervorum secundi paris.</i> | 565 | <i>Oculus quomodo coloratus dici debeat.</i> | 573 |
| <i>Observatio pulcherrima de motu oculorum.</i> | 152 | <i>Ostimestris licet vitalis non est abortus.</i> | 438 |
| <i>Occipitis ossis nomina, situs, figura, circumscriptio.</i> | 71 | <i>Ostimestris partus vitalis non est.</i> | 440 |
| | | <i>Ostimestres quidam in Aegypto vitales.</i> | ibid. |
| | | <i>Ostimestris cur vitalis non est prima ratio.</i> | 447 |
| | | <i>Odor cur non sentitur nisi inspirato ære.</i> | 589 |
| | | <i>Odoratus organum quodnam verum sit.</i> | ibid. |
| | | <i>Odoratus organa.</i> | 528 |
| | | <i>Odoratus organum cur in supremo locatum.</i> | 586 |
| | | <i>Oesophagi musculi duo communes dicti non sunt laryngis musculi, sed deglutitioni serviunt.</i> | 204 |

| | | | |
|---|----------|--|-------|
| Oesophagi nomina, situs, figura. | 514. | Ossis definitio paulo accuratior. | ibid. |
| Oesophagi compositio. | ibid. | Ossis pars est triplex. | 53 |
| Officialis actio villos requirit. | 492 | Ossis pars precipua quæ sit. | ibid. |
| Omenti nomina. | 289 | Ossis innominati tres partes. | 65 |
| Omenti usus ex Hippocrate. | ibid. | Ossis sacri nomina. | 90 |
| Omnia nouerit qui seipsum novit. | 9 | Ossium cognitio est necessaria. | 50 |
| Omplata nomina. | 95 | Ossium causæ materialis feminis crassamentum. | 51 |
| Omplata figura. | ibid. | Ossium efficiens causæ vis formatrix calido uter. | ibid. |
| Opinio Aristotelis de feminæ sexus natura. | 368 | Ossium finalis causæ triplex. | ibid. |
| Opinio Pythagoreorum de numeris. | 444 | Ossium prima differentia à duritie. 2. à magnitudine. | ibid. |
| Opinio Astrologorum de septimestri partu. | 446 | 3. à figura. 4. à cavitare solida non solida. 5. à situ. | ibid. |
| Opinio eorum qui à cerebro semen deriuant. | 378 | 6. à motu. 7. à sensu. 8. à generationis ordine. | 52 |
| Opinio nostra, mœneri à facultate cordis pulsant. | 478 | Ossium tota compages scelerot ducta. | 55 |
| Optici nervi duplex substantia. | 579 | Ossium compositio duplex. | ibid. |
| Optici cur cœunt. | ibid. | Ossium cavitatem habentium duo genera. | 60 |
| Opticorum insertio. | ibid. | Ossium noua compositio diuisio à Vesalio tradita. | 61 |
| Organa sero expurganda quæ sint. | 327 | Ossium materia Hippocrati. | 16 |
| Organica actionis forma est compositio laudabilis. | 40 | Ossium efficiens causæ. | ibid. |
| Organica actio quid. | ibid. | Ossium finalis causæ triplex. | ibid. |
| Organicum duobus modis consideratur. | ibid. | Ossium efficiens causæ calidum aduerens. | 58 |
| Organorum quatuor ordines. | 29. & 40 | Ossicula tria in metu auditorio continentur, scilicet, | ibid. |
| Organum quid. | ibid. | incus, malleolus. | 70 |
| Orificiorum vetriculi apertio occlusioque quomodo fiat. | 305 | Ossiculorum horum trium articulatio. | ibid. |
| Oris usus. | ibid. | Ossicula hæc tria à primo ortu perfecta & scissim. | ibid. |
| Oris partes. | 591 | Ossiculorum horum trium usus. | 71 |
| Oscitantes cur non ita acutè audimus. | 586 | Ossicula tria in aure. | 132 |
| Oscitationum medela. | 502 | Ossiculorum aurium usus. | ibid. |
| Osinominatum. | 96 | Ossiculorum sesamoideon usus. | 597 |
| Osilium. | ibid. | Ossiculorum sesamoideon in pede usus. | 602 |
| Os pubis. | ibid. | Ostiola in maioribus vasis à recentioribus deprehensa. | 128 |
| Os ischi. | ibid. | Ostiola in æzgo nulla. | 464 |
| Osthyoides cur in scaletro non describitur; nomina, partes, usus. | 101 | Ouarachos. | 147 |
| Ossis hyoidis vincula cur carnea esse debuerunt. | 139 | | |
| Os quid. | 596 | | |
| Ossisecum cur. | 51 | | |
| Os frigidum cur. | ibid. | | |
| Os durum quomodo. | ibid. | | |
| Os graue cur. | ibid. | | |
| Ossa dura & solida cur. | ibid. | | |
| Ossa insensilia cur. | ibid. | | |
| Ossa hominis & simiarum quid differant. | 57 | | |
| Ossa calida esse probatur; Galenus. | 58 | | |
| Ossa an pilis sint succiora. | ibid. | | |
| Ossa insensilia esse. | ibid. | | |
| Ossa frigida esse. | ibid. | | |
| Ossa omnia medullam non habent & contrariò medullam habent. | 59 | | |
| Ossa capitis; faciei dentes. | 64 | | |
| Ossa manuum & pedum. | 65 | | |
| Ossa sentire docetur; Hippoc. Gal. & per multorum auctoritate. | 59 | | |
| Ossa alia celerius perficiuntur aliis. | 402 | | |
| Ossa pubis & ilium diuelli in partu docetur. | 449 | | |
| Ossa pubis non diuelli posse opinio nostra. | ibid. | | |
| Ossa quæ prius perficiuntur. | 402 | | |
| Ossis definitio à Galenò tradita. | 50 | | |

P

| | |
|--|-------|
| Palatum. | 591 |
| Palpebra unica mobilis. | 566 |
| Palpebra duobus musculus clauditur. | 185 |
| Palpebra cur moueri debuerunt. | ibid. |
| Palpebram aperit musculus unus. | ibid. |
| Palpebra cur ita dicte. | 104 |
| Palpebra cur cartilagineæ. | ibid. |
| Palpebra cur cartilagineæ. | 566 |
| Palpebra due. | ibid. |
| Palpebram aperiens musculus. | ibid. |
| Palpebram claudentes musculi. | ibid. |
| Palpebrarum foramina. | 104 |
| Palpebrarum musculi. | ibid. |
| Palpebrarum usus. | 565 |
| Palpebrarum nomina. | 566 |
| Palpebrarum compositio. | ibid. |
| Palpebrarum cutis laxa. | ibid. |
| Palpebrarum pili. | ibid. |
| Pancreas quid. | 294 |
| Panniculi carnosii nomina & differentia. | 276 |
| Panniculi carnosii usus. | ibid. |
| Panniculus cur carnosus in homine dicatur. | ibid. |

ET VERBORVM.

| | | | |
|--|------------|--|-------|
| <i>Papilla</i> quid. | 454 | <i>Partus causa</i> vniuersales. | 443 |
| <i>Paracensis</i> an debeat fieri, apertio tempus, locus & modus. | 287 | <i>Partus causa</i> vniuersalis ex parte fœtus. | ibid. |
| <i>Paradoxon</i> vitalem facultatem cordis esse in fortu otiosam. | 430 | <i>Partus causa</i> vniuersalis ex parte vteri. | ibid. |
| <i>Paralysis</i> quomodo fiat. | 539 | <i>Partus</i> particulares causa. | ibid. |
| <i>Paralysis</i> triplex. | 162 | <i>Partus</i> diuersitatis causa ex parte materie. | 444 |
| <i>Parastata</i> varicosi. | 339 | <i>Partus</i> nullus vitalis ante perfectionem partium. | 447 |
| <i>Paristhymia</i> quid. | 591 | <i>Partus</i> hominis cur maxime laboriosus. | 448 |
| <i>Pari</i> , particula, membrum, locus, sunt synonyma. | 31 | <i>Pectoris</i> multiplex acceptio. | 452 |
| <i>Pars</i> princeps quid sit. | 35 | <i>Pectoris</i> latera. | ibid. |
| <i>Partes</i> omnes an simul conformantur. | 403. & 405 | <i>Pectus</i> percuti in systole. | 475 |
| <i>Partes</i> successive generari. | 404 | <i>Pectus</i> percuti in diastole contraria opinio. | 476 |
| <i>Partes</i> ignobiles quæ sint. | 26 | <i>Peculiaris</i> causa abortus apud Hippocrat. vteri paruitas. | 443 |
| <i>Partes</i> multæ in scapula obseruanda. | 95 | <i>Pedem</i> flectunt duo muscoli, extendunt quatuor. | 202 |
| <i>Partes</i> in meatu auri contentæ. | 582 | <i>Pedis</i> officium. | 599 |
| <i>Partus</i> definitio ab Aponensi tradita. | 31 | <i>Pedis</i> figura ad ambulationem commoda. | 600 |
| <i>Partus</i> definitio duplex à Galeno. | ibid. | <i>Pedum</i> cum manibus similitudo. | ibid. |
| <i>Partus</i> nomina. | 22 | <i>Pedis</i> totius similes partes. | ibid. |
| <i>Partus</i> definitiones. | ibid. | <i>Pedis</i> vena. | ibid. |
| <i>Partus</i> exquisita definitio. | 23 | <i>Pedis</i> arteria. | ibid. |
| <i>Partus</i> definitio ab Auicenna tradita improbat. | 31 | <i>Pedis</i> totius nervi quatuor. | ibid. |
| <i>Partium</i> quatuor generum in omni organo obseruantur. | 175 | <i>Pedis</i> musculi & ossa. | 601 |
| <i>Partium</i> flexus dissimilis in homine & brutis. | 9 | <i>Pedis</i> partes. | ibid. |
| <i>Partium</i> superiorum & inferiorum in homine & brutis dissim. ratio. | ibid. | <i>Pedis</i> diuisio. | 98 |
| <i>Partium</i> omnium mirabilis consensus. | 12 | <i>Pedij</i> ossa. | 100 |
| <i>Partium</i> Galenica diuisio in arte parua. | 30 | <i>Pedium</i> . | 601 |
| <i>Partium</i> differentie ex Arabum doctrina. | ibid. | <i>Pedium</i> digiti. | ibid. |
| <i>Partium</i> diuisio Fenceliana. | ibid. | <i>Pedum</i> digitorum flectunt duo muscoli, extendunt totidem adducunt vermiculares quatuor adducunt interossei octo. | 202 |
| <i>Partium</i> mirabilis proportio. | 4 | <i>Penis</i> musculi quatuor. | 200 |
| <i>Partium</i> cognitio quomodo sit necessaria ad morborum diagnosim. | 13 | <i>Penis</i> duo vsus, seminis primum, deinde urinae emissio. | 342 |
| <i>Partium</i> ignobilium differentia. | 26 | <i>Penis</i> nomina variasitus. | ibid. |
| <i>Partium</i> Philosophica diuisio in humidas & siccas. | 28 | <i>Penis</i> tota structura & structura eius ratio. | ibid. |
| <i>Partium</i> medica diuisio in spermaticas & carnosas. | ibid. | <i>Pennis</i> cur ossens non fuit. | ibid. |
| <i>Partium</i> spermaticarum differentia. | ibid. | <i>Peniscus</i> non ex sola arteria constructus. | ibid. |
| <i>Partium</i> quatuor genera in perfecto organo obseruantur. | 29 | <i>Penis</i> cur venosus non fuit, & cur non ex nervis communibus sed peculiaribus. | ibid. |
| <i>Partium</i> duplex est necessitas. | 36 | <i>Penis</i> nervi duo sunt canes. | ibid. |
| <i>Partium</i> dignitas & necessitas confertur. | 38 | <i>Penis</i> musculi. | 343 |
| <i>Partium</i> coalitus duplex. | 45 | <i>Penis</i> cur breuior in homine. | ibid. |
| <i>Partium</i> spermaticarum opinio Ioberti de calore. | 47 | <i>cur</i> adeps nullus in Pene. | ibid. |
| <i>Partium</i> differentia à quibus sint petenda. | 52 | <i>Penis</i> erectio an naturalis sit vel animalis. | 350 |
| <i>Partus</i> causa. | 436 | <i>Penis</i> erectionem precedit imaginatio. | ibid. |
| <i>Partus</i> tempora quæ sint. | ibid. | <i>Penis</i> & temiginis non eadem est structura. | 359 |
| <i>Partus</i> septimestris cur vitalis. | ibid. | <i>Penis</i> erectio partim naturalis est partim animalis. | 350 |
| <i>Partus</i> quid. | 437 | <i>Pericardij</i> nomina. | 464 |
| quæ requiruntur ad perfectionem Partium. | ibid. | <i>Pericranium</i> quid. | 520 |
| <i>Partus</i> differentia. | 438 | <i>Pericranium</i> ossa temporum non tegit, sed musculum temporalem. | 188 |
| <i>Partus</i> figura naturalis descriptio. | ibid. | <i>Peripaterici</i> ex sanguine omnes partes generari volunt. | 41 |
| <i>Partus</i> varie figura contra naturam. | 439 | <i>Peripatericorum</i> rationes de cordis principatu. | 32 |
| <i>Partus</i> agrippa quid. | ibid. | <i>Peristalticus</i> motus innatur à diaphragmate & peritonæo. | 299 |
| <i>Partus</i> legitimus quid. | ibid. | <i>Peristaltici</i> intestinorum motus ratio. | ibid. |
| <i>Partus</i> illegitimus quid. | ibid. | | |
| <i>Partus</i> septimestris extremæ tempora. | 442 | | |

INDEX RERVM

| | | | |
|--|-------|--|------------|
| <i>Peritonæi foramina & usus.</i> | 285 | <i>Principiorum moles exigua, vires maximæ.</i> | 43 |
| <i>Peritonæi nomina.</i> | 284 | <i>Principii partis altera definitio.</i> | 26 |
| <i>Per nervos solam facultatem influere non corpus volunt quidam.</i> | 165 | <i>Principii apud Medicos acceptio multiplex.</i> | 135 |
| <i>Pes extremus.</i> | 601 | <i>Principium originis quid sit.</i> | ibid. |
| <i>Petrei opinio de noua cõmuniõne vasorũ cordis.</i> | 424 | <i>Principium officij distributionis.</i> | 136 |
| <i>Petrei opinio impugnatur.</i> | ibid. | <i>Principium rãdicationis.</i> | ibid. |
| <i>contradictio in Petrei demonstratione. ibid. &</i> | 426 | <i>Principium cur vnicum non sufficit.</i> | 34 |
| <i>Petrus malè ductum appellat anastomosin.</i> | ibid. | <i>Principium venarũ apud Medicos multiplex est.</i> | 133 |
| <i>Petrus malè putat arterias umbilicales soli pulmo- ni seruire.</i> | ibid. | <i>Principiũ triplex, ortus, dignitatis & necessitatis.</i> | 38 |
| <i>Phrenitici cur validos edunt motus, & sensus debi- lissimi sunt.</i> | 163 | <i>Problema de calli generatione.</i> | 46 |
| <i>Phrenitis diaphragmatis.</i> | 460 | <i>Processus mammarum qui.</i> | 589. & 517 |
| <i>Phrenitis utraque quomodo dignoscatur.</i> | ibid. | <i>Processus tres in ususbus temporum.</i> | 70 |
| <i>Phrenitis diaphragmatis cur respirationem habeat parnam & raram.</i> | 460 | <i>Processuum usus.</i> | ibid. |
| <i>Phrenitidis differentie.</i> | ibid. | <i>Proiectura quid.</i> | 66 |
| <i>Pili in homine paucissimi.</i> | 8 | <i>Proiectura deficiente cur deficiat futura.</i> | 75 |
| <i>Pili sub alis soli homini.</i> | 9 | <i>Prolabia.</i> | 590 |
| <i>Pili congeniti quot.</i> | 519 | <i>Prostate glandulose, earum usus.</i> | 141 |
| <i>Pili postgeniti quot.</i> | ibid. | <i>Prostatuum usus.</i> | 109 |
| <i>Pilorum cause quatuor.</i> | ibid. | <i>Psoa quid.</i> | 271 |
| <i>Pilorum diuisio.</i> | ibid. | <i>Pudendi particule omnes.</i> | 356 |
| <i>Pilorum nomina.</i> | ibid. | <i>Puello quid profuit aque.</i> | 401 |
| <i>Pilorum materia duplex.</i> | ibid. | <i>Puellus cur fugat statim atque editus est.</i> | 419 |
| <i>Pilorum palpebrarum usus.</i> | 566 | <i>Puellus quæ per alium extrudit feces non sunt.</i> | ibid. |
| <i>Pisces audiunt.</i> | 583 | <i>Puellus an lacte in utero nutriatur.</i> | ibid. |
| <i>Placenta caro quid.</i> | 407 | <i>Puellus qua forma prodeat.</i> | 436 |
| <i>Placenta usus secundum recentiores.</i> | 401 | <i>Puelli conatus quàm sit necessarius.</i> | 438 |
| <i>Plato animalem voluit esse uteri motum.</i> | 361 | <i>Puellus cur excludi non possit.</i> | 448 |
| <i>Pleura membrana quid.</i> | 461 | <i>cur figura qua in caput prodit Puellus naturalis est.</i> | 438 |
| <i>Pleura omnia colligat.</i> | ibid. | <i>Pueri cur sæpe vomant.</i> | 297 |
| <i>Pleuritis quatuor differentie.</i> | 142 | <i>Pulchritudo partis quid sit.</i> | 24 |
| <i>Pleuritis non semper ab ætæ.</i> | ibid. | <i>Pulmo absolute non necessarius est.</i> | 36 |
| <i>Plexus choroides quomodo fiat.</i> | 145 | <i>Pulmo factuum recens natorum ruber est.</i> | 426 |
| <i>Plexus choroides quid.</i> | 527 | <i>Pulmo factus cur ruber.</i> | 421 |
| <i>Plexuum usus duo.</i> | 339 | <i>Pulmo factus cur crassior.</i> | 422 |
| <i>Pollicis musculi peculiare.</i> | 202 | <i>Pulmo quid.</i> | 496 |
| <i>Pollicem flectit vnicus musculus, extendant duo, adducunt tres, & abducunt totidem.</i> | 196 | <i>Pulmo organum vocis.</i> | 498 |
| <i>Post partum purgatio breuior si mare peperit.</i> | 371 | <i>Pulmo quomodo molli.</i> | 506 |
| <i>Postremus cerebri ventriculus nobilior.</i> | 554 | <i>Pulmo quomodo dicatur ali bilioso sanguine.</i> | ibid. |
| <i>Potum non ferri in pulmones.</i> | 509 | <i>Pulmo situs focus.</i> | ibid. |
| <i>Potus in pulmones ferri auctoritates.</i> | 508 | <i>Pulmo quare non fatigatur perenni suo motu.</i> | 507 |
| <i>Quædam caput quid.</i> | 66 | <i>Pulmo calidus demonstratur.</i> | 505 |
| <i>Præagoras nervos putabat esse arterias.</i> | 167 | <i>Pulmo humidus docetur.</i> | 506 |
| <i>Præputij frenum, corona, sutura; Tauri quid.</i> | 343 | <i>Pulmo contrarium trahit alimentum.</i> | ibid. |
| <i>Priapismi causa.</i> | 351 | <i>Pulmonem esse frigidum.</i> | 505 |
| <i>Principatus prima definitio.</i> | 35 | <i>Pulmonis motus accidentarius est.</i> | 507 |
| <i>Princeps facultas quid.</i> | 533 | <i>Pulmonis nomina, situs, figura, lobi.</i> | 496 |
| <i>Princeps pars quid sit.</i> | 26 | <i>Pulmonum lobi cur plures in brutis quàm in homine.</i> | ibid. |
| <i>Principes partes tres.</i> | ibid. | <i>Pulmonum quatuor ita seu magnitudo, temperam, motus, sensus, structura, caro, vasastica, nervi, connexio, usus.</i> | 497 |
| <i>Principes partes tres tantum sunt.</i> | 36 | <i>Pulsatilis facultas momento fertur.</i> | 478 |
| <i>Principes partes quomodo mutuis egent auxiliis.</i> | 38 | <i>Pulsatilis facultas per tunicas fertur non per cava arteriarum.</i> | ibid. |
| <i>Principes animæ facultates unica sede firmari.</i> | 534 | <i>Pulsationis usus duplex.</i> | 477 |
| <i>Principes facultates & à temperie & à conforma- tione manare.</i> | 535 | <i>Pulsus & respirationis idem usus.</i> | ibid. |
| | | <i>Pulsus respiratione nobilior.</i> | 501 |

| | |
|---|-----|
| Pulsus quomodo dicatur libera actio. | 473 |
| Pulsus & motus cordis eadem ratio. | 477 |
| Pulsus primaria causa non est calor nec sanguis. <i>ibid.</i> | |
| Pulsuum doctrinam non ignorauit Hippoc. | 476 |
| Pupilla quid. | 562 |
| Pus empiricorum per cor & arterias expurgari docetur auctoritatibus & exemplis. | 487 |
| Putant quendam se non concepisse, quæ conceperunt. | 440 |
| Pyrotecorum usum in fontanella non probat author. | 69 |

Q.

| | |
|---|-----|
| Quantitatem frequenter metiunt. | 326 |
| Quies necessarios motus contrarios excipit. | 475 |
| Quid sentiamus de feminis in mares conuersis. | 360 |

R.

| | |
|--|--------------|
| Radij partes. | 97 |
| Radius mouent quatuor muscoli. | 194 |
| Radius quid. | 97 |
| Ratiocinatio actio est mista. | 336 |
| Ratiocinatio est intellectus. | 7 |
| Rationibus eorum, qui respirationem omnino voluntariam esse voluit satisfuit. | 504 |
| Recentiores ab Hippocrate & Galeno dissentiunt de varietate futurarum. | 75 |
| Receptio specierum quo loco fiat. | 570 |
| Restitutio quid. | 140 |
| Regio corporis publica triplex est. | 30 |
| Regiones corporis tres. | 269 |
| Renes cur dicti, & cur gemini sunt situs. | 327 |
| Renes quomodo cordis figuram habeant. | 328 |
| Renum & ventriculi societas. | 333 |
| Ren alter cur altero elatior. | 328 |
| Renum structura incognita veteribus. | <i>ibid.</i> |
| Renum membrana due. | <i>ibid.</i> |
| Renum verus usus. | 330 |
| Renum calculus quomodo à vesica calculo dignoscatur. | 333 |
| Respirare infans alium docetur. | 430 |
| Respiratio quid, & perspiratio. | 498 |
| Respiratio quomodo fiat. | 196 |
| Respiratio duplex, coacta & libera. | <i>ibid.</i> |
| Respiratio quid. | 429 |
| Respiratio non est absolute ad vitam necessaria. | 430 |
| Respiratio mista est actio. | 503 |
| Respiratio cur voluntaria esse debuit. | <i>ibid.</i> |
| Respiratio & pulsus quibus conueniant. | 500 |
| Respiratio & pulsus in quibus dissideant, & an pulsus quàm respirationis sit maior necessitas. | <i>ibid.</i> |
| Respiratio cur refrigerat duplici ratione. | 500 |
| Respiratio cur non fatigatur. | 502 |
| Respiratio motum etiam arteriarum denotat. | 504 |
| Respirationem naturalem esse docetur. | 501 |
| Respirationem omnino voluntariam esse. | 502 |
| Respirationem Hippoc. sæpe appellat πνίγναι. | 499 |
| Respirationis due partes. | <i>ibid.</i> |

| | |
|--|--------------|
| Respirationis efficiens causa, partim anima, partim natura. | <i>ibid.</i> |
| Respirationis usus duplex. | <i>ibid.</i> |
| Respirationis organa quot & quæ. | 496 |
| Respirationis usus, generatio spirituum. | 500 |
| Respirationis organa trium generum. | <i>ibid.</i> |
| Respiratoriij musculi propriij communes. | 196 |
| Respiratoriij musculi sexaginta quinque sunt, & distendunt 32 inspirationi inservientes. | <i>ibid.</i> |
| Reticularis quid. | 563 |
| Renferuus nervos vult esse venas continuatas: refellitur hæc opinio. | 158 |
| Rondeletij de animali spiritu opinio. | 167 |
| Rosseti opinio de usu anastomoseon. | 427 |
| Rosseti opinio conuellit. | 428 |
| Rosseti argumentum conuellit. | 429 |
| Rotula genui & eius usus. | 99 |
| Rubor in angina duobus fit modis. | 205 |

S.

| | |
|--|--------------|
| Sacrum os magna vertebra dicitur Hippoc. | 90 |
| Sacri osis processus, eiusdem foramina. | 91 |
| Sanguificatio quomodo fit. | 138 |
| Sanguificatio duo continet, elaborationem & ruborem. | <i>ibid.</i> |
| Sanguis menstruus quid. | 386 |
| Sanguis menstruus materia. | <i>ibid.</i> |
| Sanguis cur in muliere redundet. | <i>ibid.</i> |
| Sanguis cur excrementum dicatur. | <i>ibid.</i> |
| Sanguinis menstrui vacationis efficiens causa. | <i>ibid.</i> |
| Sanguinis menstrui vacationis tempora. | <i>ibid.</i> |
| Sanguinis menstrui via expurgationi dicata. | 367 |
| Sanguis menstruus an sit excrementum secundæ vel terciæ coctionis. | 389 |
| Sanguis menstruus an variolarum & morbillorum causa sit. | <i>ibid.</i> |
| Sanguis menstruus cur quotidie non expurgatur. | 392 |
| Sanguis & semine simul in coitu non excernuntur. | 394 |
| Sanguinem menstruum peccare qualitate demonstratur. | 387 |
| Sanguinis menstrui incommoda eius puritatem arguunt. | 389 |
| Sanguinis expurgatio cur singulis mensibus fiat. | 392 |
| Sanguis cur ad mammas potius refluat. | 457 |
| Sanguis cur non remeet à sinistro ad dextrum cordis sinum. | 482 |
| Sanguis alius venosus, alius arteriosus. | 133 |
| Sanguis in venis nunquam concreuit. | 134 |
| Sanguis principium ex quo. | 374 |
| Sanguis menstruus passivum est principium. | 385 |
| Sanguis cur per uterum potius quàm alias vias expurgatur. | 387 |
| Sanguis menstruus ab iisdem fit causis à quibus & reliquis. | 388 |
| Sanguis menstruus refluxus ad mammas loc facit. | 389 |
| Sanguis menstruus causa est variolarum. | 391 |

| | | | |
|---|-------|---|------------|
| Sanguis duplex, venosus & arteriosus. | 426 | Auerrois opinio de Seminum circulatione. | 394 |
| Sanguinis mensuri nomina. | 385 | Seministractio prima actio est. | 396 |
| Scaligeri opinio de partium principatu. | 35 | Seminum permixtio 2. retentio 3. 4. & ultima vteri | ibid. |
| Scapularum usus triplex. | 95 | est conceptio. | ibid. |
| Scapularum motus. | 192 | Sensio omnis duos habet motus, materialem & for- | 279 |
| Scapulam deprimentes nulli sunt proprii musculi. | ibid. | malem. | 279 |
| Scapularum cartilago. | 108 | Sensibus quomodo sit utendum. | 10 |
| Sceletos quid. | 50 | Sensibilis pars quot modis dici possit. | 30 |
| Scroti & uterini fundi nulla est similitudo, ut ve- | | Sensilis cavitatis in vasis deferentibus non requiritur | |
| teres existimantur. | 359 | semen. | 346 |
| Scrotum quid. | 340 | Sensus est quid aduentitium. | 58 |
| Scutiformis cartilaginis descriptio. | 106 | Sensus peculiaris à nequis. | 150 |
| Scythæ venas pone aures secabant. | 378 | Sensus illaso motu cur pereat, & contra. | 162 |
| Sectio hominū vinorum & impia & inutilis. | 14 | Sensus cur in epilepsia perit manente motu. | 163 |
| Sectio qua methode institui debeat. | 15 | Sensus externi quinque sunt. | 557 |
| ad Sectionem artificiosam qua requirantur. | 22 | Sensus quinque tantum necessarij. | ibid. |
| Semel in vita omnes variolos laborare. | 389 | Sensus absolute necessarij duo, tactus & gustus. | ibid. |
| Semen humidum & quomodo calidum, sffusum, | | ibid. | |
| & album cur. | 374 | Sensus terrei medium habent cum organo coniu- | 139 |
| Semen igneum & aqueum quomodo. | ibid. | etum. | 139 |
| Semen quomodo efficiens sit & materiale princi- | | ad Sensem duo requiruntur. | 160 |
| pium. | ibid. | Septenarij præstantia. | 444 |
| Semen quomodo ab omnibus corporis partibus fluat. | | Septenario multa constare. | ibid. |
| 375 | | Septenario vita hominis constat. | 445 |
| Semen duplex, alterum maris fœmina alterum. ibid. | | Septenarius nec gignit nec gignitur. | 444 |
| Semen duplex in vitroque sexu apud Hippoc. | ibid. | Septenarius numerus perfectionis, quietis, sanctifi- | ibid. |
| Semen & genitura idem. | ibid. | cationis, beatitudinis. | ibid. |
| Semen non est pars. | 376 | Septenarius vita nostra quomodo dispensetur. | 447 |
| Semen excrementum est. | ibid. | Septimestris vitæ dies est. | 439. ibid. |
| Semen quomodo excrementum dicatur. | ibid. | Septimestris partus varietas. | 440 |
| Semen ab omnibus partibus manare. | 377 | Septimestres; octimestres; nonimestres & decime- | |
| Semen manare à cerebro & medulla rationibus de- | | stres qui sint. | 441 |
| monstratur. | 378 | Septimestris cur vitalis sit, non octimestris. | 444 |
| Semen à solis testibus manare opinio nostra. | 380 | Septimestris partus ratio medica. | 447 |
| Semen fœmineum non admittit Aristoteles. | 381 | Septimus Vesalii musculus non datur in homine. | 561 |
| Semen muliebri admittunt Peripatetici quidam, sed | | Septimus mensis primus terminus. | 439 |
| infœcundum esse voluit. | 382 | Seri quomodo fiat expurgatio. | 330 |
| Semen muliebri docetur vim efficiendi habere. ibid. | | Serutus partus duplex, latoris & preparatoris. | 26 |
| Semen duo in se continet spiritus & corpulentia. | 43 | Sesamoidea ossa cur dicta. | 100 |
| Semen tantum sanguine est calidius. | 48 | Sesamoideon usus & numerus incertus. | ibid. |
| Semen principium à quo & ex quo. | 373 | Senerini Pinæi de ossium pubis in partu distinctione | |
| Semen à cerebro manare. | 378 | opinio consuevit. | 449 |
| Seminis excretionem iuuare musculos. | 343 | Senerinus Pinæus librum edidit de notis virgini- | |
| Seminum effusio ad generationem necessaria. | 368 | tatis. | 21 |
| Seminis definitio & forma. | 374 | Sexus discrimen cur necessarium. | 367 |
| Seminis materia. | ibid. | Sexus perfectione & forma non differunt. | ibid. |
| Seminis varia definitiones. | 375 | Sexuum necessaria distinctio. | 368 |
| Seminis perfecta definitio. | 376 | Sexus differentie essentielles. | ibid. |
| Seminis materia duplex. | ibid. | Sexus quomodo distinguuntur. | 369 |
| Seminis duplex natura, ignea & aquea. | 377 | Similares partes etiam organice dici possunt. | 29 |
| Seminis materia quomodo duplex permisceatur & | | Similares partes cur simplices vocentur. | 38 |
| excoquatur. | ibid. | Similares partes plures esse quàm veteres descripte- | |
| Seminis vias cōuellantur qui putant intercludi. | 379 | runt. | 39 |
| Seminis fœminei usus. | 382 | Similari pars princeps quomodo dignosci queat. | 137 |
| Seminis excretio an naturalis sit vel animalis. | 384 | Similari pars duobus modis consideratur. | 27 |
| Seminum permixtio. | 394 | Similari partis definitio. | ibid. |
| an Semina misceantur. | 395 | Similari pars omnis organice dici potest. | ibid. |
| | | Similari partis essentia in temperie est posita. | 28 |

| | | | |
|---|----------|---|-------|
| <i>Similaris actio quid.</i> | 40 | <i>Spermatice partes coalescere docetur.</i> | 44 |
| <i>Similaris partis forma est temperies.</i> | ibid. | <i>Spermatice partes ex sanguine fieri rationes.</i> | 41 |
| <i>Similaris pars materiam habet & formam.</i> | 39 | <i>Spermatice partes ex semine immediate generari</i> | |
| <i>Similarium partium nomina omnia.</i> | 27 | <i>multis rationibus docetur.</i> | 42 |
| <i>Similarium partium differentie.</i> | 28 | <i>Spermatice vena cur ita dicta.</i> | 115 |
| <i>Similarium partium diuisio.</i> | ibid. | <i>Sphincteris vesicæ musculi vsus & actio.</i> | 210 |
| <i>Similarium partium necessitas & vsus.</i> | 29 | <i>Sphincteris vesicæ officium.</i> | 209 |
| <i>Dissimilarium partium diuisio.</i> | ibid. | <i>Sphincteris vesicæ situs conuoluerfus.</i> | 210 |
| <i>Similarium partium numerus.</i> | ibid. | <i>Sphincteris propria actio.</i> | ibid. |
| <i>Similarium partium duo genera.</i> | 39 | <i>Spina quid & eius nomina.</i> | 87 |
| <i>Similibus nutritio fit.</i> | 426 | <i>Spine dignitas.</i> | ibid. |
| <i>Similitudo speciei quid & à quo.</i> | 410 | <i>Spina cur cana & cur processus habuit.</i> | ibid. |
| <i>Similitudo sexus quid & unde.</i> | ibid. | <i>Spina cur pluribus constat ossibus.</i> | ibid. |
| <i>Similitudo individui quid.</i> | 411 | <i>Spine elegans descriptio.</i> | 16 |
| <i>Similitudinis naturæ causa ordinaria est vis for-</i> | | <i>Spine quatuor partes.</i> | 64 |
| <i>matrix.</i> | 412 | <i>Spine figura elegans.</i> | 88 |
| <i>Similitudinis causa extraordinaria est imaginatio.</i> | | <i>Spine partes quatuor.</i> | ibid. |
| <i>ibid.</i> | | <i>Spinalis medullæ nomina & eius dignitas & neces-</i> | |
| <i>Simonis Petrei opinio de communione vasorum cor-</i> | | <i>sitas.</i> | 529 |
| <i>do in fetu refellitur.</i> | 423 | <i>Spinalis medullæ ortus.</i> | ibid. |
| <i>Sincipitis nomina.</i> | 69 | <i>Spinalis medullæ diuisio.</i> | 530 |
| <i>Sincipitis ossa qualia.</i> | 74 | <i>Spiratio frigidi necessaria.</i> | 498 |
| <i>Singularia omnia quomodo & cur mutationi obno-</i> | | <i>Spiritu animalium nullum esse probatur multis ra-</i> | |
| <i>xia.</i> | 337 | <i>tionibus.</i> | 545 |
| <i>Singultus medela.</i> | 502 | <i>Spiritu animalium generatio in fetu.</i> | 435 |
| <i>Sinus in osse frontis sunt Chirurgi aduertendi.</i> | 69 | <i>Spiritu hunc animam vocat Hippocrates.</i> | 481 |
| <i>Sinum osse.</i> | ibid. | <i>Spiritu in opticis contineri.</i> | 165 |
| <i>Sinus duo longi & amplissimi à veteribus descripti</i> | | <i>Spiritu duplex materia.</i> | 313 |
| <i>non inueniuntur in homine.</i> | 329 | <i>Spiritu naturalem nunquam negauit Galenus.</i> | |
| <i>Sinus quatuor inter duplicaturas meningium.</i> | 512 | | 314 |
| <i>Sinus in capite quot.</i> | 84 | <i>Spiritu motus perennis.</i> | 26 |
| <i>Sinus quid.</i> | 83 | <i>Spiritu motus duplex.</i> | ibid. |
| <i>Situs partis quid denotet.</i> | 24 | <i>Spiritu animale mœluerunt quidam per arterias</i> | |
| <i>Situs pueri in utero.</i> | 434 | <i>ferri.</i> | 167 |
| <i>Solide partes propriæ quæ sint.</i> | 49 | <i>Spiritu animale per medullam ferri.</i> | 168 |
| <i>Solide partes an humectari possint.</i> | ibid. | <i>Spiritu per internam nervi substantiam ferri.</i> | ibid. |
| <i>Solide partis substantia ex Galeno duplex.</i> | ibid. | <i>Spiritu animale ferri per arterias & sese inter-</i> | |
| <i>Solide partes cur humectari nequeant.</i> | ibid. | <i>secare arterias.</i> | 540 |
| <i>Solide partis acceptio multiplex.</i> | 48 | <i>Spiritu animalis quomodo multiplex.</i> | 543 |
| <i>Solide partes refarciri nequeunt.</i> | 49 | <i>Spiritu impetum facientia.</i> | 26 |
| <i>Solidum quid Philosophis.</i> | 26. & 49 | <i>Spiritu quid.</i> | 312 |
| <i>Somnus quid sit.</i> | 163 | <i>Spiritu quot sint.</i> | 313 |
| <i>Sonus quid.</i> | 583 | <i>Spiritu animalis an feratur per nervos.</i> | 165 |
| <i>Sophistica Galeni ratio de testium principatu.</i> | 37 | <i>Spiritu consideratur duobus modis.</i> | 167 |
| <i>Sophistica Galeni argumentatio de testium princi-</i> | | <i>Spiritu cur æthereus dicatur.</i> | 312 |
| <i>pato.</i> | 345 | <i>Spiritu corpus est.</i> | ibid. |
| <i>Sordes aurium.</i> | 581 | <i>Spiritu motus multiplex.</i> | 313 |
| <i>Spermatice omnes partes simul formantur.</i> | 136 | <i>Spiritu insiti & influentes.</i> | ibid. |
| <i>Spermatice partes cur non coalescant, triplex causa.</i> | | <i>Spiritu tres.</i> | ibid. |
| | 45 | <i>Spiritu quantum tribuant veteres.</i> | 400 |
| <i>Spermaticarum omnium partium rudimenta con-</i> | | <i>Spiritu an corde calidior.</i> | 489 |
| <i>spicua sunt septimo die.</i> | 402 | <i>Spiritu unde cum caloris gradum acceperint.</i> | ibid. |
| <i>Spermaticarum partium absolutio quotidie fit.</i> | ibid. | <i>Spiritu vitalis rires.</i> | 481 |
| <i>Spermaticarum partium alia sunt molles, alia sunt</i> | | <i>Spiritu vitalis preparationem in liene non posse</i> | |
| <i>dure.</i> | 45 | <i>ferri.</i> | 485 |
| <i>Spermatice partes coalescere non posse docetur.</i> | ibid. | <i>Spiritu vitalis materia duplex, æter & sanguis.</i> | 481 |
| <i>Spermatice partes generari ex semine, contraria</i> | | <i>Spiritu animalis materia.</i> | 543 |
| <i>opinio.</i> | 42 | <i>Spiritu materia est seminis.</i> | 374 |

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| <i>Spiritus qui insunt in semine.</i> | 377 | <i>acer.</i> | 11 |
| <i>Spiritus animæ organum quid molietur in genere.</i> | 400 | <i>Sylui de foraminibus sphenoides sententia.</i> | 77 |
| <i>Spiritus vitalis usus in corde & extra cor.</i> | 481 | <i>Sylui defensio pro Galeno de motu capitis.</i> | 91 |
| <i>Spiritus vitalis preparatio.</i> | ibid. | <i>Sympathia causæ.</i> | 258 |
| <i>Spiritus in oculo adesse multos.</i> | 565 | <i>Symphysis aliquando pro articulatione usurpatur.</i> | 64 |
| <i>Splenis usus organum.</i> | 320 | <i>Symphysis quid.</i> | 56 |
| <i>Splenici rami distincti.</i> | 113 | <i>Symphysis duplex, sine medio & cum medio.</i> | ibid. |
| <i>Splenitici cur ferro abundant.</i> | 326 | <i>Symphysis cum medio triplex.</i> | ibid. |
| <i>Spontaneum quid sit.</i> | 174 | <i>Symphysis communis per cutem & membranas sit.</i> | 63 |
| <i>Squammosum os quid.</i> | 69 | <i>Symphysis nullam per carnes fieri putat Vesalius.</i> | ibid. |
| <i>Squammarum modo cur committuntur sutura.</i> | 67 | <i>Symphyses natura in quo consistat.</i> | 63 |
| <i>Stellæ errantes in microscopio.</i> | 5 | <i>Symphyses naturam non intellexit Vesalius.</i> | ibid. |
| <i>Stercus hominis cur magis faciet.</i> | 200 | <i>eiisdemque in Galenum calumnias, & defensas.</i> | ibid. |
| <i>Sterni nomina.</i> | 93 | <i>Galeni de Symphysis.</i> | ibid. |
| <i>Sterni osium numerus.</i> | 94 | <i>Symphyses essentia non est de essentia motus.</i> | 64 |
| <i>Sterni ossa in puerulo qualia sint.</i> | ibid. | <i>Synarthrosis quid.</i> | 55 |
| <i>osses & sterni varia apud Hipp. acceptiones.</i> | ibid. | <i>Synarthroses species tres.</i> | 56 |
| <i>Sterilitatis Scytharum causæ incognita.</i> | 379 | | |
| <i>Sterilitatis causæ tres.</i> | ibid. | | |
| <i>Sterilitatis causæ uteri peruersio.</i> | 394 | | |
| <i>Stomachus quid.</i> | 304 | | |
| <i>Structura partis quid.</i> | 23 | | |
| <i>Substantia partis quid.</i> | ibid. | | |
| <i>Succenturiati musculi.</i> | 209 | | |
| <i>Superciliorum nomina partes.</i> | 567 | | |
| <i>Supercilia quid denotent apud Poëtas.</i> | ibid. | | |
| <i>Superciliorum usus structura.</i> | ibid. | | |
| <i>Superciliorum cutis cur dura & crassa.</i> | ibid. | | |
| <i>Superciliorum pili.</i> | ibid. | | |
| <i>Superciliorum usus.</i> | ibid. | | |
| <i>Superfœtatio datur.</i> | 415 | | |
| <i>Superfœtatio quomodo fieri possit.</i> | 416 | | |
| <i>Superfœtatio quid sit.</i> | 415 | | |
| <i>Superfœtationis varia exempla.</i> | ibid. | | |
| <i>cur Superfœtet sæpius mulier quàm vir.</i> | 416 | | |
| <i>Superfœtationis modus ex Hippocrate.</i> | 416 | | |
| <i>Superiores ventriculi cerebri ignobiliores sunt.</i> | 554 | | |
| <i>Surdi non idè obmutescunt quia idioma addiscere nequeunt.</i> | 585 | | |
| <i>Syndactilis causæ rara.</i> | 182 | | |
| <i>Sutura coronalis, sagittalis, lambdoides.</i> | 67 | | |
| <i>Suture vere cur tres sint demonstratio.</i> | ibid. | | |
| <i>Suture quomodo se habeant in figura capitis non naturalis.</i> | ibid. | | |
| <i>Suture spurie squamosæ dicte.</i> | ibid. | | |
| <i>Suture communes tres sunt.</i> | ibid. | | |
| <i>Suture plures in pueris.</i> | 73 | | |
| <i>Sutura quomodo committuntur.</i> | 74 | | |
| <i>Suturarum diuisio.</i> | 66 | | |
| <i>Suturarum numerus varius est pro capitis figura.</i> | 67 | | |
| <i>Suturarum usus explicantur.</i> | ibid. | | |
| <i>nos quid sentiamus de Suturarum numero, pro figurarum varietate.</i> | 75 | | |
| <i>Suturarum numerus non est diuersus in mare & fœmina, contra Aristotelem.</i> | 76 | | |
| <i>Sylui laus. Primus ille muscularis & venis nomina indidit propria, fuit in Galeno defendendo nimis</i> | | | |

| | | | |
|--|------------|--|-------|
| <i>Testes glandosa sunt corpora, non glandes.</i> | 454 | <i>Tussis an ætio sit animalis.</i> | 507 |
| <i>Testes quomodo principes partes dici debeant.</i> | 26 | <i>Tussis an naturalis sit affectus, an prater naturā ibi.</i> | |
| <i>Testes quomodo sint partes principes.</i> | 37 | <i>Tympanum quid.</i> | 581 |
| <i>Testes corde præstantiores esse docet Galenus probabili ratione.</i> | ibid. | <i>Tympani descriptio ex Hippocrate.</i> | ibid. |
| <i>Testis nomina, numerus, situs, figura.</i> | 340 | <i>Tympani situs, ortus.</i> | 582 |
| <i>Testium præstantia.</i> | 339 | V | |
| <i>Testium substantia, & temperamentum.</i> | 340 | <i>Valisij de semine opinio improbat.</i> | 383 |
| <i>Testium musculi & vasa.</i> | ibid. | <i>Valvula in coli principio observatio pulcherrima.</i> | 293 |
| <i>Testium tunica.</i> | ibid. | <i>Valvulae in utroque ductu vesicula quomodo à nobis deprehensa observatio pulcherrima.</i> | 315 |
| <i>Testium vires maxime.</i> | 344 | <i>Valvulae in vena mesenterij nulla sunt.</i> | 141 |
| <i>Testium usus triplex.</i> | 346 | <i>Valvulae in cordis motu quomodo aperiatur & claudantur.</i> | 470 |
| <i>Testium usus à Medicis quibusdam propositus impugnatur.</i> | 347 | <i>Valvulae in az ygo nulle sunt.</i> | 143 |
| <i>Testium verus usus.</i> | 348 | <i>Valvulae tricuspidales.</i> | 469 |
| <i>Testium & thoracis sympathia.</i> | 349 | <i>Valvulae semilunares.</i> | ibid. |
| <i>Testium & vocis societas.</i> | ibid. | <i>Valvula Aristotelis nulla est.</i> | 588 |
| <i>Testibus vim denegat seminis procreatricem Aristoteles.</i> | 346 | <i>Vaporis locus.</i> | 571 |
| <i>Theodorus partem à membro distinguit.</i> | 31 | <i>Vasa umbilicalia quatuor sunt.</i> | 286 |
| <i>Theologi quid de septenario partu sentiant.</i> | 444 | <i>Vasa deferentia quæ sint.</i> | 141 |
| <i>Thomæ à Veiga de nutritione ventriculi opinio impugnetur.</i> | 309 | <i>Vasa chyli & sanguinis deducendi non sunt distincta.</i> | ibid. |
| <i>Thomæ Erasmi de similitudine naturæ opinio non probatur.</i> | 411 | <i>Vasa præparantia quatuor.</i> | 351 |
| <i>Thomas de Zerbius magnum de Anatome opus edit.</i> | 21 | <i>Vasa deferentia duo.</i> | ibid. |
| <i>Thoracem contrahunt 32 musculi expirationi infernientes.</i> | 197 | <i>Vasa sentire docetur.</i> | 139 |
| <i>Thoracis partes.</i> | 93 | <i>Vasorum nomine quid intelligendum.</i> | 118 |
| <i>Thoracis via ad testes.</i> | 349 | <i>Vegetas facultas à vitæ medicorū distinguitur.</i> | 430 |
| <i>Thorax quid Hippoc. Grecis & Aristoteli.</i> | 451 | <i>Vegetantis duplex operatio.</i> | 471 |
| <i>Thoracis figura, structura, situs.</i> | ibid. | <i>Vena quomodo ab arteria distinguitur.</i> | 118 |
| <i>Thoracis partium omnium enumeratio.</i> | 452 | <i>Vena cur simplicem tunicam habuit.</i> | 119 |
| <i>Thoracis partes continentis propria.</i> | ibid. | <i>Vena umbilicalis ceteris omnibus quomodo continua.</i> | 286 |
| <i>Thoracis partes carnosæ quæ sint.</i> | ibid. | <i>Vena gastrica, epiploica dextra, coronaria, stomachica, epiploica posterior, vas breve.</i> | 123 |
| <i>Thoracis ossæ partes.</i> | ibid. | <i>Vena cava quomodo ore potèntissimo aperiatur cordi.</i> | 116 |
| <i>Thoracis partes membranosa.</i> | ibid. | <i>Vena humeraria non oritur à iugulari, ut voluit Vesalius.</i> | 141 |
| <i>Thoracis partes contentæ.</i> | ibid. | <i>Vena umbilicalis unica.</i> | 147 |
| <i>Thoracice omnes partes quomodo cordi famulætur.</i> | 462 | <i>Vena arteriosa quid.</i> | ibid. |
| <i>Thorax quid.</i> | 269 | <i>Vena consideratur aut ut similis aut ut organica.</i> | 119 |
| <i>Thorax cur aliqua ex parte cartilagineus.</i> | 107 | <i>Vena quomodo à nervo distinguitur.</i> | ibid. |
| <i>Thorax cur ita appelletur.</i> | 93 | <i>Vena hypogastrica.</i> | 125 |
| <i>Thorax cur partim ossæus & partim carneus.</i> | ibid. | <i>Vena porta cur lactea vocetur.</i> | 141 |
| <i>Tibiae partes.</i> | 601 | <i>Vena cava arteriam venosam constituit in prima formatione.</i> | 422 |
| <i>Tibiae os.</i> | 99 | <i>Vena arteriosa arteria magna est propago.</i> | 423 |
| <i>Tibiam flectunt quatuor musculi, extendunt totidem, adducunt duo, abducit unicus.</i> | 201 | <i>Vena arteriosa non est amplius quàm requirat pulmo.</i> | 483 |
| <i>Tigæus quid.</i> | 350 | <i>Vena cava descriptio.</i> | 17 |
| <i>Traxini Imperatoris elegans de liene cõparatio.</i> | 321 | <i>Vena nomina omnia.</i> | 118 |
| <i>Tremor quomodo fiat.</i> | 176 | <i>Vena & arterie sæpè apud veteres confunduntur.</i> | ibid. |
| <i>Triæ in qualibet parte spectanda sunt.</i> | 23 | <i>Vena portæ diuicatio & nomina.</i> | 302 |
| <i>Trochlea quid.</i> | 104. & 561 | <i>Vena & arteria membrana musculi actionem conseruant.</i> | 175 |
| <i>Trochanteres duo.</i> | 98 | | |
| <i>Trunci divisio.</i> | 64 | | |
| <i>Tussis sicca quid.</i> | 349 | | |
| <i>Tussis cum materia.</i> | ibid. | | |

INDEX RERVM

| | | | |
|--|-------|--|-----------|
| <i>Vena</i> ducunt tantum, causa & porta. | 121 | <i>Venarum</i> communis usus. | 120 |
| <i>Vena</i> causa & portae radices quomodo in hepate im-
plicantur. | ibid. | <i>Venarum</i> peculiare usus. | ibid. |
| <i>Vena</i> portae nomina omnia. | 122 | <i>Venarum</i> differentiae à numero. | 122 |
| <i>Vena</i> portae diuisio. | ibid. | <i>Venarum</i> differentiae à situ. | ibid. |
| <i>Vena</i> causa descendens descriptio & nomina. | 124 | <i>Venarum</i> differentiae ab officio & partibus. | ibid. |
| <i>Vena</i> causa descriptio ex Hippocrate. | ibid. | <i>Venarum</i> duplex est actio, communis & primata. | 128 |
| <i>Vena</i> causa ascendens distributio. | 126 | <i>Venarum</i> in hepate mirabiles anastomoses. | 311 |
| <i>Vena</i> causa truncus quomodo alligetur vicinis par-
tibus. | ibid. | <i>Venas</i> omnes quae fecari solent agnouit Hippoc. | 17 |
| <i>Vena</i> azigos duplex communio à recentioribus ob-
seruata. | ibid. | <i>Venas</i> oriri à capite volunt quidam. | 128 |
| <i>Vena</i> axillaris diuaticio. | 127 | <i>Venas</i> solas sanguinem conficere voluerunt Vesa-
lius & Iohannes. | 136 |
| <i>Vena</i> an vim habeant sanguificandi. | 136 | <i>Venas</i> magnas & parvas quomodo vocet Hipp. | 122 |
| <i>Vena</i> meseraica cur rubent. | 139 | <i>Venena</i> saepe latent. | 380 |
| <i>Vena</i> an moueantur. | ibid. | <i>Venis</i> sensum denegat Galenus. | 139 |
| <i>Vena</i> umbilicalis descriptio. | 407 | <i>Venis</i> concessa est facultas coquendi sanguinem. | ibid. |
| explicatur Galeni locus de ortu <i>Vena</i> umbilicalis. | 408 | <i>Ventriculi</i> dignitas & necessitas. | 302 |
| <i>Vena</i> quatenus similis est definitio. | 119 | <i>Ventriculi</i> definitio, figura, situs, conexus, numerus,
substantia, compositio. | 303 |
| <i>Vena</i> quatenus est organica definitio. | ibid. | <i>Ventriculi</i> orificia cur aperiantur & claudantur
ambo. | 304 |
| <i>Vena</i> figura & structura. | ibid. | <i>Ventriculi</i> partes calorem iuuantes quae sint. | 305 |
| <i>Vena</i> sanguini distribuendo dicata. | 120 | <i>Ventriculi</i> motus. | ibid. |
| <i>Vena</i> calorem & spiritum deferunt. | ibid. | <i>Ventriculi</i> superius orificium an sedes sit appeti-
tia. | ibid. |
| <i>Vena</i> à vniuersum quinque numerantur, id est,
quinque vasa <i>vena</i> nomine donantur. | 121 | <i>Ventriculi</i> actio non est absolute necessaria. | 36 |
| <i>Vena</i> omnes quomodo sint continuae. | ibid. | <i>Ventriculi</i> chylum pellentis motus non est violentus. | 296 |
| <i>Vena</i> causa truncus descendens. | 124 | <i>Ventriculi</i> maxima vis in totius habitus muta-
tione. | 302 |
| <i>Vena</i> à trunco manantes quinque. | ibid. | <i>Ventriculi</i> segnitie omnium confusio. | ibid. |
| <i>Vena</i> iliace diuaticio. | 125 | <i>Ventriculi</i> interior tunica cur ori continua esse de-
bit. | ibid. |
| <i>Vena</i> cruralis distributio. | ibid. | <i>Ventriculi</i> <i>vena</i> omnes. | ibid. |
| <i>Vena</i> subclauia distributio. | 126 | <i>Ventriculi</i> oris & cordis sympathia. | 304 & 307 |
| <i>Vena</i> iugulares. | 127 | <i>Ventriculi</i> orificiorum apertio occlusioque quomodo
fiat. | 305 |
| de <i>Venarum</i> ortu rationes authoris. | 132 | <i>Ventriculus</i> cur rotundus. | 303 |
| <i>Vena</i> causa ostium cur debuit esse amplissimum cir-
cacor. | 135 | <i>Ventriculus</i> cur in homine oblongior. | ibid. |
| <i>Vena</i> vim habent alterandi & carnes rubefaciendi. | 138 | <i>Ventriculus</i> organum sit tangendi quomodo. | 277 |
| <i>Vena</i> & arteria quomodo sentiant. | 139 | <i>Ventriculus</i> cur quatuor substantias non gignat. | 307 |
| <i>Vena</i> cur non moueantur. | 314 | <i>Ventriculus</i> an chylo aletur vel sanguine, rationes
variae. | ibid. |
| <i>Venam</i> iugularem internam maiorem esse externa. | 142 | <i>Ventris</i> inferioris diuisio. | 270 |
| <i>Venarum</i> tunica communis non omnibus inest ve-
nis. | 119 | <i>Ventris</i> inferioris nomina. | ibid. |
| <i>Venarum</i> necessitas. | 120 | <i>Ventris</i> variae acceptioes. | 302 |
| <i>Venarum</i> primus usus est sanguini conservare. | ibid. | <i>Ventritus</i> inuestigatio difficilis. | 443 |
| <i>Venarum</i> epigastrica & mammaria coeclusus. | 283 | <i>Vertebra</i> prima cervicis quid habeat peculiare. | 89 |
| <i>Venarum</i> plexus cur. | 311 | <i>Vertebra</i> lumborum. | 90 |
| <i>Venarum</i> & arteriarum per renes diuaticio. | 319 | <i>Vertebra</i> cur dicantur. | 88 |
| <i>Venarum</i> spermaticarum descriptio. | 338 | <i>Vertebra</i> omnes quid habeant commune. | ibid. |
| <i>Venarum</i> differentiae. | 121 | <i>Vertebra</i> cervicis quid habeant peculiare. | 89 |
| <i>Venarum</i> differentiae peculiare. | ibid. | <i>Vertebra</i> dorsi quid distent à vertebra cervicis. | 90 |
| <i>Venarum</i> & arborum elegans similitudo. | 122 | <i>Vertebra</i> dorsi nomina. | ibid. |
| <i>Venarum</i> mesenterij usus duplex. | 123 | <i>Vertebra</i> articulatio duplex. | 88 |
| <i>Venarum</i> quamplurima communionis à nobis saepe
obseruata. | 128 | <i>Vertebra</i> symphysis. | ibid. |
| <i>Venarum</i> nullum agnoscit principium Hippoc. | 129 | <i>Vertebra</i> duarum primarum articulatio diffi-
mili. | 89 |
| <i>Venarum</i> thoracicarum communio cum ramis azy-
gos. | 143 | <i>Vertebra</i> duarum symphysis & causa particu- | |

INDEX RERVM

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| <i>la illius articulationis & symphyseos.</i> | 89 | <i>Visio fit emissionem, prima opinio.</i> | 568 |
| <i>Verriginis natura.</i> | 343 | <i>Visio receptione sola fit opinio Peripateticorum.</i> | ibid. |
| <i>Verus nutritionis modus.</i> | 418 | <i>ibid.</i> | ibid. |
| <i>Vesalius articulationis naturam ignoravit.</i> | 61 | <i>Visio fit receptione, opinione nostra.</i> | 569 |
| <i>Vesalius in Galenum calumnia & defensio Galeni de symphysi.</i> | 63 | <i>Visionis organum aqueum est & cur.</i> | ibid. |
| <i>Vesalius affirmat Galenum multa ignorasse in peculiarium muscularum historia.</i> | 184 | <i>de Visionis receptione quatuor inquirenda.</i> | 570 |
| <i>Vesalius de usu epiphyseon calumnia improbat.</i> | 60 | <i>de Visionis natura sententia tres.</i> | 568 |
| <i>Vesalius Galeno imponit de officulo quodam.</i> | 78 | <i>Visionis certitudo.</i> | 558 |
| <i>Vesalius imponit Hippocrati de quarta capitis figura.</i> | 75 | <i>Visionis obiectum nobilissimum.</i> | ibid. |
| <i>Vesalius & Columbus male Galenum arguunt de capitis motu.</i> | 92 | <i>Visionis organum igneum esse vult Plato.</i> | 572 |
| <i>Vesalius venas à corde oriri vult: eius rationes singule examinantur & conuelluntur.</i> | 135 | <i>Visionis organum aqueum Aristoteli.</i> | ibid. |
| <i>Vesalius non agnovit venosam arteriam vena caue esse continuam.</i> | ibid. | <i>de Visis seu imaginationibus.</i> | 571 |
| <i>Vesalius in omni plenitudine secari vult dextram venam: eius error.</i> | 142 | <i>Visorum duo genera.</i> | ibid. |
| <i>Vesalius de peritonæi usu Galenum male arguit.</i> | 285 | <i>Visorum causæ.</i> | ibid. |
| <i>Vesica proprium videtur habere ventrem, ex sententia Dioscori.</i> | 334 | <i>Visionum conorum axes in eodem plano esse debent.</i> | 576 |
| <i>Vesica an urinam trahat.</i> | 335 | <i>Visum quid.</i> | 571 |
| <i>Vesica inter duas peritonæi tunicas sita, nona observatio.</i> | 285 | <i>Visus sensuum omnium nobilissimus.</i> | 557 |
| <i>Vesica figura, substantia, nomina & situs.</i> | 334 | <i>Visus præsentiam quatuor indicant.</i> | ibid. |
| <i>Vesica musculi visus.</i> | 200 | <i>Visus plures differentias demonstrat.</i> | 558 |
| <i>Vesica & recti intestini cum utero consensus.</i> | 363 | <i>Visus in actione sua ceteris antecellit.</i> | ibid. |
| <i>Vesica officium.</i> | 335 | <i>Visus quomodo ad intellectus naturam accedat.</i> | ibid. |
| <i>Vesica actio partim animalis, partim naturalis.</i> | 336 | <i>Visus libertas.</i> | ibid. |
| <i>Vesicula an bilem trahat eaque nutriatur.</i> | 316 | <i>Vitalem dari demonstratur.</i> | 470 |
| <i>Vesicula in quibusdam deficit.</i> | 319 | <i>cur Galenus Vitalem à naturali distinxerit.</i> | 471 |
| <i>Vesicula fellea.</i> | 315 | <i>Vitalis & celestis facultatis similitudo præclara.</i> | 5 |
| <i>Vesicula ductus duo.</i> | ibid. | <i>Vitalis facultas quid sit.</i> | 470 |
| <i>Vesicula fellea nomen & substantia.</i> | ibid. | <i>Vitalis facultas non omni animali convenit.</i> | ibid. |
| <i>Vesicula ab Herophilo primum descripta.</i> | 141 | <i>Vitalis facultas an distinguatur à purissima.</i> | 471 |
| <i>Vesicularum semen asseruantium descriptio.</i> | ibid. | <i>Vitreus humor an pars sit.</i> | 577 |
| <i>Verulam præclarum dictum.</i> | 9 | <i>Vitreæ tunica.</i> | 563 |
| <i>Vicium opportunitas.</i> | 457 | <i>Vitreus humor quid, & usus.</i> | 564 |
| <i>Villi ad officialem non priuatam actionem sunt necessarii.</i> | 116 | <i>Vivere quid sit.</i> | 404 |
| <i>Villi quomodo locentur in organis naturalibus.</i> | 117 | <i>Vocis gracilitatem varia quomodo soluat.</i> | 350 |
| <i>Villi cur in tunica venarum.</i> | 119 | <i>Voluntas duplex ab electione & ab instinctu.</i> | 174 |
| <i>Villus non est opus ad priuatam actionem.</i> | 295 | <i>Voluntas duplex.</i> | 499 |
| <i>Villi ad rectitudinem nihil conferunt.</i> | 140 | <i>Voluntas brutorum & infantium ab instinctu est.</i> | 181 |
| <i>Villi recti, obliqui, transversi quomodo agant.</i> | 117 | <i>Voluptas an maior sit viri quam mulieris.</i> | 385 |
| <i>Villi recti non semper ad tractionem.</i> | 296 | <i>Voluptatem hanc cur dormientes sentiant.</i> | ibid. |
| <i>Villorum nomina.</i> | 116 | <i>Voluptatis insignis finalis causa in coitu & seminum effusione.</i> | 384 |
| <i>Villorum definitio.</i> | ibid. | <i>Voluptatis causæ efficientes.</i> | 385 |
| <i>Villorum differentia.</i> | 117 | <i>Voluptatis spiritus cur in aliis partibus sensum non excitant.</i> | ibid. |
| <i>Villorum usus duo, motus & custodia carnis.</i> | 116 | <i>Vomitum in calculo renum cur fit.</i> | 333 |
| <i>Villorum cordis usus.</i> | 467 | <i>Vmbilici dignitas.</i> | 286 |
| <i>Virgineus flos quid sit.</i> | 366 | <i>Vmbilico secto cur pereat animal.</i> | 312 |
| <i>Violentus motus quid, animalis & naturalis.</i> | 473 | <i>Vmbilici partes & nomina.</i> | 271 |
| <i>Visa cerebri vitio.</i> | 571 | <i>Vmbilici vasa quomodo coeant & funiculo ducantur.</i> | 408 |
| <i>Visa oculorum propria.</i> | ibid. | <i>Vmbilico resecto cur moriantur.</i> | 286 |
| <i>Vesformatrix quid possit.</i> | 412 | <i>Vmbilicus centrum occupat corporis.</i> | 38 |
| | | <i>Vngues melioris gratia constructi.</i> | 597 |
| | | <i>Vngues crescunt per appositionem.</i> | ibid. |
| | | <i>Vnguium natura.</i> | 599 |
| | | <i>Vnguium partes.</i> | 597 |
| | | <i>Vnica fit concoctio, tertia scilicet.</i> | 420 |
| | | <i>Vnicus est ductus in cervice vesica.</i> | 320 |

INDEX RERVM ET VERBORVM.

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| <i>Vrachos</i> quid. | 407 | <i>Vteri & mammarum peculiaris consensus.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Veterum</i> per renes distributio. | 329 | <i>Vteri affectus ex mammarum infectioe dignoscitur.</i> | 364 |
| <i>Vrina</i> retenta cur magis foetet. | 301 | <i>Vteri & mammarum via communiois aperitur.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vrina</i> oleosa quid. | 332 | <i>Vteri acetabula & triplex acceptio.</i> | 365 |
| <i>Vrinae</i> retentio & excretio an animalis vel naturalis sint facultatis opera. | 335 | <i>Vteri os an post secundam aut tertium conceptionis mensem possit aperiri.</i> | 416 |
| <i>Vrina</i> nigra duobus modis sunt. | 326 | <i>Vterum reuera moveri sursum & ad latera.</i> | 361 |
| <i>Vrinae</i> triplex materia. | 331 | <i>Vterum odoribus affici.</i> | 362 |
| <i>Vrinarii</i> meatus qui sint. | 334 | <i>Vterus quomodo odores persentiat.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vsus</i> ventricularum cerebri triplex. | 527 | <i>Vterus odores non sentit sub odoris specie.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vsus</i> quid sit. | 24 | <i>Vterus cur exquisitissimi sensus.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vsus</i> quid differat ab actione. | <i>ibid.</i> | <i>Vterus cur oblectatur suavis.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vsus</i> partis duplex est, alter sequitur, alter precedit actionem. | <i>ibid.</i> | <i>Vterus an vim habeat agendi aliquam in conformatione foetus.</i> | 396 |
| <i>Vteri</i> necessitas. | 353 | <i>Vterus quot modis agat.</i> | <i>ibid.</i> |
| sine Vtero potest vivere femina. | <i>ibid.</i> | <i>Vterus secandus statim extincta matre.</i> | 448 |
| <i>Vteri</i> nomina omnia Graeca & Latina. | <i>ibid.</i> | <i>Vterus vna matre tuto etiam secari potest.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vteri</i> membrana quo tempore crassiores sunt. | 354 | <i>Vterus in formatione foetus quid moliat.</i> | 396 |
| <i>Vteri</i> observatio pulcherrima. | 355 | <i>Vterum aperiri putant quidam certis temporibus.</i> | 416 |
| <i>Vteri</i> vasa, venae, arteriae, nervi, ligamenta propria, quae quatuor sunt. | <i>ibid.</i> | <i>Vterum semper hiare alia opinio.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vteri</i> vinculorum usus. | <i>ibid.</i> | <i>Vterus quid & situs, & cur inter vesicam & rectum intestinum est collocatus; magnitudo, figura, substantia, compositio.</i> | 354 |
| <i>Vteri</i> vincula cur laxa. | <i>ibid.</i> | <i>Vterus movetur quoquoersum.</i> | 360 |
| <i>Vteri</i> communia ligamenta. | <i>ibid.</i> | <i>Vuae varie est colorata.</i> | 562 |
| <i>Vteri</i> nomine quid intelligamus. | 356 | <i>Vuae tunica nomina, ortus.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vteri</i> totius divisio in quatuor partes. | <i>ibid.</i> | <i>Vuae varij sunt usus.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vteri</i> prima pars pudendam est. | <i>ibid.</i> | <i>Vuula quid.</i> | 591 |
| <i>Vteri</i> secunda pars. | 357 | <i>Vuula praecisa cur tabidos reddat.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vteri</i> tertia pars. | <i>ibid.</i> | <i>Vuula usus.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vteri</i> os incrassatur & pingui obducitur paulo ante partum. | <i>ibid.</i> | | |
| <i>Vteri</i> oris apertio oclusioque non debuit esse voluntaria, sed naturalis. | <i>ibid.</i> | | |
| <i>Vteri</i> quarta pars. | <i>ibid.</i> | | |
| <i>Vteri</i> cornua. | 358. & 365 | | |
| <i>Vteri</i> triplex motus, naturalis, symptomaticus, missus. | 361 | | |
| <i>Vteri</i> muliebrium omnium cause. | 363 | | |
| <i>Vteri</i> & cerebri sympathia. | <i>ibid.</i> | | |
| <i>Vteri</i> & cordis consensus. | <i>ibid.</i> | | |
| <i>Vteri</i> & hepatis idem. | <i>ibid.</i> | | |
| <i>Vteri</i> & renum consensus quomodo. | <i>ibid.</i> | | |
| <i>Vteri</i> & inguinum ac ossium pubis connexio. | <i>ibid.</i> | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| | X | |
| <i>Xiphoides</i> cur dicatur. | 94 | |
| <i>Xiphoides</i> nomina. | 107 | |
| <i>Xiphoides</i> foramen à paucis observatum. | <i>ibid.</i> | |
| <i>Xiphoides</i> verus usus. | <i>ibid.</i> | |
| <i>Xiphoides</i> ad ventriculi oris tutelam. | 108 | |
| <i>Xiphoides</i> non decidunt ut anicula seclitant. | <i>ibid.</i> | |
| | Z | |
| <i>Zygoma</i> quid, figura, usus. | 78 | |

FINIS INDICIS.

ERRATA QVÆ IN HOC LIBRO
CONTINENTVR, SCILICET.

Pagina 5. lege laryngem linea 40.
pag. 6. lin. 40. lege gradire pro ingredi.
pag. 8. lin. 8. lege tam, pro tum.
pag. 11. lin. 37. lege plures pro totidem.
pag. 11. lin. 3. lege hinc in inde.
pag. eadem lin. 28. lege natura nostra.
pag. 17. lin. 32. lege putem.
pag. 18. lin. 10. lege decem & septem.
pag. 19. lin. 30. dele decimo septima.
pag. 28. lin. 26. adde xxi. & xxi.
pag. 28. lin. 44. pro & lege est.
pag. 35. lin. 29. lege differimus.
pag. 26. lin. 43. lege in quavis non quavis.
pag. 45. lin. 43. lege linamentis.
pag. 48. lin. 33. lege quia pro quis.
pag. 55. lin. 11. pro si enim lege si autem.
pag. 56. lin. 2. lege γεωργίου & γεω.
pag. 64. lin. 24. lege uniuntur pro minuantur.
pag. 66. lin. 37. lege medullarum.
pag. 69. lin. 23. lege pyrrica.
pag. 81. lin. 16. lege exasa non excisa.
pag. 89. lin. 32. lege canit ates non qualitate.
pag. 101. lin. 88. lege basi hac.
pag. 104. lin. 38. lege referenti.

pag. 115. lin. 25. lege allantoides in brutis tantum.
pag. 115. lin. 40. lege vitrea & dele ciliaris.
pag. 130. lin. 33. lege collata pro collocata.
pag. 178. lin. 42. lege eorum motus non est vehemens.
pag. 180. lin. 24. lege cicatur non creatur.
pag. 202. lin. 1. lege molam.
pag. 271. lin. vltima lege ubique non oblique.
pag. 286. lin. 30. dele allantoidem & pone amion.
pag. 310. lin. 31. lege multis velis.
pag. 314. lin. 8. lege ferri non fieri.
pag. 338. lin. 33. lege vasa lumbaria.
pag. 402. lin. 23. lege orbicularem.
pag. 471. lin. 23. lege facultas in eis desideratur, & dele in dies.
pag. 490. lin. 24. dele concuti & lege cor cuti.
pag. 497. lin. 12. lege laboraret non liberaret.
pag. 497. lin. 46. lege carnem.
pag. 510. lin. 23. lege adipe etiam destituitur.
pag. 534. lin. 15. lege ficiior non senior.
pag. 537. lin. 35. lege Autonomo non Automno.
pag. 539. lin. 36. lege insulsum & dele inflatum.
pag. 548. lin. 29. lege constrictione.
pag. 583. lin. 20. lege Alcmeon ideo.

EXTRAICT DV PRIVILEGE
DV ROY.



PAR Privilege du ROY, il est permis au sieur DVLAURENS
Conseiller & Medecin ordinaire de sa Majesté, de faire imprimer
par tel LIBRAIRE ou IMPRIMEVR que bon luy semblera, ses
Oeuures Anatomiques, pour le temps & terme de dix ans. Et defen-
ses sont faictes à tous LIBRAIRES & IMPRIMEVRS, d'impri-
mer ou faire imprimer ledit liure sans son consentement, sur peine de cent
escus d'amende, & de confiscation desdits liures & exemplaires qui sen trouue-
ront imprimez. Et ledit DVLAURENS a choisy pour l'imprimer IAME
METTAYER IMPRIMEVR & LIBRAIRE ordinaire du ROY, &
MARC ORRY aussi LIBRAIRE à Paris. Donné à Fontainebleau le ving-
quattiesme iour d'Octobre, l'an de grace mil cinq cens quatre-vingts dix-neuf.
Et de nostre regne l'onzième.

Signé,

HENRY.

Et plus bas,
Et seellé en Cire jaune sur simple queue.

LOMENYE.